



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibliotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet.

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap som många gånger är svårt att upptäcka.

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig.

Riktlinjer för användning


Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor.

Vi ber dig även att:

- Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke
Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för enskilt, ideellt bruk.
- Avstå från automatiska frågor
Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov.
- Bibehålla upphovsmärket
Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den.
- Håll dig på rätt sida om lagen
Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt.

Om Google boksökning

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk <http://books.google.com/>



7. 345


LSoc 4321.40

Ba. Man. 77











26

12

ÖFVERSIGT

AF

KONGL.

VETENSKAPS-AKADEMIENS

FÖRHANDLINGAR.

TIONDE ÅRGÅNGEN.

1853.

Med fyra Taflor.

10 - //

^c/_h STOCKHOLM, 1854.

P. A. NORSTEDT & SÖNER,
Kongl. Boktryckare.

LSoc 4321.40

1877, Jan. 2.
Gift of the
Academy.

Innehåll.

Föredrag.

	Sid.
ANDERSSON, botaniska bref från Sidney, Cap, m. m.	58, 75, 177.
ARESCHOU, Virginia, ett nytt algsläkte	145.
— — Spongocladia, ett nytt algsläkte	204.
— — Copulationen hos Zygnemaceæ	251.
BJÖRLING, om oändliga serier	147.
EDLUND, om magnetiseradt jerns ledningsförmåga för elektricitet	243.
EDMANN, vattenståndet i mälaren och saltsjön 1774—1852	33.
FRISTEDT, botaniskt om trakten kring Torne träsk	5.
HANMARGREN, foglar i Wermland, Dalsland och Wenern	121.
HYLTÉN-CAVALLIUS, försök med lim	166.
IGELSTRÖM, mineral-analyser	69.
LAGERBUEHL, om Paraffin	117.
LINDMAN, om en definit integral	1.
— — om functioners maxima och minima	98.
— — om ellipsen	237.
— — om jordens afplattning och massa	85.
NILSSON, om Scizæna aquila	70.
RETZIUS, om en döfstum och blindfödd, som talar	267.
ROSENCHÖLD, bref från Paraguay	102.
STÅL, nya svenska Homoptera	174.
— nya Hemiptera från Cafferlandet	209.
— nya genera bland Hemiptera	259.
SURDEYALL, ny art af Branchiostoma	11.
— — Coturnix, Anas falcaria, Acipenser buso, funna i Sverige	227, 228.
THOMSON, Sveriges Palpicornia	40.
WALLENGREN, Skandinavians Hesperioideæ, serdeles sl. Syrictus	19.
— — foglar i nordvestra Skåne	124.
— — nya svenska Lepidoptera	169.
WALLMARK refer. ÅNGSTRÖMS optiska undersökningar	71.
— — och Frih. WREDE, om SCHREUTZ's räknemaschin	228.
ÅNGSTRÖM, om polarisationsplanets betydelse	125.

Inlemnade skrifter.

ANDERSON (Ch. J.), 192; BJÖRKNAN, 192; BOLINDER, 31, 76; BURMAN, 14; CAUSELL, 140; KREUGER, 268; KULLBERG, 31; PFUND, 140; SCHEELE, 64; SCHUMACHER, 140; SMITT, 31; WAHLGREN, 64, 76; WALLMAN, 76, 115; ÅNGSTRÖM, 31, 64.

Akademiska angelägenheter.

Med döden afgångna ledamöter: ARAGO, 192; v. BUCH, 76; GERMAR, 192; GRUBBE, 269; OLIVIER, 191; SWARTZ, 191.
 Invalda ledamöter: ASCHAN, 269; HOLMSTRÖM, 14; NORDENSCHÖLD, 228.
 Det fernerska priset tilldelas Hr BJÖRLING sid. 64.
 BENZELIUS bildstod uppresas på platsen vid Nybron . . . » 140.
 Sekreterarens berättelse på högtidsdagen » 93.

Skänker.

Till Akademiens bibliotek: 14, 31, 83, 115, 141, 192, 229, 269.
 Till Rikets Naturhistoriska Museum:
 Zoologiska afdelningen: 15, 31, 65, 84, 143, 196, 231, 271.
 Botaniska afdelningen: 15, 32, 84, 144, 197, 232, 271.
 Mineralogiska afdelningen: 16, 66, 145, 233.
 Meteorologiska iakttagelser: 16, 66, 145, 233, 273.



ÖFVERSIGT
AF
KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS
FÖRHANDLINGAR.

Arg. 10.

1853.

Ni 1.

Onsdagen den 12 Januari.

Föredrag.

1. *Om definitiva Integralen* $\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax^2}}{a+x^2} dx$. — Hr ED-

LUND föredrog följande meddelande från Hr Lektor LINDMAN i
Strengnäs:

I GRUNERTS Archiv der Math. und Physik Tom. X, pag.
340 (tryckt 1847) anförde Professor SCHLÖMILCH den definitiva
integralen

$$I_1 = \int_0^{\infty} \frac{e^{-b^2 x^2}}{a^2 + x^2} dx,$$

som han transformerat till

$$I_1 = \frac{\sqrt{\pi}}{a} e^{-a^2 b^2} \int_{ab}^{\infty} e^{-t^2} dt$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{a} e^{-a^2 b^2} \left\{ \frac{\sqrt{\pi}}{2} - \int_0^{ab} e^{-t^2} dt \right\}.$$

Emedan han icke nämner, *huru* detta resultat erhållits,
företog jag mig för omkring halftannat år sedan att undersöka
denna integral, hvarvid jag fann, att ett skrif- eller tryckfel
insmygt sig i Professor SCHLÖMILCHS formel, emedan det icke bör
vara $e^{-a^2 b^2}$ utan $e^{+a^2 b^2}$, såsom jag snart skall visa. Jag har
visserligen icke lyckats att finna sjelfva integralen, utan blott

att transformera den till en annan, som synes mig betydligt enklare och hvarpå mekanisk quadratur med temmelig framgång kan användas. Emedan samma behandling kan nyttjas, då exponenten är ett annat helt tal >2 , har jag företagit mig att transformera

$$I_n = \int_0^{\infty} \frac{e^{-cx^n}}{a+x^n} dx, \dots\dots\dots (1)$$

hvärest a och c äro positiva konstanter samt $n \geq 2$.

För det första är tydligt, att I_n är ändlig, emedan den mycket hastigare aftager än den ändliga $\int_0^{\infty} e^{-cx^n} dx$. Lätt finner man vidare, att

$$\int_0^{\infty} \frac{d^n \left(\frac{e^{-cx^n}}{a+x^n} \right)}{dc^2} dx$$

kan uttryckas genom I_n och $\Gamma(\frac{1}{n})$ och således är ändlig, i följe hvaraf differentiation i (1) under \int är tillåtlig. Derigenom fås

$$\begin{aligned} \frac{dI_n}{dc} &= - \int_0^{\infty} \frac{x^n e^{-cx^n}}{a+x^n} dx \\ &= - \frac{\Gamma(\frac{1}{n})}{nc^{\frac{1}{n}}} + a I_n. \end{aligned}$$

Häraf fås den lineära differential-equationen

$$\frac{dI_n}{dc} - a I_n + \frac{\Gamma(\frac{1}{n})}{nc^{\frac{1}{n}}} = 0,$$

genom hvars integration erhålles

$$I_n = e^{ac} \left[C - \Gamma\left(1 + \frac{1}{n}\right) \int c^{-\frac{1}{n}} e^{-ac} dc \right] \dots\dots\dots (2),$$

hvärest C är den arbiträra konstanten. För att bestämma denne, kunde man göra $c=0$ i (1) och (2); men emedan gränssorna äro 0 och ∞ , så måste serskildt undersökas, hvad värdet på I_n för $c=0$ kan vara. Om y insättes i stället för x^n , så har man

$$I_n = \frac{1}{n} \int_0^{\infty} \frac{y^{\frac{1}{n}-1} e^{-cy}}{a+y} dy.$$

Emedan e^{-cy} kan utvecklas i en alltid konvergerande serie, så blir

$$I_n = \frac{1}{n} \int_0^{\infty} \frac{y^{\frac{1}{n}-1}}{a+y} dy - \frac{1}{n} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-1)^{p-1}}{\Gamma(p+1)} \cdot c^p \int_0^{\infty} \frac{y^{p+\frac{1}{n}-1}}{a+y} dy.$$

Som nu

$$\frac{y^{p+\frac{1}{n}-1}}{a+y} = \sum_{r=1}^{\infty} (-1)^{r-1} a^{r-1} y^{p+\frac{1}{n}-r-1} + (-1)^p \frac{a^p y^{\frac{1}{n}-1}}{a+y},$$

så blir

$$c^p \int \frac{y^{p+\frac{1}{n}-1}}{a+y} dy = c^p \sum_{r=1}^{\infty} (-1)^{r-1} a^{r-1} \frac{y^{p+\frac{1}{n}-r}}{p+\frac{1}{n}-r} + (-1)^p c^p a^p \int \frac{y^{\frac{1}{n}-1}}{a+y} dy.$$

För $y=0$ är också $\frac{y^{p+\frac{1}{n}-r}}{p+\frac{1}{n}-r} = 0$. Sätter man $\frac{1}{2}$ i stället för y , så blir

$$\frac{c^p y^{p+\frac{1}{n}-r}}{p+\frac{1}{n}-r} = \frac{c^{r-\frac{1}{n}}}{p+\frac{1}{n}-r} \left(\frac{c}{2}\right)^{p+\frac{1}{n}-r},$$

som tydligen är $=0$ för $c=0$, $\infty=0$. Slutligen är

$$\int_0^{\infty} \frac{y^{\frac{1}{n}-1}}{a+y} dy = \frac{a^{\frac{1}{n}-1} \pi}{\sin \frac{\pi}{n}},$$

som multiplicerad med c^p blir $=0$ för $c=0$. Alltså försvinna alla termer under \sum för $c=0$ och för detta fall blir

$$I_n = \frac{1}{n} \int_0^{\infty} \frac{y^{\frac{1}{n}-1}}{a+y} dy = \frac{a^{\frac{1}{n}-1} \pi}{n \sin \frac{\pi}{n}} \text{ för } c=0.$$

Emedan integralen i (2) äfven försvinner för $c=0$, så blir

7. 345


LSoc4321.40

Ba. Mar. 77











26.5.12

ÖFVERSIGT

AF

KONGL.

VETENSKAPS-AKADEMIENS

FÖRHANDLINGAR.

TIONDE ÅRGÅNGEN.

1853.

Med fyra Taflor.

16 - //

^c/_h STOCKHOLM, 1854.

P. A. NORSTEDT & SÖNER,
Kongl. Boktryckare.

Lappm.), *Rhododendron*, *Juncus biglumis* L., *Carex rupestris* ALL. och *Cystopteris montana* HÄNK. — Härifrån begåfvo vi oss till öfra ändan af träsket. Stranden är här på några ställen brant och klippig. I hållarnas springor gömma sig flere fjällväxter, bland hvilka *Gentiana tenella* ROTTB. (ny för Torn. Lappm.) och *Draba rupestris* LINDBL., äro de utmärktaste. — Från denna punkt begåfvo vi oss på vandringen öfver fjällen till Norska kusten. De växter, som funnos på denna vandring, äro öfverhufvud de samma, som finnas på fjällen kring träsket. Blott några få arter voro för fjällryggen egendomliga, nemligen på Svenska sidan: *Alchemilla alpina* L., *Juncus arcticus* WILLD. (ny för Torn. Lappm.) och *Carex saxatilis* L. och på den Norska: *Erigeron alpinus* L., *Hieracium corymbosum* Fr., *Primula scotica* HOOK., *Draba alpina* L., *Saxifraga adscendens* och *Salix pyrenaica: norvegica* Fr. samt dessutom ymnigare än på Svenska sidan: *Gentiana tenella* ROTTB. (ny för Nordlanden) och *Juncus arcticus* WILLD. På Norska stranden vid Ofotenfjorden funnos bland de vanliga hafsväxterna *Gentiana serrata* ROTTB., *Halianthus oblongifolius* TORR. & GR. *Carex salina: cuspidata* WNG., *C. incurva* LIGHTF. m. fl. — Sedan vi vid gården Fagernæs förskaffat oss brödförråd, vände vi tillbaka öfver fjällen till stränderne af Torneå träsk. Först gjorde vi några excursionser i subalpina regionen och styrde sedan kosan till det sydvest om träsket belägna fjället Nuljalaki. Detta vackra och tillika högsta af de besökta fjällarne hade den rikaste vegetationen bland alla. Här växte nemligen icke blott de flesta ofvan anförda sällsynta arter, utan tillika flera endast på detta ställe under hela resan anträffade. Dessa äro: *Wahlbergella affinis* (J. VAHL.) (ny för Sveriges flora), *Oxytropis lapponica* (WNG.), *Carex parallela* SOMF., *Cobresia scirpina* WILLD. (ny för Torn. Lappm.) och *Triticum violaceum* HORN. (ny för Svenska Lappland).

Från detta fjäll återvände vi direkte till Rattowuoma och styrde kosan till medlersta södra delen af träsket. Härinvid reser sig fjället Kaisapakta. Detta är i synnerhet på den mot

sjön vända sidan mycket brant, och då det tillika har en betydlig höjd, synes det på långt afstånd, t. o. m. nere vid Kurrawaara. Bland de här förekommande växterna förtjena att nämnas: i björkregionen: *Polemonium caeruleum* L. och *Stellaria alpestris* Fr. samt på sjelfva fjället: *Ranunculus glacialis* L., hvars under blomningen hvita kronblad nu genom åldern blifvit mörkröda, omslutande den mogna frukten, *R. acris: pumilus* Hn., *Carex fuliginosa* SCHER., *Calamagrostis lapponica* WNG., *Hierochloa alpina* Sw., *Poa alpina: alpestris* (vivipara) ANDS. GRAM., *Polypodium alpestre* HOPPE och *Allosorus crispus* (L.) (ny för Torneå Lappm). — Detta var det sista fjäll, vi besökte; ty vintern syntes redan vara i antågande och de flesta växter voro öfverblommade både i alpina och subalpina regionen. Vi drogo oss så småningom mot sydvestra ändan af träsket och insamlade åtskilliga vid stränderna befintliga växter, hvaribland må nämnas *Umbilicaria cylindrica* (L.) samt en ovanligt låg och späd form af *Aira caespitosa* L. Den trettonde Augusti uppnådde vi Tarrakoski eller den mäktiga fors, som är början till Torneå elf, och togo farväl af den intressanta fjällvegetationen kring Torneå träsk».

3. Ny art af *Branchiostoma*. — Några månader sedan Coopv.-kapten WERNGRENS upptäckt af en ny art af *Branchiostoma*, vid Peru, hade blifvit meddelad för Akademien *) återkom han från en ny resa till Brasilien och Vestindien, samt medförde, såsom vanligt, en samling af naturalster, som han förärade till Riksmuseum. Deruti förekommo åter några exemplar af samma märkvärdiga slägte, hvilka, vid närmare granskning befunnos ega betydliga olikheter med de förut kända arterna, och utvisa, att en art finnes i Atlantiska hafvet utmed Amerikas kuster, som är skild både från den europeiska och från den peruanska. Denna art skiljer sig vid första påseendet från

*) Se Öfversigten 1852, p. 147, hvarest namnet *Amphioxus* bör utbytas mot *Branchiostoma*.

de öfriga kända, genom läget af analöppningen, nära intill stjertspetsen. Hr WERNGREN hade hemfört exemplar både från St Thomas i Vestindien och från hamnen vid Rio Janeiro, och flera andra, af samma art, hafva nyligen blifvit hemsända af Doktor KINBERG, som funnit dem vid Plataflodens mynning. Hr SUNDEVALL förevisade exemplaren och lemnade följande beskrifning på den nya arten samt en, genom jämförelsen dermed, förbättrad karakteristik af de förut beskrifna.

Branchiostoma caribæum musculis corporis utrinque ($37 + 14 + 9 =$) 60; cauda pone anum brevissima ($\frac{1}{17}$ totis longit:); pinna supra caudam vix altiore.

Crassities corporis similiter variabilis ut in sp. europæa; caput et cauda paullo angustiora apparent. Lobus pinnæ subcaudalis multo humilior; supracaudalis vix ullus; pinna supra apicem caudæ sensim decrescit et desinit, apicem non cingens. Musculi corporis, ab antica parte ad juncturam carinarum ventris lateralium, 37 numerantur; 38vus mox pone juncturam, ad initium pinnæ præ-analis descendit. Anus inter apices ventrales musculorum, post juncturam, 14mi paris invenitur; (h. e. juxta musc. a rostro 51, ab apice caudæ, 10um.). Pone anum musculi 9 in marginem ventralem descendunt. Apex postremus corporis (chordæ dorsalis) musculis, ut videtur, carens, brevissimus, vix æqualis spatio musculi ultimi. Musculi, in medio corpore, 6 æquant longitudinem $\frac{1}{2}$ corporis ($4\frac{1}{2} = \frac{1}{10}$ corp:s). Cirri oris evidentes, antice plerumque prominuli, in margine utriusque labii 15. Cartilagine pinnæ dorsalis, ut in sp. europæa, crassæ, contiguæ, obtusæ; anticæ angustiores; dein sensim paululum auctæ; in cauda, ubi desinunt, paululum crassiores quam in medio corpore; neque rationem musculorum sequi videntur.

Specimina, ex insula Antillarum St Thomas et ex Rio de Janeiro allata, 35—21 millim. longa; quædam ovariis sat explicatis prædita. Alia, ex ostio fluminis Plata, usque ad 51 mm. longa, ovariis plerumque minus explicatis.

Comparatione denuo instituta liceat characteres emendatos reliquarum hujus generis specierum ita proponere:

Br. lanceolatum (Eur. septentr.) musculis corporis utrinque ($36 + 14 + 11 =$) 61; pinna, in cauda, supra subtusque alta, apicem cingente. — Cauda, pone anum (præter pinnam) longitudine æqualis $\frac{1}{2}$ totius corporis. Pone anum musculi 11 in marginem ventralem descendunt; anus igitur inter musculos 12mi et 13mi paris situs. Apex caudalis, musculis carens, brevis, spatio m. ultimi parum longior. Musculi medii $6\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ corporis ($5\frac{1}{2} = \frac{1}{10}$ corp:s).

Br. elongatum (Peru) (Vet. Ak. Öfv. 1852, 147) musculis corporis utrinque ($49 + 18 + 12 =$) 79. — Pinna, ad caudam, supra subtusque paullo altior; cauda, pone anum, $= \frac{1}{2}$ corporis. Pone anum musculi 12 in marginem ventralem descendunt; apex vero corporis, post musculos, longior, æqualis spatio 2 vel 3 musculorum (ibi quoque

interdum observantur macula una, vel duæ obscuriores, in descriptione, prius data, pro musculis numeratæ). Musculi medii 9= $\frac{1}{8}$ corporis ($7=\frac{1}{10}$).

Enligt uppgift af J. MÜLLER, i hans afhandling om Branchiostoma (Berl. Abh. 1841, 397), har KRÖYER från Brasilien hemfört en art af detta slägte, som på anförda ställe provisoriskt blifvit kallad *Br. muelleri*. Så vidt jag känner har den aldrig blifvit beskrifven, men då MÜLLER uttryckligen säger sig icke hafva funnit någon olikhet hos den, med den europeiska arten, tyckes detta utvisa, att den europeiska arten äfven finnes på amerikanska sidan. Möjligtvis kunde det ock vara den här beskrifna *Br. caribæum*, hvilken dock vid jemförelse lätt igenkännes såsom skild art.

4. *Naturaliesamlingar.* — Hr MOSANDER meddelade underrättelser ur bref från Hr D:r HEDENBORG på Rhodus och Hr PEDRO NISSER i republiken nya Granada. Den förre, som altjemt fortsätter sina forskningar och ämnar utgifva en Fauna Rhodiaca, har gjort betydliga insamlingar af öns naturalster, af hvilka tretton stora packor vexter komma att afskickas till Hr P. WAHLBERG, tre stora lådor, innehållande flere tusende insekter, till Hr BOHEMAN och en vacker samling hafssvampar till Hr ARESCHOU, och hvilka samlingar, efter skedd undersökning, skola öfverlemnas till det under Akademiens vård ställda Riksmuseum.

Hr NISSER omnämner, att han i nya Granada gjort en insamling af insekter, hvilka, under loppet af detta år kommer att öfver Panama afsändas till Akademiens disposition.

Akademiska angelägenheter.

Till ledamot i nionde klassen kallades genom anställt val Erkebiskopen, C. m. st. K. N. O., Dr H. O. HOLMSTRÖM.

Inlemnad afhandling.

Hr Assessoren E. BURMAN: Meteorologiska observationer i Nederkalix.

SKÅNKER.

Till Vetenskaps-Akademins Bibliothek.

Af Franska Regeringen.

Annales des Mines. 1852. Livr. 3.

Af K. Danske Videnskabernes Selskab.

Skrifter. 5:te Række. Histor. og philos. Afdel. B. I. Kbhvn 1852.

Af K. Preuss. Akademie der Wissenschaften i Berlin.

Abhandlungen aus dem J. 1850. Berlin 1852. 4:o.

Monatsbericht. 1851: Juli—Dec. 1852: Jan.—Juni.

Af Royal Society i Edinburg.

Transactions. Vol. XX. P. 3. Edinb. 1852. 4:o.

Proceedings. Vol. III. N:o 42. 1852. 8:o.

Af K. Nederland. Instituut i Amsterdam.

Verhandelingen. Derde Reks. Deel V. Amsterd. 1852. 8:o.

Jaarboek. 1851. Amsterd. 1852. 8:o.

Tijdschrift. Deel 5. Aflev. 1—3. Amsterd. 1851—52. 8:o.

Af Académie Roy. de Belgique i Brüssel.

Mémoires. T. XXVI. Brux. 1851. 4:o.

— — couronnés et des sav. étr. T. XXIV. 1852. 4:o. — T. V.
P. 1. 1852. 8:o.

Bulletin. 1851: 2. 1852: 1, 2. 8:o.

Annales de l'Observatoire roy. de Bruxelles. T. VIII: 2. T. IX.
Brux. 1852.

Annuaire de l'Acad. 18:e Année. 1852. 12:o.

— — de l'Observatoire. 19:e Année. 1852. 12:o.

Af Société Géologique de France i Paris.

Bulletin. T. IX: f. 20—27. Table génér. du T. VIII. Paris 1852. 8:o.

Af Hr Quetelet i Brüssel.

Observations des phénomènes périodiques. 1850. 4:o.

Af Utgifvaren.

Nya Botaniska Notiser. 1852. Nr 11, 12. Med titel. 8:o.

Af Gottlands Hushållnings-Sällskap.

Under hvilka förhållanden kan en regering finna sig föranlåten, att i större eller mindre mån taga vård om privata skogars behandling? Af Fa. SCHUEBERG. Wisby 1852. 8:o.

Berättelse till Gottlands Läns Hushållnings-Sällskap för år 1851. Wisby 1852. 8:o.

Till Btkets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Hr Grefve G. F. Wirsén.

En Lanius excubitor, och

En Fringilla carduelis.

Af Frih. Anders och Conon Cederström.

Fem st. ägg af Psittacus pullarius.

Botaniska Afdelningen.

Af Hr G. L. Sjögren.

Talrika exemplar af Elsholtzia cristata WILLD., förvildad vid Byresta nedre qvarn, Grödinge Socken i Södermanland, samt sex mossarter från samma socken, och en Calebasse-frukt hemförd från Portugal af Sjökaptenen EHLENT.

Af Studeranden Hr B. F. Fristedt.

Tjugo odlade växtarter af familjerna Compositæ och Caryophyllæ.

*Meteorologiska Observationer i Stockholms Observatorium
i November 1852.*

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkingar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,39	25,59	25,70	— 2°0	— 0°6	— 1°8	N.	N.N.O.	N.N.O.	Mulet
2	25,68	25,58	25,39	— 1,7	+ 3,0	+ 2,0	O.N.O.	S.	S.S.O.	Regn
3	25,18	25,03	25,27	+ 3,4	+ 4,1	+ 2,0	S.S.O.	V.N.V.	V.	Snö
4	25,37	25,38	25,39	+ 3,0	+ 5,9	+ 4,0	V.	V.S.V.	V.S.V.	Dimma
5	25,52	25,67	25,78	+ 2,0	+ 1,0	— 3,1	N.N.O.	N.	N.	Mulet
6	25,86	25,81	25,77	— 3,0	+ 0,4	— 0,8	O.	O.S.O.	O.S.O.	Snö
7	25,73	25,66	25,50	— 0,9	+ 0,1	+ 4,0	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	—
8	25,19	25,11	24,94	+ 8,0	+ 10,2	+ 9,6	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Mulet
9	24,78	24,96	25,08	+ 2,0	— 2,3	— 4,1	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	—
10	25,17	25,30	25,37	— 2,5	— 1,0	— 6,8	N.	N.	N.N.V.	Halfkl.
11	25,31	25,23	25,15	— 8,2	— 3,5	— 4,0	V.	V.	V.	Klart
12	25,21	25,30	25,33	— 8,0	— 7,2	— 10,1	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	—
13	25,13	25,12	25,09	— 4,3	— 2,0	— 4,1	V.	V.N.V.	V.N.V.	Mulet
14	25,15	25,26	25,32	— 8,2	— 6,1	— 11,0	N.N.V.	N.V.	V.N.V.	Klart
15	25,41	25,48	25,51	— 12,9	— 6,3	— 4,3	N.V.	N.V.	O.	—
16	25,46	25,37	25,29	— 1,6	— 0,7	+ 0,6	O.S.O.	O.S.O.	O.S.O.	Snö
17	25,24	25,25	25,28	+ 2,3	+ 3,6	+ 3,1	S.O.	S.O.	O.S.O.	Regn
18	25,14	25,04	25,06	+ 2,0	+ 3,4	+ 2,1	O.S.O.	O.S.O.	V.S.V.	—
19	25,04	25,04	25,00	+ 3,5	+ 4,4	+ 4,5	S.S.V.	S.S.V.	V.S.V.	—
20	25,07	25,18	25,27	+ 0,1	— 0,8	— 2,8	N.N.V.	N.N.V.	N.	Snö
21	25,28	25,29	25,29	— 4,1	— 2,8	— 1,3	N.	N.	O.N.O.	Mulet
22	25,27	25,23	25,16	— 2,0	— 1,5	— 2,0	O.	O.	O.	—
23	25,05	24,98	24,87	+ 1,0	+ 2,7	+ 3,6	O.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	Regn
24	24,79	24,93	25,03	+ 1,2	+ 2,8	+ 3,0	V.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	Halfkl.
25	25,20	25,38	25,57	— 1,8	— 2,6	— 2,8	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Klart
26	25,70	25,78	25,79	— 7,0	— 4,0	— 6,7	N.	N.N.V.	N.N.V.	—
27	25,66	25,52	25,40	— 0,8	+ 0,5	+ 2,1	O.S.O.	S.S.O.	S.	Snö
28	25,31	25,36	25,43	+ 3,0	+ 4,0	+ 1,5	S.	S.	S.	Mulet
29	25,46	25,49	25,51	+ 3,0	+ 3,9	+ 3,0	S.	S.	S.S.O.	—
30	25,47	25,45	25,47	+ 2,3	+ 3,0	+ 3,0	S.S.O.	S.S.V.	S.S.V.	—
Me- dium	25,307	25,326	25,334	— 1°08	+ 0°39	— 0°59	Nederbörden = 1,947 dec. tum			
	25,322			— 0°43						

i December 1852.

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkning- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,48	25,47	25,46	+ 2,7	+ 3,0	+ 0,9	S.S.V.	S.V.	S.V.	Mulet
2	25,32	25,24	25,11	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,5	S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
3	24,94	25,02	25,17	+ 1,1	+ 2,0	— 0,8	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Snö
4	25,27	25,32	25,35	— 3,2	0,0	— 3,7	V.S.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klart
5	25,33	25,23	25,12	— 6,6	— 2,1	— 2,0	—	V.S.V.	V.S.V.	Dimma
6	25,04	25,14	25,14	— 2,8	— 5,6	— 8,2	V.N.V.	V.N.V.	V.	Klart
7	25,27	25,44	25,56	— 5,8	— 3,8	— 7,4	V.N.V.	N.N.O.	N.N.O.	Mulet
8	25,58	25,57	25,48	— 8,0	— 3,8	— 4,0	S.	S.V.	O.	—
9	25,25	25,11	25,11	— 2,0	0,0	— 1,0	O.	O.	O.N.O.	Snö
10	25,26	25,38	25,45	— 0,8	— 0,8	— 1,5	O.N.O.	O.N.O.	O.S.O.	—
11	25,34	25,26	25,21	+ 1,2	+ 3,2	+ 5,2	S.	S.S.V.	S.S.V.	Mulet
12	25,20	25,19	25,19	+ 6,9	+ 6,2	+ 4,6	S.S.V.	S.V.	S.V.	—
13	25,08	25,06	25,22	+ 4,5	+ 7,0	+ 3,7	S.S.V.	S.S.V.	V.	—
14	25,27	25,21	25,09	+ 1,4	+ 1,9	+ 4,3	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	Dimma
15	25,06	25,01	24,97	+ 4,8	+ 4,2	+ 5,1	S.S.V.	S.S.V.	V.	—
16	24,89	24,91	24,88	+ 3,6	+ 5,1	+ 5,0	S.	S.S.V.	S.S.V.	Regn
17	24,82	24,82	24,73	+ 5,2	+ 3,2	— 0,1	S.S.V.	S.S.V.	N.N.O.	Snö
18	24,97	25,18	25,41	— 3,5	— 4,5	— 6,7	N.	N.N.V.	N.V.	Klart
19	25,57	25,79	25,84	— 8,0	— 5,0	— 6,6	N.N.V.	N.	O.	—
20	25,69	25,43	24,95	— 3,0	— 2,1	0,0	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	Regn
21	24,48	24,59	25,58	0,0	— 1,0	— 2,3	N.N.V.	V.	V.	Halfkl.
22	24,82	24,97	25,13	— 9,0	— 8,0	— 5,1	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Snö
23	25,27	25,30	25,43	— 10,5	— 5,4	— 8,5	N.N.V.	N.N.V.	V.N.V.	Halfkl.
24	25,51	25,51	25,40	— 10,8	— 5,0	— 4,1	V.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	—
25	25,14	25,03	24,66	— 1,0	+ 1,6	+ 3,5	V.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Mulet
26	24,93	25,08	25,12	+ 1,0	+ 3,1	+ 1,9	V.	V.	V.S.V.	Halfkl.
27	25,14	25,09	24,68	+ 2,3	+ 2,5	+ 5,2	V.S.V.	S.	S.	Regn
28	24,63	24,75	25,00	+ 6,2	+ 5,8	+ 3,7	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Klart
29	25,00	25,05	25,36	+ 2,0	+ 4,0	— 1,1	V.S.V.	V.S.V.	N.	Regn
30	25,53	25,43	25,27	— 2,0	+ 0,5	+ 3,2	S.S.O.	S.S.O.	S.	—
31	25,23	25,35	25,47	+ 5,0	+ 5,0	+ 4,4	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Halfkl.
Me- diam	25,171	25,193	25,179	— 0,842	+ 0,455	— 0,309	Nederbörden = 1,283 dec. tum.			
	25,181			— 0,232						

*Sammandrag af meteorologiska observationerna å Stockholms
Observatorium år 1852.*

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.				Thermometern Celsius.				Nederbörd.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Me- dium.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Me- dium.	
Januari .	25,270	25,263	25,260	25,264	— 2°06	— 0°90	— 1°42	— 1°46	1,143
Februari	340	346	346	344	— 5,43	— 2,55	— 4,62	— 4,20	0,039
Mars . .	517	520	523	520	— 4,09	+ 1,70	— 1,21	— 1,20	—
April . .	641	660	648	653	— 1,67	+ 4,06	— 0,46	+ 0,64	—
Maj . . .	502	496	504	501	+ 9,73	+ 14,84	+ 8,68	+ 11,08	0,367
Juni . . .	428	423	419	423	+ 15,28	+ 18,49	+ 14,61	+ 16,13	3,276
Juli . . .	525	522	524	524	+ 18,35	+ 23,43	+ 18,03	+ 19,94	0,065
Augusti .	466	472	471	470	+ 16,48	+ 21,08	+ 16,14	+ 17,90	2,436
Septemb.	374	357	346	359	+ 10,18	+ 15,85	+ 11,99	+ 12,67	0,579
Octob. . .	341	372	382	465	+ 2,24	+ 5,01	+ 2,59	+ 3,28	1,696
Novemb.	307	326	334	322	— 1,08	+ 0,39	— 0,59	— 0,43	1,947
Decemb.	171	193	179	181	— 0,84	+ 0,46	— 0,31	— 0,23	1,283
Medium	25,407	25,412	25,411	25,410	+ 4°75	+ 8°49	+ 5°29	+ 6°18	12,834

Tryckfel i »Öfversigten» Sept. 1852:

Sid. 177, rad. 5 står: $\text{Log}_\beta^{(x)}$, läs: $\text{Log}_\beta(x)$.

ÖFVERSIGT
AF
KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS
FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1853.

N. 2.

Onsdagen den 16 Februari.

Föredrag.

1. *Skandinaviens HESPERIOIDÆ, med särskild hänsyn till arterne af släktet SYRICHTUS.* — En under denna titel insänd uppsats af S. M. Adjunkten H. D. J. WALLENGREN inlemnades af Hr BOHEMAN.

»*Hesperioidæ*, som onekligen böra skiljas från öfriga dagfjärilar uti egen familj och icke, ehuru af LINNÉ förda till det atrika släktet *Papilio*, sammanfattas med dem under det gemensamma namnet *Papiliones*, äro hittills föga utredda i anseende till de arter, som vår halfö fostrar. Genom de undersökningar, som jag för utarbetande af en beskrifning om våra dagfjärilar förlidet år företagit, har jag, rörande de genera och arter af denna familj, hvilka böra räknas till vår fauna, kommit till det resultat, som jag i följande uppställning tager mig friheten framlägga.

Ehuru alla till familjen hörande arter onekligen å ena sidan hafva stor likhet sinsemellan, och derföre med större svårighet än öfriga dagfjärilar låta med bestämda och tydliga karakterer söndra sig i naturliga genera, finnas dock å andra sidan så väl i lefnadssätt som i färgteckning m. m. skiljagheter, som berättiga till en sådan delning. Detta har redan af flera författare, i synnerhet af Franska skolan, blifvit insedt och erkänt.



Sedan slägtnamnet *Hesperia*, som FABRICIUS gaf gemensamt åt *Lycenoidæ* och *Hesperiodæ*, blifvit af LATREILLE användt för de sednare, hafva dessa länge varit betraktade såsom ett enda slägte. OCHSENHEIMER följde LATREILLE och använde det af honom föreslagna slägtnamnet. Likaså DALMAN och ZETTERSTEDT, äfvensom BOISDUVAL uti Index Methodicus. Också DUMERIL ansåg de europeiska arterne utgöra endast ett slägte, men kallade detta: *Heteropterus*. Sednast har äfven HERRICH-SCHÄFFER i sitt utmärkta arbete följt samma method, utan att, såsom han eljest gör, fästa sig vid vingnervernas olikhet arterne emellan, och använt det generiska namn, som LATREILLE gifvit.

FABRICIUS var den förste, som företog en delning i genera af de sammanställda arterne. Uti sitt *Systema Glossatorum* (ILLIG. Mag. VI. B.) har han bibehållit namnet *Hesperia* för en del utomeuropeiska arter af de egentliga Papiliones, och, hämtande, såsom vanligt hos honom, karakterer nästan uteslutande af mundelarne, låtit alla sina förra till samma genus förda *urbicolæ* sönderfalla i trenne släkten: *Thymele*, *Helias* och *Pamphila*. Af dessa omfattar det förstnämnda, »med treledade palper», största delen af de honom bekanta Hesperioider med stjärtlilik förlängning af bakvingarne och en del af dem, som sakna sådan, bland hvilka må nämnas hans *P. malvæ* och LINNÆS *P. tages*. Till släktet *Helias* förde han blott en enda och utom-europeisk art. Släktet *Pamphila* deremot, hvilket han likväl origtigt karakteriserar såsom skulle det blott ega »tvåledade palper», öfverseeende den visserligen korta men dock tydliga basleden, innefattar bland andra äfven hans arter *P. comma*, *paniscus* och *fritillum*. BOISDUVAL deremot söndrade familjen, hvad de europeiska arterna vidkommer, uti fyra släkten, utgående från olikheterna i metamorfosen, så vidt denna var känd, och stödjande sig hufvudsakligen dels på det olika sätt, hvarpå arterna under hvilat lägga vingarne, dels uppå olikheterna uti antennklubbans form och dess beskaffenhet i spetsen. Ehuru han icke uti sina generiska diagnoser upptog de kännetecknen, som fötterna och vingnerverna erbjuda och som utan tvifvel äro

ganska användbara, i synnerhet som olikhetera i vingnerverna hos fjärilarne ofta stå i nära sammanhang med skiljagheter i metamorfos och lefnadsätt, emedan vingarne äro ett organ, som hos dem blifvit utveckladt på andras bekostnad, om man eljest så kan uttrycka sig, blifva dock de af honom fastställda släkten högst naturliga och må derföre i vetenskapen behållas. Han benämnde dem: *Steropes*, *Hesperia*, *Syrichthus* och *Thanaos*. DUPONCHEL har också i supplementet till GODART's *Lepidoptères de France* hufvudsakligen bibehållit dessa genera, ehuru han för det förra måst använda det för alla europeiska Hesperioider af DUMERIL gifna namnet: *Heteropterus*, och från *Syrichthus*, måhända mindre lyckligt, afskilt *P. malvæ* FABR., *P. altheæ* och *lavateræ* HÜBN. under namn af *SPILOTHYRUS*.

Steropes, *Hesperia* och *Syrichthus* BOISD. utgöra tillsammans FABRICII slägte *Pamphila*, hvilket namn likväl för ingendera af dem bör bibehållas, såsom varande snarlikt det af LATREILLE redan 1802 åt ett Hymenopter-slägte gifna namnet: *Pamphilius*. Namnet *Steropes* kan icke eller behållas, emedan samma namn år 1806 blifvit tilldeladt ett slägte bland *Coleoptera*, hvarföre man här måste med DUPONCHEL upptaga det namn, som DUMERIL användt. Slägtet *Thanaos* innefattar endast tvenne europeiska arter, hvaraf den ena äfven är Skandinavisk; för öfrigt höra dit en del Nord-Amerikanska. Den Skandinaviska är: *P. tages* LIN. Väl har redan FABRICIUS förordat denna fjäril med sitt slägte *Thymeles*, men detta namn kan endast bibehållas för den del af de arter, som hafva stjärtliskt förlängda bakvingar, emedan dessa, såsom första gruppen inom slägtet, äro typer för detsamma.

Utaf ifrågavarande familj har DALMAN uti sin Beskrifning af Sveriges Dagfjärilar, intagen i Kongl. Vet. Akademiens Handlingar för år 1816, upptagit 6 arter såsom Svenska: *H. Linea*, *Comma*, *sylvanus*, *malvæ*, *fritillum* och *tages*, af hvilka Prof. ZETTERSTEDT uti *Insecta Lapponica* äfven uppför de trenne såsom lappska. Bland öfriga af DALMAN på uppgifna stället beskrifna arter voro de tvenne, *H. paniscus* och *sylvius*, blott

kända såsom Finska, och en art uppfördes såsom tvifvelaktig för vår fauna: *H. malvarum*, hvilken ej eller sedan dess blifvit inom Skandinavien nuvarande område funnen, utan bör tills vidare utgå från vår fjärl-lista. Af de tvenne Finska arterna har Prof. BOHEMAN visat, att *H. sylvius* äfven tillhör vår fauna, hvilken således har att med säkerhet uppvisa 7 af de utaf DALMAN beskrifna, till denna familj -hörande fjärlilar. Härtill kommer en art från Gottland, som Prof. BOHEMAN uti Kongl. Vet. Akademiens Förhandlingar för år 1847 ådagalagt böra skiljas från DALMANS *H. fritillum*, och dessutom, enligt följande uppställning, ytterligare trenne: *H. lineola*, *S. serratulæ* och *andromedæ*, så att vår fauna för närvarande har af denna familj inalles 11 arter, hvilka fördelas i följande med korta karakterer angifna genera:

- A. Tibiæ pedum posticorum calcaribus duobus. (Costa 7 et 8 alarum anticarum ad basin approximatae) HETEROPTERUS.
- B. Tibiæ pedum posticorum calcaribus quatuor.
 - 1. Costa 7 et 8 alarum anticarum ad basin approximatae.
 - a. Costa 5 alarum anticarum e plica transversa cellulæ oriens et basi ad costam 4 propius accedens. Ex apice cellulæ discoidalis posticarum plica tenuissima, haud distincta, egreditur HESPERIA.
 - b. Costa 5 alarum anticarum e plica transversa cellulæ, sed exacte in medio inter costam 4 et 6 oriens. Ex apice cellulæ discoidalis posticarum plica sat distincta egreditur STRICHTUS.
 - 2. Costa 7, 8 et 9 alarum anticarum ad basin approximatae. (Costa 5 in medio inter costam 4 et 6 e plica transversa cellulæ oriens THANACUS.

I. Gen. HETEROPTERUS (DUM.) DUP.

(*Hesperia* LATR. OCHS. DALM. *Pamphila* FABR. *Steropes* BOISD.)

Species unica Scandinaviæ,

H. sylvius (KNOCK), ad Howe Norvegiæ a Celeb. BOHEMAN mense Junio captus.

Syn. PAP. *sylvius* KNOCK. Beytr. I. St. t. 5. f. 1. 2. p. 71.
 HÜBN. Pap. t. 94. f. 477. 478. Text p. 72. 12. HESPERIA
 OCHS. Schm. I. 2. p. 221. DALM. Pap. Sv. 201. 5. GOD.
 et DUP. Lepid. II. 214. pl. 27. f. 1. 2. PAP. *pantiscus* var.
 β. FABR. E. S. III. 1. 328. 242.

II. Gen. HESPERIA (LATR.) BOISD.

(*Hesperia* OCHS. DALM. ZETT. *Heteropterus* DUM. *Pamphila* FABR.)

A. *Clava antennarum apice obtuso, non hamato.*

1. *H. lineola* (SCRIBA): alis supra fulvis, anticis maris lineola nigra tenerrima in disco, feminae immaculatis; posticis infra griseo-flavidis, margine interiore flavido; clava antennarum infra apice nigerrima.

Syn. PAP. *lineola* SCRIBA Journal III. St. p. 244. HESPERIA OCHS. Schm. I. 2. 230. IV. 34 & 161. BOISD. Icon. p. 243. pl. 47. f. 4. 5. PAP. *virgula* HÜBN. Pap. t. 130. f. 660—663.

Hab. in Scania ad Trolle Ljungby, Sjöbo et Kåseberga sat vulgaris mensibus Julio et Augusto, præsertim in locis Trifolio repletis.

2. *H. linea* (W. V.): alis supra fulvis, anticis maris linea nigra in disco, feminae immaculatis; posticis infra flavo-griseis macula flava ad marginem anteriorem; clava antennarum infra apice fulvo.

Syn. PAP. *linea* W. V. 160. F. A. n. 5. HÜBN. Text. 72. 16. pl. 96. f. 485—487. FABR. E. S. III. 1. 326. 236. HESPERIA OCHS. Schm. I. 2. 228. IV. 34. TREITSCH. X. 1. 97. DALM. Pap. Sv. 200. 1. GOD. et DUP. Lepid. I. 233. pl. 12. tert. f. 2. PAP. *thauwas* ESP. Schm. I. t. 36. S. 12. f. 2 3. p. 344. PAP. *venula* HÜBN. Pap. t. 131. f. 666—669.

Hab. in Scania rarius. Mihi non obvia. Specimen unicum, a Prof. SUNDEWALL olim captum, tantum vidi.

B. *Clava antennarum apice hamato.*

3. *H. comma* (LIN.)

Syn. PAP. *comma* LIN. F. Sv. 285. 1080. HÜBN. Pap. t. 95. f. 479—481. FABR. E. S. III. 1. 325. 233. HESPERIA OCHS. Schm. I. 2. 224. IV. 34. DALM. Pap. Sv. 201. 3. ZETT. Ins. Lapp. 915. 3. GOD. et DUP. Lepid. I. 237. pl. 12. tert. f. 4. H. S. Text. I. 159.

Hab. ubique vulgaris mensibus Junio—Augusto.

4. *H. Sylvanus* (ESP.)

Syn. PAP. *sylvanus* ESP. Schm. I. t. 36. S. 12. f. 1. p. 343. HÜBN. Pap. t. 95. f. 482—484. Text. 72. 14. FABR. E. S. III. 1. 326. 237. HESPERIA OCHS. Schm. I. 2. 226. IV. 34. DALM. Pap. Sv. 201. 2. GOD. et DUP. Lepid. I. 235. pl. 12 secund. f. 2. H. S. text. I. 159.

Habitat non infrequens in Scania — Westmannia Sueciæ et in Norvegia meridionali (ex. gr. Christiania, Østerdalen et Gudbrandsdalen) mensibus Julio et Augusto.

III. Gen. SYRICHTUS BOISD.

(*Hesperia* LATR. OCHS. DALM. ZETT. *Heteropterus* DUM. *Pamphila* FABR.)

- A. *Macula alba inter costam 1 et 2 in parte inferiori alarum posticarum fere æquales (postica basali non major).*

1. *S. centaurea* (Bonn.): alis supra obscure fuscis, in nigredinem vertentibus, maculis quadratis albis, posticarum obsoletioribus; anticis infra fuscis, cinereo obductis, maculis albis ut in parte superiore lineisque longitudinalibus inter limbum albidum et seriem macularum; posticis subtus nigricantibus, haud virescentibus, costis albidis, maculis basalibus albis, serie macularum albidarum continua margineque inferiore nigro-cinereo; clava antennarum infra obscure brunnea. Long. al. exp. 32—33 millim.

Syn. *STRICTUS centaurea* BOISD. *HESPERIA* H. S. Text. I. 455. pl. 1. f. 1—3. *Hesp. fritillum* DALM. Pap. Sv. 202. 7. (certe; species alia in Museo ejus non existit). ZETT. Ins. Lapp. 914. 1. ex parte. *Hesp. alveus* GON. et DUP. Lepid. Suppl. I. 259. pl. 42. f. 3. 4.? (excl. synon.)

Hab. in Lapponica ad Lycksele, Quickjock et Torneå. (ZETT. BEN. WAHLB.)

Obs. *H. carthami* HÜBN. valde affinis, sed re vera distincta. Magnitudo minor; maculae albae alarum posticarum in parte superiore obsoletiores (series interna non tam expressa quam in illa). Macula interna inter costam 1 et 2 in parte superiore alarum anticarum duplex, ubi illa maculam albam geret simplicem. Alae posticae etiam infra sunt obscuriores, quam in illa, haud virescentes, costis albis, minime virescentibus.

- B. *Maculae albae inter costam 1 et 2 in parte inferiore alarum posticarum inaequales (postica basali evidenter major).*

1. *Maculae albae, ad fasciam mediam in parte inferiore alarum posticarum pertinentes, inter costam 3 et 4 subaequales, intus abrupte truncatae.*

2. *S. alveus* (HÜBN.): alis supra obscure fuscis, in nigredinem vertentibus, cinereo subobductis, maculis quadratis albis majoribus, posticarum cinereis obsoletioribus; anticis infra fuscis, albido hinc inde obductis, maculis albis ut in parte superiore; posticis infra virescentibus costis concoloribus, maculis basalibus fasciaeque discoidali maculata continua albis, et margine interno cinereo macula trigona fusca ad angulum ani; clava antennarum infra ferruginea. Long. ad. exp. 27—30 millim.

Syn. *PAP. alveus* HÜBN. Pap. t. 92. f. 461—463. *HESPERIA* H. S. text. I. 156. *Hesp. fritillum* OCHA. Schm. I. 2. 207. ex parte. ZETT. Ins. Lapp. 914. 1. ex parte. BOHEM. Öfversigt af Kongl. Vet. Akad. Förhandl. 1847. p. 300. (excl. syn. GON. et HÜBN., ad *H. fritill.* pertin.)

Hab. in Gottlandia australi et meridionali e. gr. Thorsburg, Furillen, Wamblingbo et Hoburg; mense Julio. (ZETT. BEN. DAHLB.)

3. *S. serratula* (RAMB.): alis supra fusco-brunneis, anticis maculis albis quadratis minoribus, posticis fere immaculatis maculis tantum fusco-cinereis obsolescentibus; anticis infra fusco-ci-

neris maculis albis ut in parte superiore; posticis infra virescentibus maculis albis basilaribus fascisque media maculata alba, evidenter interrupta, maculis inter costam 4 et 6 minutis, discretis, et margine interiore cinereo-nigro, immaculato; clava antennarum infra ferruginea. Long. al. exp. 23—26 millim.

Syn. *HESPERIA serratula* RAMBUR Fn. Andalous. pl. 8. f. 9. H. S. Text. I. 156. pl. 4. f. 18—20. *PAP. alveus* HÜNN. Pap. t. 99. f. 506. *HESPERIA* OCHS. Schm. I. 2. 206. GOD. et DUP. Lepid. Suppl. I. 312. pl. 50. f. 7. 8. (excl. syn. HÜNN.) *SYNCHETUS* BOISD. Icon. p. 238. pl. 46. f. 1—3. *HESP. fritillum* ZETT. Ins. Lapp. 914. 1. ex parte.

Hab. in Suecia et Norvegia passim; ad Riise et Drivstuep in alpe Dowre (BUN.); in Wermlandia (WAHLB.), Ostrogothia (STERN.) et Westmannia (FREDRICKSS.) Mensibus Junio et Julio occurrit.

2. *Macula albæ, ad fasciam mediam in parte inferiore alarum posticarum pertinentes, inter costam 3 et 4 inæquales; macula antica longior, versus basin prominens.*

4. *S. andromeda* (n. sp.): alis supra fusco brunneis, anticis maculis quadratis albis, posticis maculis evanescentibus; anticis infra fusco-griseis maculis albis ut in parte superiore; posticis infra virescentibus fascia media maculata alba, subcontinua maculisque albis difformibus ad basin et margine interiore cinereo, ad angulum ani dilutiore; antennarum clava infra ferruginea. ♂ Long. al. exp. 27—28 millim.

Hab. rarius in alpe Dowre Norvegiæ, quo Celeb. BOHEMAN mense Junio specimina collegit. Etiam in alpinis Dalcariæ occurrit.

5. *S. malva* (LIN.): alis supra fuscis, in nigredinem vertentibus, maculis quadratis et punctis albis, posticarum biseriatis, distinctis; anticis infra fusco-griseis maculis ut in parte superiori lineisque longitudinalibus albis inter limbum et seriem albam macularum; posticis infra obscure virescentibus, nervis dilutioribus, fascia alba maculata medio interrupta maculisque difformibus basilaribus albis et margine interiore fusco-cinereo, unicolore; clava antennarum infra fusco-brunnea. Long. al. exp. 22—24 millim.

Syn. *PAP. malva* LIN. Fn. Sv. 285. 1081. *HESPERIA* DALM. Pap. Sv. 202. 6. ZETT. Ins. Lapp. 915. 2. *PAP. alveolus* HÜNN. Pap. t. 92. f. 466. 467. *HESPERIA* OCHS. Schm. I. 2. 208. GOD. et DUP. Lepid. I. 240. pl. 12. secund. f. 3.

Var. b. maculis alarum anticarum albis coadunatis, fasciam transversam supra constituentibus.

Syn. *PAP. malva minor* ESP. Schm. t. 36. f. 5. *PAP. sav* BEAUSTAS. Icon. t. 40. f. 8. 9. *PAP. lavatera* FABR. E. S. III. 1. 353. 339?

Var. c. fascia macularia media in parte inferiore alarum posticarum continua maculis albis coadunatis inter costam 4 et 6.

Hab. primo vere ubique vulgaris.

IV. Gen. THANAOS BOISD.

(*Hesperia* LATR. OCHS. DALM. ZETT. *Heteropterus* DUM. *Thymela* FABR.)

Species unica Scandinaviæ:

Th. tages (LIN.)

Syn. PAP. *tages* LIN. Fn. Sv. 286. 1082. FABR. E. S. III. 1. 354. 346. HÜBN. Pap. t. 91. f. 456. 457, Text. 70. 4. *HESPERIA* OCHS. Schm. I. 2. 214. IV. 34. DALM. Pap. Sv. 204. 9. GOD. et DUP. Lepid. I. 241. pl. 12. secund. f. 4. H. S. Text. p. 158.

Habitat primo vere in Suecia et Norvegia intermedia et meridionali ubique sat vulgaris. Rarius mensibus Julio et Augusto occurrit.

2. Öfversigt af Characeæ. — Hr Lector WALLMAN i Linköping hade insändt följande uppställning af familjen Characeæ, som af Sekreteraren föredrogs.

Fam. CHARACEÆ.

Obs. Asterisco (*) ante nomen species a nobis nondum visas, et eadem nota in calce, in Scandinavia repertas designavimus.

I. Gen. NITELLA Ag. et ENDL. (excl. excl.)

Chara LINNÆI et AUCTORUM.

Simpliciter tubulosæ, læves, inermes, diaphanæ, flexiles. Exinvolucratæ. Radii ebracteati: fructiferi divisi, fructificatione in angulo divisuræ. Globuli epigyni.

Sect. 1. Ebracteatæ.

Radiatorum axis divisus.

A. radiis repetito-divisis.

† Radiolæ. Radii fructiferi passim triplicato-divisi, apice articulatim mucronati, vel breviter corniculati.

a. cruribus terminalibus infra articulum apicalem continuis.

1 N. hyalina. DECAND.

* 2 N. heterophylla. AL. BRAUN.

* 3 N. congesta. ROB. BROWN.

* 4 N. Lhotskyi. AL. BR.

5 N. tenuissima. DESV.

6 N. africana. AL. BR.

7 *N. Braunii*. WALLM.

8 *N. bengalica*. WALLM.

b. cruribus terminalibus infra articulum apicalem articulatis.

9 *N. gracilis*. SMITH.

10 *N. virgata*. AL. BR.

†† *Dichotomæ*. Radii fructiferi passim duplicato-divisi, apice (plerumque) articulatum mucronati, vel breviter corniculati.

1. cruribus terminalibus mucrone articulatum inserto, vel corniculis instructis.

a. cruribus infra articulum apicalem continuis.

* 11 *N. condensata*. RUPA.

* 12 *N. interrupta*. RUPA.

* 13 *N. longifurca*. RUPA.

14 *N. norvegica* * WALLM.

15 *N. mucronata* * AL. BR.

heteromorpha * AL. BR.

16 *N. flabellata*. AL. BR.

17 *N. capillaris*. * WALLM.

b. cruribus infra articulum terminalem passim articulatis, inæqualibus. Globuliferæ.

18 *N. stelligera*. BAUER.

2. cruribus terminalibus omnino, etiam apice, continuis.

19 *N. anomala*. WALLM.

B. *Furcatæ*. Radii simpliciter (semel) divisi.

1. cruribus terminalibus mucrone articulatum inserto armatis.

20 *N. Wahlbergiana* * WALLM.

* 21 *N. gelatinosa*. AL. BR.

2. cruribus terminalibus apice continuis, exarticulatis.

a. radiis cylindricis.

† *Monoicæ*.

22 *N. translucens*. PERSOON.

23 *N. flexilis* * AL. BR.

N. procera. WALLM.

†† *Dioicæ*.

24 *N. syncarpa* * THUILL.

N. opaca * AG.

N. atrovirens * WALLM.

N. lejopyrena * AL. BR.

25 *N. capitata*. NEES VON ESENH.

b. radiis inflatis, exsiccatis lanceolatis; nucula bracteolis minutissimis vix conspicuis suffulta.

* 26 *N. exigua*. RABENH.

Sect. 2. *Pseudobracteata*.

Axis radii primarii usque ad apicem verticilli protensus, ad genicula radiis minoribus, in modum bractearum, stipatus.

A. *Steriles*. Radii omnino etiam apice continui.

* 27 *N. ulvoides*. BEZOL.

B. Proliferae. Radii articulo terminali instructis, steriles plerumque simplicissimi.

† radiis infra articulum terminalem bracteisque spuriiis (radiis minoribus) articulatis.

a. bracteis spuriiis divisis.

28 *N. polysperma*. Flor. Badens. Cryptogam.

29 *N. prolifera* Zrz.

b. bracteis spuriiis simplicissimis.

* 30 *N. glomerulifolia*. Rupr.

31 *N. glomerata*. AL. BR.

32 *N. Stenhammariana* (nidifica) * WALLM.

†† radiis omnibus infra articulum apicalem continuis.

33 *N. borealis* * WALLM.

2. Gen. CHARA LE VAILLANT.

LINNÉ. AG. ENDLER.

Caulis composite tubulosus, corticatus, sulcato-striatus, in sicco statu fragilis, plerumque strigosus vel aculeolatus (rarius simpliciter tubulosus, flexilis, Sect. 1.) Verticilli basi involucratî. Ramenta simplicissima, ad genicula bracteis subverticillatis instructa. Globuli epigyni, extrafoliacei (rariissime pleurogyni).

Sect. 1. *Monosiphonæ*.

Nitella AG. ENDL.

Simpliciter tubulosæ, laeves, inermes, flexiles habitu Nitellarum. Ramenta ad genicula constricta, apice bracteifero-corniculata.

A. Barbatae, involucri aculeis elongatis, diametrum caulis superantibus; globulis pleurogynis.

a. nuculis in fundo verticilli axillaribus lateralibusve.

* 1 *Ch. Macropogon*. AL. BR.

b. nuculis lateralibus.

2 *Ch. barbata*. MÛRIEN.

* 3 *Ch. spinosa*. AMCI.

4 *Ch. alopecuroides* * DEL.

B. Imberbes, involucri aculeis abbreviatis; globulis hypogynis, extrafoliaceis.

† Dioicae.

* 5 *Ch. australis*. ROE. BAOW.

* 6 *Ch. plebeja*. ROE. BA.

†† Monoicae.

a. nuculis in fundo verticilli axillaribus lateralibusve.

7 *Ch. corallina*. WILLD.

b. nuculis lateralibus.

* 8 *Ch. eremosperma*. Rupr.

9 *Ch. coronata* * Zrz.

Ch. Perotetti. AL. BR.

Sect. 2. *Polysiphonica*.

Composite tubulosæ. Globuli extrafoliacei, hypogyni.

A. Heterosiphonica. Caulis composite tubulosus, corticatus, sulcato-striatus. Ramenta simpliciter tubulosa, lævia, flexilia.

1. caule substrigoso.

† Monoicæ.

a. involucri aculeis diametrum caulis subæqualibus.

10 Ch. scoparia. BAUER.

b. involucri aculeis diametro multoties longioribus.

11 Ch. Hornemannii WALLM.

†† Dioicæ.

* 12 Ch. Preissii AL. BR.

2. cauli inermi.

13 Ch. Hydropithys BRUCKER.

14 Ch. fibrosa. AG.

B. Polysiphonica propria. Caulis internodiumque ramentorum unum alterumve composite tubulosæ, corticata, sulcato-striata.

1. Strigosæ.

Caulis saltem superne aculeatus vel papillosus.

† Monoicæ.

Gymnopodeæ AL. BR. internodio basali simpliciter tubuloso.

15 Ch. brachyus. AL. BR.

16 Ch. Martensi. AL. BR.

17 Ch. ceylanica. WILLD.

18 Ch. nudipes. WALLM.

* 19 Ch. foliolosa. MUELENB.

20 Ch. polyphylla. AL. BR.

* Ch. Michauxii. AL. BR.

21 Ch. Wikströmi. WALLM.

22 Ch. Commersoni. AL. BR.

* 23 Ch. compressa. KUNZE.

Cinerascentes. Exsiccata cinerascentes, vel cretacei coloris, collabentes.

24 Ch. squamosa. DESF.

25 Ch. gymnophylla. AL. BR.

Ch. vulgaris.

26 Ch. foetida. AL. BR.

Ch. crassicaulis * SCHLEICH.

Ch. longibracteata * KÜTZ.

Ch. cespitosa * WALLM.

Ch. sphagnoides. WALLM.

* Ch. gymnoclada. GANTER.

27 Ch. contraria. AL. BR.

* 28 Ch. Kirghisorum. LESS.

* 29 Ch. Kokeillii. AL. BR.

Ch. hispida.

30 Ch. hispida * SMITH.

β. gymnotiles. AL. BR.

γ. pseudocrinita. AL. BA.
Ch. micracantha. AL. BA.
Ch. circinnata * WALLM.

Virentes vel exalbidæ.

- 31 *Ch. longispina* (var. *Ch. hispidæ* AL. BA.)
32 *Ch. Agardhiana*. WALLM.
33 *Ch. Noltiana*. AL. BA.
* 34 *Ch. tenuispina*. AL. BA.
* 35 *Ch. pleiospora*. GANTER.
36 *Ch. acicularis*. WALLM.
37 *Ch. distans* * WALLM.
38 *Ch. baltica* * FRIES.

†† Dioicæ.

Vesiculosæ

- 39 *Ch. ceratophylla* * WALLM.
40 *Ch. tomentosa* * LINN.

Crinitæ.

- 41 *Ch. crinita* * WALLM.
 β. subflexilis * WALLM.
* 42 *Ch. Karelini*. LESS.
43 *Ch. aspera α. strigosa* * WILLD.
 β. aculeolata * WALLM.
44 *Ch. macrosphæra*. AL. BA.

2. Inermes.

† Dioicæ.

- 45 *Ch. connivens*. SALT.
* 46 *Ch. stachymorpha*. GANTER.
47 *Ch. annulata* * WALLM.

†† Monoicæ.

- 48 *Ch. fragilis (pulchella)* * DESV.
 Ch. capillacea * THUILL.
49 *Ch. nigricans* * WALLM.
50 *Ch. rostrata*. WALLM.
-

Inlämnade afhandlingar.

Af Hr ÅNGSTRÖM: Optiska undersökningar.

Remitterades till Htt WALLMARK och BÖLUND.

Af Hr Prosten KULLBERG, meteorologiska observationer vid Vinberg i Halland, och

Af Hr Dr SMITT, meteorologiska observationer i Halmstad.

Öfverlemnades till det Astronomiska observatorium.

Af Hr J. BOLINDER, som med det af Hr SWARTZ meddelade resestipendium, enligt Akademiens anmodan, besökt världsexpositionen i London: en berättelse om utförandet af detta uppdrag och en afhandling om träds bearbetande medelst maskiner.

Remitterades till Hr Frih. WARDE och Hr WALLMARK.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af Hans Maj:t Konungen.

BLUME, C. L., Rumphia, sive commentationes botanicae imprimis de plantis Indiae Orientalis. IV Tomi. Lugd. Batav. 1835—1848. Fol. (Cum tabl. color.) — Praktband.

— — Museum Botanicum Lugduno-Batavum. Tom. I. Lugd. Bat. 1849—51. 8vo. — Praktband.

Af K. Danske Videnskabernes Selskab i Köpenhamn.

Oversigt af Forhandlinger i Aaret 1851. Af S. FORCHHAMMER. Kphmn 1851. 8vo.

Af K. Preussische Akad. der Wissenschaften i Berlin.

Abhandlungen der Akademie aus der Jahre 1851. Berlin 1852. 4vo.
(m. t.)

Monatsbericht. Juli—Oktob. 1852. 8vo.

Af Kongl. Bergs-Kollegium i Stockholm.

Underd. Berättelse om förhållandet med bergshandteringen år 1851. 4vo.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Studeranden von Post.

En Strix passerina.

Af Kadetten Björkman.

En *Corvus frugilegus*.

Af Bildhuggaren Fernander.

En *Simia cynomolgus*.

Af Hr Elmänder.

En *Corvus frugilegus*.

Af Friherre C. J. Cederström.

Yngel af *Perca fluviatilis*.

Botaniska afdelningen.

Af Studeranden Rob. Hartman.

Etthundradessexton sällsyntare arter, deribland sjuttionio från Skåne, t. ex. *Hordeum pratense*, *Carex paniculata*, *C. virens*, *Alisma ranunculoides*, *Cimicifera campestris*, *Senecio paludosus*, *Snula britannica*, *Filago germanica*, *Astragalus arenarius*, *Lathyrus maritimus*, *Medicago minima*, flera arter af *Rubus*, v. s. v.; tjugo arter från Öland, t. ex. *Orchis militaris*, *O. morio*, *Carex obtusata*, *Ulmus effusa*, *Oxytropis campestris* m. fl., samt sjutton från särskilda trakter af Sverige, t. ex. *Galium triflorum*, *Thlaspi alpestre*, *Vicia dumetorum* m. fl.

Af Studeranden Fristedt.


Trettiofem tryptogamiska arter från Westerbotten och Tornedö lappmark, deraf tjugusex mossor, två *Hepaticæ* och sju *Lichenes*.

Af Studeranden S. O. Lindberg.

Fyrtioåtta mossarter och fjorton *Hepaticæ* från Stockholms-trakter.

Af Internisten.

Fyrtiofyra sällsyntare arter samlade i Bohuslän af Magister Linnæus, t. ex. *Calamagrostis acutiflora*, *Carex maritima*, *Zostera angustifolia*, *Z. nana*, *Agrimonia odorata*, *Sium angustifolium*, *Callitriche stagnalis*, *Atriplex crassifolia* m. fl. samt tre arter från nejden af Christiania: *Calamagrostis Hartmanni*, *Thymus chamædryas* och *Asplenium ruta muraria*.



ÖFVERSIGT
AF
KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS
FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1853.

N: 3.

Onsdagen den 9 Mars.

Föredrag.

1. *Vattenståndet i Mälaren och Saltsjön.* —

Sedan den nya af Hr Öfverste Ericsson byggda Slussen i slutet af år 1850 bläf färdig till begagnande, så ditflyttades också från och med den 1 September 1851 de observationer öfver vattenståndet, som hittills blifvit gjorde vid den gamla Slussgrafen. Men som nu nollpunkten eller slusströskeln uti den Nya Slussgrafen ligger 5 fot 4 verktum lägre än den Gamla Grafvens *), så nödgas man, för att kunna jemföra alla de hittills gjorda gamla observationerna med de hädanefter skeende nya, tillägga till de förra eller afdraga från de sednare dessa 5 fot 4 verktum. Då det är att förmoda, att dessa iagttagelser öfver vattenhöjden allt framgent komma att fortsättas, och då det af flera anledningar kan vara nyttigt och välkommet, att en gång för alla hafva denna reduktion för det förflutna gjord, så anhöll Hr ERDMANN att nu få meddela och här intaga följande

*) Nb. 5 fot 4 verktum lägre än den nya nollpunkten i Gamla grafven, eller 5 fot lägre än den gamla ursprungliga nollpunkten i samma graf. Se härom vidare Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandl. 1847—52.



*Tabell öfver Mälarens och Saltsjöns medelhöjder samt hög-
stående år *), sammandragen ur de vid Slussverket
alla måtten äro hänförde till den nya.*

M Ä L A R E N.

	Medel- stånd.		Högsta stånd.		Lägst stånd.		Dagar för	
	Fot.	tum.	Fot.	tum.	Fot.	tum.	högsta vat- tenstånd.	lägsta vat- tenstånd.
1774	17	1,7	19	3,3	15	0,8	$\frac{21}{5}$	$\frac{17}{10}$
1775	16	2,5	17	7,5	15	0,8	$\frac{24}{4}$	$\frac{15}{10}$
1776	17	3,3	19	1,7	15	3,3	$\frac{28}{5}$	$\frac{31}{1}, \frac{20}{12}$
1777	16	4,2	18	—	15	5,0	$\frac{24}{5}$	$\frac{1}{1}, \frac{2}{2}$
1778*	16	2,5	18	5,0	15	7,5	$\frac{16}{5}$	$\frac{15}{10}$
1779*	16	2,5	17	—	15	—	$\frac{26}{4}, \frac{25}{11}$	$\frac{15}{10}$
1780	20	0,8	22	3,3	15	5,0	$\frac{4}{4}, \frac{5}{5}$	$\frac{10}{10}$
1781	16	0,8	18	—	14	8,3	$\frac{6}{5}$	$\frac{20}{10}$
1782	17	—	18	2,5	15	8,3	$\frac{26}{4}$	$\frac{8}{10}$
1783	16	4,2	19	4,2	15	1,7	$\frac{12}{5}$	$\frac{15}{12}$
1784	16	5,0	18	5,8	14	8,3	$\frac{21}{5}$	$\frac{8}{4}, \frac{15}{10}$
1785	16	4,2	$\left\{ \begin{array}{l} 18 \\ 18 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 5,0 \\ 7,5 \end{array} \right.$	15	0,8	$\frac{19}{5}, \frac{7}{12}$	$\frac{26}{3}, \frac{31}{10}$
1787*	16	1,7	17	1,7	15	3,3	$\frac{25}{11}, \frac{13}{12}$	$\frac{17}{9}$
1788*	16	5,8	20	5,0	15	0,8	$\frac{19}{5}, \frac{20}{10}$	$\frac{16}{10}, \frac{18}{10}$
1789	15	9,2	18	0,8	14	4,2	$\frac{22}{5}$	$\frac{27}{3}$
1790	15	6,7	16	6,7	14	5,8	$\frac{2}{1}, \frac{5}{5}$	$\frac{4}{6}, \frac{17}{7}$
1791*	16	9,2	18	—	15	5,0	$\frac{6}{5}$	$\frac{7}{1}$
1796*	16	2,5	17	6,7	15	5,0	$\frac{11}{4}$	$\frac{13}{9}, \frac{17}{10}$
1797	15	5,8	16	3,3	15	—	$\frac{25}{12}, \frac{31}{10}$	$\frac{4}{8}, \frac{14}{10}$
1798*	16	5,8	17	5,0	15	4,2	$\frac{30}{5}$	$\frac{28}{8}$
1799*	15	2,5	18	—	13	5,8	$\frac{21}{11}$	$\frac{8}{4}$
1801*	15	—	18	—	14	2,5	$\frac{20}{4}, \frac{30}{10}$	$\frac{15}{10}, \frac{19}{10}$

*) De år, hvilkas kolumner icke äro utfyllde, saknas alldeles, och tecknet * bredvid något årtal antyder, att ej allenast icke dagliga iagttagelser för hela det året finnas gjorde eller antecknade,

sta och lägsta vattenstånd i fot och decimaltum för nedan-
i Stockholm förde journaler, och i hvilken Tabell
år 1850 färdigbyggda, Slussens skalor.

SALTSJÖN.

	Medel- stånd.		Högsta stånd.		Lägsta stånd.		Dagar för	
	Fot.	tum.	Fot.	tum.	Fot.	tum.	högsta vat- tenstånd.	lägsta vat- tenstånd.
1774	14	6,7	16	—	13	4,2	$\frac{28}{12}$	$\frac{24}{8}$
1775	15	5,0	16	—	14	3,3	$\frac{1}{1}, \frac{31}{3}$	$\frac{9}{2}$
1776	14	8,3	16	0,8	13	7,5	$\frac{27}{8}$	$\frac{17}{6}$
1777	15	1,7	17	—	14	1,7	$\frac{20}{11}$	$\frac{13}{4}$
1787	14	9,2	16	0,8	14	—	$\frac{28}{8}$	$\frac{20-24}{5}$
1788*	14	9,2	16	—	13	5,8	$\frac{24}{12}$	$\frac{3}{4}$
1789	14	5,0	$\left\{ \begin{array}{l} 15 \\ 16 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 5,0 \\ - \end{array} \right\}$	13	2,5	$\frac{14}{2}, \frac{31}{12}$	$\frac{12}{3}$
1790	15	—	16	7,5	13	—	$\frac{28}{2}$	$\frac{4}{5}, \frac{25}{5}$
1791	14	7,5	16	—	14	—	$\frac{2}{9}$	$\frac{4-7}{4}$
1798*	14	0,8	15	—	13	—	—	$\frac{1}{3}$
1799	14	7,5	15	7,5	13	5,0	$\frac{10}{12}$	$\frac{1}{10}$
1801*	14	7,5	$\left\{ \begin{array}{l} 15 \\ 15 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 8,3 \\ 6,7 \end{array} \right\}$	13	5,8	$\frac{21}{3}, \frac{16}{12}$	$\frac{13}{10}$

utan äfven att en eller annan månads observationer helt och hållet eller till större delen saknas.

MÄLAREN.

	Medel- stånd.		Högsta stånd.		Lägst stånd.		Dagar för	
	Fot.	tum.	Fot.	tum.	Fot.	tum.	högsta vat- tenstånd.	lägsta vat- tenstånd.
1802	15	4,2	16	6,7	14	8,3	$\frac{30}{5}$	$\frac{14}{1, 2, 12}$
1803	15	2,5	16	2,5	14	1,7	$\frac{6-8}{5}$	$\frac{14-16}{2}$
1804	15	8,3	18	5,0	14	5,0	$\frac{28}{5}$	$\frac{27, 13}{3, 4}$
1805	15	1,7	15	9,2	14	—	$\frac{2-12}{8}, \frac{26}{12}$	$\frac{1-6}{2}$
1806	16	0,8	18	9,2	14	5,8	$\frac{3}{6}$	$\frac{19}{11}$
1807	15	8,3	16	9,2	14	6,7	$\frac{2-3, 13}{6}$	$\frac{7}{9}$
1808	15	5,0	16	9,2	14	5,8	$\frac{19-31}{5}$	$\frac{18-20}{11}, \frac{30}{12}$
1809	15	1,7	16	5,0	14	—	$\frac{26-27}{5}$	$\frac{12-13}{2}$
1810	15	4,2	16	6,7	14	3,3	$\frac{9}{6}$	$\frac{28-30}{11}$
1811	15	8,3	18	7,5	{ 14 6,7 } { 14 5,8 }		$\frac{2-3}{6}$	$\frac{27}{2}, \frac{1}{3}, \frac{16-17}{10}$
1816*	17	0,8	19	—	14	8,3	$\frac{11-17}{6}$	$\frac{16}{4}$
1817	16	2,5	17	2,5	14	6,7	$\frac{7}{5}$	$\frac{29}{10}$
1818*	16	6,7	20	—	14	7,5	$\frac{27-31}{5}$	$\frac{12}{12}$
1819*	14	9,7	15	8,3	13	8,3	$\frac{26}{4}, \frac{3}{5}$	$\frac{28-31}{12}$
1820*	15	4,2	18	1,7	13	6,7	$\frac{20-21}{5}$	$\frac{13-23}{28}$
1824	15	5,0	18	—	14	2,5	$\frac{16-21}{12}$	$\frac{1}{28}$
1825	16	1,7	{ 17 7,5 } { 17 5,0 }		14	5,0	$\frac{1-5}{1}, \frac{4-10}{5}$	$\frac{10}{8}, \frac{20}{10}$
1826	14	9,2	16	2,5	13	7,5	$\frac{18-21}{3}$	$\frac{12}{7}$
1827	15	—	16	9,2	14	—	$\frac{7}{5}$	$\frac{31}{10}$
1828	15	0,8	16	6,7	14	3,3	$\frac{16-29}{5}$	$\frac{12}{2}$
1829	15	0,8	17	—	14	—	$\frac{26}{5}$	$\frac{16-30}{4}$
1830	14	6,7	{ 15 8,3 } { 15 9,2 }		13	4,2	$\frac{8-15}{51}, \frac{1}{11}$	$\frac{19}{2}$
1831	15	—	17	2,5	13	5,0	$\frac{11-16}{5}$	$\frac{11}{10}$
1832	14	7,5	15	9,2	13	8,3	$\frac{2}{1}$	$\frac{9}{5}$
1833	14	9,2	16	4,2	13	8,3	$\frac{31}{12}$	$\frac{12}{4}$
1834	15	6,7	17	7,5	13	8,3	$\frac{1-6}{4}$	$\frac{28}{8}$
1835	14	8,3	16	—	13	4,2	$\frac{15}{2}$	$\frac{28}{8}$
1836	15	5,8	18	0,8	14	5,8	$\frac{1-3}{5}$	$\frac{22}{8}, \frac{23}{9}$
1837	15	—	16	4,2	14	—	$\frac{2}{6}$	$\frac{6-16}{4}$

SALTSJÖN.

	Medel- stånd.		Högsta stånd.		Lägst stånd.		Dagar för	
	Fot.	tum.	Fot.	tum.	Fot.	tum.	högsta vat- tenstånd.	lägst vat- tenstånd.
1802	15	—	15	9,2	13	0,8	$\frac{12}{4}$	$\frac{20}{11}$
1803	14	5,8	15	8,3	11	5,0	$\frac{29}{8}$	$\frac{25-31}{1}$
1804	14	1,7	15	7,5	13	0,8	$\frac{25}{3}$	$\frac{11}{11}$
1805	14	5,0	15	9,2	13	—	$\frac{11}{12}$	$\frac{8-9}{4}$
1806	14	7,5	16	5,0	13	7,5	$\frac{11}{1}$	$\frac{4, 5}{41-22}$
1807	14	9,2	16	7,5	13	7,5	$\frac{16}{1}$	$\frac{4}{4}$
1808	14	5,0	16	2,5	{ 13 5,0 13 3,3 }		$\frac{14}{1}$	$\frac{20}{3}, \frac{19}{11}, \frac{31}{12}$
1809	14	3,3	15	8,3	13	3,3	$\frac{28-30}{8}$	$\frac{16-18}{1}$
1810	14	5,0	15	9,2	13	5,8	$\frac{26}{12}$	$\frac{11}{4}$
1811	14	5,0	16	—	13	—	$\frac{4}{12}$	$\frac{15}{1}$
1816*	14	0,8	14	8,3	13	2,5	$\frac{7}{10}$	$\frac{29}{4}, \frac{2}{5}$
1819*	13	8,3	14	8,3	12	8,3	$\frac{2-7}{4}$	$\frac{20-21}{12}$
1820*	13	9,2	14	7,5	12	8,3	$\frac{11}{2}$	$\frac{20}{2}$
1824			12	4			$\frac{20-21}{12}$	
1825	14	5,8	{ 16 9,2 16 8,3 }		13	3,3	$\frac{1-7}{1}, \frac{30}{11}$	$\frac{17-19}{5}$
1826	13	9,2	15	—	12	9,2	$\frac{17}{4}$	$\frac{19}{12}$
1827	14	—	14	9,2	13	—	$\frac{25}{3}$	$\frac{20}{5}, \frac{21}{10}$
1828	14	1,7	15	—	13	—	$\frac{19}{12}$	$\frac{22}{4}$
1829	13	8,3	15	1,7	12	7,5	$\frac{16}{11}$	$\frac{18}{4}$
1830	13	9,2	15	5,0	12	6,7	$\frac{2}{11}$	$\frac{16}{12}$
1831	13	7,5	15	8,3	12	6,7	$\frac{16}{11}$	$\frac{26-28}{4}$
1832	14	1,7	15	4,2	12	6,7	$\frac{25}{7}$	$\frac{10}{3}$
1833	14	—	16	0,8	12	5,0	$\frac{10}{12}$	$\frac{18}{3}$
1834	14	5,0	15	7,5	13	6,7	$\frac{6}{11}$	$\frac{5-29}{8}$
1835	14	3,3	16	—	13	1,7	$\frac{15}{2}$	$\frac{22-28}{9}$
1836	14	5,0	15	8,3	13	3,3	$\frac{28}{3}$	$\frac{11-14}{5}$
1837	14	—	15	0,8	13	—	$\frac{2-4}{11}$	$\frac{1-3}{10}$

MÄLAREN.

	Medel- stånd.		Högsta stånd.		Lägsta stånd.		Dagar för	
	Fot.	tum.	Fot.	tum.	Fot.	tum.	högsta vat- tenstånd.	lägsta vat- tenstånd.
1838	15	0,8	17	2,5	13	5,8	$\frac{25}{5}$	$\frac{31}{3}$
1839	14	7,5	15	9,2	13	5,0	$\frac{26}{1}$	$\frac{29}{12}$
1840	15	1,7	16	8,3	13	7,5	$\frac{27}{11}$	$\frac{29}{9}$
1841	15	0,8	18	0,8	13	5,8	$\frac{31}{12}$	$\frac{9}{10}$
1842	14	7,5	17	3,3	13	1,7	$\frac{22}{1}$	$\frac{5-7}{10}$
1843	14	5,0	15	5,0	13	8,3	$\frac{18}{1}, \frac{11-18}{2}$	$\frac{24}{8}, \frac{4-26}{9}$
1844	15	1,7	16	8,3	13	5,8	$\frac{1-6}{11}$	$\frac{29-31}{3}$
1845	14	4,2	$\left\{ \begin{smallmatrix} 15 & 5,0 \\ 15 & 6,7 \end{smallmatrix} \right\}$		13	5,8	$\frac{1}{1}, \frac{18-31}{12}$	$\frac{24}{3}$
1846	15	—	17	7,5	13	6,8	$\frac{20-28}{4}$	$\frac{21}{11}$
1847	14	6,7	16	7,5	13	3,3	$\frac{23-30}{5}$	$\frac{28}{1}$
1848	15	2,5	$\left\{ \begin{smallmatrix} 17 & — \\ 17 & 1,7 \end{smallmatrix} \right\}$		13	8,3	$\frac{29-30}{4}, \frac{2-4,7}{5}$	$\left\{ \begin{smallmatrix} 11-17-20-23 \\ 2 \\ 29-30 \\ 9 \end{smallmatrix} \right\}$
1849	15	—	16	7,5	14	4,2	$\frac{1}{1}$	$\left\{ \begin{smallmatrix} 17-21 & 1-2 \\ 6 & 10 \\ 28-31 \end{smallmatrix} \right\}$
1850	15	—	16	5,0	13	7,5	$\frac{26-28}{5}$	$\frac{25-29}{1}, \frac{1-10}{2}$
1851	16	0,8	$\left\{ \begin{smallmatrix} 19 & 1,7 \\ 18 & 9,2 \end{smallmatrix} \right\}$		$\left\{ \begin{smallmatrix} 14 & — \\ 13 & 9,2 \end{smallmatrix} \right\}$		$\frac{18-20-24}{5}$	$\left\{ \begin{smallmatrix} 29-31 \\ 3 \\ 9-10 \\ 3 \end{smallmatrix} \right\}$
1852	15	2,8	$\left\{ \begin{smallmatrix} 17 & 2,0 \\ 17 & 4,5 \end{smallmatrix} \right\}$		13	6,0	$\left\{ \begin{smallmatrix} 1 \\ 30-31 \\ 12 \end{smallmatrix} \right\}$	$\frac{16}{9}$

SALTSJÖN.

	Medel- stånd.		Högsta stånd.		Lägst stånd.		Dagar för	
	Fot.	tum.	Fot.	tum.	Fot.	tum.	högsta vat- tenstånd.	lägst vat- tenstånd.
1838	13	7,5	14	9,2	12	4,2	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$
1839	13	6,7	15	8,3	11	9,2	$\frac{8}{1}$	$\frac{21}{12}$
1840	13	9,2	15	1,7	13	—	$\frac{28}{1}$	$\frac{5}{2}, \frac{20}{12}$
1841	13	7,5	14	9,2	12	5,8	$\frac{15-16}{11}$	$\frac{25}{9}$
1842	13	7,5	$\left\{ \begin{smallmatrix} 14 & 9,2 \\ 14 & 8,3 \end{smallmatrix} \right\}$		12	4,2	$\frac{18}{7}, \frac{31}{12}$	$\frac{3}{2}, \frac{1}{10}$
1843	13	9,2	15	4,2	12	1,7	$\frac{12}{1}$	$\frac{24}{5}$
1844	14	—	15	3,3	12	3,3	$\frac{4}{1}$	$\frac{14-17}{12}$
1845	13	7,5	15	0,8	12	7,5	$\frac{30}{10}, \frac{6}{12}$	$\frac{30}{5}$
1846	13	8,3	15	9,2	12	4,2	$\frac{3}{1}$	$\frac{8}{11}$
1847	13	6,7	15	—	12	7,5	$\frac{6}{12}$	$\frac{17-20}{1}, \frac{13}{5}, \frac{12}{10}$
1848	13	6,7	$\left\{ \begin{smallmatrix} 15 & 2,5 \\ 15 & 1,7 \end{smallmatrix} \right\}$		$\left\{ \begin{smallmatrix} 11 & 7,5 \\ 12 & — \end{smallmatrix} \right\}$		$\left\{ \begin{smallmatrix} 23 \\ 2, \frac{14}{12} \end{smallmatrix} \right\}$	$\left\{ \begin{smallmatrix} 11 \\ \frac{1}{2} \end{smallmatrix} \right\}$
1849	13	8,3	16	—	12	1,7	$\frac{20}{2}, \frac{9}{3}$	$\frac{11-12}{12}$
1850	13	8,3	15	5,0	11	5,0	$\frac{26}{12}$	$\frac{21}{1}$
1851	13	8,3	$\left\{ \begin{smallmatrix} 15 & 4,2 \\ 15 & 5,0 \end{smallmatrix} \right\}$		$\left\{ \begin{smallmatrix} 12 & 7,5 \\ 12 & 6,7 \end{smallmatrix} \right\}$		$\left\{ \begin{smallmatrix} 2-6 \\ 29, \frac{29}{10} \end{smallmatrix} \right\}$	$\left\{ \begin{smallmatrix} 27 \\ 16-20 \\ 4 \end{smallmatrix} \right\}$
1852	13	7,5	$\left\{ \begin{smallmatrix} 15 & 1,0 \\ 15 & 2,0 \end{smallmatrix} \right\}$		12	5,0	$\left\{ \begin{smallmatrix} 4, 6 \\ 1, \frac{22}{12} \end{smallmatrix} \right\}$	$\frac{3}{5}$

2. Öfversigt af de i Sverige funna arter af familjen *Palpicornia*. — En under denna titel af Hr Magister C. Thomson insänd uppsats föredrogs af Hr BOHEMAN.

»Sedan GYLLENHAL utgaf fjerde delen af *Insecta Suecica*, har Svenska Faunan endast blifvit rigtad med tvenne arter inom ofvanstående familj, hvarföre en öfversigt af de sedermera tillkomna ej torde sakna intresse.

Med uteslutande af *Elophorus minutissimus*, hvilken, såsom bekant är, numera hänföres till familjen *Trichopterygia*, uppgår antalet af de arter, som uppföras uti GYLLENHALS nämnda arbete till 40, hvartill komma *Hydrophilus nigricans*, beskrifven af Professor ZETTERSTEDT uti *Insecta Lapponica* samt *Berosus æriceps* af Prof. BOHEMAN i Vet. Akad. Handl. för 1850. I denna öfversigt har jag upptagit 61 species, hvaraf en del förut obeskrifna. Att jag med Svenska Faunan kunnat införlifva så många nya species, därför har jag hufvudsakligast att tacka den välvilja, hvarmed jag blifvit understödd af flera Entomologer inom fäderneslandet, bland hvilka jag med tacksamhet bör nämna: Professor BOHEMAN i Stockholm, som gunstbenäget skickat mig flera af GYLLENHAL meddelade arter; Adjunkt DAHLBOM och Kandidat G. F. MÖLLER samt Professor ZETTERSTEDT i Lund, hvilken sednare godhetsfullt tillåtit mig granska typerna till *Insecta Lapponica*.

I. Familjen HYDROPHILOIDÆ (ERICHs.)

SPERCHEUS (KUGELL.)

1. *S. emarginatus* (SCHALL). Fuscus, obscurus; clypeo emarginato Long. 3 lin.

GYLL. Ins. Sv. 1, 125, 1.

Er. Käfer Mark. 1, 193, 1.

Muls. Palp. 25, 1.

I stillastående vatten, sällsynt vid Lund. Öland, BOHEMAN.

HELOPHORUS (FABR.)

A) *Elytra med en punktserie vid basen, mellan första och andra strian.*

1) *Interstitierna på elytra till en del köl- eller tuberkelformigt upphöjda.*

1. *H. nubilus* (FABR.). Ovatius, griseo-testaceus; thorace 5-sulcato; elytris nigro-nebulosis, interstitiis alternis costatis Long. 1½—1¾ lin.

Gyll. Ins. Sv. 1, 130, 6.

Er. Käf. d. Märk. 1, 194, 1.

Muls. Palp. 30, 2.

Allmän på torra, soliga ställen; äfven under uppkastad hafstång.

2. *H. Fennicus* (PAYK.). Fusco-ferrugineus, griseo-pubescent; thorace 5-sulcato; elytris griseis, fusco-nebulosis, punctato-striatis, interstitiis alternis costatis Long. $2\frac{1}{2}$ lin.

Gyll. Ins. Sv. 1, 129, 5.

Zett. Ins. Lapp. 124, 5.

Under stenar vid den sandiga stranden af Torneå flod i Lappland; ej funnen i sjelfva vattnet, troligen öfverensstämmande i lefnadsätt med föregående (ZETT.)

3. *H. borealis* (SAHLB.). Oblongus, fuscus, fere glaber; thorace 5-sulcato, fusco-æneo, crebre granulato; elytris grisescentibus, fusco-nebulosis, punctato-striatis, interstitiis alternis æneis, costatis. Long. $2\frac{1}{2}$ lin.

R. FERD. SAHLBERG Diss. Nov. Col. 1834, p. 4.

I norra Lapplands stillastående vatten (SAHLB.).

Den afviker från föregående deruti, att kroppen saknar den grå, nästan ulliga beklädnad, som utmärker den förre; thorax är deremot tydligare granulerad, metallglänsande, elytras ribbor metallgröna.

4. *H. tuberculatus* (GYLL.). Ovatus, niger, obscurus; thorace obsoleto 5-sulcato; elytris punctato-striatis, interstitiis alternis tuberculis oblongis elevatis. Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Gyll. Ins. Sv. 1, 129, 4.

ZETT. Ins. Lapp. 124, 4.

Funnen i Lappland af Prof. ZETTERSTEDT; det enda, mig veterligen, i Skåne tagna exemplar, är funnet af Kandidat G. F. MÖLLER i en damm söder om Lund.

2) Interstitierna på elytra ej köl- eller tuberkelformigt upphöjda.

5. *H. aquaticus* (LIN.). Oblongus, capite thoraceque æneis, hoc 5-sulcato, punctato-rugoso, lateribus sinuato, elytris griseis, punctato-striatis. Long. $2\frac{1}{2}$ —3 lin.

Gyll. Ins. Sv. 1, 126, 1.

ZETT. Ins. Lapp. 124, 1.

Er. Käf. Märk. 194, 2. *H. grandis*.

Muls. Palp. 33, 4. *H. aquaticus*.

Af denna art förekomma tvenne ganska olika former: på den ena, som alltid är större, är hufvudet och skifvan af thorax försedda med tydliga granulerade punkter; hvartannat af elytras mellanrum något upphöjdt: på den andra, mindre, är deremot pannan och skifvan på thorax endast fint punkterade, elytras mellanrum jemna.

Båda formerna äro allmänna öfver hela Sverige och gå ända upp till Lappland.

B) Mellan 1:sta och 2:dra strian på elytra synes ej spår till någon mellanliggande punktserie.

6. *H. pallidipennis*. Oblongus, depressus, fusco-niger, antennis, palpis pedibusque testaceis, fronte juxta oculos striga punctata; tho-

race 5-sulcato, sulcis lateralibus leviter flexuosis, fusco-pallido; elytris pone medium dilatatis, pallide-testaceis, crenato-striatis. Long. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ lin.

Funnen i Umeå Lappmark af Prof. ZETTERSTEDT.

Nästan lika stor som *H. aquaticus* LIN., men något smalare. Hufvudet är på båda sidor invid ögonen punkteradt, och försedt med en kort intryckt grop mellan ögonen och frontal-linien, som sträcker sig ända fram till den böjda tvärfåran. Thorax är proportionsvis längre än hos något annat species inom detta släkte, vid spetsen bredare än vid roten, sidorna nästan räta, skifvan otydligt punkterad, genomskuren af 5 ej djupa men breda fåror, lateral-fårorna lätt böjda; blekbrun, med en svag kopparglans; scutellen metallbrun. Elytra äro tillhopatagne vid roten lika breda som thorax, något utvidgade efter midten, humeral-vinkeln rät, skarp; enfärgade blekgula, djupt strierade, strierna punkterade. Benen blekgula.

7. *H. Lapponicus*. Oblongus, subdepressus, capite thoraceque viridi-æneis, hoc convexiusculo, 5-sulcato, sulcis lateralibus internis leviter flexuosis, margine antico lateraliq. pallido; elytris pone medium dilatatis, punctato-striatis, interstitiis planis, pallidis, macula communi suturali pone medium, fusca. Long. 2— $2\frac{1}{4}$ lin.

Zett. Ins. Lapp. 124, 3.

I Umeå Lappmark, ej sällsynt (Zett.). Jag har fått den från Enontekis.

Den är mycket lik *H. dorsalis* Es., men större, thorax kullrigare, sidorna nästan räta, elytra lergula, med en lätt skugga invid suturen efter midten, som understundom är otydlig; för öfrigt så lik att någon vidare beskrifning torde anses öfverflödig.

I ofvan citerade arbete säger Prof. ZETTERSTEDT "elytra pallida, macula suturali communi pone medium fusca sæpe obsoleta."

8. *H. griseus* (Hbst). Oblongus, capite thoraceque viridi-æneis, hoc sub-depresso, 5-sulcato, sulcis lateralibus internis flexuosis, margine antico late lateraliq. anguste pallido: elytris pone medium dilatatis, punctato-striatis, interstitiis planis, pallidis, griseo-nebulosis. Long. $1\frac{3}{4}$ lin.

Gyll. Ins. Sv. I, 128, 3.

Es. Käf. d. Mark. I, 196, 5.

H. dorsalis Es. Käf. d. Mark. I, 196, 6.

» » Muls. Palp. 40, 6.

H. granularis. Var. Muls. Palp. 37.

Allmän i Södra Sverige, äfven i Lappland, men synes derstädes vara sällsyntare än föregående.

Anm. MULSANT har, i sin utmärkta Monographie öfver Frankrikes Palpicorner, sammanfört ERICHSONS *H. griseus* under sin *H. granularis*; jag har, och som mig synes med mera skäl, förenat den med båda dessa författares *H. dorsalis*; för denna åsigt tyckes tala ERICHSONS "Gestreckter, Halsschild nach hinten deutlich verschmälert, und sein Vorderrand, oft auch die Seitenränder hellgelb. Die Grundfarbe der Flügeldecken ist heller gelb; die Punktstreifen

sind *feiner*, die Zwischenräume daher auch *breiter und flacher*."

Att GYLLENHALS *H. griseus* sammanfaller med ERICHSONS *H. dorsalis*, finner man tydligen af den förres beskrifning på thorax, med sin gula sidokant, och på elytra, med den vinkelformiga fläcken vid suturen. Utomdessa har Prof. BOHEMAN skickat två exemplar, meddelade af GYLLENHALS sjelf, såsom dennes *H. griseus*, hvilka fullkomligt öfverensstämma med ERICHSONS *H. dorsalis*. De karakterer, som konstant skilja *H. griseus* från *H. granularis*, äro: den metallgröna färgen på hufvud och thorax, dessas finare punktering och mindre djupa fåror; den aflånga formen på elytra, dessas svagare strier, och bredare, mera platta, mellanrum, samt blekgula färg, med endast tvenne mörkare fläckar, en bredvid suturen på midten, som bildar en vinkel med den motsvarande på andra täckningen, samt en på midten af 7:de mellanrummet, hvilken sistnämnde ofta är otydligare.

9. *H. granularis* (LIN.). Oblongo-ovatus, capite thoraceque æneis, hoc 5-sulcato, sulcis lateralibus internis flexuosis; elytris obscure testaceis, nigro-maculatis, profunde punctato-striatis, interstitiis angustioribus. Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

H. granularis GYLL. Var. b. Ins. Sv. I, 127, 2.

En. Käfer der Mark. I, 195, 4.

MULSANT. Palpic 37, 5. Var. D.

Allmän öfver hela Sverige.

Ann. 1. Anses af MULSANT såsom en varietet till följande, men tyckes dock vara en väl skild art; från föregående kännes den lätt på sin kortare kroppsform; oftast vackert kopparröda thorax, med tydligare granulering; mörkare elytra, med djupare strier och smalare interstitier.

Ann. 2. GYLLENHALS *H. granularis* var. c., af hvilken jag har för mig två exemplar, är måhända en egen art; afviker isynnerhet på elytras ljusare färgteckning, hvori den mera närmar sig *H. griseus*; strierna äro djupa, interstitierna smala; thorax ej så starkt granulerad, framkanten lergul; utomdessa är den dubbelt så liten som den typiska.

10. *H. æneipennis*. Oblongo-ovatus, fusco-æneus, subnitidus; thorace profunde 5-sulcato, sulcis lateralibus internis flexuosis; elytris obscure testaceis, subæneis, fortiter punctato-striatis, interstitiis convexis. Long. $1\frac{1}{2}$ —2 lin.

H. granularis GYLL. Ins. Suec. I, 127, 2.

» » MULS. Palpic. 36, 3. Var. B.

H. aquaticus En. Käfer der Mark. I, 195, 3.

Allmän i stillastående vatten.

Den skiljes lätt från föregående species på formen af thorax, hvars sidor äro rundade före midten; på sina mörka ofläckade elytra, hvilkas sutur alltid är metallgrön; oftast äro äfven de andre mellanrummen mer och mindre tydligt bronzerade.

11. *H. laticollis*. Oblongo-ovatus niger, antennis, palpis pedibusque testaceis; capite thoraceque viridi-æneis, hoc 5-sulcato, sulcis la-

teralibus internis leviter arcuatis, convexiusculo, lateribus in medio rotundatis; elytris obscure testaceis, subæneo-micantibus, profunde punctato-striatis. Long. 2 lin.

H. granularis Zett. Ins. Lapp. 124, 2.

Den är funnen uti Lappland i stillastående vatten och vid flodstränder af Prof. ZETTERSTEDT.

Ganska lik föregående, men kännes lätt på formen af thorax, som är jemnt rundad på sidorna, bredast öfver midten, lätt kullrig, de inre lateralfårorna äro svagt bågböjda, skifvan otydligt punkterad. Elytra äro ej bredare än thorax öfver midten, strierna djupa, dunkelt gula, svagt metallglänsande. Benen lergula.

12. *H. nivalis*. Oblongo-ovatus, supra nigro-æneus, antennis pedibusque concoloribus; thorace 5-sulcato, sulcis lateralibus internis flexuosis, disco subtiliter punctulato; elytris nigro-æneis, pallido-maculatis, punctato-striatis, interstitiis planis. Long. 2 lin.

H. griseus var. b. Zett. Ins. Lapp. 124, 3.

Funnen på sjelfva snön i Maj månad, på högsta åsen af Torneå fjell (Zett.).

Synes stå nära *H. glacialis* Heer, men afviker isynnerhet genom de inre lateralfårorna, som äro mindre starkt bågböjda, och på sin kroppsform, som mera öfverensstämmer med *H. æneipennis*. Hufvudet är metallglänsande, vid ögonen skrynkligt punkteradt, panngroppen och tvärfåran djupa; palperna metallbruna. Thorax är till formen öfverensstämmande med *H. æneipennis*, på sidorna före midten rundad, vid roten smalare än öfver spetsen, metallsvart, skifvan fint och sparsammare punkterad, sidorna skrynkligt punkterade; mellersta fåran djupt utvidgad på midten, de inre lateralfårorna äro ej starkt böjda. Elytra äro vid roten tillhopatagne bredare än thorax, starkt punkterade-strierade, interstitierna ej smala, nästan platta; metallglänsande svarta, med gula fläckar, understundom enfärgade, metallbruna. Benen bronzfärgade, svartbruna.

13. *H. nanus* (SCHÜPPEL). Oblongo-ovatus, convexus, capite thoraceque æneis, hoc 5-sulcato, sulcis omnibus rectis, convexiusculo, disco lævi; elytris obscure æneis, fortiter punctato-striatis. Long. 1½ lin.

En. Käfer der Mark. I, 197, 8.

Muls. Palpic. 42, 8.

Var. elytris fusco-testaceis macula communi discoidali nigra.

Ej sällsynt kring Lund; äfven funnen i Lappland af Professor ZETTERSTEDT.

Denna art skiljes lätt från de öfriga, på sin kullriga thorax, med nästan räta, djupare fåror, och glatt skifva. Den varierar understundom med dunkelt gula elytra och en svart strimma, som upptar mellersta tredjedelen af suturen.

14. *H. pumilio* (En.). Oblongo-ovatus, convexus, capite thoraceque æneis, hoc granuloso, 5-sulcato, sulcis lateralibus internis leviter arcuatis; pedibus elytrisque obscure testaceis, his punctato-sulcatis, interstitiis subcarinatis. Long. 1—1½ lin.

En. Käfer der Mark. I, 197, 7.

Muls. Palpic. 41, 7.

Tillsammans med föregående, och lika litet sällsynt.

Den står midt emellan föregående och *H. granularis*, samt afviker från bådadera uti sin granulerade thorax, med svagt böjda inre lateralfårer, och lätt rundade sidor; elytra äro metallskimrande svartbruna, med djupt punkterade fårer, och kölförmigt upphöjda interstitier.

HYDROCHUS (GERM.).

1. *H. brevis* (Hbst). Oblongus, niger; thorace foveolato; elytris ovatis, fortiter striato-punctatis, sutura interstitiisque alternis carinatis. Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Elophorus brevis GYLL. Ins. Sv. 1, 132, 8.

Hydrochus brevis Er. Käfer der Mark. 1, 198, 2.

» » Muls. Palpic. 44, 1.

Ej sällsynt i Skåne, isynnerhet på lerbotten; äfven under stenar vid stranden af Ringsjön.

2. *H. carinatus* (GERM.). Elongatus, niger; thorace foveolato; elytris oblongis, striato-punctatis, sutura interstitiisque alternis carinatis. Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Er. Käfer der Mark. 1, 198, 3.

Muls. Palpic. 45, 2.

Sällsynt i stillastående vatten vid Lund.

Den är något mindre och betydligt smalare än föregående, till habitus mera lik *H. elongatus*, svart, knappt bronzerad. Thorax är mycket längre än bred, försedd med samma stora gropar, som föregående. Elytra äro aflånga, smala, punktserierna ej så grofva, som hos *H. brevis*, 2:dra, 4:de och 6:te mellanrummen samt suturen kölförmigt upphöjda.

3. *H. elongatus* (FABR.). Elongatus, æneo-niger; thorace foveolato; elytris oblongis, punctato-striatis, sutura interstitiisque plurimis carinato-elevatis, carinis interioribus abbreviatis. Long. 2 lin.

Elophorus elongatus GYLL. Ins. Sv. 1, 131, 7.

Hydrochus elongatus Er. Käfer der Mark. 1, 197, 1.

» » Muls. Palpic. 46, 3.

Ej sällsynt med föregående.

OCHEBIUS (LEACH).

1. *O. marinus* (PAYK). Ovatus, subdepressus, viridi-æneus, nitidus; thorace brevi, transversim impresso, disco lævi; elytris fuscis, punctato-striatis, pedibus pallidis. Long. $1-1\frac{1}{4}$ lin.

Elophorus marinus GYLL. Ins. Sv. 1, 134, 16.

Ochtebius marinus Muls. Palpic. 60, 5.

Ej sällsynt vid hafsstränderne; äfven i en damm vid Lund har jag funnit några exemplar.

2. *O. pygmaeus* (FABR.). Ovatus, leviter convexus, fusco-æneus; thorace punctato canaliculato, elytris punctato-striatis, apice pedibusque piceo-testaceis. Long. 1 lin.

Elophorus pygmaeus GYLL. Ins. Sv. 1, 133, 9.

Hydrena riparia ZETT. Ins. Lapp.

Ochtebius pygmaeus En. Käfer der Mark. I, 199, 1.

» » Muls. Palpic. 626.

Allmän i stillastående vatten öfver hela Sverige.

3. *O. rufomarginatus* (En.). Ovatus, valde convexus, supra fusco-æneus; thorace punctato, canaliculato, disco 4-foveolato, margine dilatato, rufo; elytris fortiter punctato-striatis. Long. $\frac{3}{4}$ lin.

En. Käfer der Mark I, 199, 2.

O. bicolon var. b. Muls. Palpic. 64, 7.

Jag har funnit den på flera ställen i Skåne, såsom vid Ramlösa, Kungsmarken nära Fogelsång, samt vid Lund; endast i slamm, aldrig i vattnet.

Den kännes mycket lätt från föregående på kroppens större kullighet, pannans intryck, och de 4 groparne på thorax, samt på de starka strierna med något upphöjda mellanrum hos elytra.

Ann. De funna exemplaren öfverensstämma fullkomligt med *Enichsons* beskrifning; jag har vid undersökning af ett halft hundrade individer ej kunnat finna någon olikhet eller förändring i kroppens kullighet, färg, eller elytras djupare striering, som *Mulsant* omnämner, hvarföre jag tror att *O. bicolon* och *O. rufomarginatus* äro 2:ne väl skilda arter.

HYDRAENA (KUGELL.)

1. *H. riparia* (Kug.). Oblonga, subdepressa, nigra, antennis, palpis pedibusque rufis; thorace transverso, lateribus angulato, crebre punctato, medio obsolete canaliculato; elytris creberrime punctato-striatis. Long. $1\frac{1}{4}$ lin.

Elophorus minimus Gyll. Ins. Sv. I, 114, 11.

Hydraena riparia En. Käfer der Mark. 2, 696.

» » Muls. Palpic. 79, 4.

Ej allmän, oftast i stillastående vatten.

2. *H. gracilis* (Germ.). Depressiuscula, nitida, nigra, antennis, palpis pedibusque rufis, femoribus picescentibus; thorace subquadrato, lateribus angulato-dilatato, disco parcius, lateribus crebrius punctato; elytris dorso sat fortiter punctato-striatis. Long. 1 lin.

Mas. femoribus crassioribus, tibiis posticis intus ciliatis, sutura elytrorum apice denticulo prominulo.

Muls. Palpic. 82, 6.

v. Kiesenw. Linnæa. Ent. IV, 184, 17.

Jag har funnit den talrikt under småstenar i den lilla bäcken vid Ramlösa. Den är smälare, och något mera glänsande än föregående. Hufvudet framtill nästan glatt, pannan ej lätt men starkt punkterad; palperna röda, slutleden enfärgad. Thorax är knappt bredare än lång, nästan lika bred vid basen som vid spetsen, sidorna vinkelformigt rundade, ej tätt men starkt punkterad, något sparsammare på båda sidor om midten; försedd med en starkt markerad intryckning inom sidokanten. Elytra äro på det bredaste stället obetydligt bredare än thorax öfver midten; mellan suturen och skuldervinkeln stå 6 rader af djupa aflånga punkter, dessa punktseriers mel-

lanrum temligen breda, platta; sidorna tätare punkterade; i spetsen äro de gemensamt urnupna, hos honan är yttersta spetsen af suturen köllformigt upphöjd, hos hannen utlöper suturen i en liten hvass tand. Benen äro röda, låren beckfärgade, starkt bygda; bakre parets tibier på insidans nedre hälft cilierade hos hannen.

3. *H. pulchella* (GERM.). *Depressiuscula*, oblonga, nitida, nigra, antennis, palpis, thorace disco infuscato, elytris pedibusque testaceis; thorace subquadrato, lateribus angulato-dilatato, parce et subtiliter punctato; elytris punctis minus crebris, dorso subseriatis. Long. $\frac{1}{2}$ lin.

KIESSENW. Linnæa. Ent. IV, 187, 19.

Tillsammans med föregående, men sparsammare.

Mycket mindre och med ljusare färgteckning än föregående. Hufvudet är mycket fint punkteradt, pannan starkare; palpernas slutted i spetsen mörkare. Thorax är kortare än bred, sidorna på midten utvidgade i en något trubbig vinkel, mot spetsen svagare än bakåt, afsmalnande, glänsande, blekgul, på midten med en mörk skugga, som stundom utbreder sig åt sidorna, men aldrig når fram- eller bakkanten. Elytra äro äggformigt elliptiska, mer än hälften bredare än thorax öfver midten, i spetsen gemensamt rundade, glänsande, blekgula, suturen och sidokanten något mörkare, ej tätt punkterade, punkterna ordnade i 4—6 serier inifrån suturen, på sidorna tätare och i spetsen mera oregelbundna. Benen blekgula.

LIMNEBIUS (LEACH.).

1. *L. truncatellus* (PAYK). Ovatus, leviter convexus, nitidulus, subtilissime rugoso-punctatus, parcus et tenuiter pubescens, niger; thorace elytrisque tenuiter fusco-marginatis; vertice punctulato, labro apice leviter emarginato. Long. $\frac{3}{4}$ lin.

Mas. abdominis segmento ventrali 6:to apice medio dente obtuso canaliculato armato, ultimo apice biemarginato; tibiis posticis basi valde coarctatis. Long. 1 lin.

Hydrophilus truncatellus GYL. Ins. Sv. I, 123, 13.

Limnebius truncatellus MULS. Palpic. 90, 1.

Är sällsynt öfver hela Sverige, äfven i Lappland; jag har endast funnit den i skogstrakter.

Aflångt-äggformig, ganska glest finhårig, mycket fint punkteradt; elytra nästan chagrinerade. Hufvudet är tydligare och starkare punkteradt mellan ögonen än framtill; labrum i spetsen lätt urbräddadt; palperna rödaktiga. Hannens framtibier äro båg böjda, mot spetsen incrasserade; det bakre parets äro på första tredjedelen mycket tunna, derifrån komprimerade ända till spetsen, mycket längre än hos honan. Nästsista bukringen är hos hannen i spetsen beväpnadt med en trubbig, nedåt och bakåt riktad tand, som är lätt rännlad på inre sidan; sista är i spetsen biemarginerad; hos honan äro båda dessa segmenter hela, glatta. Outbildadt är den liksom de följande arterna blekare, endast hufvudet och skifvan af thorax äro vanligen beckfärgade.

2. *L. papposus* (Muls.). Ovatus, convexiusculus, nitidulus, subtilissime punctatus, parce et tenuissime pubescens, niger; thorace elytris piceo-marginatis; vertice thoracisque lateribus subtiliter punctulatis, labro apice truncato. Long. $\frac{3}{4}$ lin.

Mas abdominis segmento 6:to ventrali fasciculato-piloso. Long. $\frac{3}{4}$ lin.

Hydrophilus truncatellus Gyll. Ins. Sv. I, 123, 13. (Var. minor).

» » Zett. Ins. Lapp. 123, 10.

Limnebius truncatellus Er. Käfer der Mark. I, 203. 1.

» *papposus* Muls. Palpic. 92, 2.

I stillastående vatten, allmän öfver hela Sverige; jag har ej funnit den tillsammans med föregående.

Mindre och något kullrigare än föregående, finare punkterad, och mycket tydligare finhårig. Hufvudet är tätt och fint punkteradt mellan ögonen; labrum i spetsen tvärt afhuggen. Thorax är på sidorna fint punkterad, skifvan nästan glatt. Bakre låren äro lätt bågböjda på öfre sidan, på den undre nästan räta, svagt rännlade, beckfärgade, tibier och tarser roströda.

3. *L. truncatulus*. Ovatus, convexiusculus, nitidus, sublævis, parce et tenuissime pubescens, niger; thorace elytris tenuiter piceo-marginatis; labro apice truncato. Long. $\frac{3}{4}$ lin.

Mas. abdominis segmento penultimo fasciculato-piloso; femoribus postice subtus dente obtuso armatis. Long. $\frac{3}{4}$ lin.

Tillsammans med föregående, ej sällsynt; äfven i Lappland.

Ytterst lik föregående, men hannen lätt kännlig på baklårens tand; dessutom afviker den i följande hänseende: Hufvudet är knappt märkbart punkteradt, då deremot bjessen är tydligt fastän fint punkterad hos föregående. Thorax är öfverallt lika fint punkterad, endast inom framkanten synas 2:ne transversella punktserier, löpande parallelt med densamma, hvilka äro något tydligare hos föregående. Elytra äro glänsande, temligen kullriga, nästan omärkbart punkterade. Benen äro af samma färg, som hos föregående, men hos hannen äro låren på midten af undersidan beväpnade med en trubbig tand; främre tibierna äro svagt böjda, mot spetsen incrasserade.

BEROSUS (LEACH.)

1. *B. spinosus* (Stev.). Oblongus, convexus, testaceus; elytris nigro-submaculatis, punctato-striatis, interstitiis uniseriatim punctatis, apice bispinosus. Long. $2\frac{1}{4}$ lin.

Muls. Palpic. 98, 1.

Först funnen i Norrige af Prof. BOHEMAN, sedermera vid Lomma af Dr ROSENKRÖLD, i Blekinge af RIDDERBJELKE och på Gottland af J. WAHLBERG.

2. *B. æriceps* (CURTIS). Oblongo-ovatus, convexus, luridus; capite prothoracisque lineis duabus approximatis, æneis; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis subseriatim punctatis. Long. $2\frac{3}{4}$ lin.

Er. Käfer der Mark. I, 205, 2. — BOHEM. Act. Holm. 1850, p. 204.

I stillastående vatten på Gottland. KLINGEMANN.

3. *B. lu-*

3. *B. luridus* (LIN.). Oblongo-ovatus, gibbus, luridus, capite thoracisque disco nigro-æneis; elytris nigro-maculatis, profunde punctato-striatis, interstitiis punctatis. Long. 2 lin.

Hydrophilus luridus GYLL. Ins. Sv. I, 115, 4.

» » ZETT. Ins. Lapp. 122, 3.

Berosus luridus ER. Käf. der Mark. I, 205, 1.

» » MULS. Palpic. 100, 3.

I stillastående vatten; ej allmän.

HYDROPHILUS (GEOFFROY.)

1. *H. piceus* (LIN.). Oblongo-ovatus, leviter convexus, piceo-niger, nitidus; abdominis segmento anali ventrali carinato-elevato. Long. 18—22 lin.

GYLL. Ins. Sv. I, 113, 1.

ER. Käfer der Mark. I, 206, 1.

MULS. Palpic. 108, 1.

Ej sällsynt; finnes ej i Lappland.

2. *H. aterrimus* (ESCH.). Oblongo-ovatus, leviter convexus, piceo-niger, nitidus; abdominis segmentis ventralibus carinato-elevatis. Long. 16—22 lin.

ER. Käfer der Mark. I, 206, 2.

Funnen på Öland af RIDDERBJELKE; i Ljungska samlingen äro äfven flera exemplar, troligen från trakten af Calmar.

Ann.: Mesosterni ränna är mer och mindre tydlig hos båda arterna, hvarföre jag ej upptagit denna karakter uti diagnosen.

HYDROUS (LEACH.)

1. *H. caraboides* (LIN.). Ovatus, convexus, niger, nitidus, elytris pone medium ampliatis. Long. 8 lin.

Hydrophilus caraboides GYLL. Ins. Sv. I, 114, 2.

» » ER. Käfer der Mark. I, 207, 3.

Hydrous caraboides MULS. Palpic. 112, 1.

Temligen allmän i stillastående vatten.

HYDROBIUS (LEACH.)

1. *H. fuscipes* (LIN.). Ovalis, convexus, piceo-niger, supra nitidus, confertissime punctatus; elytris crenato-striatis, pedibus piceis. Long. 3—3½ lin.

Hydrophilus fuscipes GYLL. Ins. Sv. I, 114, 3.

» » ZETT. Ins. Lapp. 122, 1.

Hydrobius fuscipes ER. Käfer der Mark. I, 208, 2.

» » MULS. Palpic. 122, 3.

Allmän öfver hela Sverige.

2. *H. limbatus* (FABR.). Sub-hemisphæricus, supra fusco-testaceus, capite thoracisque disco nigris; elytris dorso nigricantibus, stria suturali impressa. Long. 1—1½ lin.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 10. N:o 3.

Hydrophilus globulus GYLL. Ins. I, 117, 6.

» » ZETT. Ins. Lapp. 123, 5.

Hydrobius limbatus ER. Käfer der Mark. I, 208, 3.

» *globulus* MULS. Palpic. 126, 3.

Lika allmän, som föregående.

3. *H. bicolor* (PAYK.). Ovatus, convexus, niger, thorace elytris-que flavescentibus, his postice punctato-striatis, stria suturali profundiori impressa; clypeo apice profunde emarginato. Long. 2—2½ lin.

Hydrophilus bicolor GYLL. Ins. Sv. I, 121, 10.

Hydrobius bicolor MULS. Palpic. 124, 1.

Ganska sällsynt i stillastående vatten.

LACCOBIUS (ERICHs.)

1. *L. minutus* (LIN.). Sub-hemisphaericus, supra pallidus, capite thoracisque disco nigro-æneis; elytris confertim punctato-striatis, griseo-irroratis; fronte macula parva ante oculos pallida. Long. 1—1½ lin.

Hydrophilus minutus GYLL. Ins. Sv. I, 216, 5.

» » ZETT. Ins. Lapp. 123, 4.

Laccobius minutus ER. Käf. der Mark. I, 203, 1.

» » MULS. Palpic. 129, 1.

Allmän öfver hela Sverige.

2. *L. nigriceps*. Ob-ovatus, valde convexus, niger, supra pallidus, capite, thoracis disco scutelloque nigro-æneis; elytris confertim irregulariter punctato-striatis, interstitiis alternis, punctis majoribus seriatis, nigro-irroratis; capite nigro. Long. 2 lin.

Vid Enontekis i Lappland, sällsynt.

Till staturen lik föregående, men dubbelt så stor, omväändt-äggformig, starkt kullrig; de punkterade strierna på elytra äro oregelbundna, på hvart annat mellanrum stå några större punkter, ordnade i rader, alla punkterna i botten infuscerade; liksom hos föregående ser man äfven här en mörk fläck nedom midten straxt invid suturen, samt en hvitblek rund framför spetsen. Scutellen är aflångt triangulär.

Anm.: Den bör ej kunna förblandas med *L. decorus* GYLL., som synes distinkt genom hufvudets olika punktering och färgteckning, samt på de utplattade sidorna af thorax.

3. *L. decorus* (GYLL.). Oblongus, supra pallidus, vertice thoracis disco scutelloque viridi-æneis; elytris confertissime punctato-striatis, punctis infuscatis, corpore subtus nigro, pedibus pallidis (GYLL.)

Hydrophilus decorus GYLL. Ins. Sv. IV, 275, 4—5.

Mycket sällsynt på Gottland (GYLL.). Öland RIDDERBJELKE.

HELOPHILUS (MULS.) *)

1. *H. lividus* (FORST.). Oblongo-ovalis, subdepressus, supra punctatissimus; fusco-testaceus. Long. 2½ lin.

*) Detta namn är förut af MEIGEN använt för ett Dipter-slägte, hvarföre det måste utbytas emot ett annat.

Hydrophilus griseus GYLL. Ins. Sv. I, 122, 11.

» » ZETT. Ins. Lapp. 123, 9.

Hydrobius griseus ER. Käf. der Märk. I, 211, 8.

Helophilus lividus MULS. Palpic. 134, 1.

Allmän öfver hela Sverige.

PHILHYDRUS (SOLIER.)

1. *P. testaceus* (FABR.) Oblongo-ovalis, leviter convexus, supra testaceus, creberrime et subtiliter punctatus, vertice nigricante; elytris stria suturali impressa; palporum maxillarum articulo secundo femoribusque nigris, apice testaceis. Long. 3 lin.

Hydrophilus griseus GYLL. Ins. Sv. IV, 276, 9—10 (forte).

» *melanocephalus* ZETT. Ins. Lapp. 123, 6.

Hydrobius testaceus ER. Käf. der Märk. I, 209, 4.

Philhydrus melanocephalus MULS. Palpic. 137, 1. Var. A.

Allmän i stillastående vatten; på lerbotten (ZETT.)

Hufvudet är alltid svart mellan ögonen, stundom utbreder denna färg sig ner åt spetsen, men lemnar alltid en smal gul kant nedom ögonen fri; palpernas 2:dra led är svart, i spetsen lergul, sista i spetsen mörkbrun. Benen äro lergula, låren svarta, med undantag af yttersta spetsen, som är lergul. För öfrigt synes denna art vara ganska distinkt genom sin något aflånga, rent ovala kroppsform, och öfre sidans fina och täta punktur.

Anm.: Jag har ej funnit ett enda individ vid hafskusten, hvarest följande art deremot ej är sällsynt; det är sålunda med tvekan jag här citerat GYLLENHALS *H. griseus*. Interessant vore det att veta, om det är denne eller följande art som Dr SCHAUH har funnit vid saltsjön vid Mansfeld.

2. *P. maritimus*. Oblongo-ovalis, angustior, parum convexus, nitidus, crebre punctatus, griseo-testaceus, vertice thoracisque disco infuscato; elytris stria suturali impressa; palpis antennisque testaceis; femoribus nigricantibus, apice superne testaceis.

Vid hafskusten under lång; ej sällsynt.

Till staturen är den lik *Helophilus lividus*, men något kullrigare, dock vida mindre än föregående; öfre kroppsytan grågul, nästan oljaktigt glänsande, tydligt punkterad, till och med mera öppet än hos *P. melanocephalus*. Hufvudet är blekgult, hjessan infuserad; palper och antenner enfärgade blekgula. Thorax är något mera rundad på sidorna än hos föregående, grågul, stundom med en mörk skugga på midten af skifvan. Elytra äro starkare och mera öppet punkterade än hos föregående, de gröfre punkt-serierna, som finnas hos beslägtade arter, äro här mera markerade. Benen lergula, låren svarta, öfre hälften blekgula.

Anm.: Vore ej punkturen så stark, jemförelsevis med närliggande arter, skulle GYLLENHALS *H. griseus* passa ganska väl in på denna art; ty så väl uppgiften in "maritimus" som "femoribus nigricantibus superne apice testaceis" kunna ej rätt gerna hänföras till föregående species.

3. *P. melanocephalus* (FABR.). Ovalis, sat convexus, supra testaceus, punctatissimus, capite thoracisque disco nigris; elytris stria suturali impressa; palporum maxillarium articulo ultimo apice fusco; femoribus nigris, supra testaceis. Long. $2\frac{1}{2}$ lin.

Hydrophilus melanocephalus ER. Käfer der Mark. 1, 209, 5.

Philhydrus melanocephalus MULS. Palp. 137, 1. Var. 3.

Ej sällsynt i stillastående vatten.

Denna art är alltid mindre än *P. testaceus*, mera elliptiskt-oval; hufvudet svart, med en blekgul linie framför ögonen; palperna äro lergula, dess sista led i spetsen jemte antennklubban svartaktiga. Thorax är något smalare mot spetsen än hos *P. testaceus*, svart, sidorna blekare. Elytra något tydligare punkterade, mera spetsigt rundade, blekt gula. Benen äro lergula, låren svarta, längs midten dunkelt gula.

4. *P. nigricans* (ZETT.). Ovatus, convexus, supra fusco-testaceus, punctatissimus, capite thoracisque disco nigris, palpis totis pedibusque rufescentibus, femoribus supra tenuiter nigro-marginatis; elytris stria suturali impressa. Long. $2\frac{1}{2}$ lin.

Hydrophilus nigricans ZETT. Ins. Lapp. 123, 7.

Ganska sällsynt i Lappland (ZETT.)

Till kroppsform öfverensstämmer den mest med *P. melanocephalus*, och har samma fina punktur, men är något kullrigare och kortare, rödbrun; hufvudet svart med en rödgul fläck framför hvarje öga; palperna äro rödaktiga, antennerna äro af samma färg, klubban något mörkare. Thorax är mera afsmalnande fram mot spetsen än hos *P. melanocephalus*, kullrigare längs midten, skifvan svartaktig, sidorna rödbruna. Elytra öfverensstämma fullkomligt till puncturen med ofvannämnde *P. melanocephalus*, men äro något mera brunröda till färgen, och något starkare kullriga. Benen brungula, låren med en svart ofvankant.

5. *P. marginellus* (FABR.). Oblongo-ovalis, leviter convexus, supra punctatissimus, fusco-niger, thoracis elytrorumque margine fusco-testaceis; his stria suturali impressa; palpis articulo ultimo nigro. Long. $1\frac{3}{4}$ lin.

Hydrophilus affinis GYLL. Ins. Sv. 1, 123, 12.

Hydrobius marginellus ER. Käf. der Mark. 1, 210, 7.

Philhydrus marginellus MULS. Palp. 141, 2.

Allmän med *P. melanocephalus*.

6. *P. ovalis*. Sat convexus, oblongo-ovalis, crebrius punctatus, niger, nitidus, thoracis lateribus elytrisque, stria suturali impressa, margine piceis; palpis totis rufescentibus. Long. 2 lin.

Från Gottland och vid Stockholm; benäget meddelad af Prof. BOREMAN.

Af en aflång, rent oval form, kroppens öfra sida starkare punkterad, mera intensift svart, antenner och palper rödaktiga; annars till habitus mest lik föregående.

CYLLIDIUM (ERICH.)

1. *C. seminulum* (PAYK.). Subglobosum, nigrum, nitidum, læve; elytris stria suturali impressa. Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Hydrophilus seminulum GYLL. Ins. Sv. I, 118, 8.

Cyllidium seminulum ER. Käf. der Mark. I, 211, 1.

» » MULS. Palp. 144, 1.

Ej sällsynt vid vatten.

II. Familjen SPHÆRIDIOIDÆ (ERICHs.)

CYCLONOTUM (DEJ.)

1. *C. orbiculare* (FABR.). Subhemisphæricum, atrum, nitidum, creberrime punctatum; elytris stria suturali impressa. Long. 1½ lin.

Hydrophilus orbicularis GYLL. Ins. Sv. I, 118, 7.

Cyclonotum orbiculare ER. Käf. der Mark. I, 212, 1.

» » MULS. Palpic. 148, 1.

Allmän i stillastående vatten.

SPHÆRIDIDIUM (FABR.)

1. *S. scarabæoides* (LIN.). Nigrum, elytris macula antica sanguinea, apicali testacea; pedibus testaceis, fusco-maculatis. Long. 3 lin.

GYLL. Ins. Sv. I, 100, 1.

ER. Käf. der Mark. I, 214, 1.

MULS. Palp. 151, 1.

Var. nigrum, elytris apice macula lunata lutescente.

GYLL. Ins. Sv. I. c. var. b.

Allmän i nyfallen spillning.

2. *S. bipustulatum* (FABR.). Atrum, elytris margine tenui, maculae subapicali lunata pedibusque testaceis, his nigro-fasciatis. Long. 2 lin.

Sphæridium marginatum GYLL. Ins. Sv. I, 101, 2. Var. b.

» *bipustulatum* ER. Käf. der Mark. I, 215, 3.

» » MULS. Palp. 153, 2.

Var. a. elytris macula humerali rufa.

Sphæridium marginatum GYLL. Ins. Sv. I, 101, 2. Var. c.

Var. b. nigrum, margine thoracis elytrorumque rufo-testaceo.

Sphæridium marginatum GYLL. I, 101, 2.

» » ER. Käf. der Mark. I, 215, 2.

I sällskap med föregående och lika allmän.

CERCYON (LEACH.)

A) *Framtibian med en inskränning före spetsen, beväpnad med en skarp bakåt krökt tand i spetsen.*

1. *C. littorale* (GYLL.). Ovale, leviter convexum, piceo-nigrum, dense punctatum; thoracis lateribus in medio dilatatis; elytris punctato-striatis, striis apicem versus profundioribus, interstitiis confertim punctulatis, apice convexis; tibiis anticis ante apicem excisis; labro transverso, apice subemarginato. Long. 1½ lin.

Sphæridium littorale GYLL. Ins. Sv. I, 111, 13.

» » ZETT. Ins. Lapp. 121, 9.

Cercyon littorale Muls. Palp. 172, 9.

Var. a. thorace elytrisque margine rufo-testaceis, his apice late pallidis, pedibus rufescentibus.

Gyll. l. c. var. b.

Var. b. thorace rufo-piceo, elytris basi rufo-maculato pallidis, pedibus rufis.

Gyll. l. c. var. c.

Var. c. rufo-castaneum totum.

Gyll. l. c. var. d.

Under uppkastad tång vid hafskusten ej sällsynt.

B) *Framtibian utan inskärning före spetsen.*

2. *C. dorso-striatum*. Ovale, parum convexum, nigrum, thoracis lateribus, in medio explanato-dilatatis, elytrisque apice fusco-testaceis, his subnitidis, dorso obsolete punctato-striatis; labro transverso, apice truncato; mesosterno lineari-elongato. Long. $1\frac{1}{4}$ lin.

Tillsammans med föregående, men mycket sparsammare. Den finnes äfven i Ljungska samlingen, under *S. littorale* var. b.

Ganska lik föregående, men mindre kullrig; labrum svart, i spetsen afhuggen. Thorax är på sidorna, som äro brungula, nästan starkare rundad än föregående. Elytra äro svagt glänsande, på skifvan försedda med några punkterade strier, hvilka försvinna före spetsen, som är smutsgul, interstitierna äro mycket fint och glest punkterade, suturalvinkeln snarare afrundad än nedböjd. Mesosternum glänsande, lineär. Framtibiernas spets är, liksom hos de följande arterna, ej emarginerad, utan afrundad och beväpnad med fina tänder, hvilka blifva starkare nedåt.

De funna exemplaren öfverensstämma alla i färgteckningen.

3. *C. marinum*. Ovale, convexum, nigrum, nitidum, crebre punctatum, elytris subtiliter punctato-striatis, margine inflexo maculaque apicali subdeterminata rufotestaceis, sutura nigra; elytrorum angulo suturali recto; mesosterno oblongo. Long. $1\frac{1}{2}$ – $1\frac{3}{4}$ lin.

Sphaeridium terminatum Zerr. Ins. Lapp. 121, 8.

Cercyon aquaticum Var. B. Muls. Palpic.

Vid Lomma på sanden ej sällsynt. I Torneå Lappmark af FAIGELIUS.

Till kroppsform snarlik *C. flavipes*, fint punkterad, svart glänsande. Hufvudet är fint punkteradt, labrum i spetsen svagt bågböjd; palperna beckfärgade. Thorax är smalare öfver spetsen än vid roten, kullrig, sidorna jämnt rundade, fint punkterad; svart med en beckröd punkt i frambörnen. Elytra äro fint strierade; strierna ej starkt, mellanrummen tydligare punkterade; svarta, den invikna sidokanten och en ganska begränsad fläck i spetsen, som går högre upp på sidan, äro brungula, suturalvinkeln rät. Mesosternum aflångt. Benen beckröda, lären mörkare.

Anm.: Från *C. laterale* skiljes den lätt på sin mera aflånga kroppsform, på thorax, som ej är så starkt kullrig, med endast en beckröd punkt i frambörnen; från *C. flavipes* på sin rätta suturalvinkel.

4. *C. palustre*. Rotundato-ovatum, convexum, nigrum, nitidum, crebre punctatum, tarsi, puncto in angulo thoracis antico maculaque elytrorum apicali determinatori rufotestaceis, sutura nigra; elytris tenuiter punctato-striatis, angulo suturali recto; mesosterno oblongo-ovali, nitido, punctulato. Long. 1 lin.

Vid Lund tillsammans med *C. hamorrhoum*, sällsynt.

Till kroppsformen mest lik *C. lugubre* GYLL., kort, äggrund, ganska kullrig, svart, glänsande, fint punkterad. Hufvudet svart, palperna af samma färg; labrum i spetsen bågböjd. Thorax är transversel, mycket bredare vid roten än öfver spetsen, som i midten är något främragen, sidorna jämnt rundade, fint men tydligt punkterad, svart med en bekröd punkt inom hvarje framhörn. Elytra äro fint strierade, strierna och dess mellanrum fint, ej tätt, men tydligt punkterade, glänsande, svarta, med en skarpt begränsad brungul fläck i spetsen, hvilken upptar fjerdedelen af elytra, samt sträcker sig något högre upp på sidorna; suturen svart, dess vinkel rät. Mesosternum glänsande, aflångt-oval, knappt dubbel så lång som bred, punkterad. Benen svarta, tarserna roströda.

Anm.: Från *C. aquaticum* STEPH., som den tyckes stå närmast, skiljer den sig genom sin kortare kroppsform, mörkare antenner och ben; från *C. lugubre* GYLL. på sin större, baktill mera rundade kroppsform, och på de starkare punkterade strierna och interstitierna på elytra; från *C. granarium* ER. på elytras bestämda färgteckning; från alla kännes den på sina svarta palper och ben.

5. *C. lugubre* (PAYK.). Breviter ovatum, convexum, nigrum, nitidum, elytris subtiliter punctato-striatis, striis integris, interstitiis lævibus, apice subdeterminate piceo-rufis; mesosterno oblongo-ovali. Long. $\frac{3}{4}$ lin.

Sphæridium lugubre GYLL. Ins. Sv. I, 111, 12.

Cercyon lugubre ER. Käf. der Mark. I, 220, 10.

» » MULS. Palp. 181, 14.

Sällsynt vid Lund på fuktiga ställen; från Småland och Stockholm af Prof. BOHEMAN.

Anm.: Ett exemplar, som Professor BOHEMAN sändt mig till påseende och blifvit meddeladt honom af GYLLENHAL såsom dennes *S. lugubre*, hör till följande art; jag nämner det endast derföre, att man vanligen lägger mera vikt på original-exemplar, än den allra noggrannaste beskrifning.

6. *C. minutum* (FABR.). Breviter ovatum, convexum, nigrum, subnitidum, elytris subtilius punctato-striatis, interstitiis, apiceque piceo, lævibus; mesosterno oblongo-ovali. Long. $\frac{3}{4}$ —1 lin.

Sphæridium minutum GYLL. Ins. Sv. I, 110, 11.

Cercyon minutum ER. Käf. der Mark. I, 220, 11.

» » MULS. Palp. 180, 13.

Allmän vid vatten.

Anm.: Den är lätt känlig från föregående derpå att thorax är mycket tydligare och djupt punkterad, dess sidor endast framtill beckfärgade, samt palper och ben mörkare.



7. *C. anale* (PAYK.). Oblongo-ovatum, postice acuminatum, nigrum, nitidum, elytris punctato-striatis, macula apicali determinata pallide rufa, sutura nigra; mesosterno oblongo. Long. 1 lin.

Sphæridium terminatum GYLL. Ins. Sv. I, 108, 10.

Cercyon anale ER. Käf. der Mark. I, 249, 9.

» » MULS. Palp. 183, 15.

Allmän på fuktiga ställen, i synnerhet under ruttnande vext-ämnen.

Ann.: Thorax är i framhörnerna beckfärgad, dess punkter liksom mellanrummens på elytra äro svagare än striernas, suturalvinkeln spetsigt nedböjd; palper och ben rödgula. Utbildad till färgen är den blekröd, elytras strier mot spetsen något svagare; kanske hör HEERs *C. castaneum* hit.

8. *C. hæmorrhoum* (GYLL.). Ovale, subgibbosum, nigrum, nitidum; thorace pulvinato-convexo; elytris striatis, macula intra apicem determinata rufa; mesosterno lineari. Long. 1½ lin.

Sphæridium hæmorrhoum GYLL. Ins. Sv. I, 107, 9.

Cercyon hæmorrhoum ER. Käf. der Mark. I, 216, 2.

» » MULS. Palp. 161, 3.

Ej sällsynt vid vatten.

9. *C. obsoletum* (GYLL.). "Rotundato-ovatum, nigrum, parum convexum; elytris tenuiter punctato-striatis, apice pedibusque rufescentibus." GYLL.

Sphæridium obsoletum GYLL. Ins. Sv. 110, 7, 8.

Cercyon obsoletum MULS. Palpic. 157, 1.

Lär vara funnen i Sverige, men mycket sällsynt enligt GYLLENHAL.

10. *C. hæmorrhoidale* (FABR.). Ovatum, subgibbosum, nigrum; thorace puncto baseos impresso; elytris punctato-striatis, apice piceo-castaneis. Long. 1½—1¾ lin.

Sphæridium hæmorrhoidale GYLL. Ins. Sv. I, 105, 6.

» » ZETT. Ins. Lapp. 121, 6.

Cercyon hæmorrhoidale ER. Käf. der Mark. I, 216, 1.

» » MULS. Palp. 159, 2.

I spillning allmän, liksom alla följande arter.

11. *C. laterale* (STREB.). Ovato-ovale, convexum, nigrum, nitidum, crebre punctulatum, palpis thoracis lateribus pedibusque rufis; elytris, subtiliter punctato-striatis, piceis, apice pallidioribus, angulo suturali recto. Long. 1½ lin.

MULS. Palpic. 163, 4.

Sphæridium hæmorrhoidale Var. b. ZETT. Ins. Lapp. 121, 6.

Funnen på sandbackar i kospillning; sällsynt.

Lätt känlig från *C. flavipes* FR., som den närmast liknar, der på att thorax är kullrigare längs midten; dess sidor alltid ljusare än skifvan; elytras interstitier äro ej så lätt punkterade, vanligen beckröda, ljusare utåt spetsen, med en svartaktig fläck vid skuldran och en vid scutellen; stundom är färgen blekare, men suturen alltid, liksom hos den typiska, infusceraad ända från basen till spetsen;

suturalvinkeln är alls icke nedböjd, utan rät. Benen jemte palperna rödaktiga.

Anm.: Kanske böra GYLLENHALS *Sphæridium melanocephalum* var. *d* och *e* föras hit.

12. *C. flavipes* (FABR.). Oblongo-ovale, convexum, dense punctulatum, nigrum; elytris subtiliter punctato-striatis, margine tenui apiceque rufis, angulo apicali suturali acuminato-deflexo. Long. 1—1½ lin.

Sphæridium melanocephalum Var. *c*. GYLL. Ins. Sv. I, 103, 4.

» » ZETT. Ins. Lapp. 121, 4.

Cercyon flavipes ER. Käf. der Mark. I, 216, 3.

» » MULS. 176, 11.

Allmän öfver hela Sverige.

13. *C. melanocephalum* (LIN.). Oblongo-ovatum, convexum, nigrum, nitidum; elytris subtiliter striatis, striis interstitiisque subtiliter punctulatis, macula communi scutellari majori triangulari, aliaque humerali oblonga nigra; angulo suturali leviter deflexo. Long. 1 lin.

Sphæridium melanocephalum GYLL. Ins. Sv. I, 103, 4.

Cercyon melanocephalum ER. Käf. der Mark. I, 217, 4.

» » MULS. Palp. 178, 12.

Tillsammans med föregående och lika allmän.

14. *C. unipunctatum* (LIN.). Oblongo-ovale nigrum, modice convexum, subtiliter punctulatum, thoracis lateribus elytrisque testaceis, his macula communi cordata media nigra, punctato-striatis. Long. 1—1½ lin.

Sphæridium unipunctatum GYLL. femina Ins. Sv. I, 102, 3.

Cercyon unipunctatum femina ER. Käf. der Mark. I, 27, 5.

» » MULS. Palp. I, 64, 5.

Ej sällsynt.

15. *C. quisquilius* (LIN.). Oblongo-ovale, nigrum, modice convexum, thoracis lateribus æqualiter rotundatis, pedibus elytrisque testaceis, his subtiliter punctato-striatis. Long. 1 lin.

Sphæridium unipunctatum mas GYLL. Ins. Sv. I, 102, 3.

Cercyon unipunctatum mas ER. Käf. der Mark. I, 217, 5.

» *quisquilius* MULS. Palp. 166, 6.

Lika litet sällsynt, som föregående.

16. *C. centrimaculatum* (STRM.). Ovato-ovale, modice convexum, nigrum, thoracis lateribus pone medium rotundato-dilatatis, elytris-que rufo-testaceis, his (sæpe macula media fusca) punctato-striatis. Long. ¾ lin.

Sphæridium pygmaum var. *b*. GYLL. Ins. Sv. I, 104, 5.

Cercyon centrimaculatum ER. Käf. der Mark. I, 208, 7.

» » MULS. Palp. 169, 7.

Ej så allmän som följande.

Skiljes lätt från föregående på formen af thorax, hvars sidor äro utvidgade före basen, hvarest den är bredare än öfver spetsen; på skifvan är den mörkbrun, sidorna ljusare; strierna på elytra äro tydliga, i synnerhet de som äro närmast suturen, hvilka löpa ända från

basen ner till spetsen; genom denna caracter kännes den lätt från utbildade individer af följande art.

C. pygmæum (ILLIG.). Ovatum, convexum, nitidum nigrum; elytris punctato-striatis, castaneis, basi nigris. Long. $\frac{3}{4}$ lin.

Sphæridium pygmæum GYLL. Ins. Sv. I, 104, 5.

Cercyon pygmæum ER. Käf. der Mark. I, 209, 8.

» » MULS. Palp. 170, 8.

Allmän i spillning.

Varierar med ljusare elytra, hvilkas spets i sådant fall äro mera lergula.

MEGASTERNUM (MULS.)

1. *M. boletophagum* (MARSH.). Breviter-ovatum, convexum, punctulatum, nitidum, piceum, elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis sublævibus. Long. $\frac{3}{4}$ lin.

Cercyon boletophagum ER. Käf. der Mark. I, 221, 13.

Megasternum boletophagum MULS. Palp. 187, 1.

Jag har funnit ett exemplar i svamp vid Ramlösa, och några i torr spillning vid Lund; äfven på Gottland, vid Stockholm och Anneberg i Småland af Prof. BOHEMAN.

CRYPTOPLEURUM (MULS.)

1. *C. atomarium* (FABR.). Rotundato-ovatum, nigrum, punctatissimum; elytris crenato-striatis, apice rufescentibus, parce pubescentibus. Long. 1 lin.

Sphæridium atomarium GYLL. Ins. Sv. I, 106, 7.

Cercyon atomarium ER. Käf. der Mark. I, 222, 14.

Cryptopleurum atomarium MULS. Palp. 188, 1.

Allmän i spillning.

3. Bref från resande naturforskare. — Ur en skrifvelse från Hr Mag. N. ANDERSON, hvilken såsom botanist åtföljer fregatten Eugenie, meddelade Sekreteraren följande utdrag:

»Vi anlände till Sidney sent om qvällen den 21 October och afseglade den 31 tidigt på morgonen. Vi hade således åtta dagar på oss här i denna nya natur, i detta det intressantaste af oss hittills besökta land, endast åtta dagar att se, studera och samla! Hvad skulle vi då kunna uträtta? Emellertid tror jag mig ej från någon lokal hafva sammanbragt så betydliga samlingar som härifrån; jag är ej i stånd att noggrannt uppgifva antalet, men jag vill tro mig hafva insamlat åtminstone 400 arter i 4000 exemplar om ej mera. I berättelsen från förra expeditioner hade jag läst, att vid pass

70 mil söder om Sidney finnes ett distrikt, Illawarra, der naturen skulle vara ytterst luxuriös, rik och skön i förening. Föreståndaren för Sidneys botaniska trädgård bestyrkte min af-sigt att resa till denna »Nya Hollands trädgård», som trakten kallas, och hade artigheten att sjelf dit åtfölja och på allt upp-tänkligt sätt leda mig. Jag afreste således med ett ångfartyg till distriktets stad Wollongong och uppehöll mig derstädes tre dagar, samt hembragte betydliga skördar så väl af torkade väx-ter som stammar af ormbunkar och palmer, samt diverse mi-neralier. Under andra förhållanden än dem, hvarunder jag såg Nya Holland, skulle dess naturscenerier säkerligen hafva frap-perat mig, men intrycken af det myckna outsägligt sköna jag skådat på Sandwichsöarne och Otaheiti, för att ej nämna allt det föregående, var för lifligt, att jag skulle mäktigt imponeras af hvad jag här såg. Landskapet egde visserligen ett outsäg-ligt bördigt utseende, en stor rikedom af olika situationer och tät lummighet af grönskande skogar, men saknade dessa stor-artade berg eller denna saftfullhet och omvexling, som ensam-ma förmå att skapa en naturskön nejd. Närmast en vidsträckt sandstrand, derofvan vidsträckta betesmarker, så ett kuperadt åkerbruksland och sist en temligen sakta sluttande medelmåttig bergås — bortom hvilket allt omätliga vattentomma, brännheta, af låga buskväxter betäckta slätter utbreda sig — se der det allmänna utseendet af Illawarras distrikt, som dock skall vara det vackraste. Den nyholländska vegetationens allmänna ka-rakter af torrhet och mager enformighet passar ej fullt här, men återfinnes i all sin sanning omkring Sidney. Här var frodig-heten, bördigheten större. Märkvärdigt, att ibland växtmassor af en alldeles från våra förhållanden afvikande fysiognomi, med former i grunden egendomliga för detta land, jag skulle träffa flera gamla bekanta från det kära Norden än någorstädes annars. *Veronica* nära *chamædrys*, *Scirpus maritimus* och *palustris*, *Tri-glochin palustre*, *Solanum nigrum*, *Stellaria media*, *Prunella vul-garis*, *Plantago major* och *lanceolata*, *Sonchus oleraceus*, *Juncus bufonius*, *Drosera rotundifolia*, *Senecio* nära *crucifolius*, *Rumex*

liknande conglomeratus, *Trifolium repens*, *Ranunculus acris*, *Cerastium vulgare*, jemte *Briza virens* och major samt *Cynodon dactylon* m. fl. voro af detta slag. Till ett närmare åskådliggörande af denna vegetation skall jag korteligen omnämna det mest framstående. På den sandiga hafsstranden voro *Calystegia rupestris*, ett *Triticum* och ett annat märkvärdigt gräs allmänna; der insamlade jag åt *Aræschoug* en vacker samling *Spongia*, till ersättning för de få *Alger* (blott tre arter härifrån!) jag annars varit i stånd att få. Ofvan denna sand, på den hårda banken, bildade *Banksia integrifolia* och *Fabricia lævigata* ogenomträngliga busksnår; på öppnare ställen växte *Westringia rosmarinifolia* i täta småbuskar och hvitblommig, *Pimelia pilosa* bildade täta hvita tufvor, *Herotes altissima* i stora gröna ruskor, samt deribland de blå *Wahlenbergia grandiflora*, *Aster herbacea*, gula *Meliloti* och *Medicagines* samt *Plantago hispida*. Betesmarkerna derofvan hade en ej aflägsen likhet med våra; ymnigt betäcktes den af *Trifolium repens* höljda marken af *Pteris esculenta*, nu brunvissnad, liksom vår ormbunke; stora sträckor fylldes af *Melaleuca armilloides* och den gullgula *Viminaria*, medan *Xyrides*, *Lycopodia*, *Triglochin*-arter fyllde våtare ställen och den glesa skogen utgjordes af *Eucalyptus*- och *Casuarina*-arter. — Det rika, bördiga och blott af få farmers bebodda odlingsbara landet med sina väl skötta åkerfält, der 30 år å rad samma sädesslag kan odlas utan behof af gödning, med sina yppiga betesmarker, der klöfver och rajgräs bilda de herrligaste naturliga ängar, med sina af jättelika *Eucalypter* och fastä *Casuariner* bestående skogar, var ett riktigt Eden. Hvete och majs odlades företrädesvis, vinskötseln är ock mycket på modet. Alla Europas ädla fruktsorter lyckas förträffligt, och boskapsskötsel (inclusive smör-, ost- och äggberedning) utgör provinsens hufvudnäring. Väl har vegetationen redan här den egendomliga prägeln, men det var egentligen först med bestigandet af berget, som den utvecklade all sin kraft och tjugande mångfald. Nedersta regionen utmärktes af *Leucadendron*-buskar med sina björkhvita stammar och kolsvarta grenar, *Pittosporum fulvum*

och *Eugenia trinaria*, bland hvilka den röda *Kennedya rubicunda*, den blå *Hardenbergia monophylla*, den gula klocklika *Billardiera scandens* slingrade sig, insnärjd bland klättrande *Bignonia pandora*, *Goodenia aurea*, *Passiflora* en gulröd art, *Clematis stenopetala*, *Eustrephus angustifolius*, medan tomrummen fylldes af den hvita *Cassia arborea*, den violettepurprade *Prostanthera*, *Pimelia hypericifolia*, *Gymnostachys acutus*, gulglänsande *Senecio*-arter, det yfviga buskartade *Solanum laciniatum*, och vår allmänt bekanta *Helichrysum bracteatum*. — Mellersta regionen, omfattande 2—600 fots höjd, företedde dock den mest storartade karakteren. Här nådde *Eucalypterna* en höjd af nära 200 fot med en diameter af minst tre alnar, omkransade af ofantliga svamputväxter eller enorma myrbon högt uppe på stammen eller af de fågelbo lika ormbunkarne *Acrosticum alcorni* och *Neothopteris vulgaris*, blandade med väldiga *Acacia melanoxylon* samt de mer än hundra fot höga palmerna *Seaforthia* och *Corypha australis*, under hvilkas kronor de mer än 20 fot höga trädartade ormbunkarna *Dicksonia antarctica* och *Cyathea dealbata* höjde sina fina bladmassor, medan gigantiska *Ficus*-träd utsände sina väldiga af slingrande Lianer genomflätade grenverk, och bland andra trädslag den tio alnar och mera höga *Urtica gigas*, med stora fotbreda rysligt brännande blad, trängde sig in i löfmassorna, — och man hade onekligen här en efterbild af den tropiska yppigheten, hvilken man icke skulle väntat sig vid en sådan latitud i Nya Holland, och som endast lär återfinnas i Illawarra. *Lasiopetalum*, *Smilax australis*, tre *Rubi*, *Clerodendron*, *Omalanthus populifolius* jemte flera voro här ymniga, och af ormbunkar *Polypodium rupestre*, *P. Billardieri*, *Gleichenia* tre arter, *Asplenium flabellatum* och andra. Äfven af Orchideer märktes ingen brist, men i allmänhet var bladsystemet här förherrskande. När man uppnår den tredje regionen, och dermed inträder på den sandiga torra jordmånen, återfinnas samma växter som vid Sidney, och hvilka jag snart skall närmare omnämna.

Återkommen från denna intressanta utfärd, exkurrerade jag i Sidneys omgifningar ett par dagar och gjorde ett besök vid den klassiska Botany Bay, der så mycket talar om de fordna tider, då *BANKS* först såg detta herrliga land och dess sköna växtskatter. Hela trakten hvilat på sandsten, sanden hoppar sig allestädes i höga kullar, bevuxna af en tät buskvegetation och temligen resliga Eucalypter, Casuariner, Banksier, *Xylomela*, *Podocarper*, *Acacier*, mellan hvilka stå de talrika sköna växterna. Jag vet intet bättre att likna en vandring genom dessa skogsnår och dessa sandfält vid, än vid ett vistande i det vidsträcktaste, praktfullaste orangeri. Förtjusande former, herrliga, lysande färger, en otalig rikedom på individer, en förvånande blandning af arter, detta är den allmänna karakteren. Högre buskar bilda de talrika *Grevilleerna* (*buxifolia*, *sericea*, *linearis*, *concinna* m. fl.), den gulblomniga *Aotus villosa*, *Gompholobium latifolium*, *Leptosperma*, de praktfulla *Callithamnierna* och *Callistemon*, de praktfulla *Lambertia formosa* och *Styphelia latifolia*, de talrika *Pulteneerna*, *Persoonierna*, *Lysinema pungens* och de småtäckta *Dillwynierna*. Mellan denna skiftande samling af sällsynta skönheter packa sig de icke mindre strålande *Epacrideerna* (särdeles *grandiflora* och *pulchella*), de azurblå *Dampiererna*, de rosenfärgade *Bauera rubioides*, *Borreria pin-nata* och *alata*, *Tetratheca ericifolia*, den hvita *Leucopogon microphyllum* och *Calliceme serrata* samt de gula *Billardiera*, *Platylobium*, *Pulteneerna* och *Diuris maculata*. Der är en variation, som sannerligen bländar ögat och man stannar nästan orörlig af förundransfull hänryckning. Ögat vänder sig från det underbara (såsom Grästrädet, *Xantorrhæa*, hvaraf jag hembragt hela stånd) till det sköna (hvaraf priset tillkommer *Epacrideerna* och de barrtorra *Papilionaceæ*), och vet ej vid hvilket man helst och längst skall fästa sig.

Nya Holland är utan gensägelse det mest afundsvärda land för en botanist. Morphologen har här gåtor att lösa, som ingenstädes annars, den former och färger älskande den största rikedom och mångfald, den som är fiken efter nytt, har här

oändliga oundersökta ställen att genomforska. Jag kan icke tänka mig något så ofundsvärdt öde som att få här vara och arbeta, och det skall bli målet för mina framtida ansträngningar att hit återvända.

Ingenstädes under hela vår färd hafva vi blifvit bemötta med en så hjertlig och stor gästfrihet och vänlighet som här. Föreståndaren för den botaniska trädgården, Mr CH. MOORE, åtföljde mig allestädes och underlättade mig med sina råd och anvisningar. Han gaf en värdefull frösamling och lofvade att i framtiden skicka oss växter härifrån. MAC LEAY den äldre är visserligen för länge sedan död; men der lefde ännu en ganska åldrig MAC LEAY (sonen). Han bodde som en furste, hade en vidsträckt botanisk trädgård, ofantliga insektsamlingar och arbetar med stor ifver och sakkännedom i alla naturhistoriens grenar. Han bemötte mig med den mest vidsträckta artighet och välvilja, och bad mig helsa Prof. WAHLBERG och BOHEMAN, att det skulle glädja honom komma i utbyte med skandinaviska insekter mot nyholländska. Af Cassidæ hade han materialier till ett godt supplement.

Från Sidney gjorde vi en ytterst snabb resa. Redan den 8 Nov. voro vi utanför Stewartsöarne (öster om Salomons) (8°38' lat.), men ett långt framskjutande ref hindrade deras angörande. Kring linien fingo vi ligga i en af ytterlig hetta odräglig stiltje, och den 21 Nov. nådde vi Wellington Island (Carolinerna); jag fick gå i land efter några sköldpaddor, men det blef mörkt innan vi nådde det, så att jag fick intet se af vegetationen. Påföljande dagen fingo vi fyra timmar att besöka Ascension, en hög, stor vulkanisk ö, omgifven af vidsträckta korallbildningar. Vegetationen hann jag blott föga se. Den var alldeles densamma som på de förra öarne, Cocospalm, Brödfrukt-träd, Ficus och Barringtonia öfvervägande, vid stränderna Rhizophora; men litet ostindiskt mötte redan här, t. ex. en ymnig Curcuma. Till Guaham hade vi en otroligt snabb resa, gjorde den 25 ända till 280 minuter! och anlände den 27 Nov. till hamnen Umata. Som icke mera än en och en half dag bestods oss att

anställa exkursioner på, kunde skördarne ej blifva talrika. Jag besteg bergshöjderna, genomvandrade dalarne och strök längs hafsstranden, så att jag på den korta tiden dock fick ett ungefärligt begrepp om vegetationen. Den var alldeles lik de öfriga vulkaniska öarnes, men mindre rik på ormbunkar; de lägre trakterna hyste en otroligt yppig skog af två slags palmer, brödruktträd, *Rhizophora*, *Ficus*, *Bambusa* och *Hibiscus tiliaceus*; höjderna betäcktes af två till tre alnar högt gräs i ogenomträngliga massor, men i öfrigt var artmångfalden ringa och antalet af för mig nya besteg sig icke till tio. Emellertid bi-drogo de få timmarne att temligen utvidga den förut förvärfvade kännedomen om Oceaniens Flora, och jag lemnade nu densamma ej utan talrika angenäma intryck.»

Inlemnade afhandlingar.

- Af Hr Prosector Dr FR. WAHLGREN i Lund: Anteckningar öfver byggnaden af ryggmergen och ryggmergsganglierna hos Rockan. Remitterades till Hrr A. RETZIUS och SANTESSON.
- Af Hr Bergmästaren F. VON SCHEELE: Meteorologiska iakttagelser vid Philipstad. Öfverlemnades till det astronomiska observatorium.

-
- Hr ÅNGSTRÖMS afhandling: Optiska undersökningar, som varit remitterad till Hrr WALLMARK och EDLUND, återlemnades med tillstyrkande af dess införande i Akademiens Handlingar.

Akademiska angelägenheter.

Det Fernnerska priset tillerkändes Hr BJÖRLING för dess afhandlingar: Om det Cauchyska kriteriet på de fall, då funktionerna af en variabel låta utveckla sig i serie fortgående efter de stigande digniteterna af variabeln, samt: Om funktionerna x^y och $\text{Log. } \beta^{(x)}$.

SKÄNKER.

Hr PALMSTEDT förärade till Akademien ett skrin till förvarande af reagenser och smärre kemiska redskap, inredt af BERZELIUS med egen hand och under hans resor i Sverge begagnadt, och anhöll att det samma måtte blifva förvaradt i BERZELIUS i oförändradt skick bibehållna laboratorium.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

**Af Hr Inspektoren C. F. Palmér genom Stud.
S. Wessberg.**

En lärka skjuten i Munsö socken den 28 Februari.

Af Hr Canzli-Rådet A. G. Bruncrona.


En *Asaphus expansus* funnen i ett kalkstensblock vid Wiks gård på Wermdön.

*Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i Januari 1853.*

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkning- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,48	25,45	25,49	+ 5°0	+ 5°8	+ 5°5	V.S.V.	V.S.V.	S.V.	Mulet
2	25,51	25,49	25,47	+ 4,5	+ 4,6	+ 3,6	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Regn
3	25,46	25,49	25,40	+ 4,6	+ 4,0	+ 2,2	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Mulet
4	25,30	25,35	25,30	+ 3,1	+ 3,9	+ 4,9	V.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
5	25,23	25,22	25,24	+ 4,2	+ 4,5	+ 5,0	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
6	25,34	25,39	25,39	+ 2,9	+ 3,0	+ 4,0	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Halfkl.
7	25,39	25,27	25,24	+ 1,0	+ 3,1	+ 3,0	S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Regn
8	25,08	25,11	25,17	+ 3,4	+ 3,7	+ 3,1	S.	S.	S.	—
9	25,10	25,09	25,13	+ 3,0	+ 2,7	+ 2,1	S.	S.	S.	—
10	25,07	25,15	25,19	+ 3,4	+ 3,0	+ 2,0	S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Klart
11	25,16	25,06	24,88	+ 3,0	+ 3,4	+ 2,0	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Mulet
12	24,80	24,83	24,94	+ 4,0	+ 3,6	+ 1,1	S.S.V.	S.S.V.	V.N.V.	Regn
13	24,67	24,46	24,56	0,0	+ 0,3	— 3,0	O.N.O.	N.N.V.	N.N.V.	Snö
14	24,73	24,86	24,94	— 4,7	— 4,9	— 6,7	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Halfkl.
15	25,04	25,14	25,19	— 7,3	— 6,0	— 7,0	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Snö
16	25,21	25,24	25,27	— 6,1	— 6,0	— 5,4	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Mulet
17	25,29	25,35	25,40	— 4,1	— 2,0	— 3,4	N.	O.N.O.	O.N.O.	Snö
18	25,46	25,57	25,61	— 3,5	— 2,5	— 2,9	O.S.O.	O.S.O.	O.N.O.	—
19	25,67	25,72	25,76	— 5,0	— 3,1	— 6,0	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	Halfkl.
20	25,68	25,54	25,39	— 4,3	— 3,6	— 0,7	S.S.O.	S.	S.	Mulet
21	25,28	25,27	25,25	+ 0,9	+ 1,7	+ 0,5	S.	S.	S.	Regn
22	25,18	25,16	25,25	— 0,9	— 0,1	+ 1,5	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	Snö
23	25,43	25,57	25,73	+ 1,2	+ 1,6	+ 0,9	S.S.O.	S.S.O.	O.N.O.	Dimma
24	25,79	25,84	25,85	0,0	— 0,8	— 0,4	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	Snö
25	25,82	25,82	25,84	+ 0,5	+ 1,0	+ 0,1	O.N.O.	O.	O.S.O.	—
26	25,79	25,80	25,82	— 0,9	— 0,5	— 1,0	O.S.O.	O.S.O.	O.S.O.	—
27	25,82	25,84	24,84	— 4,0	— 3,8	— 5,0	O.S.O.	O.S.O.	O.S.O.	Mulet
28	25,79	25,79	25,78	— 6,0	— 5,5	— 5,1	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
29	25,74	25,69	25,68	— 6,0	— 4,9	— 4,9	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
30	25,63	25,61	25,55	— 2,2	— 0,1	— 0,8	O.N.O.	O.S.O.	O.S.O.	Snö
31	25,54	25,58	25,69	— 1,0	+ 1,0	— 1,3	O.S.O.	—	S.S.O.	—
Me- dium	25,370	25,379	25,395	— 0°36	+ 0°23	— 0°39	Nederbörden = 0,169 dec. tum.			
	25,381			— 0°17						

i Februari 1853.

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkning- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,84	25,92	25,99	— 1°0	+ 0°6	0°0	S.O.	—	—	Dimma
2	26,02	26,03	26,03	+ 0,5	+ 0,1	— 2,5	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	Mulet
3	25,95	25,88	25,82	— 5,0	— 0,6	— 4,0	—	O.S.O.	O.S.O.	Klart
4	25,76	25,77	25,76	— 4,0	+ 1,6	— 5,7	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
5	25,75	25,75	25,74	— 4,5	— 3,0	— 3,8	O.N.O.	O.	O.	Halfkl.
6	25,67	25,63	25,58	— 4,1	— 3,0	— 4,0	O.N.O.	O.N.O.	O.S.O.	—
7	25,50	25,44	25,37	— 4,0	— 2,9	— 4,0	O.S.O.	N.O.	N.O.	Snö
8	25,27	25,31	25,23	— 4,4	— 2,2	— 4,7	N.O.	N.O.	N.O.	—
9	25,22	25,22	25,21	— 5,5	— 6,0	— 10,0	N.O.	N.N.O.	N.N.O.	Mulet
10	25,20	25,23	25,25	— 10,1	— 11,0	— 12,0	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	Snö
11	25,18	25,11	25,04	— 12,0	— 11,0	— 11,8	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	—
12	25,05	25,16	25,29	— 11,5	— 9,0	— 13,0	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
13	25,37	25,46	25,45	— 12,0	— 11,0	— 12,0	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	—
14	25,38	25,23	25,08	— 11,0	— 8,4	— 7,5	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	—
15	24,99	25,03	25,09	— 7,9	— 7,0	— 10,0	N.	N.	N.	—
16	25,16	25,17	25,13	— 10,0	— 8,8	— 8,1	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	—
17	25,04	25,00	25,05	— 11,6	— 8,2	— 13,0	N.N.V.	N.N.V.	V.N.V.	—
18	25,15	25,26	25,40	— 16,0	— 8,0	— 11,0	—	—	—	Dimma
19	25,44	25,46	25,44	— 7,6	— 1,5	— 5,5	N.O.	N.O.	N.O.	Mulet
20	25,36	25,23	25,14	— 8,0	— 7,0	— 8,1	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	Snö
21	25,10	25,14	25,16	— 8,3	— 6,0	— 10,0	N.	N.	N.	Klart
22	25,08	25,08	25,07	— 10,0	— 4,2	— 8,9	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
23	24,82	24,63	24,72	— 5,8	— 2,0	— 1,0	S.	S.	S.	Snö
24	24,87	24,87	24,86	— 12,0	— 3,5	— 3,0	N.N.O.	N.N.O.	O.N.O.	—
25	24,79	24,88	24,95	— 3,6	— 2,6	— 6,3	O.N.O.	N.O.	N.N.V.	—
26	25,14	25,18	25,22	— 9,6	— 6,1	— 10,7	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	—
27	25,23	25,26	25,29	— 11,5	— 8,0	— 12,0	N.N.V.	N.O.	N.O.	—
28	25,26	25,28	25,38	— 12,5	— 6,0	— 11,8	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Dimma
Me- dian	25,307	25,307	25,312	— 7°96	— 5°17	— 7°66				
	25,309			— 6°93						



ÖFVERSIGT

AF

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Arg. 10.

1853.

N. 4.

Onsdagen den 13 April.

Föredrag.

1. *Mineral-analyser.* — Hr ERDMANN meddelade följande af Hr L. J. ICKELSTRÖM utförde mineralanalytiska undersökningar:

Dolomit eller dolomitartad kalksten.

	Gåsbornshyttan i Gåsborns s:n.	Borns silfvergr. fält i Filipstads s:n.	Långbanshyttan i Filipstads s:n.
Ca C . .	66,76.	72,33.	55,90.
Mg C . .	27,21.	27,77.	40,10.
olöst . .	5,99.		olöst (qvarz) 3,73.
	<u>99,96.</u>	<u>100,00.</u>	<u>99,73.</u>

Kornig kalksten (s. k. urkalk.)

- från ett kalkbrott vid vestra sidan af Hyttsjön nära Långbanshyttan, löste sig i utspädd saltsyra med 6,45 procents återstod, och lösningen innehöll endast spår af talkjord.
- från Linnön i sjön Långban innehöll endast vid pass en procent talkjord.
- från Nordmarkshyttan i Nordmarks socken innehöll endast 0,202 procent kolsyrad talkjord.

Jernspat från Finnmossegrufvan vid Nordmarkshyttan be-
fanns innehålla

Fe C . . .	90,89.
Mg C . . .	8,45.
Mn C . . .	spår.
	<u>99,34.</u>



Jernkisel från Wardsgrufvan vid Yngshyttan i Filipstads socken innehöll Si 94,90, Fe med spår af mangan 2,50, Mg 0,44, H 0,74, = 98,58.

Späckstensart från Mörkhults jerngrufvor i Filipstads socken, uti Vet. Ak. Öfvers. 1850: 297 förut angifven såsom en »jösökumsart», visade sig innehålla

Si . . .	58,55.
Mg . . .	27,34.
Fe . . .	7,88.
Al . . .	1,03.
H . . .	2,68.
	<hr/>
	97,48.

Serpentin, till färgen hvit, snarlik Saponit, från Sven Persgrufvan vid Yngshyttan i Filipstads socken, befanns innehålla

Si . . .	41,44.
Mg . . .	42,47.
Fe . . .	1,73.
Al . . .	spår.
H . . .	14,37.
	<hr/>
	100,01.

2. *Sciæna aquila*. — Hr Nilsson hade i bref meddelat, att en *Sciæna aquila*, en fisk som ej förr blifvit träffad vid våra kuster, sisl. Julaften (d. 24 Dec.) blifvit funnen utanför Ålstorp, söder om Landskrona. Den hade 5 fots längd och vägde 3 L \mathbb{X} 12 \mathbb{X} . Den hade sprungit upp på en sandbank, der den låg och slog omkring sig bland hafstången för att komma lös. Några fiskare, som från stranden sågo dess rörelser och trodde att det var en människa i lifsfara, rodde genast dit ut, men då de funno en fisk, dödade de den med båtshaken. Efter helgdagarnes slut blef den införd till Lund, hvarest den nu finnes uppstoppad i Universitetets zoologiska samling. Olyckligtvis hade man uttagit och bortkastat inelfvorna, som sedan ej kunde återfinnas ehuru de blifvit eftersökta.

3. Optiska undersökningar. — Hr ÅNGSTRÖM hade till införande i Akademiens Handlingar insänt en afhandling under denna rubrik, för hvilken afhandling, som blifvit till Hr WALLMARK och EDLUND remitterad, Hr WALLMARK redogjorde sålunda:

»Till ifrågavarande undersökningar har Hr ÅNGSTRÖM blifvit föranledd deraf, att han ansett det ljusets dispersions, diffusions och absorptions-fenomener, icke ännu blifvit nöjaktigt förklarade. Sedan han antydt de förnämsta förklaringsgrunderna, och visat hvari han anser dem ofullständiga, uttalade han sin åsigt att väl *diffusion* bör anses hafva sin grund i och vara en modifikation af *etherns* egen rörelse, men att deremot *absorption* är en följd af etherrörelsens öfvergång till kroppens egna molekyler. Enligt denna åsigt — den Eulerska — rörande absorption, uppkommer färgen hos en kropp genom resonans af de oscillationsrörelser partiklarna sjelfva kunna antaga. Dessa partiklarnas rörelser måste likväl bero af kroppens egendomliga beskaffenhet, och kroppen måste absorbera företrädesvis alla de oscillationsseries den sjelf kan antaga, men derjemte äfven sådana, hvilka med de förra stå i enkelt förhållande såsom oktaven, tersen o. s. v. — Det absorberade ljuset anser Hr ÅNGSTRÖM i de flesta fall öfvergå till värme, och ser han deri äfven orsaken hvarföre de flesta kroppar icke genomsläppa mörkt värme. — Hr ÅNGSTRÖM anser nu af nämde samband emellan *etherns* och *mediets* egna oscillationer böra följa, att *en kropp i glödgadt tillstånd bör utsända företrädesvis just de ljussorter kroppen vid vanlig temperatur absorberar*. Emellertid är pröfningen af denna sats riktighet underkastad stora svårigheter derföre, att en kropp, för att i glödgadt tillstånd uppträder under helt andra elasticitets-förhållanden än de, hvarunder hans absorptionsförmåga blifvit pröfvad. Då de svarta strecken i *solspectrum*, åtminstone till en del, äro en följd af absorption i vår atmosfär, borde *spectrum* af glödgad luft, enligt ofvanantagna princip, visa ljusa streck på samma ställen, som de svarta förekomma i *solspek-*

trum; men då solatmosferen äfven sannolikt åstadkommer en mängd mörka streck, bör man naturligtvis icke begära någon fullkomlig öfverensstämmelse i afseende å alla de mörka och ljusa streckens plats i de båda spectra.

För att likväl närmare undersöka huruvida någon motsvarighet härutinnan finnes, har Hr ÅNGSTRÖM begagnat elektriska gnistan vid framkallandet af spectrum. Som bekant hafva WOLLASTON, FRAUENHOFER, WHEATSTONE och MASSON äfven studerat det spectrum, som uppkommer då elektriska gnistan öfvergår från en metall till en annan, men Hr ÅNGSTRÖM har funnit, hvad som synes hafva undgått de förrnämdes uppmärksamhet, att spectrum från elektriska gnistan egentligen är att betrakta såsom *tvenne särskilda spectra, det ena tillhörigt den gasart, hvarigenom gnistan öfverhoppas, och det andra den metall eller det ämne hvaraf ledaren består.*

Elektriska spektrum är nemligen enligt Hr ÅNGSTRÖM genomdraget 1) af en stor mängd lysande linier, till en del jemförliga med de Frauenhoferska mörka linierna i solspectrum, och äro dessa lysande linier för alla metaller desamma, men bero, i afseende å intensiteten, af elektriska kondensatorns styrka samt luftens beskaffenhet; 2) af ännu mera glänsande linier, egendomliga för hvarje metall, skiljaktiga från de förra äfven derigenom, att då laddningen ej varit för stark, de icke bilda hela linier utan synas utgå från prismats ändkanter, och liksom slockna innan de mötas på midten. — Hvad de förra beträffar antager Hr ÅNGSTRÖM FARADAYS och MASSONS förklaring, men, angående de sednare, anser Hr ÅNGSTRÖM dessa uppkomma genom *glödning af ledarens egna förflygtigade partiklar*, hvilka utkastas samtidigt från båda polerna, men förlora under vägen sin temperatur och på samma gång sin lysande egenskap.

För att göra jemförelsen mellan solspectrum och det från elektriska gnistan mera öfverskådlig, har Hr ÅNGSTRÖM vid afhandlingen fogat en teckning af dessa båda spektra bredvid hvarandra. Af teckningen synes att några linier såsom C, D, E, G

i det Frauenhoferska spectrum, hafva sin motsvarighet i elektriska spectrum, men att för andra, deribland de 2 starkaste ljuslinierna, icke finnes någon sådan.

Som redan nämnt är förmodar Hr ÅNGSTRÖM att denna brist i öfverensstämmelse är att tillskrifva de mörka liniernas i solspectrum tillkomst genom inverkan, ej blott af jordens, utan äfven af solens atmosfär. Öfver jordatmosferens egendomliga inflytande erinras om BREWSTERS, MILLERS och BROCHS iakttagelser. Hr ÅNGSTRÖM anser emellertid att, i sin helhet betraktade, dessa spectra gifva det intryck som vore det ena spectrum en, så att säga, omyändning af det andra, samt att förklaringen af de mörka linierna i solspectrum tillika innebär förklaringen af de lysande i det elektriska; denna förklaring må för öfrigt sökas, antingen i ljusets interferens, eller i luftens egenskap att antaga blott vissa oscillationer, af hvilka förklaringsgrunder den förra dock sjelf hvilat på eller förutsätter möjligheten af alla de olika retardationer, som dervid måste antagas, ehuru ännu obevista till sin existens.

I en annan figur har Hr ÅNGSTRÖM gifvit en teckning af de hufvudsakligaste linier, hvilka visa sig i de olika metallernas spectra. Här af ses hurusom vissa linier finnas hos alla metaller, andra gemensamt hos blott några metaller, andra förekomma gruppvis o. s. v. och då WHEATSTONE funnit att, när polerna bestå af två olika metaller, spectrum innehåller båda metallernas linier, har Hr ÅNGSTRÖM gjort försök med några metall-legeringar då det visade sig att uti spectrum af t. ex. $Pb\ Sn^4$ funnos de flesta af de linier som tillhöra bly och de flesta af dem som tillhöra tenn, samt att likaså i spectrum af $Sn^4\ Zn$ linier funnos tillhöriga tenn och zink o. s. v. Dessa hvarje metall egna linier anser Hr ÅNGSTRÖM icke kunna uppkomma genom interferens, helst så skarpt begränsadé, isolerade linier som dessa, — hvilka dessutom utgå från prismats ändkanter och förlora sig i midten, utan att grunden hvar på de afteckna sig synes på något sätt förändrad — icke likna interfiranslinier, hvaremot analogin med alkobollågens spectrum häntyder på an-

tagandet att de, en metall tillhöriga ljusa linier i elektriska spectrum, hvilkas antal växer med elektricitetens styrka, motsvara metallens oscillationsserier i gasformigt tillstånd.

I sammanhang härmed har Hr ÅNGSTRÖM anfört den af honom gjorda iakttagelse att lägen från en lösning af jod och alkohol gifver icke allenast flere svaga ljusa linier med lika mellanrum på båda sidor om en af alkoholns egna ljuslinier, utan äfven mörka band midt emellan tvenne andra af alkoholns ljuslinier. Detta fenomen anser Hr ÅNGSTRÖM vara det samma som det vid jodens absorption, hälst banden icke voro skarpt begränsade, utan liknade verkliga interferensband.

Slutligen har Hr ÅNGSTRÖM fäst sin uppmärksamhet på den frågan, huruvida dubbelstjernornas färgor kunna enligt DOPPLER förklaras genom antagandet att en kropps hastighet har inflytande på dess färg. Enär PETZVAL på analytisk väg bevisat, det mediets rörelse icke kan hafva något inflytande på oscillationstiden, hvarpå färgen uteslutande beror, så har Hr ÅNGSTRÖM velat praktiskt visa rigtigheten af denna sats. På grund af WHEATSTONES och MASSONS undersökningar antar Hr ÅNGSTRÖM den hastighet, hvarmed elektriska gnistan fortplantar sig, många gånger större än dubbelstjernornas; om nu DOPPLERS förklaring vore riktig, så skulle, då elektriska gnistan öfverhoppas mellan tvenne ledare, i sned rigtning med hänseende till den räta linia, som går från gnistan till åskådarens öga, en förskjutning af dessa liniers läge ega rum, men Hr ÅNGSTRÖM har icke kunnat förmärka någon olikhet i detta afseende; tvertom visade sig alltid färgen hos de partiklar som utströmmade från den ena polen, alldeles lika med färgen hos dem som utströmmade från den andra. Så väl på theoretiska som praktiska grunder anser sig Hr ÅNGSTRÖM således kunna sluta, att *oscillationstid och färg äro oberoende af hastigheten hos mediet hvarifrån ljuset utgår.*»

4. *Söderhafsväarnas vegetation.* — Ur ett bref från Hr Mag. ANDERSON dat. Sidney d. 24 October 1852, meddelade Sekreteraren följande utdrag.

»Vi afseglade den 11 Aug. från San Francisco och anlände den 25 i samma månad till Honolulu. Som vi der ej qvardröjde mera än två, egentligen halfannan dag, var icke tillfälle att mer än hasta upp åt bergen i en förut af mig ej besökt dal. Utbytet kunde således ej blifva stort; dock medförde jag några rekryter för mina förra samlingar från Oahu, mest Filices och Rubiaceæ.

Den 14 September ankrade vi utanföre Papeeti på Taheiti och qvarlägo der endast fyra dagar. Jag gjorde derunder en excursion på det smala slättlandet längs stranden och upp till en fransysk bergfästning, Fatuahua, belägen midt ini centern för den höga klippöns stora bergssystem, på en höjd af vid pass 6000 fot. Den herrligaste natur omgaf på alla sidor, den yppigaste frodighet och de skönaste former mötte allestädes, och om de voro korta dessa njutningsfulla stunder, så voro de så mycket mera innehållsrika. Vegetationen särskilde sig här i fyra mycket tydliga regioner, hvarigenom den erhöi en omvexling och rikedom, som intet annat förut af oss besökt land uppvisat: *slättlandet*, utmärkt af ogenomträngliga guavesnår (Psidium), Barringtonia, Cocospalmer, Brödfruktträd och andra odlingar, samt talrikare Syngenesister; *bergfotregionen*, der Ficusarter, Citrus, Aleurites, Pandarus och Dracæna bildade trädvegetationen, der gräsen voro talrika och ormbunkar började visa sig; *bergbananernas* region, der dessa växter stodo i öfverskådliga massor, trädartade ormbunkar uppträdde, och en stor mångfald af de mest olikartade buskväxter, Zingiber, Ananassa, Alpinia o. s. v. frodades, samt *bergkammarna*, fullsatta med medelmåttigt stora ormbunkar, parasitiska orchideer (som totalt saknades på Oahu), Lycopodia, Ericineæ, Metrosideros m. fl. Vi afseglade till klippön Eimeo, der vi tillbragte sju timmar. Naturen derstädes var i alla afseenden

fullkomligt lik den på Taheiti, med den skillnaden likväl, att den nyss anförde tredje regionen der alldeles saknades.

Den 28 passerade vi utanföre Savage island och emottog ett besök af der boende menniskoätande vildar, och den sista September ankrade vi utanför Foua, en af de medlersta Vänskapsöarna. Alldeles saknande berg, såsom helt och hållet bestående af korallbildning, egde den en vegetation i betydlig grad afvikande från Taheitis, Oahus och Eimeos. Märkbarast var den totala bristen på ormbunkar, som annars på Söderhafsöarna äro så förherrskande, och på Taheiti spelade en så förvånande stor rol.»

Inlemnad afhandling.

Af Hr Lector J. H. WALLMAN i Linköping: Försök till en systematisk uppställning af växt-familjen Characeæ.

Rémitterades till Hrr FRIKS och ARESCHOUG.

Följande tvenne vid föregående sammanträden inlemnade afhandlingar tillstyrktes till införande i Akademiens Handlingar.

Hr ÅNGSTRÖMS: Optiska undersökningar, som varit remitterad till Hrr WALLMARK och EDLUND, samt

Hr Prosector WAHLGREN: Anteckningar öfver byggnaden af ryggsmergen och ryggsmergsanglierna hos Rockan, som varit remitterad till Hrr A. RETZIUS och SANTESSON.

Akademiska angelägenheter.

Præses tillkännagaf, att Akademiens utländske ledamot i femte klassen, Hr LEOPOLD VON BUCH med döden afgått.

Sekreteraren anmälte, att Akademiens Handlingar för år 1851 af trycket utkommit.

Hr Frih. WREDE och Hr WALLMARK afgåfvo följande utlåtande.

Kongl. Akademien har behagat till vårt utlåtande remittera Hr Fabriksidkaren JOHAN BOLINDERS till Akademien afgifna Berättelse om sina iakttagelser under den resa han, med understöd af

Akademiens Ledamot Hr JOHN SWARTZ verkställt, för att vid Verldsexpositionen i London efter eget urval för praktiskt utförande i hemlandet instudera ett industriellt ämne, som med tiden kunde i större skala hos oss verkställas; och få vi med anledning häraf äran nämna följande.

Hr BOLINDER har till föremål för sina iakttagelser valt träds bearbetning. Hans berättelse innefattar beskrifning om följande apparater dertill:

1) *Hyvelmaskin för lister, äfven användbar för slåtthylling.* Hr BOLINDER uppgifver sig hafva sett en mängd olika lister tillverkade på denna maskin, hvilka alla skola varit särdeles väl utförda;

2) *Maskin för tillverkning af takrännor.* En sådan maskin, som begagnades vid uppbyggandet af Expositions-palatset, uppgifves hafva åstadkommit icke mindre än 4000 fot takrännor i dygnet;

3) *Hyvel- och Spont-maskin för bräder och plank.* Denna maskin kan samtidigt hyfla brädets alla fyra sidor, och derjemte, om man så åstundar, på samma gång sponta det. Såsom bevis på denna maskins utomordentliga effekt har Hr BOLINDER bifogat en från ett furubræde afhyflad spån af brädets hela bredd;

4) *Hyvelmaskin för bjelkar, plankor, tunna bräder m. m. d.* Bjelkar af alla dimensioner, ända till 40 à 50 fot långa, kunna å densamma med lätthet hyflas rätvinkliga och till fullkomligt parallela sidor; plankor samt bräder af äfven hårda träds lag kunna likaledes bearbetas af denna maskin utan minsta svårighet;

5) *Borr- och Tappskärnings-maskin.* Denna synes vara af särdeles högt värde för allt vid inredande af byggnader förekommande snickararbete; såsom paneler, dörrkarmar, fensterbågar, ramar o. d., med ett ord öfver allt der intappningar komma i fråga. I samma maskin kan man äfven insätta borrar, då hål kunna med stor hastighet åstadkommas;

6) *Huggnings-maskiner* för stämning af alla sorter tapphål, en för finare arbeten, drifven af arbetaren själf med foten, en annan för gröfre arbeten, drifven af maskinkraft;

7) *Horizontel Borrmaskin.* Med denna maskin kunna hål af alla förekommande storlekar med största hastighet åstadkommas;

8) *Fanersåg.* Maskinen har en cirkulärsåg, hvars, af flera delar ändamålsenligt sammansatta skifva roterar med en hastighet af 90 hvarf i minuten, och framskjutes sågblocket emot sågskifvan med en hastighet af $2\frac{1}{2}$ fot i minuten;

9 och 10) *Ångbåsningsstrumma med böjningsapparater.* Vid bearbetning af träd, der krumma former förekomma, är methoden att, efter skedd ångbåkning, böja detsamma, af största nytta. Hr BOLINDER beskriver speciellt sättet att sålunda forma den bugtiga sidan af en fortepiano-stomme, hvarigenom stor besparing i material och arbete vinnes, äfvensom å sättet att af ett enda stycke förfärdiga ringar till vagnshjul, hvilka sålunda tillverkade blifva på en gång billigare, stadigare och mera varaktiga än de på vanligt sätt, af flera delar sammansatta;

11) *Prässram för faner.* Fördelen af denna tillställning är att faneret blifver fast och jemnt tillklämdt på alla punkter af ytan;

12) *Apparat för tråds impregnering med ämnen som hindra detsammes förruttelse.* Trädet inlägges i en cylinder som pumpas lufttom och vidare fylles, under starkt tryck, först med en lösning af jernvitriol och sedan med kiselvåtska, hvarigenom trädet blir både hårdt och varaktigt. I denna apparat kan trädet äfven behandlas med stenkolsolja, i stället för nämnde våtskor; dock föredrager Hr BOLINDER i detta hänseende följande apparat;

13) *Ugn för tråds torkning och impregnering med kreosot.* Trädet, inlagdt i denna ugn, utsättes för den heta rök, som utvecklas vid ofullkomlig förbränning af stenkol, och blir sålunda på en gång befriadt från fuktighet och impregneradt med stenkolsets destillationsprodukter, hvaribland kreosot, som i hög grad motverkar förruttelse. Hr BOLINDER har bifogat ett prof på sålunda kreosoteradt träd.

Slutligen har Hr BOLINDER äfven bifogat prof å korkbark, som genom en mycket enkel inrättning blifvit bragt till de tunnaste sammanhängande skivor af betydlig storlek, användbara till en mängd behof, såsom till hattstommar m. m.

Alla ofvan anförda maskiner och apparater äro uti Hr BOLINDERs reseberättelse tydligt beskrifna och, uti den berättelsen åtföljande planschatlas, utmärkt väl ritade och leverade, allt efter skala, och, med den tydlighet och utförlighet, att hvar och en skicklig mekanikus bör kunna, utan vidare förklaring än den som innehållas i nämnde berättelse, utföra desamma. Likaledes äro arbetsmethoderna väl och tillräckligt utförligt beskrifna.

Så väl maskiner och apparater, som arbetsmetoder, synas oss i allmänhet särdeles enkla och sinnrika samt lätta att verkställa. Maskinerna, af hvilka de flesta bestå till en betydlig del af träd, torde icke heller blifva särdeles kostbara i förhållande till den nytta de kunna åstadkomma, förutsatt likväl att tillverkningen sker i en tillräckligt stor skala.

Endast en del af dessa maskiner och apparater hafva varit i Expositionslokalen utställda. Hr BOLINDER har därför gjort sig mödan att om de flesta taga kännedom å de ställen i England, der de varit i verksamhet.

Vi anse slutligen, att Hr BOLINDER gjort ett utmärkt godt val af föremål för sin resa, då de här omförmälda maskiner och metoder för tråds bearbetning obestriddligen böra blifva af ganska stor nytta i vårt land, samt att han genom sitt sätt att taga och sprida kännedom derom, med heder uppfyllt gifwarens till Fäderneslandets väl syftande ändamål med det frikostigt donerade reseanslaget, och motsvarat det förtroende Hr BOLINDER erhållit af Kongl. Akademien, som utsett honom till utförande af Hr SWARTZ's vackra idé.

Hr J. SWARTZ hade i ett nu uppläst bref förklarat sig vilja bestrida kostnaden för allmängörandet af ofvan refererade afhandling af Hr J. BOLINDER.

Vid Akademiens offentliga sammankomst på dess högtidsdag den 31 Mars afgaf Sekreteraren följande berättelse.

Redan sistförflutna högtidsdag hade Vetenskaps-Akademien tillfredsställelsen anmäla, att den vidsträckta, under längre tid fortsatta gradmätningen mellan Torneå och Norska Finmarken blifvit afslutad, afvensom att det nivelleringsarbete, hvarigenom relativa höjden af Bottniska viken och Ishafvet kommer att utrönas, fortgått lika långt som gradmätningen. Sedan Kongl. Maj:t, på Akademiens underdåniga bemästallan, i nåder behagat anvisa 2000 R:dr B:ko till fulländandet af detta arbete, hafva Professorerne SELANDER och M. AGARDH under sistlidne sommar utfört detsamma ända till slutpunkten Alten, hvarjemte kontrollerande iakttagelser med hänsyn till gradmätningen blifvit anställda, så att af båda dessa för vetenskapen viktiga företag, numera endast beräkningarne återstå, med hvilka Hr SELANDER för närvarande är sysselsatt.

Efter det Kongl. Maj:t infordrat Akademiens underdåniga utlåtande öfver en hemställan af Superintendenten vid Meteorologiska Observatoriet i Washington, Lieutenant MAURY, om samfällid medverkan från de civiliserade nationernas sida, enligt en af honom uppgjord och använd plan, för anställande af meteorologiska observationer m. m., har Kongl. Maj:t i nåder anbefallt, att dylika, ej blott för de fysikaliska vetenskaperna utan äfven för sjöfarten m. m. gagnande iakttagelser om bord å svenska örlogsfartyg, som passera Atlantiska oceanen, enligt nyssnämnda plan skola anställas och journalerna öfverlämnas till Vetenskaps-Akademien, hvilken det åligger att till Lieutenant MAURY meddela innehållet.

Till ordnande af de betydliga växtsamlingar, som af Magister WIDEN från Brasilien blifvit hemförda och med dertill anslagna statsmedel för Riksmuseum och Läroverken blifvit inlösta, har Kongl. Maj:t nådigst beviljat 400 R:dr B:ko; hvarigenom Intendenten vid botaniska afdelningen kommit i tillfälle att bereda Riksmusei andel till inläggning i herbarierne, samt att för Universiteterna aflägga fullständigare sviter, och åt Elementar-läroverken för dem lämpliga samlingar, med hvilkas ordnande han nu är sysselsatt.

Från de unga vetenskaps-idkare, som åtfölja fregatten Eugénie på dess resa kring jorden hafva så väl intressanta vetenskapliga meddelanden ingått, som värdefulla remisser af naturalier ur de flesta klasser, bland hvilka de sällsynta föremålen från Magellanssundet och dess omgifningar ådraga sig särskild uppmärksamhet genom sin nära förvandtskap med nordens naturalster. I öfrigt äro de största nu hemkomna samlingarne gjorda vid Rio Janeiro, Buenos Ayres och Monte Video. De vackra resultat, som denna resa synes lofva för naturalhistorien, påkalla ett tacksamt erkännande af den synnerliga välvilja och det verksamma understöd naturforskarnes af fregattens Chef, Kommendör-Kaptenen VINCE städse åtnjutit.

Fabrikören J. BOLINDER, som utsågs att besöka den stora expositionen i London för att, med understöd af de medel Akademiens Le-

demot Hr JOHN SWARTZ frikostigt öfverlemnadt, derstädes taga kännedom om något till införande i fäderneslandet viktigare industrielt ämne, har ingifvit berättelse om sin resa, åtföljd af fullständig beskrifning på den sak han utvalt till föremål för sin inakttagelse, nemligen *träda bearbetning med maskiner* till flersaldiga behof. Detta för den inhemska konstfliten gagnande ämne har med särdeles noggrannhet och sakkännedom blifvit behandladt samt genom lättfattliga, väl utförda ritningar förtydligadt. En fabrik för dylika arbetens tillverkning är redan i hufvudstaden under anläggning i större skala.

Studeranden R. F. FRISTEDT, som sistförflutna år af Akademien erhöill anslag för en botanisk resa till Lappmarken, har aflemnadt berättelse derom, hufvudsakligen rörande nejderna kring Torneå träsk, hvilka han med bänsyn till vegetationens förhållanden noga undersökt och der han äfven anträffat för fäderneslandet hittills obekanta arter.

Genom det till afbildning af svenska växter samt till zoologiska arbeten utgående statsanslaget har den dyrbara samlingen af svampmålningar, under ledning af Hr FRIES, blifvit ökad med ett ej ringa antal figurer, samt dessutom förträffliga målningar af svenska fogel- och fisk-arter anskaffade från den utmärkte artisten WILHELM VON WAGNER.

Till följe af Kongl. Maj:ts nådiga remisser, och af Embetsverkens begäran om upplysningar, har Akademien afgifvit utlåtanden i åtskilliga ämnen, som fordra vetenskaplig utredning, såsom Lieutenant MAURY's nyssnämde plan för meteorologiska observationer, om anslag till vetenskapliga resor och utgifvandet af lärda arbeten, om beskaffenheten af fiskredskap i Bleking m. fl., och för närvarande har hon under granskning frågan om bränvinsproffvare af en ny konstruktion.

Akademins Fysiker, som för ett talrikt auditorium fortfarande håller de Thamiska föreläsningarne, framställer dervid Optikens viktiga delar.

Globverketaden, som Akademien har under sitt inseende, fortfar i oförändradt skick.

Enär under de sistförflutna åren särdeles rågsädet mångenstädes befunnits af svampbildningar angripet och på helsan utöfvat skadligt inflytande, har Akademien ansett sig böra fästa allmänhetens uppmärksamhet härpå, och derföre, i den nu under tryckning varande almanachen för nästkommande år, som prognosticon intagit en uppsats om de s. k. mjölkorna, deras menliga inflytande på helsan och sättet att minska detsamma.

Den verksamhet Akademien utöfvar genom sina skrifter har som vanligt blifvit fortsatt medelst utgifvande af handlingarne för det föregående året (1851), öfversigten af förhandlingarne vid sammankomsterna och årsberättelser öfver vetenskapernas framsteg. Afhandlingar för år 1852 äro inlemnade af Entomologen ZELLER i Glogau, Lector BRÖHLING, Observator ÅNGSTRÖM och Prosector WANLIGREN.

Meteorologiska iakttagelser äro insända af Kronofogden **BRUNN** i Neder-Calix, Prostén **KULLBERG** i Vinberg nära Falkenberg, Provincial-Läkaren **Doctor SMITT** i Halmstad samt Bergmästaren **von SCHTELE** i Philipstad.

Utom de förbindelser till inbördes utbyte af skrifter och vetenskapliga meddelanden, hvilka tillförene egt rum med de flesta lärda samfund och hvilka fortfarande underhållas, har Akademien trädt i beröring med the geological Society i London och die naturforschende Gesellschaft i Nürnberg. Nya tillfällen till sällsynta naturalsters erhållande hafva blifvit öppnade eller äldre förnyade, dels med Apothekaren **HJALMARSSON**, som någon tid varit bosatt i Westindien och senast berest Republiken Honduras, dels med Hr **PEDRO NASSA** i nya Granada och med Professoren **HEDENBORG** på Rhodus.

För sitt bibliotek har Akademien, oberäknadt allt hvad i öfrigt blifvit skänkt eller inköpt, fått emottaga flera ganska dyrbara arbeten, nemligen af H. Maj:t Konungen: **BLUMES** stora botaniska verk, **Rumphia**, i fyra delar in folio med talrika kolorerade plancher, äfvensom densammes Museum Botanicum Lugduno-Batavum första delen och **RAMANS** Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland; af H. Maj:t Konungen af Preussen: det stora praktverket *Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien* von **Lepsius**; af Stor-Britanniska Regeringen genom Sir **HENRY DE LA BECHE** dennes dyrbara geologiska kartor och sektioner af Stor-Britannien; af Bibliotheks-administrationen i St Petersburg: *Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliotheque de St Petersburg*, hvaraf blott få exemplar blifvit tryckta, samt af the Smithsonian Institution i Washington: ett större antal utmärkta arbeten rörande Amerikas geologi, ethnografi och statistik m. m.

Fysikaliska samlingen har blifvit ökad med instrumenter för ett sammanlagdt belopp af 1200 Rdr Bko. Dessutom har Professor **PALMSTEDT** till den i **BERZELII** fornda arbetsrum i oförändradt skick bevarade samlingen af kemiska apparater m. m. öfverlemnadt ett reseschatull för kemiska undersökningar, hvilket af **BERZELIUS** med egen hand blifvit inredt och af honom i yngre åren varit begagnadt.

Riksmuseum har äfvenledes vunnit betydlig tillväxt ej blott genom de värdefulla samlingar, som blifvit hemsända från naturforskarnas på fregatten *Eugénie*, utan äfven genom inköp, byte och skänker från åtskilliga trakter.

Utom hvad den mineralogiskt-geognostiska samlingen sålunda bekommit, har den isynnerhet genom en af Intendenten till dess förökande företagen resa erhållit ej obetydlig tillgång på flera sällsyntare inhemska mineralier.

Den botaniska afdelningen har emottagit samlingar af Stor-Brittanniens sällsyntare växter från the botanical Society i London och Professor **SCOULER** i Dublin, äfvensom af Italiens från Professor **PARLATORE** i Florens, hvarförutan så väl utländska arter, som svenska från rikets flesta provinser af inhemska Botanister blifvit öfverlem-

nade, deribland större samlingar från Torneå Lappmark af Hr FINESTEDT och Magister CARL HARTMAN, samt från Skåne af Hr ROBERT HARTMAN.

De af Magister ANDERSSON hittills hemsända remisserna innehålla öfver 1100 species, ofta i talrika exemplar, oberäknadt stammar, barkslag, frukter och frön. Genom de Widgrenska samlingarna har Museum blifvit ökad med omkring 1200 för detsamma nya Brasilianska arter.

Utom de förråder af djur ur nästan alla klasser, som den Zoologiska afdelningen erhållit genom Doktor KINBERGS insamling på de af fregatten Eugénie besökta orter, och det som zoologiens vänner och idkare skänkt, har en dyrbar samling, särdeles af lägre sjödjur, från Westindien och Brasilien blifvit hemförd och till Museum öfverlemnad af Koffördi-keptenen WERNEREN, hvars nit och frikostighet redan förut genom mångt sällsynt föremål bevitnats. Största tillväxten har dock den Entomologiska samlingen vunnit, ej blott genom betydligare remisser från Grefve MANNERHEIM, Hrr MÜLSANT, ZELLER, DOHR och WOLLASTON, utan äfven genom inköp ur Doktor SARLBERGS i Helsingfors rika Brasilianska insekt-förråder, hvarigenom mer än 4000 förut saknade arter bekommit.

Till det i Malmö nybildade Naturhistoriska Museum har Akademien aflemnat en större samling dupletter af däggdjur, skeletter, samt svenska och utländska foglar. I öfrigt hafva däggdjur och foglar blifvit meddelade till Läroverken i Westerås och Örebro, liksom till en skola i hufvudstaden, svenska fiskar till Stockholms läns Hushållningssällskap och en insektsamling till Läroverket i Carlstad.

De för minnesstoden öfver BENZELIUS insamlade medlen uppgå till nära 25,000 R:dr B:ko, med anledning hvaraf Akademien nu är betänkt på att vidtaga åtgärder till arbetets snara utförande.

Det af Envoyéen von ASP stiftade s. k. Byzantinska resestipendiet, som denna gång af Akademien tillsättes, har med 1000 R:dr B:ko åt hvardera blifvit tilldeladt Kemie-Dozenten vid Universitetet i Upsala, läraren vid Ultuna Landtbruks-institut, Magister J. KEIJSEN till fortsatta studier i landtbruks-kemien; Laboratorn vid härvarande Technologiska institut K. SRYFFE för inhemtandet af ökad insigt i kemiens tillämpning på inhemska produkters tillgodogörande; samt Läns-Agronomen i Stora Kopparbergs län, Ingenjören K. L. BLADIN för vinnande af fullständig kännedom om grunddikning med flera landtbrukets viktigare ämnen.

Sitt anslag till vetenskapliga resor inom fäderneslandet har Akademien för mineralogiska undersökningar och insamlingar tilldelat Intendenten vid Riks-Museum, Professor MOSANDER.

Den Fernnerska belöningen har blifvit tillerkänd Lektor BRÖRLING i Westerås, för hans båda till 1852 års handlingar inlemnade matematiska afhandlingar.

Som uppmuntran för visad skicklighet i matematiska instrumenters tillverkning har Akademien utdelat de dertill bestämda medlen åt Instrumentmakarne FRANS BEAC, SÖRENSEN och ÅDERMAN.

Minnespenningen för dagen är präglad öfver den utmärkte Entomologen, Kommersrådet och Kommendören af Kongl. Wasa-orden C. J. SCHÖNHERR.

Med fädernesland och brödrasfolk delar Akademien den djupa saknaden af sin Förste Hedersledamot Högstsälig Hans Kongl. Höghet Hertigen af Upland, den för vetenskapernes främjande i Norden löfresrike PRINS GUSTAV.

Hon beklagar dessutom förlusten bland sina inländska Ledamöter af f. d. Medicine Professoren vid Christiania Universitet, Kommendören af Kongl. Norska St Olafs-Orden och Riddaren af Kongl. Nordstjerne-Orden Doktor MICHAEL SEJLDERUP; Brukspatronen, Kommendören af Kongl. Wasa- och Riddaren af Kongl. Nordstjerne-Orden WILHELM HISINGER; Öfverste-Kammarjunkaren, Riddaren och Kommendören af Kongl. Maj:ts Orden Grefve CARL EDWARD GYLDENSTOLPE, och Öfver-Direktören för Mynt- och Kontrollverken, Riddaren af Kongl. Nordstjerne-Orden NILS WILHELM ALMROTH, samt bland utländske Ledamöter Stats-Rådet, Botan. Prof. JOACH. FREDR. SCHOUW i Köpenhamn; f. d. Kemie Professoren vid Åbo Universitet J. GADOLIN, Kongl. Preussiske Kammarherren, Riddaren af Kongl. Nordstjerne- och Kommendören af Kongl. Norska St Olafs-Orden LEOPOLD VON BUGA i Berlin, och bland korresponderande Ledamöter Kemie Professoren i Glasgow Doktor THOMSON.

Deremot har Akademien till inländske Ledamöter kallat: Lektorn vid Christiania Universitet Doktor OLE JACOB BROCH; Kemie Professoren i Upsala, Riddaren af Kongl. Wasa-Orden Doktor ELOF WALLQUIST; Kirurgie Professoren vid Kongl. Carolinska Med. Chir. Institutet Doktor CARL GUSTAF SANTESSON, och Ärke-Biskopen, Upsala Universitets Pro-Kanslär, Kommendören med Stora Korset af Kongl. Nordstjerne-Orden Doktor HANS OLOF HOLMSTRÖM, samt till utländske Ledamöter Botanices Professoren i Berlin ALEXANDER BRAUN och Sekreteraren i Geologiska Sällskapet i London SIR HENRY THOMAS DE LA BECHE.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademietens Bibliothek.

Af Kongl. Norska Universitetet.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. B. VII. H. 2, 3.

Aarsberetning for 1851. Christ. 1853. 8:o.

KORSEN og DANIELSSON, Bidrag til Pectinibranchiernes Udviklingshistorie. Bergen 1851. 8:o. Med 1 Supplement. (m. t.)

Saga Olafs Konungs Tryggvasunar, af Odd SNORRESSON. Udg. af P. A. MUNCH. Christ. 1853. 8:o.

Cantate ved Feesten den 17 Marts 1853.

Af Accademia R. delle scienze i Neapel.

Rendiconto. Nouva Serie. N:o 6.

COLLENA, P., Un caso di ermafrodito vivente neutro-laterale. Napoli 1853. 8:o. (m. t.)

Af Författarne.

BARUFFI, G. F., Viaggio da Torino alle Piramidi. Torino 1848. 8:o.

BORRÀ, G. D., Catechismo Agrologico, ossia Principii di scienza applicata all' agricoltura. Torino 1846. 8:o.

ERDMANN, A., Lärobok i Mineralogien. Stockholm 1853. 8:o.

Af Utgifvarne.

Flora. Regensburg 1852. N:o 28—36.

Nya botaniska notiser. Utg. af TUNBERG 1853. N:o 1—3.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Hr Lagman Lemchen.

En steril Orrhöna från Småland.

Af Hr Kapten Nilser.

Käkarna af en Haj från atlantiska hafvet.

En Orm från Java, och

Stjerten af en större Delphin.

Botaniska afdelningen.

Af Hr Dr J. Ångström.

Tre svenska Filices och fyratiofem utländska mossarter af flera släkten.

Af Studeranden Hr Th. Fries.

Tjugotre sällsyntare phanerogamiska arter dels från Småland dels från Upsalanejden, samt trettiofyra laf-arter från flera trakter i Sverige.

ÖFVERSIGT
AF
KONGL: VETENSKAPS-AKADEMIENS
FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1853.

N. 5.

Onsdagen den 11 Maj.

Föredrag.

1. *Om jordens afplattning och massa.* — Hr Lector LINDMAN i Strengnäs hade insändt följande meddelande:

1. »Sedan SNELLIUS först förrättat en på vetenskapliga grunder stödd mätning, hvarigenom man kunde erhålla ett åtminstone approximativt riktigt begrepp om jordens storlek, ehuru en tidig död hindrade honom att underkasta sitt arbete nödiga korrekationer^{*)}, hafva ganska många dylika mätningar blifvit verkställda. På det sista $\frac{1}{4}$ seklet hafva gradmätningarne i synnerhet blifvit talrika och af en noggranhet, som medgifver att sluta ej blott till jordens storlek, utan äfven till dess figur. Det visade sig nemligen, att de uppmätta gradernas längd tilltog från eqvatorn till polerna, hvaraf följer, att jorden ej är en sfer. Då meridianerna således icke äro cirklar, blef naturligtvis frågan, om de inträffa med någon annan kurva: och det enklaste var då att antaga dem vara ellipser. Emedan jordens rotation och deraf följande afplattning voro till sin tillvaro konstaterade, antog man, att jorden var en elliptisk rotationssferoid och sökte bestämma förhållandet mellan den genererande ellipsens principal-axlar (halfva större= a , halfva mindre= b). För att finna detta och således äfven afplattningen ($=A=\frac{a-b}{a}$) behöfde man endast jemföra två grader, som blifvit uppmätta

^{*)} Detta gjorde MUSSCHENBROECK, men först efter PICARDS mätning.


under olika polhöjder. Men oaktadt all använd omsorg erhöles afplattningen olika af olika par af mätningarne. Sålunda gaf den Franska och Peruanska $A = \frac{1}{332}$, den Lappska och Peruanska $A = \frac{1}{330}$, den Lappska och Franska $A = \frac{1}{326}$. I denna ovisshet sökte Hr VON LINDENAU det axelförhållande, för hvilket summan af de positiva och negativa felen blef $= 0$ vid de beräknade och uppmätta gradernas jemförelse med hvarandra, och fann $b:a = 303:304$, hvilket nästan alldeles öfverensstämde med det, man funnit af en inequalitet i månens rörelse nemligen $b:a = 304:305$ *). Genom att behandla alla förhandenvarande gradmätningar efter en gemensam princip **), fann WALBECK $A = \frac{1}{302}$, SCHMIDT $A = \frac{1}{297}$ (medelfel $= \pm 10,5$ nämnarens enheter), J. SVANBERG $A = \frac{1}{304}$, BESSER i Astron. Nachr. B. XIV. pag. 333—346 $A = \frac{1}{300,7}$ (medelfel $= \pm 4,81$ nämnarens enheter) och i Astron. Nachr. B. XIX. pag. 216 $A = \frac{1}{299,15}$, hvilket sista värde är det noggrannaste, som gradmätningarne kunde gifva, då beräkningen gjordes. Sedan dess har den stora ryska gradmätningen blifvit fortsatt, och i Sverige en ny blifvit företagen, men derom har ännu ingenting hunnit publiceras.

2. Den andra experimentela methoden att finna jordens afplattning genom enkla sekundpendelns olika längd under olika polhöjder har äfven blifvit mycket använd och i de flesta af Professor CRONSTRANDS afgifna Årsberättelser äro pendelexperimenterna upptagna. Vanligtvis har likväl hvarje observatör inskränkt sig till beräkning af sina experiment, utan att underkasta hela samlingen af förhandenvarande en uniform behandling, hvilket verkställts af IVORY och BAILY. Den härledda af-

*) Om allt detta se BOHNENBERGER, Astronomie, Tübingen 1811.

**) Se CRONSTRAND, Årsberättelse för 1830 pag. 83 och SELANDER, Berättelse om Astronomiens framsteg för åren 1837—1841 pag. 82—86.

plattningen har dock oftast utfallit större än ur gradmätningarna, hvarjemte resultaterna af olika experiment-serier visat ringa öfverensstämmelse sinsemellan. Så har t. ex. LUTKE ur sina experimenter funnit $A = \frac{1}{267,1}$, men BAILY ur FOSTERS ensamt erhållit $A = \frac{1}{285}$ samt ur en mängd andra i förening med dessa $A = \frac{1}{289}$, hvilka bestämningar betydligt afvika både från hvarandra och BESSELS. Närmast till dessa kommer IVORY's, som fått $A = \frac{1}{295}$. Denna brist på öfverensstämmelse är för stor för att kunna tillskrifvas *endast* observationsfel, och man måste således antaga, att den dessutom förorsakas af anomala attraktioner, motsvarande de irregulariteter i jordens figur, hvilka gradmätningarna tydligen ådagalägga. I följe häraf kunde man vara färdig att antaga den berömda BIOTs åsigt *), som anser, att gradmätningar och pendelexperimenter endast äro tjenliga att utvisa tillståndet i afseende på figur och attraktion på observationsorten, samt att de härledda medelresultaterna sakna verklig fysisk tillämplighet. Beträffande pendelexperimenterna serskildt anser han olämpligt och mot sakförhållanden stridande att använda den från en elliptisk rotationssferoid hemtade lagen för pendellängdernas variation. Häraf ses, att BIOT blott fäster sig vid jordens *fysiska*, men ej *geometriska* figur. Vill man deremot i afseende på pendelexperimenternas behandling gå tillväga enligt samma grunder, som GAUSS och BESSEL lärt i afseende på gradmätningarna **), så torde man finna en afplattning föga afvikande från den, som gradmätningarna gifva, och genom den sålunda vunna jemförligheten mellan resultaten iständsättas att *gemensamt* använda båda för andra ändamål, såsom



*) Se *Astronomie Physique*, Trois. Ed. Paris 1844, Tom. II. pag. 460 ff.

**) Se Prof. SELANDER l. c. pag. 82—86. Emedan jag saknar de egentliga källorna, citerar jag nu och i det följande Kongl. Akademiens rikhaltiga Årsberättelser, som äro mer än tillräckliga för mitt behof.

jag skall söka visa. Saken synes här till och med lättare, emedan man redan af lokala omständigheter kan draga slutsatser angående pendlexperimenternas utslag. Så uppgifves t. ex. angående LUTKES experimenter »att pendelns irreguliera accelerationer och retardationer berott af observationsorternas geologiska beskaffenhet» *). I anledning af en tabell, som är upptagen i Årsberättelsen för 1835 yttrar Prof. CRONSTRAND: »Bland tabellens 51 stationer ligga 46 nära hafskusten; åtminstone en tredjedel af dessa på öar långt bort från fasta landet oftast af vulkaniskt ursprung, följaktligen af täta ämnen.» Då nu ingen utväg finnes att korrigera eller eliminera häraf uppkommande afvikelser, så synas sådana observationer föga tjenliga att lägga till grund för bestämning af jordens *geometrisk*a figur, såsom de der komplicera resultatet med saker, hvilkas verkningar meningen just är att fränskilja. Det enda, som man under sådana omständigheter kan göra, lærer vara att endast taga i beräkning experimenter⁹ från orter, der ingen eller relativt obetydlig inverkan af ofvannämnda orsaker är att befara. De uteslutna torde sedan, genom sin afvikelse från den enligt de vanliga förhållandena kalkulerade formeln, kunna anses såsom exponenter på de respektiva observationsorternas egendonliga beskaffenhet i anseende till attraktion. Emellertid måste man vara förvissad, att alla nödiga korrektioner blifvit iakttagna, innan man af pendlexperimenter sluter till anomala lokala attraktioner. Efter hvad Prof. CRONSTRAND yttrar i Årsb. för 1835 pag. 18, lærer detta vid äldre experimenter ej alltid hafva varit förhållandet, hvarföre jag inskränkt mig till att beräkna blott en del af de experimenter, som i nämnde Årsb. äro upptagna. De äro alla verkställda med invariabla pendlar och hafva samtliga blifvit beräknade och redigerade af BAILY. Af de 79 experimenter, som tabellen upptager, har jag uteslutit alla, som blifvit gjorda på små, långt bort från fasta landet belägna öar, äfvensom dem, hvilka blifvit betecknade såsom mindre pålitliga.

*) Se Prof. SELANDER l. c. pag. 89.

De bibehållnas antal är 36, hvartill jag lagt experimenterna i Königsberg och Stockholm, som i samma Årsb. pag. 26 äro intagna. Tabellen innehåller likväl icke pendellängderna, utan oscillationsantalet på 24^a medeltid af en enkel pendel, som i London slår sekunder. För att undvika mycket stora tal samt för att kunna vid beräkningen medtaga de serdeles noggranna experimenterna i Königsberg och Stockholm, för hvilka orter endast pendellängderna förekomma, har jag af oscillationsantalet sökt pendellängden och dervid enligt KATER antagit pendellängden i London = 39,13929 inches, hvilka jag reducerat till pariserlineer under antagande att enligt KATER 39,37079 inches vid +62° Fahr. äro = 443,296 par. linier vid +16½° Cels. Derigenom blef pendellängden i London = 440,68945 par. linier. Genom denna har jag beräknat pendellängderna för öfriga orter och infört dem jemte värdena på ϕ i Tabellen A, som dessutom innehåller några kolumner, hvilka ej behöfva någon förklaring. I den vanliga pendellängdsformeln

$$L = l + f \sin^2 \phi,$$

hvarest L betecknar pendellängden vid polhöjden ϕ , l den eqvatoriala pendellängden och f polar-pendelns öfverskott öfver den eqvatoriala, har jag sedan insatt mot hvarandra svarande värden på L och ϕ . Härvid bör likväl anmärkas, att till följe af sättet hvarpå L -värdena erhållits, de afficieras af det möjliga felet hos det antagna L för London i ett duplicerad förhållande af det observerade oscillationsantalet och 86400. Som likväl detta förhållande obetydligt skiljer sig från 1, kan man säga, att felet i den antagna pendellängden för London till hela sin storlek inverkar på alla derifrån härledda L -värden. Om då detta fel sättes = y , så blir den mot polhöjden ϕ svarande pendellängden = $L + y$ och conditionsevationernas form

$$l + f \sin^2 \phi - L - y = 0. \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

För KATERS eget experiment i London samt experimenterna i Königsberg och Stockholm kommer naturligtvis termen $-y$ att saknas, emedan dessa ej genom någon reduktion blifvit behäftade med ett dylikt fel och således endast afficieras af sina

egna observationsfel. Efter formerandet af dessa eqvationer har jag behandlat dem efter IVOY'S method, som består deri *), att eqvationerna (1) ordnas efter polhöjderna och den första eqvationen subtraheras från alla de öfriga. Sålunda har jag fått den kolumn, som i Tab. A har öfverskriften »konditions-eqvationer», genom hvilkas behandling enligt minsta kvadrat-metoden erhållas

$$f = 2,32567$$

med sannolikt fel $= \pm 0,00200$, vikt $= 11,9143$ och $y = 0,00052$. Skillnaden mellan beräkning och observation är upptagen i närmaste kolumn.

Genom insättning af f och y i (1) (eqvationen för Para är $l + 0,00064f - 439,2687 - y = 0$) och genom att taga medium finner man

$$l = 439,2679$$

med de afvikelser, som i sista kolumnen äro upptagna. Som skillnaden mellan de positiva och negativa felens summor blott är $0,0012$, så blir sannolika felet hos l blott beroende af sannolika felet hos f . Som detta är $= \pm 0,00200$ och $\sum \sin^2 \varphi = 20,536$, så blir sannolika felet hos $l = \pm 0,00108$. I följe af CLAIRAUTS theorem är

$$A = \frac{5}{2} \cdot \gamma - \frac{f}{l},$$

om γ = förhållandet mellan centrifugal-kraften och tyngden under eqvator. Som γ är $= \frac{1}{289}$, så blir

$$A = 0,00865 - \frac{f}{l}.$$

Insätter man här nyss funna värden på f och l , så fås $A = \frac{1}{298}$, hvilket värde kommer ganska nära BESSELS. Den af denna beräkning följande pendellängdsformel blir alltså

$$L = 439,2679 + 2,32567 \sin^2 \varphi.$$

Med denna formel har jag jemfört experimenter, nedan upptagna i Tab. B, hvilka blifvit gjorda af BIÖR med en BORDAISK pendel-

*) CRONSTRAND, Årsb. för 1827.

apparat och äro antecknade i hans *Astronomie Physique Trois. Ed. Paris 1844 Tom. II. pag. 467.* Pendellängderna äro der uttryckta i mètres, som jag reducerat till pariser-lineer, antagande 4 mèt. vid 0° Cels. = 443,296 par. lin. vid +16½° Cels. Såsom gjorda med olikartade instrumenter ansåg jag mig ej böra kollektift behandla dessa och de i Tab. A upptagna observationerna, utan har inskränkt mig till att jemföra de förra med den ur de sednare härledda formeln. Jemförelsens resultat innehålles i sista kolumnen af Tab. B. Vid granskningen deraf befinnas afvikelserna vid Lipari och Formentera isynnerhet betydliga. Som nu ett fel af 0,01 par. lin. motsvarar i det närmaste en hel oscillation, så måste vid bestämmandet af pendellängden för Lipari och Formentera fel blifvit begånget på nära 6 och 5 oscillationer respective. Om möjligheten deraf kunna endast de döma, som sjelfva utfört sådana observationer; jag kan endast af sjelfva metoden draga slutsatser, och *den* synes omöjligen kunna medgifva sådana fel, allraminst af Bior. Han anför sina original-observationer i Dunkerque 1809 och största afvikelsen från medium är 0^{m.m.}0164 = 0,0073 par. lin., hvilket således ej uppgår till en hel oscillation. Då dessa betydliga avvikelser ej kunna skyllas på observationsfel, återstår endast att tänka på underlåtna korrektioner eller lokala attraktioner. Det förra vore man benägen att tro i följe af Prof. CRONSTRANDS yttrande *), att »BESSEL har i den rådande teorien för fluiders rörelse upptäckt flere oriktigheter, hvilka äfven till den grad influera på pendelförsökens reduktion till lufttomt rum, att denna blir nästan dubbel mot dess förra belopp, då pendeln, såsom den Bordaiska, består af en tråd med kula, och göra, att de båda oscillationernas likhet upphör hos en Katersk pendel med reciproka axlar». PUISSANT anför **), att POISSON funnit den vanliga reduktionen böra multipliceras med $\frac{3}{2}$ vid den Bordaiska pendeln. Den korrektionsformel PUISSANT anför såsom den van-

*) Årsb. för 1828 pag. 44.

**) MONTFERRIER, Dictionnaire des Sciences Mathematiques, deux. ed. Paris 1845. Tom. III. pag. 347.

liga är i det närmaste lika med den, som BIOT användt, och BIOT nämner hvarken BESSEL eller POISSON, hvaraf man torde kunna sluta, att ifrågavarande förbättrade reduktionsmethod ej blifvit använd. Men saken blir genom ett sådant antagande blott förvärrad, ty denna reduktion är alltid positiv och skulle således öka den observerade pendellängden, som alltså både vid Lipari och Formentera komme att ändå mera skilja sig från den beräknade, hvilket blir händelsen med alla de negativa afvikelserna. Flera af dessa blifva derigenom sådana, att de nästan tyckas öferskrida möjliga observationsfel. Emellertid blir man tvehågsen vid bedömandet af probabla felets storlek, då man betänker, att på Falklandsöarna DUPERRÉ funnit pendellängden 0,00233 inches = 0,0262 par. lin. större än FREYCINET på nästan samma ställe *), hvarjemte BAILY lär hafva funnit, att experimentfelet *kan* vara ännu betydligare **). Här af blir man åtminstone lugn för de afvikelser, som Tab. A förete och hvilka utan betänkande torde kunna tillskrifvas observationsfel. Beträffande deremot de nyssnämnda experimenterna på Lipari och Formentera låter det sig knappast göra, och då återstår endast att tänka på lokala attraktioner för att förklara de betydliga afvikelserna. Dessas tecken häntyda på en större attraktion, hvilken omständighet icke synes oväntad, då man erinrar sig dessa öars vulkaniska natur, utan snarare gifver stöd åt den åsigt, som jag i det föregående följt, nemligen att utesluta observationer från orter, hvilkas geologiska beskaffenhet gaf skäl att misstänka en från vanliga förhållanden afvikande attraktion. I alla fall torde ej kunna bestridas, att dessa afvikelser äro tillräckligt små för att kunna betraktas såsom blotta perturba-

*) CRONSTRAND, Årsb. för 1830 pag. 72.

**) CRONSTRAND l. c. pag. 73. I Årsb. för 1835 uppgifves uti BAILYs tabell, att DUPERRÉ vid polhöjden = $51^{\circ}31'44''$ funnit 86399,84 oscillationer på 24^h m. t. af en enkel pendel, som i London slår sekunder, under det att FREYCINET vid polhöjden = $51^{\circ}35'18''$ funnit 86396,74 oscillationer. I BAILYs nyssnämnde tabell uppgår största skillnaden mellan observerade och beräknade oscillationer på 24^h m. t. till 11,25. Experimentet är af LUTKE på Bonin-ön.

tioner, utan att man behöfver öfvergifva den åsigten, att jordens figur, då man abstraherar från dessa små afvikelser, är en elliptisk rotationssferoid, på samma sätt som man, perturbationerna oaktadt, säger att planetbanorna äro ellipser.

3. I det föregående har jag sökt visa, att pendlexperimenterna, behandlade efter samma princip som gradmätningarna, gifva en afplattning mera öfverensstämmande med den, som härledes ur gradmätningarne, än den man funnit genom kollektiv behandling af alla förhandenvarande pendlexperiment. Visserligen qvarstå olikheter, som, ehuru de synas föga betydliga, utöfva ett ganska störande inflytande; likväl torde de kunna anses nog små och i begge lika ingående, att medgifva ett gemensamt begagnande af gradmätningarnas och pendel-experimenternas data *). Det ändamål, för hvilket jag ämnar försöka detta, är bestämningen af jordens massa, hvarpå jag sett flera från hvarandra betydligt afvikande värden. Ehuru detta väl hufvudsakligen kommer af de olika värden, som blifvit begagnade på solens parallax, torde det ej sakna allt intresse att se de zifferresultater sammanställda, hvartill olika metoder leda, då de nyaste och bästa zifferuppgifter, jag kunnat finna, begagnas.

Om jorden antages vara en homogen sferoid (massan = m), som uppkommit derigenom, att en ellips ($a^2y^2 + b^2x^2 = a^2b^2$) roterat kring mindre axeln, så är dess attraktion utefter axlarna på en i ytan belägen punkt, hvars koordinater äro α , β , γ ,

$$X = \frac{3m\alpha}{2b^2\lambda^3} \left\{ \text{Arc.tg.}\lambda - \frac{\lambda}{1+\lambda^2} \right\}$$

*) I sjelfva verket, om man jemför de afvikelser, som uppstå, i fall man med bibehållande af BESSELS eqvatorsradie, antager den afplattning, pendel-experimenterna gifvit, befinnes visserligen halfva jordaxeln hela 42 toises mindre än med afplattningen enligt BESSEL, hvilket på meridian-ellipsen gör en minskning af omkring 66 toises; granskar man deremot återstående fel i polhöjd vid gradmätningarne, så uppgå de per medium till 3'' à 4'', af hvilka hvarje motsvarar 16 toises. Vid Evrax går felet till 6'',897 (se Prof. SELANDER l. c. pag. 87), hvilket gör vid pass 110 toises.

$$Y = \frac{3m\beta}{b^2\lambda^2} \{ \lambda - \text{Arc.tg.}\lambda \}$$

$$Z = \frac{3m\gamma}{2b^2\lambda^2} \left\{ \text{Arc.tg.}\lambda - \frac{\lambda}{1+\lambda^2} \right\}^2,$$

hvarrest $\lambda = \frac{1}{b} \sqrt{a^2 - b^2}$. Resultanten af dessa krafter är

$$R = \frac{3m}{b^2\lambda^2} \sqrt{\beta^2(\lambda - \text{Arc.tg.}\lambda)^2 + \frac{a^2 + \gamma^2}{4} \left(\text{Arc.tg.}\lambda - \frac{\lambda}{1+\lambda^2} \right)^2}.$$

Om x - och z -axeln antagas göra en vinkel $= 45^\circ$ med den attraherade punktens meridianplan, om vidare jordradien till punkten sättes $= r$ och geocentriska polhöjden $= \varphi'$, så blir

$$a = \gamma = \frac{r \cos \varphi'}{\sqrt{2}}, \quad \beta = r \sin \varphi'.$$

Sätter man derjemte

$$\text{Arc.tg.}\lambda - \frac{\lambda}{1+\lambda^2} = 2\lambda^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{5}\lambda^2 + \frac{3}{7}\lambda^4 - \text{etc.} \right) = 2\lambda^2 g$$

$$\lambda - \text{Arc.tg.}\lambda = \lambda^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\lambda^2 + \frac{1}{7}\lambda^4 - \text{etc.} \right) = \lambda^3 h,$$

så befinnes

$$R = \frac{3mr}{b^2} \sqrt{h^2 \sin^2 \varphi' + g^2 \cos^2 \varphi'}. \quad . \quad . \quad . \quad (2)$$

Om den vinkel, som direktionen af R gör med y -axeln, sättes $= \psi$, så blir

$$\cos \psi = \frac{Y}{R} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{g^2}{h^2} \cot^2 \varphi'}}, \quad \text{tg} \psi = \frac{g}{h} \cot \varphi'.$$

Som g och h i följe af gradmätningarne äro bekanta, så kan man för hvilket φ' som helst finna ψ .

Pendel-experimenterna kunna ock gifva ψ . Emedan tyngden är resultant af attraktionskraften och centrifugal-kraften, så kan man föreställa dessa krafter genom diagonalen och sidorna i en parallelogram, hvars ena vinkel är $= 90^\circ - \psi$. Som tyngdens direktion är normal mot jordens yta, så blir dess vinkel med centrifugal-kraftens direktion $= 180^\circ - \varphi$, då φ är den obser-

*) Se PONTÉCOULANT, *Theorie Analytique*, Tom. II, pag. 344. Några bokstäfver, som här brukas, har jag utbytt mot andra.

verade polhöjden. Sätter man den mot ϕ svarande tyngden $=G$, så är förhållandet mellan centrifugal-kraften och tyngden $=\frac{4\pi^2 r \cos \phi'}{Gr}$ ($t=86164''.091$) och man får

$$1:\frac{4\pi^2 r \cos \phi'}{Gr} = \cos \psi : -\cos(\phi + \psi),$$

hvilken analogi gifver

$$tg.\psi = \cot.\phi + \frac{4\pi^2 r \cos \phi'}{Gr \sin \phi}.$$

Nu borde, om allt vore riktigt, de båda värdena på ψ blifva lika. Då det förra är behäftadt med felen i gradmätningarna samt det falska antagandet att jorden är homogen, så innehåller deremot det sednare felen i gradmätningarna och pendeleexperimenterna. Alla dessa fel förorsaka likväl ej större olikhet mellan de båda värdena på ψ än högst omkring $1\frac{1}{2}'$, hvarmed det sednare värdet på ψ öfverskjuter det förra. Under sådana omständigheter synes det föga vara mödan värdt att göra hypoteser i afseende på lagen för variation af jordens täthet. Om man derföre tillåter sig att betrakta jorden såsom en homogen rotationssferoid, så fås af (2)

$$m = \frac{Rb^3}{3r} \cdot \frac{1}{\sqrt{h^2 \sin^2 \phi' + g^2 \cos^2 \phi'}}. \quad . \quad . \quad . \quad (3)$$

Af elliptiska teorien känner man vidare, att

$$M + m = \frac{4\pi^2 a^3}{T^2 \sin^3 p}, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (4)$$

hvarrest M är = solens massa, T = jordens sideriska omloppstid, och p = solens eqvatoriala horizontal-parallax. Om nu (4) divideras med (3) så fås

$$\frac{M}{m} + 1 = \frac{12\pi^2 a^3 r \sqrt{h^2 \sin^2 \phi' + g^2 \cos^2 \phi'}}{Rb^3 T^2 \sin^3 p} \quad . \quad . \quad . \quad (5)$$

Tydligan *måste* man här insätta det värde på R , som pendeleexperimenterna gifva, emedan både m och R förekomma i (2). Ur ofvannämnda parallelogram fås

$$R = \sqrt{G^2 + c^2 + 2cG \cos \phi},$$

då c = centrifugal-kraften. Som man vidare har

$$G = \pi^2 L,$$

så blir

$$\begin{aligned} \text{för } \varphi=0, \quad R &= \frac{290}{289} \pi^2 l \\ \text{» } \varphi=90^\circ \quad R &= \pi^2 (l+f), \end{aligned}$$

och i följe deraf

$$\begin{aligned} \text{för } \varphi'=0, \quad \frac{M}{m} + 1 &= \frac{12a^2g}{b^2T^2 \sin^2 p} \cdot \frac{289}{290l} \\ \text{» } \varphi'=90^\circ, \quad \frac{M}{m} + 1 &= \frac{12a^2h}{b^2T^2 \sin^2 p} \cdot \frac{1}{l+f}, \end{aligned}$$

hvarrest T måste uttryckas i sekunder, l och f i toises. Gör man nu enligt BESSEL $a=3272077,14$ toises, $b=3264139,33$ (alltså $g=0,33066486$, $h=0,33199591$), och $T=365,2563744$ och enligt ENCKE $p=8'',5776$, samt antager ofvan funna värden på l , f , så fås

$$\text{för } \varphi=0, \quad \frac{M}{m} = 358916$$

$$\text{» } \varphi=90^\circ \quad \frac{M}{m} = 358501,$$

$$\text{hvaraf medium gifver } \frac{M}{m} = 358709,$$

hvilket värde ej litet skiljer sig från 354936, som finnes i Nautical Almanac för 1846.

Enligt KEPLERS tredje lag har man

$$\frac{M}{m} + 1 = \left(1 + \frac{m'}{m}\right) \frac{T'^2 \sin^2 p}{T^2 \sin^2 p},$$

då m' , T' , P beteckna månens massa, sideriska omloppstid och eqvatoriala medel-horizontaf-parallax. Nu är

$$\frac{m'}{m} = \frac{1}{87,73} \quad (\text{VON LINDENAU})$$

$$T' = 27,321661 \quad (\text{CRONSTRAND, Prakt. Astron. häft. 2 pag. 43}),$$

$$P = 3420'',52 \quad \text{enligt BURCKHARDT}$$

$$\text{» } = 3421,858 \quad \text{» HENDERSON}$$

$$\text{» } = 3422,674 \quad \text{» OLUFSEN}).$$

*) SELANDER l. c. pag. 63, 64. Ofvanstående värden fås, då man i

formlerna begagnar afplattningen $= \frac{1}{299,1528}$ och Godahoppssud-

dens longitud från Greenwich $= 1^\circ 13' 55''$ (enligt Berliner Jahrbuch) och Paris longitud $= 9^\circ 21'',5$, båda östliga.

Mot dessa tre värden på *P*, svara i ordning

$$\left. \begin{array}{l} \frac{M}{m} = 358805 \\ \gg = 359226 \\ \gg = 359484 \end{array} \right\}, \text{medium} = 359172.$$

Tab. A.

Observationsort.	Observer.	Polhöjd.	Pendellängd i pariserlin.	Konditionsekvationer.	Beräkn. — Observ.	Beräkn. — Observ.
Para.	F.	1027' 0'' s	439,2687			+0,0002
Bahia	S.	12 59 21 s	439,3885	0,04988f—0,1198	=0	— 0,0038
Madras	G.	13 4 9 n	439,3883	0,05049f—0,1196	=0	— 22
Rio Janeiro. . . .	H.	22 55 22 s	439,6180	0,15106f—0,3493	=0	+ 20 + 22
Valparaiso.	L.	33 2 30 s	439,9369	0,20666f—0,0882	=0	+ 17 + 19
Paramatta.	Br.	33 48 43 s	439,9908	0,30902f—0,7221	=0	— 34 — 32
Port Jackson. . . .	D.	33 51 40 s	440,0056	0,30981f—0,7369	=0	— 104 — 162
Godahoppsudden. .	F.	33 54 37 s	439,9892	0,31061f—0,7205	=0	+ 19 + 21
—	Fr.	33 55 15 s	439,9918	0,31078f—0,7231	=0	— 3 — 1
—	Fa.	33 55 56 s	440,0018	0,31096f—0,7331	=0	— 99 — 97
Monte Video	F.	34 54 26 s	440,0201	0,32683f—0,7514	=0	+ 87 + 89
New-York.	S.	40 42 43 n	440,2017	0,42480f—0,9930	=0	— 51 — 49
Toulon	D.	43 7 20 n	440,3345	0,46661f—1,0858	=0	— 6 — 4
Paris.	Fr.	48 50 14 n	440,5672	0,56613f—1,2985	=0	+ 181 + 183
—	S.	—	440,5701	0,56613f—1,3014	=0	+ 152 + 154
—	D.	—	440,5728	0,56613f—1,3041	=0	+ 125 + 127
Shanklin Farm. . .	K.	50 37 24 n	440,6827	0,59688f—1,3840	=0	+ 41 + 43
Greenwich	F.	51 28 40 n	440,6811	0,61146f—1,4124	=0	+ 97 + 99
—	L.	—	440,6817	0,61146f—1,4130	=0	+ 91 + 93
—	S.	—	440,6865	0,61146f—1,4278	=0	— 57 — 55
London	Fa.	51 31 8 n	440,6870	0,61216f—1,4183	=0	+ 54 + 56
—	F.	—	440,6884	0,61216f—1,4197	=0	+ 40 + 42
—	S.	—	440,6896	0,61216f—1,4179	=0	+ 58 + 60
—	K.	—	440,6895	0,61216f—1,4208 + ν	=0	+ 34 + 36
Arbury Hill	K.	52 12 55 n	440,7270	0,62396f—1,4583	=0	— 72 — 70
Clifton.	K.	53 27 43 n	440,7658	0,64491f—1,4971	=0	+ 28 + 29
Altona	S.	53 32 45 n	440,7811	0,64631f—1,5124	=0	— 93 — 91
Königsberg	B.	54 42 50 n	440,8179	0,66567f—1,5492 + ν	=0	— 6 — 4
Cap Horn.	F.	55 51 20 s	440,8729	0,68432f—1,6042	=0	— 127 — 126
Leith Fort	K.	55 58 41 n	440,8733	0,68631f—1,6046	=0	— 85 — 83
Portsoy	K.	57 40 59 n	440,9414	0,71356f—1,6727	=0	— 132 — 130
Stockholm	Sv., C.	59 20 34 n	440,9916	0,73936f—1,7229 + ν	=0	— 29 — 27
Petersburg	L.	59 56 31 n	441,0180	0,74848f—1,7493	=0	— 80 — 84
Unst	K.	60 45 28 n	441,0306	0,76073f—1,7810	=0	— 127 — 125
Hammarfest.	S.	70 40 5 n	441,3134	0,88977f—2,0447	=0	+ 246 + 248
Port Bowen.	F.	73 13 39 n	441,4087	0,91609f—2,1400	=0	— 95 — 93
Grönland	S.	74 32 19 n	441,4112	0,92829f—2,1425	=0	+ 164 + 166
Spitzbergen	S.	79 49 58 n	441,5304	0,96820f—2,2707	=0	— 190 — 188

Nb. B. betyder BESSEL, Br. BRISBANE, C. CRONSTRAND, D. DUPERNEY, Fa. FALLOWS, F. FOSTER, Fr. FREYCINET, G. GOLDIGHAM, H. HALL, K. KATER, L. LUTKE, S. SABINE, Sv. SVANBERG.

Tab. B.

Observationsort.	Observator.	Polhöjd.	Pendel- längd.	Beräkn. —Observ.
Lipari	B., ED. BIOT . . .	38°28'37"n	440,2280	—0,0398
Formentera	—	38 39 56 n	440,2238	— 481
Barcelona	—	41 23 15 n	440,2958	— 113
Figeac	B., MATTHIEU . . .	44 36 45 n	440,3959	+ 191
Bordeaux	—	44 50 26 n	440,3937	+ 306
Fiume	B., ED. BIOT . . .	45 19 0 n	440,4518	— 82
Padua	—	45 24 3 n	440,4621	— 131
Milano	—	45 28 1 n	440,4357	+ 140
Clermont-Ferrand .	B., MATTHIEU . . .	45 46 48 n	440,4511	+ 113
Paris	BORDA, CASSINI . .	48 50 14 n	440,5080	+ 168
Paris	{ B., MATTHIEU } BOUVARD . . . }	—	440,5772	+ 76
Dunkerque	B., MATTHIEU . . .	51 2 10 n	440,6719	+ 20
Leith Fort	B.	55 58 37 n	440,8715	— 60
Unst	B.	60 45 25 n	441,0855	— 170

B. betyder Biot.

2. *Om en svårighet vid bestämningen af functioners maxima och minima.* — Hr Lector LINDMAN hade meddelat följande uppsats:

»Då man på vanligt sätt söker bestämma maxima och minima af functioner utaf flere variabla, som ej äro af hvarandra oberoende, händer det understundom, att man finner blott *ettdera*, ehuru både maximum och minimum finnas, eller att man åtminstone icke finner alla maximi- och minimi-värden. För att icke falla i en otillbörlig vidlöftighet, måste jag vid behandlingen af de exempel, genom hvilka jag skall söka styrka detta påstående, följa den method, som i något arbete öfver Differential-räkning föredrages, och väljer företrädesvis Professor GRUNERTS i Suppl. zu Klügels Math. Wörterbuch, zweyte Abtheil. pag. 705—755, Leipzig 1836, hvarest finnes den fullständigaste framställning af detta ämne, som jag haft tillfälle att se »).

*) SCHLÖMILCHS method i hans Handbuch der Differenzial- und Integralrechnung, Greifswald 1847, är härmed identisk, ehuru framställningen är mindre utförlig.

Ex. 4. Om man med u betecknar radius curvaturæ i en ellips, hværs eqvation är

$$V = a^2 y^2 + b^2 x^2 - a^2 b^2 = 0,$$

så har man

$$u = \frac{(a^4 y^2 + b^4 x^2)^{\frac{3}{2}}}{a^4 b^4}.$$

Således är

$$\left(\frac{du}{dx}\right) = \frac{3x(a^4 y^2 + b^4 x^2)^{\frac{1}{2}}}{a^4}, \quad \left(\frac{du}{dy}\right) = \frac{3y(a^4 y^2 + b^4 x^2)^{\frac{1}{2}}}{b^4}$$

$$\left(\frac{dV}{dx}\right) = 2b^2 x, \quad \left(\frac{dV}{dy}\right) = 2a^2 y.$$

Vilkoret för maximum och minimum är

$$\left(\frac{du}{dx}\right) \delta x + \left(\frac{du}{dy}\right) \delta y = 0, \quad \left(\frac{dV}{dx}\right) \delta x + \left(\frac{dV}{dy}\right) \delta y = 0,$$

hvarrest $\delta x = \frac{dx}{ds}$, $\delta y = \frac{dy}{ds}$ och s en ny variabel, hvaraf x , y tänkas beroende. I detta fall bli vilkorseqvationerna efter gemensamma factorers bortdividering

$$\frac{x}{a^4} \delta x + \frac{y}{b^4} \delta y = 0, \quad b^2 x \delta x + a^2 y \delta y = 0.$$

Som nu δx , δy äro af hvarandra helt och hållet oberoende, så måste, efter den enes eliminering, den andres coëfficient vara = 0. Om då δy elimineras, så fås

$$\left(\frac{x}{a^4} - \frac{x}{a^2 b^2}\right) \delta x = \frac{x}{a^2} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) \delta x = 0,$$

hvaraf $x=0$. Då nu endast ett värde blifvit funnet och detta således blott kan gifva maximum eller minimum, men ej båda, så vill det synas, som om functionen u ej hade mera än ettdera, hvilket genom ny differentiation utrönes vara maximum. Lätt inses likväl, att i detta fall äfven minimum finnes, ehuru methoden icke lemnar någon föreskrift, huru det skall finnas. Försöker man emellertid, om det kan erhållas genom eliminering af δx , så fås $y=0$, som verkligen, såsom lätt utrönes, motsvarar minimum. Om man i stället att följa ofvannämnda method eller att anse x , y såsom functioner af s , börjat med att eliminera y emellan de ursprungliga eqvationerna $u=0$, $V=0$,

så hade man ej lyckats bättre än nu, såvida man ej derjemte derefter eliminerat x , i hvilket fall man funnit både maximum och minimum.

Ex. 2. Antag

$$u = 2y^2 + x + \mathfrak{L}(1+x), \quad V = 5y^2 + 7x - 3 = 0$$

och sök maximum och minimum af u . Här är

$$\left(\frac{du}{dx}\right) = 1 + \frac{1}{1+x}, \quad \left(\frac{du}{dy}\right) = 4y$$

$$\left(\frac{dV}{dx}\right) = 7 \quad \left(\frac{dV}{dy}\right) = 10y,$$

$$\left(1 + \frac{1}{1+x}\right) \delta x + 4y \delta y = 0, \quad 7\delta x + 10y \delta y = 0.$$

Elimineras δy , så fås

$$\left(\frac{1}{1+x} - \frac{9}{5}\right) \delta x = 0, \quad x = -\frac{4}{9}, \quad \text{alltså } y^2 = \frac{11}{9}.$$

Genom ny differentiation finner man, att dessa värden gifva $u = \text{maximum} = 2 + \mathfrak{L}\frac{9}{5}$. Hade man deremot eliminerat δx , så hade man fått

$$\frac{2y}{7} \left(9 - \frac{5}{1+x}\right) \delta y = 0.$$

Man finner här af två systemer af värden

$$y_1 = 0 \quad x_1 = \frac{3}{7}$$

$$y_2^2 = \frac{11}{9} \quad x_2 = -\frac{4}{9}.$$

Det sednare är således detsamma, som erhöles, då δy eliminerades; det förra gifver $u = \text{minimum} = \frac{3}{7} + \mathfrak{L}\frac{10}{7}$. Således inträffar här den olikheten mot i Ex. 1, att eliminering af δy gifver blott maximum, men af δx både maximum och minimum.

Ex. 3. Antager man

$$u = 4y^2 + \frac{1}{5}x + \mathfrak{L}(x + \sqrt{1+x^2})$$

$$V = 5y^2 + x - 2 = 0,$$

så finner man lätt

$$\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) \delta x + 8y \delta y = 0, \quad \delta x + 10y \delta y = 0.$$

Då

Då man eliminerar δy , så finner man $x = \pm \frac{4}{3}$ och utröner lätt att

$$x = \frac{4}{3} \text{ ger } u = \text{maximum} = \frac{4}{5} + 13,$$

$$x = -\frac{4}{3} \text{ ger } u = \text{minimum} = \frac{12}{5} - 13.$$

Nu fann man alltså både maximum och minimum; men frågan blir, om något mera maxi- eller mini-värde finnes. För-söker man med att eliminera δx , såsom förut, så fås

$$y \left(\frac{5}{\sqrt{1+x^2}} - 3 \right) \delta y = 0,$$

hvaraf man erhåller ännu ett värde $y=0$, som ger $x=2$. Hade man deremot börjat med att eliminera y emellan de gifna eqvationerna, så hade man blott funnit två värden nemligen $x = \pm \frac{4}{3}$; om man åter eliminerat x , så hade man äfven funnit $y=0$ samt att för detta värde är

$$u = \text{minimum} = \frac{2}{5} + 1(2 + \sqrt{5}).$$

Dessa exempel torde vara tillräckliga att ådagalägga till-varon af det omnämnda faktum, som jag ingenstädes funnit anmärkt, vare sig att ingen gifvit akt derpå eller att det be-funnits alltför simpelt att förtjena anföras ens i en lärobok. Om också utredandet af denna sak ej erbjuder någon svårighet, så förblifver den dock en objection mot sjelfva metoden och en, låt vara skenbar ofullkomlighet deri, hvilken det ej utan skäl torde anses nödigt att undanröjda. Äfven om detta medgifves, är det icke mig tillständigt att våga ett förslag till ändamålets vin-nande; må det endast tillåtas mig att göra några anmärkningar med anledning af de anförda exemplen. Af dessa ses att, hvarje gång δy blifvit eliminerad, ett mindre antal värden erhållits, än vederbort, samt att *alla* först blifvit funna genom successiv elimination af δy , δx , oaktadt man bordt få detsamma, om man eliminerat endera, hvilken som helst. Eftertänker man, huru-vida detta kunnat härflyta från någon egendomlig beskaffenhet hos de gifna eqvationerna, så finner man genast, att, i följe af en sådan, y försvunnit på samma gång som man eliminerat δy ,

emedan y ingått på samma sätt i u och V . För detta fall torde methoden således böra få det tillägg att δx , δy böra hvar efter annan elimineras eller att *endast den* elimineras, som *icke* ingår på samma sätt i u och V . Anmärkningsvärdt synes äfven vara att i de anförda exemplen de af methoden ej gifna värdena på den ena variabla äro sådana, med hvilka värdena på den andra upphöra att vara reela. Både GRUNERT*) och MOIRNO**) inskräpa nödvändigheten att vid functionen af en oberoende variabel bestämma de värden på den variabla, som göra functionen discontinuerlig, och undersöka, huruvida de motsvara maximum eller minimum af functionen. En dylik föreskrift angående villkorsequationen $V=0$ vid functionen af två ej oberoende variabla synes undanröjda den svårighet, hvarpå jag nu framställt några exempel.

3. *Bref från Paraguay.* — Hr Mag. EBERH. MURCK AF ROSENSCHÖLD, som sedan flera år vistas i Paraguay, hade tillskrifvit Hr SUNDEVALL ett bref, hvarur denne uppläste följande utdrag. Detsamma innefattar mycket som alldeles enskildt rör brefskrifvaren, men Hr S. ansåg sig dock böra meddela det, som behöfdes för att rätt fatta R:ns ställning i landet, och att derigenom förtydliga det, som han anför om folket, lefnadsättet och författningen i detta märkvärdiga land, hvilket torde vara det enda i verlden, der en alldeles ny europeisk civilisation, tillvägabragt allenast genom missionärer, är på väg att utbilda sig hos ett s. k. indianfolk, som ej hade någon egen, förutgående civilisation, och utan betydlig inblandning af europeer.

»Asuncion i Paraguay den 18 December 1852. . . Ett stort nöje förorsakades mig, då jag åter, i förra månaden emottog tvenne bref från dig, nemligen ett af den 8 Maj 1849, som besynnerligt nog nu först kom mig tillhanda samt ett af d. 24

*) l. c. pag. 714.

**) Calcul Diff. pag. 55. Paris 1840.

Augusti innevarande år; men det af d. 15 Maj s. å. har ej kommit fram. . . Utan att bli påmind om hemresan har jag ständigt tänkt derpå, . . men det är ej en småsak att härifrån fara hem . . I Paraguay har jag min rikliga utkomst utan att behöfva offra mera tid deråt än att jag dessutom kan egna mig åt forskningar i naturalhistorien, så vidt mitt aflägsna vistande och obekantskapen med nyare upptäckter kunna tillåta. Äfven har det varit mig svårt att ännu lemna ett land, vid hvars klimat och seder jag vant mig, der jag är aktad och der jag erhållit verkliga vänner, sådana som äro sällsynta här i verlden . . Landet är fattigt för en läkare som önskar samla för-mögenhet, och det vore nödvändigt att för detta ändamål bosätta sig i hufvudstaden; men jag har föredragit att tillbringa den mesta tiden på landet för att göra samlingar, genom hvilkas försäljande i Europa jag hoppades kunna få, tillhopa med hvad jag på annat sätt kan förtjena, något att lefva af då jag tänkte åter fara hem . . . Såsom svar på din förnyade begäran att erhålla en berättelse om min ställning här i landet, må följande meddelas.

Sedan jag anländt till Asunción blef jag snart bekant med några af sönerna till en af de bästa familjer här i landet och inqvarterade mig i ett af deras hus i staden. Fadren, som heter RIVAROLA, bor med de öfriga af familjen på landet, och är egare af flera estancier, d. v. s. egendomar med boskaps- och hästafvel. Han var förr en af de rikaste personer i landet, men led under FRANCIAS regering betydliga förluster, som mycket reducerade hans rikedom. Han är fader till sju söner och fem döttrar, hvilka sednare alla hade svag helsa, särdeles en af dem, som dagligen aftynade. Förgäfves anlätades landets läkare, som, med undantag af dem i hufvudstaden, endast äro qvacksalfvare, af hvilka många hvarken kunna läsa eller skriva, och som man ofta skulle taga för tiggare. Genom deras hopkokade örter, det enda de visste att använda, förvärrades blott sjukdomen, hvarföre jag, efter några månaders vistande i staden, blef utbjuden till estancian, som ligger v. p. tio mil häri-



från i en trakt som kallas las Cordilleras, emedan en bergås genomstryker landet, och utskickar grenar åt ena hållet, beväxta med skog, hvaremellan ängar och kärr omvexla. Som detta blef ett godt tillfälle för mig att lära känna dessa trakters naturalster, lät jag ej länge bedja mig, helst hufvudstadens omgifning, såsom vanligt vid stora städer, är mycket odlad. Under min behandling tillfrisknade patienten, och då det äfven lyckades mig att förbättra de öfrige syskonens helsotillstånd, vann jag snart ett visst anseende. Jag har äfven undervisat döttrarna, ty ehuru fadren är en för detta land studerad man, som till och med varit i fråga vid presidentvalet, kunde hvarken hans fru eller döttrar tala spanska, hvilket torde synas besynnerligt för eder der hemma. Då jag skulle efterfråga deras helsotillstånd, måste fadren tjena som tolk, emedan jag då förstod ganska litet af Guarani-språket. Det är vanligen fallet på landet, att endast detta språk förstås, och det är det enda som talas der, med undantag af de personer som äro tjenstemän. Småningom lyckades det mig att lära döttrarna spanska, som de nu tala med lätthet, och att förjaga deras blyghet, och jag är nu mera ansedd nästan som en medlem af familjen. Genom allt detta, och då jag tillbragte en stor del af min tid der, trodde man allmänt i staden, att jag skulle gifta mig i huset, och det är detta ogrundade rykte som kommit ända till dig. Men den olika religionen är ett absolut hinder, och jag skulle efter ett sådant steg aldrig mera kunna återvända hem . . . Den äldre RIVAROLA, som är egare af stora land, hvilka kunna lemna bete åt ännu många tusende djur mera, föreslog mig för några år sedan, att köpa hornboskap för att underhålla dem på hans egor, hvaraf mig försäkrades en betydlig årlig afkastning. Jag egde då något, på medicinsk praktik förvärfvade penningar, och antog tillbudet så mycket hellre, som all handel genom kriget var afbruten och penningarne således lågo alldeles ofruktbara . . . Det nästan enda sättet att skaffa sig kor är att köpa årsgamla kalfvar, som betalas till staten såsom tionde. Denna erlägges af alla landets

produkter in natura, hvilka staten årligen säljer på auktion till den mestbjudande, och i många lotter enligt de olika departementerna. Dessa inköp göras af spekulanter, som sedan sälja tionden åt andra spekulanter eller på marknaden, och fastän detta är ett vinst- och förlustspel, emedan man af förra årets afkastning blott kan ungefärligen beräkna det närvarandes, göres dock vanligen en god vinst derpå, om ej oförutsedda motgångar inträffa. Den som köper tionde måste sjelf, hus för hus hopsamla den, hvilket är förenadt med mycket besvär och betydlig omkostnad. Jag och en af RIVAROLAS söner köpte tillhoppa 450 st. årsgamla kalvvar, som utgjorde en del af tionden i Missiones. De voro ännu hos sina förra egare, utspridda från Santa Rosa till Parana, på en sträcka af nära 40 mil, och vi måste på egen bekostnad afhemta, eller som det på spanska heter, *recaudera* dem. Dertill använde vi 46 peones med deras *capatas*, och RIVAROLA frankerade oss 80 hästar och 20 mulåsnor, hvilket var oss till stor besparing. Detta arbete fordrar mycken vaksamhet och takt för att sköta djuren och hindra dem att löpa bort, då de måste tillbringa nätterna på fältet, när ej coraler eller inhägnader finnas att innestänga dem uti. Då en egare blir tillsagd att betala sin tionde, låter han hopsamla sin boskap, eller, som det kallas, sätta rodéo, och då djuret, som skall lemnas, blifvit bestämdt, fångar en peon det med sin lasso om hufvudet och en annan om fötterna, så att det under språnget faller omkull. Det får dervid en förfärlig stöt och ofta händer, att det bryter af sig halsen eller ett ben, men man har ej uppfunnit något bättre sätt att få fast på ett obändigt och nästan vildt kreatur. Nu inbränner den förre egaren ånyo sitt märke, så att de bli två, och den nye egaren sitt, hvarefter djuret afskiljes. Dessa tre märken skada huden mycket, emedan de aldrig utplånas, och äro synliga ännu sedan huden blifvit garfvad; men det är det enda sättet att beteckna, att ett djur öfvergått till ny egare. Hvarje sådan måste hafva sitt, och jag antog de sammanbundna, omvända initialerne af mitt namn. De mig tillhörige 220 kalvarne anlände slutligen i

temligen godt skick efter en så lång marche, med undantag af tio, som dels blifvit benbrutne och måst slagtas, dels lupit bort under vägen. Nu följer den kinkigaste delen af hela affären, hvarvid de största förlusterna pläga ske, nemligen den, att vänja kreaturen vid sitt nya hem, eller att »qverensiera» dem. De hafva nemligen den instinkten att vilja återgå till sitt förra hem, och måste i tre till fyra månader bevakas af folk till häst, som hålla dem instängda i en cirkel och noga tillse att de ej blandas med den öfriga, redan tama boskapen, der sådan finnes. Om natten instängas de i corall på ett säkert, afskildt ställe under noga tillsyn, och hvarje morgon måste de noga räknas, på det att de, som lyckats undkomma, må i tid kunna eftersättas; de träffas då ofta på flera mils afstånd och på samma väg som de anländt. Detta arbete kallas »*Pastoréo*». Härunder bli de magra och betäckas af en otalig mängd fästingar, som isynnerhet sätta sig på halsen, så att håren falla af. Af den smärta och klåda samt blodförlust, som fästingarne förorsaka, bli de oroliga, vilja ej äta utan lägga sig ständigt och aftyna; många dö deraf och de som bli vid lif asmagra till nästan blotta skeletter. Uti de sårnader som uppkomma framkomma fluglarfver, som äfven kunna förorsaka döden. Tjurarne äro lyckligtvis ömtåligast, så att dödligheten nästan blott inträffar bland dem; korna bli oftast vid lif. Om detta tillstånd forfore länge skulle ej en enda kalf bli öfrig; men efter några månaders förlopp falla fästingarna af, huden renar sig och nya hår utväxa. De kalfvar som uthärdat stormen, såsom man här plägar uttrycka sig derom, repa sig småningom och bli sedan ej mera besvärade af fästingar än den tama boskapen. Genom detta fördömda lilla djur förlorade jag öfver trettio kalfvar, men de öfriga hafva repat sig och äro nu feta, samt börja fortplanta sig. En granne, som erhöll 400 stycken större och mindre boskap i arf, äfven från Missiones, förlorade samma år under pastoréo omkring 450, så att jag måste anse min egen förlust ringa.

Det är besynnerligt, men af en säker erfarenhet bekräftadt, att då boskap förflyttas från en något aflägsen trakt, till

en annan, blir den på detta sätt besvärad under de första månaderna, men ej sedan. Det är således af vigt att förskaffa sig kalivar från nära håll. Ett par fogelarter afplocka väl fästingar från boskapen, nemligen *Polyborus brasiliensis* (*Coracorá* eller *Carancho*) och *Milvago degener* (*Chimango*), men de förvärra snarare det onda, ty med fästingen följer ett stycke hud, så att sårnader uppkomma, hvari flugorna lägga ägg, hvaraf såren förstöras ehuru de rensas hvar sjerde eller femte dag. På mycket sumpig eller öfersvämmad mark finnas dock ej fästingarna, och deras antal förminskas betydligt under mycket regnig väderlek. Det årliga brännandet af fälten hämmar äfven deras tilltagande; men deras förökning är så stark, att detta botemedel allenast verkar för en kort tid. Före år 1838 var detta skadedjur okänt i Paraguay, men det blef då infördt med några oxar från *St. Borja* i Brasilien, der det många år varit käddt, till staden *Itapoa* vid Parana, som då var den enda plats, der utländsk handel drefs, isynnerhet af Brasilianare. Så snart fästingarna upptäcktes på nämnde oxar, blefvo dessa efter några dagar öfersända till andra sidan floden; men *Itapoas* boskap var redan besmittad och detta var tillräckligt att förpesta hela landet, ända till dess yttersta vinklar. *Francia* i sin vishet trodde sig kunna sätta en gräns för det ondas utbredande, genom vakter, quarantainer, besigtningar m. m., och då han såg att detta ej hjälpte, befallte han, att man skulle döda kräket med smörjningar och tvättningar. Men då äfven härmed ingenting uträttades, blefvo soldater utsända åt alla håll med ordres att döda all boskap och alla hästar, som befunnos besmittade med en enda fästing, samt att uppbränna hudarna. Genom denna oförnuftiga befallning, som punktligt åtlýddes, förlorade Paraguay, som var uppfyllt af boskap och hästar, nära hälften af denna sin rikedom och många rika personer blefvo derpå utfattiga; men mot *Francias* befallningar var intet att invända. Kärror blefvo stående på vägarna, emedan deras oxar befunnos smittade, och personer till häst måste fortsätta sin väg till fots med sadeln på ryggen, sedan hästen för samma orsak

blifvit dödad. De fattigare, som blott egde några få kor och oxar, sökte dagligen afplocka fästingarne för att sålunda rädda sin egendom, men många blefvo dock qvar, dolda mellan håren, och då besigtningen kom, blefvo djuren likväl dödade utan skonsamhet.

Af alla näringsgrenar här i landet anses boskapsskötseln för den mest lönande då den med omsorg bedrifves. Fästingarne döda sällan djur som redan äro tamda och vanda vid sin mark; men de små kalfvarne dö oftare af mask, som isynnerhet fäster sig vid nafveln innan den faller af, i munnen eller på något skadadt ställe af huden. De måste ofta bortplockas och man plägar ifylla maskhålet med torr hästspillning; men jag har funnit att stenkolsolja och tjära, hvarmed såren beströkas, äro ett ypperligt botemedel, som genom sin lukt hindrar flugorna att der lägga ägg. — Jag har varit något vidlyftig i denna berättelse för att visa min rätta ställning, som nu ej är så dålig som måhända skulle tro, men som ej tillåter mig att nu öfvergifva alltsammans för att skynda hemåt innan jag hunnit erhålla någon vinst af mitt företag. Emellertid har jag nu beslutat, att hemsända en remiss af naturalier, som kunde anlända under nästa år. Det skall bli roligt att höra huru mycket jag misstagit mig i arternas bestämmande. Jag hoppas ännu kunna resa till en estancia, som en af mina vänner anlagt 20 sv. mil nordost om Villa real vid Neglas utflöde i Aqvidavánigi; men sommaren är redan långt framskriden. Derifrån kan man se många berg, som troligtvis äro utgreningar från en hög bergskedja, kallad Taquivilélo, som löper från norr till söder, men dit numera ingen Paraguay vågar sig af fruktan för M'bayas-indianerna. Bland dessa berg skulle säkert stora skördar vara att göra, såsom jag förmodar, dels af stället af lägsenhet, dels tillfölje af berättelser som jag hört af gamla personer, som passerat dessa berg för att arbeta Paraguay-thé. Jag skulle önska att kunna lefva hundra år med helsa och kraft och hafva tusentals riksdaler att våga på resor! då skulle något kunna uträttas . . . »

Hr BOHEMAN meddelade äfven följande utdrag ur ett bref från samme resande:

Du och många andra undra säkerligen öfver, att jag ännu ej hemsändt från Paraguay något af mina samlingar och kunna ha skäl att betvifla, att jag verkligen är så rik derpå, som jag uppgifvit. Sedan jag hade den olyckan, att genom Corvetten Carlskronas förolyckande förlora mina i Buenos Aires gjorda insamlingar, hvilka med nämnde fartyg afsändes, blef jag försigtig, att släppa något lös från mig. Denna händelse var dock isolerad och om jag deraf afskräcktes från att hemsända remisser skulle jag aldrig få något hem. För att ej hemsända lådorna i det tillstånd de för närvarande förefinna sig, der många arter, som äro ganska sällsynta, påträffas, hvilka kunna gå förlorade i fall någon olycka inträffar, beslöt jag, att dela min samling, bibehålla en hufvudsamling för mig och hemsända dupletterna. Detta var i sanning ej ett småarbete, der jag hade att bestämma alla arterna, och som hade dessutom sina stora svårigheter af den orsak, att jag ännu lemnat en stor del af min insektsamling på landet, dock i godt förvar, och således ej kunde jemföra ett antal arter. Detta arbete har dock raskt fortgått och uppslukat mycken tid, som jag ej eller odelad kunnat egnas deråt. Jag har härunder funnit, att jag under en art, som jag trodde mig fullkomligt känna, ofta förblandat två, tre arter, som blefvo mig sedan lätt igenkännliga, när jag en gång noga jemfört dem, såsom fallet var med *Cicindela*, *Parnus*, *Ly-cus*, *Hispa*, *Clytrura*, *Cryptocephalus*, *Chrysomela* m. fl. Utom *Coleoptera*, af hvilka jag i synnerhet önskade hemsända, såsom den ordning som med förkärlek i Europa bearbetas, har jag äfven arbetat med de öfriga ordningarna, utom *Lepidoptera*, hvilka ännu äro för mig ett chaos, men hvaraf i synnerhet af de smärre *nocturna* en omätlig skörd kan göras. Jag möter stor svårighet genom brist på bottnar för nålarne, ty *Pita* (*Agave Americana*) finnes ej här. Jag har mycket sökt efter något motsvarande här i landet och var glad när jag upptäckte ett träd, kalladt *Yacaratiá* på *Guarani*, af *Euphorbiaceernas* familj,

hvars ved är mycket mjuk och så full af en klar saft, att den neddryper, när veden pressas i handen. Jag torkade skifvorna i solen, emedan de annars ruttna, och fann dem af en lagom mjukhet för att användas, men min fröjd förvandlades till smärta, när jag fann dem sensibla för väderlekens omskiften, ty i luktigt väder uppmjuknade de och förstörde nålarnes spetsar. Genom kokning, för att utdraga saften, har jag obetydligt förmått förbättra dem. En stor fingerstjock art *Cyperus*, som allmänt växer i kärren och kallas Piri, med mjuk märe, har jag äfven försökt och deraf hopbundit liksom mattor, men den förstör äfven nålarne. Det har äfven varit svårt att i skogarna finna duglig rutten ved, ty alltid är den öfverallt genomborrad af *Cerambycin*-larfver. Jag har således att kämpa äfven mot denna svårighet, som på ett annat ställe än Paraguay, lätt kunde afhjelpas och om jag ej blir häri hulpen, måste jag lägga alla insekter i sprit.

Jag håller nu på, att hopsätta en samling åtminstone af *Coleoptera*, som kan anlända till Sverige på våren. Om Riksmuseum önskar köpa dem, erbjuder jag dem till salu, emedan mina omständigheter ännu ej tillåta att deraf göra en skänk. Den blir väl ej fullständig, men med en annan remiss, som jag hoppas kunna skicka om några månader, skall den än mer kompletteras, och den kan gifva dig någon idé, om dessa länders insektfauna. Om du finner för godt att deraf beskrifva något, har jag ingenting deremot, ty jag får väl aldrig det nöjet att göra det, och dessutom kommer denna litteratur ändå att tillhöra vårt land. Flera *Coleopter*-släkten finnas, som jag liksom med mera intresse omfattat, förmodligen derföre, att jag af dem erhållit ett emot förmodan stort antal arter; bland dessa får jag nämna *Clythra* 21 arter, *Lema* 28, *Cryptcephalus* (ännu obestämdt), *Hispa* 30, *Crysomela* 25, *Oedionychus?* (= *Haltica*, femor. posticis crassissimis, ambitu semicircularibus, tarsor. posticor. artic. ultimo incrassato) 27, *Pachypus* 12, *Hydrocephalus* (sterno spinoso) 6, etc. Dessa äro insamlade blott i en inskränkt del af Paraguay (några få egna äfven från

Corrientes) och om jag får tillfälle att besöka de mera inre och norra trakterna af landet, skall kanske artantalet åtminstone till hälften ökas. När en sådan liten fläck af S. Amerika, som den jag undersökt, kunnat lemna så många arter, hvilken omätlig skörd är ej då att förvänta, när hela denna stora kontinent blir undersökt med samma noggrannhet som jag använt . . . Jag har nu till en början utarbetat diagnoser till följande släkten: Cicindeletæ med 15 arter, fördelade på 3 släkten, Hispa 30, Clythra 24, Chrysomela 19, Doryphora 8, summa 93 arter; dessa måste jag likväl först jemföra med den samling jag ännu eger på landet, som är ganska stor. Kunde jag få in 400 arter på 4½ ark eller 4 arter på sidan, skulle jag känna mig långt nöjdare än om jag skrifvit en tjock bok med långa beskrifningar, som är mycket lättare, ehuru mera tidsödande . . .

Jag har äfven rangerat, fastän ej fullständigt, de Diptera jag eger på landet och vill, fastän ur minnet, deraf uppräknat något, för att ge en någorlunda idé af hvad jag deraf har, såsom af Tabanii 37 arter, (Pangonia 2, Tabanus 24, Chrysops 5 och 3 nya släkten). Asilici öfver 50 (Asilus 30, Laphria, Dasypogon, Ommatius, Leptogaster 3 och flere obestämda släkten), Bombyliarii (antal?), Bombylius 4, Anthrea (i 2 afdeln.) öfver 20, Pthisia 4, och flere nya släkten, med jag tror 7 arter, Stratiomydæ (en mängd af Stratiomys, Oxycera, Sargus, Nemotelus och flera besynnerliga släkten), Thereva (Bibio Fab) 4 à 5, Cyrtus 2, Syrphici öfver 100, Volucella väl 20, Scæva Fab. många; nov. gen. Scævæ affine sed corpus angustum, ocelli a vertice remoti, oculi maris ad antennarum tantum connati 14, Helophilus 13, Baccha en stor mängd till större delen med svartfläckiga vingar, Ceria 2, Milesia 2, Microdon 10, Paragus 1, Pipuncululus etc. och nya släkten, Scenopinus 1, Conops 15, Zodium 3, Phasia 3, Trichiopoda 18, Echinomyia öfver 20, Miltogramma, Ocyptera vera, Tachinariæ en stor mängd, Sarcophaga, Musca, Anthomya, Oestrus 2, Tetanocera, Tephritis 26, Calobata, Copromyza (Borborus?) 2, Trineura, Sciomyza, Ephyrinae, Dolichopodes, och en mängd, hvars namn jag nu ej rätt påminner

mig eller ännu äro obestämda. Detta är väl på långt när ej att jemföra med hvad som blifvit funnet i Sverige, men Paraguay är också ej heller genomsökt i alla vrår och vinklar som vårt land och här behöfves en Dipterolog ex professo, för att taga reda på den mängd småkräk, som af Diptera finnas.

Jag eger en otroligt stor samling af alla ordningar, uppstuckna på nålar, laggda i sprit och en mängd små mellan bomull, dagfjärillar förvarade i papper etc. Jag kan ej rätt fördraga klimatet i Asuncion under den varmaste delen af sommaren, der en osund luft, till följe af dålig polis råder, och de trånga sandiga gatorna alstra en förfärlig hetta, som hos mig ökar gallan och förorsakar diarrhoe. Jag föredrager således, och af intresse att kunna än mera öka min samling, att tillbringa åtminstone denna tiden af året på landet, der en renare och friskare luft inandas, hvaraf jemte kalla bad och motion jag straxt återställes och njuter en verkligen afundsvärd hälsa. Då foglärne denna tiden äro i dålig dräkt och i fjäderömsning, och dessutom af hettan ruttna inom få timmar sedan de blifvit dödade, hvarföre deras preparerande ej lönar mödan, och då jag besväras af ganska få patienter och mest af sådana, som ej kunna eller vilja betala något, så återstår för mig ej anoon sysselsättning, än att samla insekter och vexter.

Jag vill nämna något om, huru nödvändigt det oftast är, att vid insamlande af insekter, om man deraf önskar erhålla det största möjliga antal arter, ej vilja välja eller göra urskiljning, så vida man ej fullkomligt känner dem. Bland exempel härpå må jag endast anföra släktet *Chalcis*. Häraf förekommer af flere storlekar såsom från *C. sispes* ända till mycket små, de flesta äro gula med svart teckning, hos andra är den svarta färgen rådande, de mindre äro vanligen enfärgadt ljusbruna, och några arter likna mycket vår *C. minuta*. De som ega samma färger äro så lika hvarandra, att den som ej specielt studerat dem, ej anar någon skiljaktighet i anseende till arterna. De träffas temligen allmänt, i synnerhet på en art *Croton*, som företrädesvis växer i mängd vid skogsbrynen och hvars saft, som

utsipprar från två glandler vid spetsen af bladstjälken, de begärligt söka, i sällskap med några små Coleoptera såsom Rhyngchænus och Coccinella etc. och en mängd mindre Diptera. Förelld af deras inbördes likhet brydde jag mig ej om, att deraf göra stor insamling, då det hände sig, att jag vid vägen i en skog påträffade i Maj detta år ett ännu mycket ungt träd, Yvira poita, tillhörande troligen Cæsalpinia, en stor mängd Chalcides, sökande på undra sidan af *endast några* vissa af dess mångpinnerade blad någon saft eller kåda, hvilket jag ej kunde utreda. Detta föreföll mig ett ypperligt tillfälle att på kort tid insamla en mängd exemplar, hvaraf jag ej heller knappt lemnade ett enda, med föresatts, att så snart jag kommit hem examinera och jemföra dem. Då jag trodde mig ega endast omkring 42 à 14 arter, blef jag ytterst förvånad att se mig ega 30, alla samlade om hvarandra på ett enda ställe. Nu först blef min uppmärksamhet häråt riktad och sedan jag insamlat omkring 800 specimina, har jag bragt artantalet ända till 60. Det är skada, att jag så sent gjort detta, ty mig saknas ännu andra könet till flere arter och af andra har jag endast få exemplar. Om hela artantalet i Paraguay beräknas till 100, hvilket tyckes mig ej vara för högt tilltaget och detta antal ej kan vara mer än fjerdedelen af hvad som kan finnas i det öfriga Amerika och andra länder, fås det enorma antalet af 400 arter. Af Fabricii 33? arter tillhöra endast 27, som det tyckes, detta slägte, till största delen från S. Amerika (Brasilien?) men jag har ej kunnat bland dem igenkänna en enda af mina, som jag med skäl kan anse för ännu obeskrifna. Detta slägte skulle lemna ett godt ämne för en monographie och jag har också dermed arbetat. Af nyare författare, som deröfver skrifvit, känner jag ej mer än Boyer de Fonscolombe, som i Ann. des Sciences naturelles Juli 1832 beskrefvit 11 arter från S. Frankrike, samt Francis Walker, som infört en Monographia Chalciditum uti Entomol. Magazine (1834?) men de artnamn, som de begagnat och jag önskade veta, känner jag ej.

Var god och hälsa Prof. Retzius från mig och säg att jag är ledsen, att ej kunna uträtta något för att bidraga till fullkommandet af hans craniologie. I Asuncion finnas väl många Payaguas vid flodstranden bosatte i sina hyttor, men de äro ej villige att lemna sina hufvuden Jag har erbjudit dem en piaster för ett enda, men de ha svarat mig, huru skulle de kunna i det andra lifvet äta fisk och andra läckerheter utan hufvud? Efter Guaicurús och andra indianstammar, som lefva i Chaco på andra sidan floden anställes numera ej jagt. Alla Guaranis äro kristna och bo i städer; skulle jag lyckas att på kyrkogårdarne stjäla ett hufvud och bli upptäckt, skulle de anse det för ett helgorån och säkert slå ihjäl mig. För några år sedan grepos genom list några hundra af Caraguas eller Indios monteses (skogs-indianer), som ännu bo i skogarne och tala Guaraní, och alla dödades med lansar eller halsskärning. Kunde jag få reda på det stället, der de blifvit nedgräfde, kunde jag deraf skicka en hel skeppslast. Långt före min ankomst hit hade M'bayás, som bodde norr om vändkretsen, dragit sig undan norrut till Brasilien, och ge då och då sin närvaro tillkänna genom anfall mot fästningarne, belägne vid floden Apa. Folket är dessutom så enormt vidskepligt, att om jag vore i tillfälle att göra samlingar af mennisko-kranier, de skulle tro dem vara ämnade att dermed bedrifva hexeri, eller, de något mindre okunniga, att deraf förfärdiga medikamenter. Detta är en ren sanning, och jag har blifvit tillvitad, att af menniskofett och insekter bereda medikamenter. Här finnes hvarken medicinsk skola, hospital eller anatomie-sal, och många år lära förgå innan de skola inrättas, till följe hvaraf medicinen här står på en ganska låg ståndpunkt, och folket har långt mera förtroende till landets örter såsom läkemedel än alla ett apoteks medikamenter.

Emottagen afhandling.

Hr Lector J. H. WALLMANS: Försök till en systematisk uppställning af växtfamiljen Characeæ, som varit remitterad till Hrr FRIES och ARNSCHOU, återlemnades med tillstyrkande af dess intagande i Akademiens Handlingar.

Akademiska angelägenheter.

Hr FRIES hade aflemnat tjugo målningar af Svenska Svamparter, under hans ledning utförda af Hr PETERSON.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademins Bibliothek.

Af Franska Regeringen.

Voyage au Pol Sud et dans l'Océanie, 1837—1840, sous le commandement de M. J. Dumont-D'Urville, 13 Voll. Paris 1841—1848.

8:o — Avec Atlas. 85 Livraisons, fol.

Annales des Mines. 1852. Livr. 4 & 5. 8:o.

Af Société Géologique de France i Paris.

Bulletin. T. IX. Feuilles 11—14. T. X. f. 1—3. 8:o.

Af Författarne.

BENDS, H. C. Bang, Haandbog i den physiolog. Anatomie af de almind. danske Huuspattedyr. D. I. Hbhvn 1853. 8:o.

PETERS, W. C. H., Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique auf Befehl S. M. des Königs Friedrich Wilhelm IV in d. J. 1842 bis 1848. Zoologie. I. Säugethiere. Berlin 1852. 4:o (m. t.)

BZEC, FR. TH., Kliniska Föreläsningar i Barnsjukdomarne. Första häft. Stockholm 1853. 8:o.



ÖFVERSIGT

AF

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1853.

N. 6.

Onsdagen den 8 Juni.

Föredrag.

1. *Tillverkning af Paraffin i stort.* — Hr LA-
GERHELM anförde:

År 1830 fann Dr REICHENBACH uti den bränn-olja, som erhöles genom destillation af bokved (*Fagus sylvatica*), en oljlik massa uppfylld af glänsande kristall-fjäll. Denna oljlika massa innehåller ett nytt ämne, som han kallade *Paraffin*. Han ansåg det användbart till ljus äfvensom till basis för machinsmörja. BERZELIUS (Årsb. 1834 p. 310) förklarade att paraffin fås ur all slags ved och till den mängd, att methoder till dess fördelaktiga beredning sannolikt låta finna sig. Den har sedermera erhållits ur oleum ceræ, ur djurämnen och ur bituminös skiffer från yngre kalkformationer. LEVY har under DUMAS's ledning analyserat paraffin från flera ämnen, och funnit den lika beskaffad. Dess eg. vikt är $=0,89$; den smälter vid $+46,8^{\circ}$, kokar vid $+370^{\circ}$ à 380° och öfverdestilleras oförändrad; innehåller 85,03 proc. kol och 14,87 proc. väte; är hvit, glänsande, len för känseln, utan smak och lukt, tändes trögt i luften, men brinner klart och lysande; angripes hvarken af syror eller alkalier; löses i flygtiga och feta oljor och låter sammansmälta sig med talg, fett, vax m. m. Den skiljer sig från stearin dels derigenom att den sednare ej håller så mycket kol, och dels deraf att stearin håller syre.

Denna solida förening af kol och väte utgjorde icke föremål för tillverkning i stort, förr än en tekniker i London Mr REES REECK fästade sin uppmärksamhet dervid, att man, då torf brinner, ser en stor mängd flygtiga ämnen bortgå, hvilkas beskaffenhet ej var rätt nog undersökt. Han fann, att under destillation af dessa annars nästan oanvändbara ämnen, bildas svafvelsyrad ammoniak, ättiksyrad kalk, naphta, paraffin, en *lättflytande* olja, bestående af kol och väte, samt en *fastare* olja, som i *förening med talg* borde blifva nyttig till maskinsmörja, och i *förening med olja* kunna användas i lampor. Han tog patent på sin method i Jan. 1849.

Ett halft år derefter uppträdde en talare i Underhuset med de mest förvånande resultater af den irländska torfvens tillgodogörande. Han sade nemligen, att 100 tons torf, som kostade 8 £. sterling, och hvars förvandlande till handelsartiklar lät göra sig för 8 £., lemnade

Kolsyrad ammoniak	2602	£	värda £.	32: 10. 2.
Soda	2118	»	»	8: 16. 5.
Ättika	600	»	»	7: 10. —
Naphta	30	gallons	»	7: 10. —
Ljus	600	£	»	17: 10. —
Kamphin	600	»	»	5: — —
vanlig olja	800	»	»	3: 6. 8.
Gas				8: — —
Aska				1: 13. 4.

Summa £. sterl. 91: 16. 7.

Talaren tillade, att Hr OWEN, som han citerade, experimenterat icke blott på hundrade, men på tusentals tons under de sista tolf månaderna, samt att PELOUSE och LIEBIG godkänt methoden.

Om dessa ekonomiska resultater varit grundade på en säker erfarenhet i stort, skulle Irland uti sina torfmossar ega en stor national-rikedom. Enligt Hr REES REECK skall hela ön hålla 20 millioner acres, hvaraf torfmossarne utgöra 2,830,000 acres eller nära $\frac{1}{4}$ af det hela. Patentet, som REES REECK tagit, väckte derföre ett stort intresse hos Regeringen; och ehuru den uppenbara öfverdriften i den kalkyl, som upplästes i

Parlamentet, verkade ofördelaktigt, bildades likväl ett bolag för att realisera REES REECK's method. Patentet var sökt för Stora Britannien, men inregistrerades blott för Irland. Teckningen af såg ett kapital af 420,000 £., som dock kunde ökas till 300,000 £. Från Styrelsens sida anmodades R. KANE (Director of the Museum of Irish industry) att undersöka de praktiska fördelarna af processen. Resultat häraf finnas i hans *Report on the nature and products of the process of the destructive distillation of peat*, dat. Apr. 1851. KANE med biträde af SULLIVAN analyserade en mängd torfsorter. En del bland dem visade tydligt de växt-arter, som utgjort torfvens hufvudämne. Dessa höra till Erica, Carex, telningar af hassel och björk samt tunna skifvor af furu, Iris, Sphagnum, Hypnum, samt åtskilliga gräs-arter. Ut i en del af de torfsorter som analyserades kunde man väl finna växt-byggnaden bibehållen, men icke urskilja species. En eller annan torf analyserades äfven, uti hvilken hvarje spår af vegetabiliskt ursprung var utplånadt. Kolhalten varierade emellan 131,7 och 41 proc. och askan emellan 1,2 samt 7,9 proc. KANE och SULLIVAN analyserade äfven askan och funno i den:

Kali	minst 0,028 proc.	högst 6,668 proc.
Natron	» 0,466 »	» 2,832 »
Kalkjord	» 8,492 »	» 45,581 »
Talkjord	» 1,204 »	» 16,994 »
Lerjord	» 0,129 »	» 10,705 »
Jernoxid	» 6,012 »	» 30,725 »
Fosforsyra	» 0,188 »	» 25,602 »
Svafvelsyra	» 1,286 »	» 44,371 »
Seltsyra (Chlorvätesyra) »	0,196 »	» 3,263 »
Kiseljord, i föreningar		
som löstes i syror »	0,645 »	» 12,476 »
Sand och Silikater, olös-		
liga i syror	» 2,168 »	» 31,198 »
Kolsyra	» 1,220 »	» 19,722 »

Skiljaktigheten i halterna af fosforsyra och svafvelsyra är förvånande och förtjenar största uppmärksamhet, i fall torfven skulle användas i jernhandteringen.

Utväljer man, bland alla de torfsorter KANE och SULLIVAN analyserat, blott dem af första slaget, d. v. s. sådana, hvaruti de ingående växterna voro tydliga nog för att kunna till sina arter bestämmas, så visar sig, att vattenhalten var per med. 19,056 och kolhalten per med. 36,185 proc. Torfven var luft-torr, heter det; men om den varit torkad vid +100° och således vattenfri, så hade summan af beståndsdelarna blott uppgått till 80,944 proc. hvaraf kolhalten 36,185 utgör 44,7 proc. Denna del af de analyserade torfsorterna torde vara mest jemförlig med dem, som förekomma i Sverges Bergslager och der jernhandtering idkas. Då nu kolhalten af trädslagen, torkade vid +100°, varierar blott emellan 48,44 och 50,19 proc.; ser man att den sämsta torfvens kolhalt kommer vedens så nära, att skillnaden icke öfverstiger 4,62 proc. Hvilken rikedom af kol finnes ej i våra torfmossar!

KANE betviflade möjligheten att med vinst begagna REES REECE's patent. Emedlertid hade bolaget, som kallade sig *The Irish Peat Company* sin första sammankomst den 29 Juli sistlidet år i London. Man ser af den berättelse, som dervid föredrogs, att ända till Mars 1854 hade åtgärderna varit inskränkta till hvad som inom laboratorier låter verkställa sig. Först vid 1852 års början kom afverkningen i stort uti stadgad gång. KANE betviflade möjligheten att draga nytta af gaserna, men bolagsmännen hade sett dem användas med all den besparing af annat bränsle, som varit påräknad. Hr SCANLAN, en kemist i London, hade sedan Juni 1852 bearbetat processen i alla detaljer och, genom destillationens utförande under låg temperatur, lyckats fördubbla bildandet af paraffin. *Kolet*, som af bolaget icke varit påräknadt såsom en vinst, emotsåg man sig kunna realisera till 2 à 2½ £. per ton; och deraf skulle flere tusende tons erhållas, då verken kommo i gång i tillbörlig skala. *Den tunga, svarta oljan*, på hvars renande månader blifvit fruktlöst förspillda, gaf nu en *ljus olja, klar* som det bästa sherry-vin, och förklarades värd 2½ à 4 s. per gallon. *Paraffin* var ren och hvit samt säkert värd 4 s. per $\frac{1}{2}$

Äfven rörande öfriga produkter, såsom *ammoniak*, *ättiksyrad kalk* m. fl. hade fördelaktiga resultat vunnits. Bolaget beslöt verkens utvidgande till den grad att 700 tons torf kunde afverkas i veckan.

I medlet af Februari månad innevarande år fanns ingen *paraffin* i handeln. Bolaget hade kontraherat hela tillverknin-gen af denna artikel med Mr FIELD i Lambeth (en betydande vaxljusfabrikant). Af honom har jag fått vidfogade prof, nem-ligen ett stycke af svart färg, paraffins råaste form, genom hvars renande artikeln andra stadium, den runda, gulhvita kakan uppkommer. Den lilla halfklara, hvita kakan utvisar ren paraffin såsom handelsartikel.

Den storartade anläggning, som genom Irish Peat Com-pany framträd i den industriella världen, synes i sjelfva Eng-land hafva väckt ovanlig uppmärksamhet. CHARLES DICKENS har i sina House-hold-words intagit en utförlig beskrifning öfver denna nya fabrikation under titel: *The Irish California*; och REES REECE erkänner beskrifningens noggrannhet.»

2. Foglar i Wermland, Dalsland och We-nern. — En från Hr Magister T. HAMMARGREN insänd skrif-velse »om de i Wenerns norra och vestra kusttrakter obser-verade anmärkningsvärdare fogelarter», hade varit remitterad till Hr SUNDEVALL, som derur meddelade följande utdrag:

Strix lapponica har blifvit skjuten vid norra sidan af Wenern. Exemplaret finnes i Carlstad.

Coracias garrula är här sällsynt [vid Åmål].

Merops apiaster, skjuten på Dalsland.

Emberiza hortulana, som under många års tid ej blifvit observerad här i trakten, är i år allmän kring Åmål.

Fringilla coccothraustes, skjuten vid norra sidan af Wenern (Frih. CEDERSTRÖM). Äfven vid Örebro har den undersednare åren börjat visa sig (C. G. LÖWENHJELM).

Fringilla flavirostris finnes här vintertiden.

Tetrao lagopus. Ut i Prof. NILSSONS Fauna uppgifves att Ripor ej förekomma söder om sjön Siljan i Dalarna. Härvid bör den rättelse göras, att dessa foglar finnas hela året, och fortplanta sig i mängd, straxt norr om Frykens vattendrag, som utfaller i Wenern. På ett berg, norr om Fryken (Hof-fjället) i Wermland, hafva flera somrar å rad träffats stora skaror af Ripor; troligen gå de, efter fjellarmarna, än längre åt söder i Wermland.

Tetrao lagopoides skjuten vid norra sidan af Wenern.

Ciconia alba. I början af Juli 1833 observerades omkring 40 individer af denna fogelart i norra delen af Dalsland. Underligt att de den tiden på året, då de äro sysselsatta med ungarnas uppfödande, eller åtminstone ännu ej äro färdiga till flyttning, kunna så förflyga sig *).

Larus marinus kläcker årligen vid norra sidan af Wenern (Frih. CEDERSTRÖM). Äfven förekommer han här vid västra sidan.

Sterna caspia förekommer och fortplantar sig vid norra kusten af Wenern, i närheten af föregående art (Frih. CEDERSTRÖM).

Fuligula mollissima. År 1849 observerades hanne och hona af denna fogel, utanför Åmål, i Wenern.

Phalacrocorax carbo har många gånger blifvit fälld vid Carlstad och på flera andra ställen kring Wenern. Det är obekant huruvida den kläcker här.

*) Detta härrörde förmodligen till följe af upprödjandet vid den tiden af en ekskog i Skåne, hvarest Storkar i stor mängd haft ett gammalt tillhåll. 8 å 10 år sednare blef samma skog totalt borthuggen, hvarefter man åter under några års tid såg Storkar i flera af Sveriges mellersta landskaper. C. S.

3. *Ardea purpurea*, skjuten i Skåne. — Hr S. M. Adjunkten WALLENGREN hade i bref till Hr SUNDEVALL insändt följande uppsatts:

»Under namn af Rördrom erhöll jag i slutet af sisl. April månad mig tillsänd en fogel, som befunns vara den vackra Purpurhägern (*Ardea purpurea* LINN.) Exemplaret, som genom Studeranden G. VOGTS försorg blifvit tillvarataget och genom Magister C. O. HAGBERG kommit mig tillhanda, skjöts af en bondgosse den 48 sisl. April uti Ö. Torp af Malmöhus län och Wemmenhög's härad, den sydligaste socken i Sverige. Då jag icke har mig bekant, att denna art förut blifvit träffad i Sverige, har jag velat tillkännagifva detta, ehuru den derföre ännu icke annorlunda kan räknas till vår fauna, än öfriga sydeuropeiska foglar, som förirrat sig hit, såsom *Strix flammea*, *Merops apiaster*, *Gracula rosea*, *Pelecanus onocrotalus* m. fl.

Det svenska exemplaret håller från näbbspetsen till stjertspetsen 4 aln 48 tum, samt har icke fulländat ruggningen. Af de långa nackfjädrarne, som vanligen äro tvenne, förefinnes ej mer än den ena, hvilken till sin nedre del är innesluten i blodhylsa; likväl har den en längd af 4 tum. Måhända den andra blifvit genom oförsigtighet borttryckt. På ett hanexemplar, som jag eger från Ungern, der det blifvit skjutet den 24 Mars, saknas helt och hållet de långa nackfjädrarne, ehuru det för öfrigt har nästan gamla fogeln's dräkt, med undantag af undre stjerttäckarne, som äro i det närmaste hvita. Detta exemplar är således fogeln i tredje året. Vid jämförelse med detta utvisar det svenska en fogel af fyllda trenne år, vid hvilken ålder den fullständiga dräkten är utvecklad. Dess kön kan icke bestämmas, emedan inelfvorna och köndelarne voro uttagna och kroppen i dessas ställe ifyllt med smedslagg, när den kom mig tillhanda. Till färgen äro dessutom könen hvarandra nästan alldeles lika.

Vid jämförelse emellan det svenska och ungerska exemplaret visa sig följande olikheter i storleken, så vidt man med



någon säkerhet kan anställa mätning på ett konserveradt exemplar:

Svenska exemplaret:

Nåbbens längd fr. pannskelet $1\frac{3}{8}$ t.
 Nåbbens höjd framom näsborrarna nära $\frac{1}{8}$ t.
 Tarsens längd $5\frac{5}{8}$ t.
 Mellantån $4\frac{3}{8}$ t.
 Vingens längd fr. armvecket $15\frac{1}{2}$ t.

Ungerska exemplaret:

Nåbbens längd fr. pannskelet $1\frac{1}{8}$ t.
 Nåbbens höjd framom näsborrarna $\frac{3}{8}$ t.
 Tarsens längd $5\frac{1}{8}$ t.
 Mellantån $4\frac{3}{8}$ t.
 Vingens längd fr. armvecket 15 t.

Foglens egentliga hemvist är Asien, norra Afrika, södra och medlersta Europa. Vid Smyrna har den blifvit träffad flyttande under Mars och April månader. Vid Tanger är den funnen häckande. I morasen och vid floderna i södra Frankrike och i Ungern (dit den anländer i slutet af Mars och början af April, eller samtidigt med *Ardea nycticorax*), samt omkring Svarta och Caspiska hafven häckar den i stort antal; men i norra Tyskland och i England visar den sig blott tillfälligtvis. Uti Danmark är den icke ännu anmärkt. Ehuru arten till kroppsformen har mesta öfverensstämmelse med *Ardea cinerea*, skall den dock i lefnadssätt mera likna *Ardea stellaris*.

4. *Foglar i nordöstra Skåne.* — Hr WALLENGREN hade vidare meddelat följande: tillägg till den förteckning öfver foglar i nordöstra Skåne, som blifvit intagen i Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar år 1849 pag. 307.

Sylvia nisoria: häckande flyttfogel. Sällsynt.

Alauda alpestris. Den 15 sistl. Mars träffades en gammal hanne af denna art vid Ljungby och på senhösten 1851 sågs ett annat individ af samma art vid Krogstorp af Ifvetofta pastorat. Båda gångerna ensam.

Tringa minuta: under flyttningen höst och vår. Sällsynt.

Rallus aquaticus. Sistförflutna vinter skötes några exemplar och flera sågos (omkring jultiden) vid Årup.

5. Om polarisationsplanets betydelse inom optiken. Hr ÅNGSTRÖM yttrade:

»Till de frågor inom optiken, hvilka i theoretiskt hänseende hafva stort intresse, hör utan tvifvel bestämmandet af polarisationsplanets betydelse: antingen ether-vibrationerna ske i detta plan eller göra med detsamma en rät vinkel. Att på theoretisk väg vilja lösa denna fråga synes emellertid, att dömma af de undersökningar man hittills eger, vara förgäfvets, då de flesta ljusets fenomen lämpa sig lika väl för den ena som för den andra åsigten. Men man synes böra kunna hoppas större framgång, om man lyckades att öfverflytta frågan till ett annat gebiet eller att göra densammas besvarande beroende af sådana egenskaper hos materien, hvilka på icke-optisk väg kunna utrönas. Det är denna reflexion, som gifvit anledning till följande anteckningar:

1.

Ibland de försök, som på experimentel väg blifvit gjorda, att besvara frågan om polarisationsplanet, intager HAIDINGERS *) nyligen publicerade utan tvifvel ett utmärkt rum. Tager man nemligen en enaxlig dicroitisk kristall, såsom Turmalin, och låter en ljusstråle genomgå densamma, så bibehåller den ordinära strålen sin färg oförändrad i alla riktningar. Som nu för det fall, att strålen sammanfaller med kristallaxeln, vibrationerna nödvändigt måste göra med nämnde axel en rät vinkel, så synes det vara naturligt att antaga, att den strålen, hvars färg är oförändrad, äfven bibehåller en oförändrad, vibrationsriktning, och att således vibrationerna ske i rät vinkel med polarisationsplanet. Emellertid förfaller vid närmare granskning det bindande i HAIDINGERS bevisning.

*) P. A. Band. LXXXVI p. 131.

Denne bevisning grundar sig nemligen på den förutsättningen, att ljusets absorption beror uteslutande af mediets beskaffenhet i den riktning, hvari vibrationerna, ske och icke af den, hvari strålen forplantar sig. Men detta är just hufvudfrågan. Ty frågan om polarisationsplanet låter äfven uttrycka sig sålunda: beror ljusets hastighet blott och bart af elasticiteten i vibrationsriktningen eller bestämmes den af elasticiteten i det plan som innehåller både strålen och vibrationerna? Det förra antog FRESNEL, det sednare NEUMAN, BROCH, MACCULLAGH m. fl. Man ser således, att i HÄNDINGERS antagande, att absorption beror uteslutande af vibrationsriktningen, ligger en *petitio principii*, hvarigenom dess bevisande kraft tillintetgöres. Emellertid äro de dicroitiska kristallernas färgfenomen af stort intresse för teorien rörande ljusets absorption, och om deras färg också icke beror uteslutande af vibrationsriktningen, så kan man likväl förutse, att den icke kan förklaras genom interferens, emedan densamma icke kan uppkomma annat än i strålens riktning.

Det gifves likväl en klass af fenomen, hvilka synas stå i nära sammanhang med hvarandra, nemligen forplantningsförmågan för värmets och det strålade värmets absorption.

I allmänhet finner man, att en kropp leder värmets i samma mån bättre som han är atherman; så äro metallerna de bästa ledare för värmets och tillika de mest athermana af alla kroppar. Dessa båda egenskaper synas sålunda stå i omvänt förhållande till hvarandra, oberäknadt det inflytande ljusets eller värmets beskaffenhet dervid kan utöfva.

Enligt KNOBLAUCHS *) observationer är förhållandet emellan den ordinära och den extraordinära strålens intensitet, då polariseradt solljus ledes genom en skifva af följande kristaller:

*) P. A. Band. LXXXV p. 174. Enligt KNOBLAUCH visade den ofärgade bergkristallen icke någon olika absorptionsförmåga af solluset; sannolikt skulle likväl denna olikhet visat sig för mörkt värme.

	Ord.	Extraord. str.
Brun Bergkristall . . .	400	78
Beryll	400	21
Turmalin	400	249

Enligt SENARMONT åter är ledningsförmågan

störst i riktningen af kristallaxeln för Bergkristall,

störst Beryll,

minst Turmalin.

Jemföras dessa båda resultater med hvarandra, så finner man, att om polariseradt ljus eller värme genomgår en enaxlig kristall i en riktning, vinkelrät mot dess hufvudaxel, så absorberas strålen i större eller mindre proportion, allt efter som polarisationsplanet sammanfaller med axeln för minsta eller största ledningsförmågan.

Men äfven om lagen icke skulle ega den allmängiltighet vi sålunda tillagt densamma — hvilket kommande observationer må afgöra — så gäller den åtminstone för de anförda kristallerna; och om man då antager, att en större absorption motsvarar en bättre ledningsförmåga och icke tvertom, hvilket man väl under för öfrigt lika omständigheter kan antaga, så följer att vibrationerna måste ske i en riktning, som gör rät vinkel med polarisationsplanet.

I sammanhang med föregående vill jag äfven anförå några undersökningar anställda under sommaren 1851.

Intensiteten af det värme, som utstrålar från en kropp, måste bero 1:o af moleculernas vibrations-hastighet och 2:o af det djup under strålningsytan, som kan anses deltaga i strålningen, således af mediets absorption. Tänker man sig nu en kristall, hvars elasticitet är olika i olika riktningar, så är det icke nödvändigt, att vibrations-hastigheterna hos partiklarna skola vara desamma i alla riktningar, hvaraf åter följer, att det värme, som utstrålar från ytan af en kristall, kan visa sig mer eller mindre polariseradt. Man erhöile sålunda full motsvarighet emellan de fenomenen å ena sidan, som ljus och strålande värme visa vid reflektion och vid dubbelbrytning,

och å andra dem, som man finner hos ljus och värme, som utstrålar från en okristalliserad yta i sned riktning eller från en kristalliserad med olika elasticitetsaxlar i en riktning vinkelrät mot strålningsytan. I alla dessa fall skulle nemligen strålen visa sig mer eller mindre polariserad.

För att pröfva riktigheten af denna förutsättning har jag experimenterat med följande kristaller: Bergkristall, Turmalin, Fältspat och Gips.

Kristallen fästades vid en messingshylsa och upphettades medelst en spritlampa. Emellan den strålande ytan och thermomultiplicatorn insattes en polarisationsapparat bestående af trenne glimmerblad, infattade på ett sådant sätt, att de kunde kringvridas under konstant vinkel med den genomgående strålen, och deras principal-sektion sålunda successivt inställas på de tvenne af kristallens elasticitets-axlar i thermiskt hänseende, hvilka lågo i den strålande ytan.

Försöken med Bergkristall, Turmalin och Fältspat visade emellertid icke någon skillnad i intensitet för den ena eller andra ställningen af glimmern; hvaraf äfven följer att det genomgående värmets icke visade märkbara spår af polarisation. Detta förhållande vore sålunda i strid med den gjorda förutsättningen, att hos en kristall med olika elasticitets-axlar moleculernas vibrationshastighet äfven är olika i olika riktningar, men granskar man saken närmare och sammanhåller den med hvad redan blifvit anfördt om dessa kristallers absorptionsförmåga, så skola vi komma till ett motsatt resultat.

Turmalin t. ex. absorberar nästan helt och hållet den ordinära strålen, ty på denna egenskap beror, som bekant är, dess användning som polarisations-apparat; upphettar man nu en sådan kristall och etherpartiklarne derigenom försättas i rörelse, så måste de vibrationer, som motsvara den ordinära strålen, absorberas starkare än den andra strålens vibrationer. Då nu vid värmestrålningen från en yta äfven de undre lagren till en viss djuplek deltaga i strålningen, så måste detta djup

vara större för de vibrationer, som motsvara den extraordinära strålen, och deras intensitet till följe deraf äfven större.

Skall icke desto mindre, såsom försöken visat, intensiteten vara lika hos strålen, antingen polarisations-apparatens principala sektion sammanfaller med ena eller andra elasticitets-axeln, så måste moleculernas vibrationshastighet vara större i den riktning, som sammanfaller med den ordinära strålens ether-vibrationer, och således ett mindre djup compenseras genom större amplituder.

Det kan sålunda anses på experimentell väg bevisadt att i allmänhet *vibrationshastigheten icke är lika i alla riktningar hos en kristall med olika elasticitets-axlar* *).

Af det anförda följer visserligen, att vibrationerna hafva större intensitet i en viss riktning än i en annan; men icke om denna riktning sammanfaller med största ledningsförmågan eller icke, hvilket åter beror på den definition, man gifver på polarisationsplanet.

Antager man, att största vibrationshastigheten sammanfaller med axeln för största ledningsförmågan, och att t. ex. partiklarne beskrifva kroklinier, till formen lika med de isothermer, man enligt SENARMONTS method erhåller, så är i och med det samma frågan om polarisationsplanet afgjord, och man erhåller, att etherpartiklarnes vibrationer ske i rät vinkel med polarisationsplanet.

Utom de nyss anförda kristallerna gjordes äfven försök med gips; men som det resultat jag dervid erhöll skiljer sig ifrån det föregående, så vill jag något närmare redogöra för detsamma.

Liksom i det föregående blef glimmerapparaten inställd så, att dess principala section inföll successivt med linierna för gipsens största och minsta ledningsförmåga för värmets. Resul-

*) I stället för *olika* vibrationsamplituder kunde man äfven antaga oscillationerna lika intensiva men i stället tänka sig dem mera hopträngda i en viss riktning eller också båda fallen samtidigt. Jemför DOVE i P. A. LXXI.

tatet ses af följande lilla tabell, som utgör mediet af tvenne observationsserier, motsvarande tvenne olika lägen hos gips-skifvan.

Glimmerns principal section
vinkelrät parallel

med axeln för största ledningsförmågan.

Gipsens största thermiska axel

perpendikulär	8°,6	9°,8
horizontal	12°,0	14°,1.

Man ser sålunda, att det värme gipsen utstrålar är märkbart polariseradt i ett plan, som gör 90° vinkel med största ledningsförmågan. Att likväl maximum och minimum af polarisation sammanfaller med de thermiska axlarne och icke med de optiska elasticitets-axlarne, hvilka med de förra göra 34° vinkel, kunna föregående observationer icke afgöra; en enda inställning gaf visserligen för de optiska elasticitets-axlarne deviationerna

43° och 46°, .

hvarvid det förra värdet motsvarar den linien, som halfverar de optiska axlarnes spetsiga vinkel, men häraf kan icke någon slutsats med säkerhet dragas, huruvida polarisation i dessa riktningar är större än i de tvenne föregående.

En omständighet, som torde bidraga att förklara det afvikande resultat jag sålunda erhöll för gipsen, är den, att denna kristall vid upphettning lemnar ifrån sig sitt kristallisationsvatten, blir ogenomskinlig samt antager en hvit färg. I detta tillstånd är det djup hvarifrån värmets utstrålar obetydligt och möjligen lika för olika polarisationsplaner; intensiteten af det utstrålade värmets beror då uteslutande af ytans beskaffenhet i olika riktningar.

2.

För en kristall med tvenne optiska axlar öfverensstämma båda teorierna, den Fresnelska och den Neumanska, i att förlägga den största och minsta elasticitets-axeln i planet för de optiska axlarne, men dessa teorier skilja sig deri, att hvad

som efter den ena är den största elasticitets-axeln är efter den andra den minsta och tvertom. Denna motsats visar sig äfven vid enaxliga kristaller. Kunde man nu bestämma den riktniing hvari etherns elasticitet är störst eller minst, så hade man äfven frågan om polarisationsplanet afgjord. Jag har till den ändan rådfrågat fenomenerna vid en kristalls upphettning. Storleken af dess utvidgning i olika riktniingar beror nemligen på förhållandet emellan de attraktiva och repulsiva krafter, hvilka äro verksamma inom kristallen. Antager man nu att de attraktiva krafterna tillhöra kroppens egna partiklar och att deras inverkan på ethern yttrar sig bland annat i en förminskning i dess elasticitet i optiskt hänseende, så måste denna inverkan hos ethern framkalla en motsvarande repulsion. Denna repulsion åter måste vid kristallens upphettning yttra sig starkare i den mån etherns elasticitet är större eller motståndet af de attraktiva krafterna är svagare. Af tvenne riktniingar således, hvarom man förut känner, att de motsvara den största och minsta elasticitets-axeln för ethern, måste den större axeln motsvara den, hvari kroppen vid upphettning starkare dilaterar sig.

Vi skola nu tillämpa detta på några kristaller, hvilkas dilatationer äro bekanta, såsom Gips, Arragonit och Kalkspat.

Kallar man $\frac{\Delta a}{a}$ utvidgningen längs den linea, som halverar de optiska axlarnes spetsiga vinkel, eller som sammanfaller med kristallaxeln, då mediet är enaxligt, och $\frac{\Delta b}{b}$ utvidgningen i en riktniing vinkelrät mot de optiska axlarnes plan o. s. v., så erhåller man för

Arragonit *)

$$\frac{\Delta a}{a} = +0,003587, \quad \frac{\Delta b}{b} = +0,001008, \quad \frac{\Delta c}{c} = +0,001905, \quad \frac{\Delta v}{v} = 0,0065;$$

*) *Mitschenlich* anför, att sidytornas lutning ökas med 2'46'', och att ändytornas minskas med 5'29'' för 100° C. För att närmare fixera den sednare vinkeln har jag begagnat *Russwaga* observationer, som angifva den förändring i brytningsvinkeln hans trenne prizmer undergick vid upphettning. Den kubiska dilatation är efter *Kopp*.

Gips

$$\frac{\Delta a}{a} = -0,000508, \frac{\Delta b}{b} = +0,003869, \frac{\Delta c}{c} = +0,002384, \frac{\Delta v}{v} = 0,005745;$$

Kalkspat

$$\frac{\Delta a}{a} = +0,002793, \frac{\Delta b}{b} = -0,000416, \dots \dots \dots \frac{\Delta v}{v} = 0,001961;$$

dessutom känner man, att bergkristall dilaterar sig starkast i en riktning, som gör rät vinkel med kristallaxeln.

Som nu dilatationerna i det plan, som innehåller största och minsta elasticitetsaxeln för ethern, äro $\frac{\Delta a}{a}$ och $\frac{\Delta c}{c}$, så måste, om vårt resonnement i det föregående är riktigt, den linien, som motsvarar $\frac{\Delta a}{a}$, vara *största elasticitetsaxeln för Arragonit och Kalkspat, samt den minsta för Gips och Bergkristall*; allt i öfverensstämmelse med den *Fresnelska åsigten af polarisationsplanet*.

Ehuru vi sålunda med tillhjälp af en kristalls olika dilatationer sökt afgöra den frågan: i hvilkendera af tvenne uppgifna riktningar etherns elasticitet är störst eller minst, så skulle man likväl gå för långt, om man derutaf ville sluta till något enkelt förhållande emellan en kristalls utvidgning och etherns elasticitet, så vidt densamma bestämmes af ljusets genom dispersion komplicerade fenomen; detta visar bäst värdet på $\frac{\Delta b}{b}$, som ehuru det motsvarar så väl för Arragoniten som för Gipsen den mellersta elasticitetsaxeln, och det efter båda teorierna, likväl är för den förra kristallen det minsta och för den sednare det största af de trenne värdena på dilatations-koefficienterna. Emellertid torde denna afvikelse kunna till en del förklaras deraf, att $\frac{\Delta b}{b}$ äfven motsvarar för Arragoniten den största och för Gipsen den minsta thermiska axeln; dessutom blir, som bekant är, den symmetriska axeln hos Gipsen, som motsvarar $\frac{\Delta b}{b}$, äfven den största elasticitets-axeln för ethern, då kristallen upphettas.

En omständighet, som särskilt förtjenar att anmärkas, är den, att likasom det gifves en temperatur, hvarvid Arragoniten öfvergår

öfvergår till Kalkspat, så synes det äfven finnas en, då dessa båda kristaller blifva identiska i optiskt hänseende; hvilket sannolikt inträffar, då de tvenne af Arragonitens planer, hvilka vid vanlig temperatur bilda en vinkel af $116^{\circ}14',7$ med hvarandra, utgöra sidor i ett sexsidigt prisma. Utur RUDBERGS observationer erhålles för linien *F* i Frauenhoferska spectrum, när ljusets hastighet i luft antages till enhet:

Polarisationsplanet gör rätt vinkel med riktningen af

	$\frac{\Delta a}{a}$	$\frac{\Delta b}{b}$	$\frac{\Delta c}{c}$
Ljusets hast. i Arragonit	0,65156	0,59151	0,59980
Förändring motsv. 100°	+63,1	+73,6	+82,0

Extraord. strålen. Ordin. strålen.

Ljusets hast. i Kalkspat	0,67066	0,59938
Förändring motsv. 100°	-56,7	0+

Man ser sålunda, att de båda mindre hastigheterna, motsvarande tvenne af Arragonitens elasticitetsaxlar, närma sig hvarandra i storlek på samma gång de äfven mer och mer närma sig till den ordinära strålens hastighet hos Kalkspat, och att vidare hastigheten hos Kalkspatens extraordinära stråle minskas på samma gång den motsvarande strålen hos Arragoniten tilltager i hastighet; hvilket allt bekräftar det redan anförda.

För öfrigt kan man genom att jemföra Kalkspatens och Arragonitens utvidgning med förändringarne i dessa kristallers brytnings-koefficienter finna, att något enkelt förhållande icke eger rum dem emellan, och, i allmänhet, att dessa förändringar icke bero endast af kristallens utvidgning i vibrationsriktningen. Utgår man ifrån den Fresnelska åsigten af polarisationsplanet, så följer äfven, att den kubiska utvidgningen har en motsatt inverkan på brytningsförmågan mot den som den lineära i vibrationsriktningen utöfvar. Också om man komprimerar en glascylinder längs dess axel, erhåller densamma, som bekant är, egenskaperna af en optiskt negativ kristall under det att, enligt

NEUMAN^{*)}), så väl den ordinära som den extraordinära strålen har en större hastighet än som motsvarar det okomprimerade glaset.

3.

Antager man, att lagen för lefvande kraft gäller för intensiteten af det brutna och det reflekterade ljuset — och så vidt en kropp kan anses för fullt diafan är väl också detta antagande tillåtet — så förutsätta de Fresnelska och Neuman-ska formlerna för intensiteten, under för öfrigt lika antaganden, de förra en konstant elasticitet, och de sednare en konstant densitet hos ethern; hvarigenom densamma i förra fallet kommer att i egenskaper närma sig till gaserna och i sednare fallet till fluida kroppar. Frågan om polarisationsplanet är således besvarad, så snart man afgjort denna andra fråga, huruvida etherns täthet är konstant eller icke^{**)}.

De grunder, hvilka jag anser tala emot antagandet af en konstant densitet hos ethern, äro emellertid följande:

För det första äro de optiska fenomenerna i allmänhet för mycket komplicerade och stå ingalunda i något så enkelt förhållande till de förändringar ett medium undergår vid upphettning, kompression o. s. v. som händelsen borde vara, om de ensamt betingades af dessa sednare.

Vidare låta kristallernas diamagnetiska fenomen lättare hänföra sig till ethern direkte än till kroppens egna partiklar, hvaraf äfven följer, att densiteten hos ethern icke kan vara

*) Die Gesetze der Doppelbrechung des Lichts &c., pag. 59.

**) Som bekant är, antog NEUMAN afvensom MAC-CULLAGH etherns densitet konstant i motsats till FRESNEL, som antog densamma variabel. Ser man blott på enkelheten af en hypotes, så har äfven den förstnämnda företrädet. Det sätt hvarpå MOISEO (Report. Opt. p. 1004) behandlat frågan om polarisationsplanet synes derföre så mycket mera opassande en vetenskaplig kritik, som en åsigt ingalunda vederlägges genom att benämnas: »Les abstractions stériles des interprétations et confirmations détournées et pénibles &c. &c.» CAUCHY's stora förtjenster utesluta icke NEUMANS, och hvad särskildt BROCH beträffar, så har han uteslutande utvecklat och tillämpat CAUCHY's egna formler.

konstant, emedan en olika inverkan i olika riktningar då svårligen låter tänka sig. WERTHEIM *) har nemligen observerat, att vridningen af polarisationsplanet i en glasparallelipiped under magnetismens inverkan försvinner, då glaset komprimeras; detta synes antyda derpå, att vridningen uppkommer genom magnetismens direkta inverkan på ethern, och att denna inverkan försvinner då ethern genom kompression kondenseras och liksom fixeras i en viss riktning, samt att den då öfvergår till ett *mekaniskt moment*, som söker att vrida sjelfva kroppen, såsom också fallet är med kristallerna. Helt annorlunda är förhållandet med Bergkristall, hvars förmåga att vrida polarisationsplanet har sin grund i dess partiklars egendomliga anordning. Komprimerar man nemligen en skifva, skuren vinkelrät emot axeln, så erhåller man, som bekant är, då polariseradt ljus och parallela strålar användas, färgringar till utseendet analoga med dem, som visa sig hos tvåaxliga kristaller. Genom försök har jag likväl funnit, att långt ifrån att vridningen af polarisationsplanet vid kompression minskas, så ökas den tvertom, kristallen må för öfrigt vrida planet till höger eller venster. Kompression synes, så vidt jag utan noggranna mätningar kunnat uppskatta dess inverkan, förändra de båda cirkulärt polariserade strålarne, hvori den infallande strålen upplöser sig, i tvenne elliptiskt polariserade och derjemte föröka deras skillnad i fortplantningshastighet, hvarigenom äfven den ökade vridningen af polarisationsplanet förklaras. Emellertid torde allt detta helt enkelt uppkomma genom en *superposition* af de fenomen, hvilka kompression och kristallisation hvar för sig åstadkomma, och sålunda bekräfta de åsigter, hvilka BREWSTER **) för flera år sedan framställt om compressions inflytande på de optiska fenomenerna.

*) C. Rendu XXXII, 289. MATTEUCCIS förmenta upptäckt att vridningen af polarisationsplanet blir olika i olika riktningar, då glasparallelipedden komprimeras, är vederlagd af EDMUND Vet. Akad. Förh. p. 23.

**) Edinb. Transact. VIII, p. 284.

För! att nu återkomma till de diamagnetiska fenomenerna, så gifves det icke något skäl, hvarföre icke desamma äfven böra *quarstå jemte kompression*, om nemligen magnetismen verkar direkte på kroppens partiklar och dessa derigenom antaga en egendomlig anordning motsvarande den, som förefinnes hos bergkristall.

En stråle liniärt polariseradt ljus låter, som bekant är, analytice upplösa sig i tvenne cirkulärt polariserade strålar med samma hastighet, utan att resultatet derigenom förändras, men gifver man den ena strålen en större hastighet, så uppkommer derigenom en vridning af polarisationsplanet sådan som man finner hos Bergkristall. Emellertid är detta sätt att föreställa sig etherns rörelse i den nyssnämnda kristallen ej blott analytiskt utan äfven fysiskt riktigt, såsom redan FRESNEL och sedan JAMIN *) genom sina observationer bevisat; men det kan mycket sättas i fråga, om detta föreställningssätt äfven gäller med afseende på den vridning af polarisationsplanet, som uppkommer genom magnetismen. Också de differentialformler, hvilka enligt AIRY **) återgifva etherns rörelse under magnetismens inverkan, nemligen

$$\frac{d^2y}{dt^2} = A \frac{d^2y}{dx^2} + C \frac{dz}{dt},$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} = A \frac{d^2z}{dx^2} - C \frac{dy}{dt},$$

antydå mera ett motstånd eller en yttre kraft, som söker att vrida etherpartiklarnes vibrationsplan än en verklig dubbelbrytning, direkte beroende af mediets molekylära anordning.

Komprimeras en enaxlig kristall vinkelrätt mot axeln, så faller planet för de optiska axlarna tillsammans med kompressions-riktningen, då kristallen är positiv, men gör med denna riktniing 90° vinkel, då kristallen är negativ ***). Häråf följer, att etherns elasticitet, relativt tagen, ökas genom kompression

*) Ann. d. Ch. et d. Ph. Tom. XXX, p. 55.

**) Phil. Mag. 1846, p. 469.

***) MOIRGO, Répertoire d'optique moderne, p. 1594.

om FRESNELS definition på polarisationsplanet är riktig, men att den tvertom minskas, om den Neumanska åsigten är den rätta. Berodde förändringarne i ljusets hastighet uteslutande af mediets elasticitetsförändring i vibrationsriktningen, så vore det lätt att af det nyss nämnda förhållandet afgöra frågan om polarisationsplanet, men som detta icke är händelsen, så blir också denna fråga obesvarad; det anförda visar emellertid i hvad nära samband densamma står till hvarje annan rörande materiens moleculära krafter och deras verkningsätt.

4.

I det föregående har jag uteslutande inskränkt mig till sådana iakttagelser, hvilka till sin riktighet på icke-optisk väg kunna pröfvas; jag öfvergår nu till en klass af fenomen, hvilka, ehuru helt och hållet liggande inom det optiska området, likväl synas egnade att, oberoende af theoretiska spekulationer, belysa frågan om polarisationsplanet.

Som bekant är, har ARAGO *) för många år sedan observerat, att när naturligt ljus faller vinkelrätt emot en dispergerande yta, så visar sig det diffusa ljuset, sedt längs sjelfva ytan, polariseradt i ett plan som gör rät vinkel med diffusionsplanet (planet genom normalen och åskådarens öga). Detta fenomen ligger äfven till grund för BABINET's bevis att ethermoleculerna vibrera i sjelfva polarisationsplanet. Emellertid hafva PROVOSTAYE och DESSAINS **) funnit att ARAGO's upptäckt blott gäller för metaller och i allmänhet kroppar med en speglande yta, men att för matta kroppar såsom *lampsot*, *mattslipadt glas*, *blyhvitt*, *röd chromsyrad blyoxid*, *kolsyrad kopparoxid* o. s. v. är det diffusa ljuset alltid polariseradt i sjelfva diffusionsplanet och att denna polarisation minskas i den mån ögat närmar sig normalen. Använder man polariseradt ljus och kallar θ den vinkel ögat gör med normalen och ϕ den vinkel diffusionsplanet gör med polarisationsplanet, så aftager intensiteten af det

*) Biot, Physique, T. IV, p. 315.

**) Comte Rend., T. XXXIII, p. 447.

diffusa ljuset, när ϕ närmar sig 90° och hastigare i den mån θ ökas. Jag har verifierat dessa iakttagelser och dessutom funnit:

- 1:o Att då polariseradt ljus faller vinkelrätt emot en mattslipad glasskifva, hvars undre speglade yta är svärtad, ändrar sig med vinkeln ϕ ej blott intensiteten utan äfven polarisationsplanet, så att för $\phi=90^\circ$ gör detsamma 90° vinkel med diffusionsplanet.
- 2:o Då naturligt ljus faller på glasskifvan, är det diffusa ljuset polariseradt i ett plan, som går igenom den infallande och den diffusa strålen, och således polarisationsplanet oberoende af diffusionsplanets eller skifvans läge.
- 3:o Om polariseradt ljus raserar sjelfva ytan — vi tänka oss här det ideela fallet, hvilket man visserligen icke experimentellt kan med full stränghet uppnå, men ändå närma sig tillräckligt, för att med säkerhet kunna förutse resultatet — och det a) är polariseradt i infallsplanet, så ändrar sig polarisationsplanet för det diffusa ljuset 90° , då den vinkel ϕ' , som diffusionsplanet gör med reflektionsplanet, växer från 0° till 90° . Är det åter b) polariseradt vinkelrätt mot infallsplanet, så blir polarisationsplanet för det diffusa ljuset oförändradt, då ϕ' växer från 0° till 90° . I sednare fallet gör således alltid polarisationsplanet 90° vinkel med diffusionsplanet; i det förra åter varierar denna vinkel från 0° till 90° .
- 4:o Om polariseradt ljus raserar sjelfva ytan, och vinkeln $\phi'=90^\circ$, så är det diffusa ljusets polarisationsplan oförändradt för värden på θ emellan 0° och 90° , antingen det infallande ljusets polarisationsplan sammanfaller med infallsplanet eller med detsamma gör en vinkel af 90° .
- 5:o Betraktar man färgringarne i t. ex. en kalkspatkristall, skuren vinkelrätt emot axeln, och inskjuter emellan polarisationsapparaten och kristallen en mattslipad glasskifva, så att den gör rät vinkel med strålen, så visa sig färgringarne med oförminskad intensitet. Och om en ljusstråle visar äfven det obetydligaste spår af polarisation, så fort-

far strålens polarisation äfven sedan den gått igenom den mattslipade glasskifvan. Dess *depolariserande* förmåga är således omärklig.

Polarisationsplanets läge för det diffusa ljuset i första och andra fallet låter förklara sig, om man antager, att ljusets diffusion uppkommer genom en spegling i alla möjliga riktningar, men derigenom förklaras icke den *stora* intensitets-förminskningen, då θ och ϕ närma sig 90° . I tredje och fjerde fallet åter kan polarisationsplanets läge alls icke förklaras genom spegling; men alltsammans förklaras lätteligen om man antager, att *vibrationsriktningen hos det infallande ljuset äfven bibehåller sig oförändrad i det diffusa*. Detta antaget, är det sedan lätt att besvara frågan om polarisationsplanet, ty enligt tredje fallet är polarisationsplanets läge till diffusionsplanet oförändradt, då det infallande ljuset är polariseradt i ett plan, som gör rät vinkel med infallsplanet och således äfven sammanfaller med den dispergerande ytan; men som denna oföränderlighet icke kan inträffa utan att *ethervibrationerna* ske längs ytans normal, så följer äfven, att de *göra rät vinkel med polarisationsplanet*.

Diffusion kan i allmänhet betraktas som ett irreguliert fall af diffraction, hvarvid hvarje punkt af ytan är att betrakta såsom ett nytt centrum oscillationis; men ligga dessa centra så nära, att deras afstånd understiga ljusets våglängd, blir ytan speglande. Enligt detta föreställningssätt är det lätt att inse det samband som förefinnes emellan det föregående och de undersökningar STOKES *) anställt öfver ljusets diffraction. Han har nemligen på theoretisk väg funnit, att vibrationsriktningen bibehåller sig oförändrad i det diffracta ljuset och begagnat denna omständighet för att bestämma vibrationsriktningen relativt till polarisationsplanet; men dels kompliceras fenomenerna genom brytningen i sjelfva glaset, hvarpå linierna voro uppdragna, dels äro angifvelserna icke tillräckligt prononcerade för att vara fullt afgörande.



*) Transactions of the Cambridge Phil. Soc. V. IX, part 1.

Hvad slutligen det andra slaget af diffusion angår, som tillhör mer eller mindre ogenomskinliga kroppar med speglande ytor, så uppkommer densamma inom sjelfva kroppen, hvaraf följer, att dess rätta karaktär masqueras genom inflytandet af den speglande ytan. Att den på det hela icke skiljer sig från den förut behandlade bevisar tillvaron af de neutrala punkterna. PROVOSTAYE och DESSAINS hafva nemligen funnit, att då naturligt ljus faller vinkelrätt emot en speglande yta, gifves det ett värde af θ , för hvilket det diffusa ljuset är opolariseradt, men att för värden på θ , som äro antingen större eller mindre, polarisationsplanerna göra rät vinkel med hvarandra. För stora värden af θ är speglingen öfvervägande.

Slutligen må det äfven tillåtas mig att, med anledning af det föregående, nämna, att atmosfärens polarisations-fenomener synas enklast kunna förklaras genom diffusion, ytterligare modifierad genom brytningen i de olika luftlagren, hvarigenom de neutrala punkterna uppkomma. En närmare beröring af detta ämne får jag likväl uppskjuta till ett mera passande tillfälle.

Akademiska angelägenheter.

Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse med bifall till Akademiens förslag att på den nya platsen vid Nybron uppressa BENZELII bildstod.

Akademien beslöt att utbyte af skrifter skulle inledas med Accademia de' nuovi lincei i Rom.

Inlemnade afhandlingar.

Af Hr Dr CRUSELL i Petersburg: »Om samtidigt användande af Jodkalium invärtes och en Jodlösning utvärtes» (i syphilitiska sjukdomar).

Remitterades till Hr M. RETZIUS, BERG och SANTESSON.

Af Hr Ryttmästaren C. A. v. SCHUMACHER på Vesterlund vid Apenrade: Ueber die Möglichkeit der Herstellung des Isochronismus der Pendel astronomischer Uhren; samt Nogle Betragtninger i Henseende til saadanne lagttagelser, der formentligen ville tjene til at oplyse enkelte Momenter af Jordklodens Physik etc.

Af Hr Dr PFUND: Meteorologiska observationer anställda i Alexandria.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af H. M. Konungen.

Archiv f. wiss. Kunde von Russland. XII: 1, 2.

Af Kejsarl. Vetenskaps-Akademien i Petersburg.

Mémoires de l'Acad. Imp. Sciences Natur. VI: 3, 5, 6.

— — des divers savants. VI: 2, 3.

STRAUVE, W., Stellarum fixar. positiones mediæ pro epocha 1830, O. Petrop. 1852, fol.

— — Sur les dimensions des anneaux de Saturne. 1852. 4:o.

— — Exposé historique des travaux pour la mesure de l'arc du méridien, suivi de deux rapports de M. G. LINDHAGEN. 1852. 4:o.

Af K. Akademie der Wissenschaften i München.

Gelehrte Anzeigen. B. 34, 35.

Abhandlungen. — Phil. Cl. VI: 3. VII: 1. — Math. VI: 3. — Hist. VI: 3.

Annalen der Sternwarte. B. V.

Hohenpeissenberger Beobachtungen, 1792—1850.

Bulletin, 1850. N:o 1—25.

Jahresbericht des Observatoriums, 1852. 8:o.

Reden von THIERSCH, A. VOGEL u. FR. KUSTMANN. 4:o.

Af Kais. Akademie der Wissenschaften i Wien.

Denkschriften. — Mathem. naturw. III: 2, IV: 2.

Sitzungsberichte. — Dio VIII: 4, 5. IX: 1, 2. — Philos. hist. VIII: 3—5. IX: 1, 2.

Almanach. 3:r Jg. 1853.

Fontes rer. austriac. 2:ta Abth. B. V. 1852. 8:o.

Archiv. B. VIII: 1, 2. 1852. 8:o.

Die feierliche Sitzung, 29 Maj 1852. 8:o.

Notizenblatt. Jg. 1852. N:r 11—24.

Af Kais. Geologische Reichsanstalt i Wien.

Abhandlungen. B. I. Wien 1852. fol.

Jahrbuch. 1852: 3. 8:o.

Af K. Gesellschaft der Wissenschaften i Leipzig.

Abhandlungen. B. IV. Bogen 1—13.

Berichte. — Math. phys. 1852: I.

Af K. Leopold.-Carolin. Akad. der Naturforscher.

Nova Acta. XXII. Supplem. 1852. 4:o.

Af allg. schweizer. Gesellschaft der Wissenschaften.

Neue Denkschriften. B. II, III, IV & XII.
Verhandlungen, 1819, 1823—27, 1829, 30, 32, 35—39 u. 1851.
Mittheilungen der naturf. Gesellsch. in Bern. N:o 195—257.

Af Schlesische Gesellschaft f. vaterl. Kultur.

Jahresbericht 1851. Bresl. 4:o.

Af Académie des sciences i Paris.

Comptes Rendus, 1852: 24—26. 1853: 1—8.

Af Museum d'histoire naturelle i Paris.

Archives du Museum. T. VI: 3, 4.

Af Société Entomologique i Paris.

Annales. 2:ème Sér. T. V—IX. Paris 1847—51. 8:o.

Af Geological Society i London.

The quarterly Journal. N:o 5—32. Lond. 1846—1852. 8:o.

Af Geographical and Statistical Society i New-York.

Bulletin. Vol. I. N:o 1. New-York 1852. 8:o.

Af Observatorium i Cambridge (U. S).

Astronomical Journal. N:o 50—54. 1852. 4:o.

Af Accademia Reale delle Scienze i Neapel.

Rendiconto. Nuova Ser. N:o 1—5. 1852.

PALMIERI et SCACCHI, Del monte Vulture. Nap. 1852. 4:o.

Relazione sulla malattia della vite. Nap. 1852. 4:o.

Af Accademia Pontaniana i Neapel.

Atti della Società Pontaniana. Vol. III, IV. Nap. 1819, 1847. 4:o.

Atti dell' Accademia Pontaniana. Vol. III, V: 2.—5. Nap. 1833—51. 4:o.

Agli scienziati d'Italia del settimo Congresso. Nap. 1845. 4:o.

Elogio Funebre in onore di Franc. Maria Avellino. Nap. 1850. 4:o.

Notizia dei lavori, 1845—1847. Nap. 1850. 4:o.

— — — 1851. Nap. 1851. 8:o.

Af Real Academia de Ciencias i Madrid.

Memoias. T. I. P. 2. 4:o.

Resumen de las Actas, 1851. 8:o.

Programa. 1853. 4:o.

Af Zoologisch-botanischer Verein i Wien.

Verhandlungen. B. II. Wien 1853. 8:o.

Af naturforschender Verein i Riga.

Der kaiserl. Universität Dorpat zu ihrem Jubelfeste 1852. Riga 1852. 4:o.

Af Hr Hausmann i Göttingen.

Gött. Gelehrte Anzeigen, 1852. B. 1—3.

Nachrichten von den Universität. 1852. 8:o.

Af Författarne.

ARCKLANDER, F. W. A., Astronöm. Beobachtungen auf der Sternwarte der Univ. zu Bonn. B. I, II: 1, 2. Bonn 1846—52. 4:o. — Anhang zum 2:ten Bde. 8:o.

DELCHOS, Notice sur les altitudes du Mont-Blanc et du Mont-Rose. 8:o.

DUMERIL, Prodrome de la classification des reptiles ophidiens. Paris 1853. 4:o. — Jemte 8 andra mindre skrifter af samma förf.

MARTINS, Ch., Des Climats de la France. Paris 1850. 8:o.

— — Essai sur les terrains superfic. de la Vallée du Pô. — 4:o.

VAN DER HOEVEN, J., Handb. der Dierkunde. II: 5. Amst. 1853. 8:o.

DE VERNEUIL et COLLOMB, Coup d'oeil sur la constitution géologique de plusieurs provinces de l'Espagne. Paris 1853.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Gördelmakaren Arfvidsson.

Två ex. af *Cobitis taenia* från Lillsjön vid Jönköping.

Af Kapten Valley.

En Leguan-ödlä, en *Chaetodon* och en *Balistes* från Brasilien.

Af Hr P. von Schneldau, genom Brukspatron G. Grill.

En *Menobranchus palmatus* från Wisconsin.

Af Hr E. Wallin.

En *Mus rattus* från Stockholm.

Af Baron C. J. Cederström.

Fyra ex. af *Muraena Anguilla*.

Af K. K. Geologische Reichsanstalt i Wien.

En samling fossila snäckor från Wiens tertiärbacken.

Botaniska afdelningen.

Af Doctor Todaro i Palermo.

Tvåhundrafemtioen växt-arter från Sicilien, (örnämligast af familjerna Gramineæ, Cyperaceæ, Liliaceæ, Cruciferæ, Leguminosæ, Asperifoliæ m. fl.

Af Studeranden Fr. Björnström.

Tjugo sällsyntare phanerogamiska arter af flera familjer.

Af Studeranden Lindberg.

Sextio moss-arter från Stockholms neiden.

Mineralogiska afdelningen.

Af Hr Sam. Wiberg i Brevig.

Sex stuffer norska mineralier.

*Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i Mars 1853.*


	Barometern reducerad till 0°. Decimaltäm.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkning- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,41	25,47	25,50	—13°0	— 7°0	—13°0	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Snö
2	25,51	25,52	25,41	—19,0	— 9,0	—10,1	N.N.V.	N.N.V.	N.	Klart
3	25,15	25,15	25,23	— 4,9	+ 0,1	— 2,5	N.N.O.	N.N.O.	O.	Snö
4	25,27	25,34	25,40	— 2,0	— 0,5	— 4,0	S.S.O.	S.S.V.	S.S.V.	—
5	25,43	25,46	25,47	— 8,0	— 3,0	—10,0	S.S.V.	S.S.V.	N.	Klart
6	25,46	25,52	25,58	—16,0	— 5,1	— 6,9	V.S.V.	V.S.V.	V.N.V.	Halfbl.
7	25,49	25,57	25,54	— 9,4	+ 0,7	— 2,0	V.	S.V.	S.V.	Snö
8	25,56	25,64	25,74	— 1,5	+ 1,0	— 7,1	V.S.V.	—	V.S.V.	Mulet
9	25,82	25,85	25,85	— 6,0	— 5,1	— 6,1	N.N.V.	N.N.O.	N.N.O.	—
10	25,81	25,81	25,79	— 3,0	+ 6,3	+ 1,0	—	—	V.S.V.	Dimma
11	25,75	25,81	25,85	+ 0,9	+ 4,3	+ 0,1	V.N.V.	V.N.V.	V.S.V.	Klart
12	25,81	25,70	25,80	— 3,7	+ 0,4	— 0,7	V.S.V.	V.S.V.	V.	Dimma
13	25,48	25,56	25,71	— 3,0	— 3,5	—11,1	V.	N.N.O.	N.N.O.	Mulet
14	25,78	25,76	25,76	—19,4	—13,1	—18,0	N.	N.	N.	Klart
15	25,75	25,75	25,72	—22,0	—14,3	—18,0	N.	N.	N.	—
16	25,75	25,77	25,80	—23,5	—12,9	—19,0	N.N.V.	N.N.O.	N.	—
17	25,81	25,75	25,72	—23,0	—11,9	—16,0	N.	N.	N.	—
18	25,60	25,53	25,50	—20,0	— 7,0	—11,0	V.S.V.	V.S.V.	V.	—
19	25,40	25,41	25,43	—14,5	— 4,0	— 6,0	V.	V.	—	—
20	25,50	25,52	25,56	—11,5	— 0,5	— 4,0	S.S.V.	S.S.V.	S.S.O.	—
21	25,61	25,65	25,66	— 4,0	— 0,5	— 8,0	S.S.O.	O.	N.O.	—
22	25,59	25,56	25,54	—10,0	— 3,5	— 8,0	N.O.	N.O.	N.O.	Snö
23	25,52	25,52	25,54	—12,8	— 6,1	—13,8	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	Klart
24	25,55	25,53	25,53	—18,0	— 7,5	—14,0	N.	O.N.O.	N.N.O.	—
25	25,42	25,39	25,38	—20,0	—10,4	—15,1	N.	N.	N.	—
26	25,40	25,44	25,48	—18,0	— 4,4	— 8,0	V.	V.	V.	—
27	25,53	25,58	25,59	—12,0	— 1,0	— 7,0	V.	V.	V.S.V.	—
28	25,52	25,43	25,31	— 5,0	+ 0,5	+ 0,2	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Snö
29	25,25	25,43	25,49	+ 0,2	+ 3,0	— 1,5	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klart
30	25,50	25,35	25,30	— 4,5	+ 7,0	+ 3,2	V.N.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
31	25,47	25,59	25,59	— 5,5	— 0,8	— 4,0	N.N.O.	N.N.V.	V.N.V.	—
Med- dium	25,545	25,560	25,567	—10°71	— 3°47	— 7°75				
	25,557			— 7°31						

i April 1853.

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärknin- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,50	25,46	25,41	— 4°0	+ 4°0	— 1°5	S.V.	S.S.V.	S.S.O.	Mulet
2	25,39	25,46	25,53	— 2,0	— 1,9	— 5,2	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
3	25,56	25,59	25,62	— 4,0	— 1,0	— 4,9	O.	O.	O.	Halfkl.
4	25,61	25,61	25,62	— 8,2	+ 0,4	— 5,0	O.	O.N.O.	O.N.O.	Klart
5	25,58	25,52	25,45	— 7,0	+ 2,0	+ 0,1	—	O.S.O.	O.S.O.	Mulet
6	25,46	25,51	25,41	+ 0,1	+ 3,6	— 0,5	O.S.O.	O.S.O.	O.S.O.	Sol
7	25,13	24,92	24,92	+ 0,1	+ 6,1	+ 4,0	S.O.	S.S.V.	S.S.V.	—
8	24,82	24,88	24,98	+ 3,0	+ 7,0	+ 2,0	S.S.V.	V.S.V.	V.N.V.	Regn
9	25,14	25,30	25,36	— 0,9	+ 1,6	— 0,1	V.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Sol
10	25,48	25,53	25,57	— 3,1	— 0,1	— 4,0	N.N.V.	N.	—	Klart
11	25,60	25,57	25,44	— 5,7	— 2,0	— 6,3	O.S.O.	O.	O.	—
12	25,38	25,37	25,38	— 8,0	— 0,8	— 6,0	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	—
13	25,41	25,43	25,45	— 9,0	— 1,7	— 7,2	N.	N.N.O.	N.N.O.	—
14	25,45	25,45	25,47	— 9,4	+ 1,2	— 5,0	V.S.V.	N.V.	V.N.V.	—
15	25,46	25,44	25,46	— 6,5	+ 2,2	— 2,0	V.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	—
16	25,48	25,47	25,46	— 5,0	+ 3,9	— 0,9	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
17	25,45	25,46	25,51	— 0,1	+ 5,3	— 3,2	V.N.V.	V.	O.N.O.	—
18	25,55	25,54	25,47	— 4,3	+ 3,7	+ 0,1	N.N.O.	N.	N.	—
19	25,49	25,60	25,64	— 1,1	+ 1,4	— 1,8	N.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
20	25,60	25,57	25,54	— 1,7	+ 4,8	— 1,0	O.N.O.	O.S.O.	O.N.O.	—
21	25,48	25,43	25,41	0,0	+ 3,1	+ 1,0	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	Sol
22	25,36	25,35	25,33	+ 1,9	+ 6,9	0,0	O.S.O.	O.S.O.	O.S.O.	Halfkl.
23	25,27	25,25	25,20	— 0,3	+ 6,0	+ 2,4	O.S.O.	O.S.O.	S.S.O.	—
24	25,24	25,31	25,38	— 1,0	+ 5,6	+ 2,1	S.S.V.	V.	—	Dimma
25	25,40	25,38	25,43	+ 2,9	+ 4,7	+ 0,1	O.N.O.	—	—	Regn
26	25,54	25,57	25,51	— 1,8	+ 3,2	+ 2,0	O.	O.S.O.	O.N.O.	—
27	25,45	25,50	25,52	+ 2,7	+ 8,7	+ 4,0	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	—
28	25,50	25,53	25,51	+ 5,0	+ 11,0	+ 4,6	O.N.O.	O.	O.N.O.	Klart
29	25,47	25,50	25,50	+ 3,6	+ 6,1	+ 4,9	O.N.O.	O.S.O.	O.N.O.	Regn
30	25,49	25,55	25,58	+ 4,0	+ 6,1	+ 4,4	O.S.O.	O.S.O.	N.O.	—
Me- dium	25,425	25,435	25,436	— 1°00	+ 3°35	— 0°76	Nederbörden = 0,341 dec. tum.			
	25,432			+ 0°20						

i Maj 1853.

	Barometern reducerad till 0°. Decimalum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmär- ningar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,63	25,69	25,73	+ 3,9	+ 14,0	+ 6,0	—	—	O.	Mulet
2	25,75	25,76	25,77	+ 5,1	+ 11,5	+ 5,1	—	O.N.O.	O.N.O.	—
3	25,70	25,67	25,53	+ 5,5	+ 6,2	+ 4,9	O.N.O.	O.N.O.	N.N.V.	Regn
4	25,57	25,61	25,64	+ 4,5	+ 9,7	+ 5,0	N.N.V.	N.	N.	Halfkl.
5	25,66	25,61	25,51	+ 3,3	+ 10,5	+ 5,0	N.	N.N.O.	O.S.O.	Klart
6	25,28	25,22	25,12	+ 7,0	+ 7,0	+ 1,7	S.S.O.	N.N.O.	O.N.O.	Mulet
7	25,05	25,09	25,11	+ 0,5	+ 5,5	+ 1,1	N.O.	N.	N.	Regn
8	25,10	25,14	25,20	+ 1,3	+ 7,0	+ 2,0	O.S.O.	S.	S.	—
9	25,22	25,19	25,23	+ 1,9	+ 3,7	+ 5,0	—	S.O.	S.V.	Mulet
10	25,35	25,41	25,36	+ 5,7	+ 10,7	+ 5,1	V.S.V.	V.S.V.	S.	Halfkl.
11	25,33	25,44	25,49	+ 5,5	+ 9,6	+ 5,1	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Mulet
12	25,54	25,58	25,67	+ 4,3	+ 10,9	+ 3,1	V.S.V.	V.S.V.	N.N.V.	Regn
13	25,80	25,87	25,92	+ 4,0	+ 11,1	+ 5,4	N.N.V.	N.N.O.	O.N.O.	Klart
14	25,97	25,93	25,89	+ 3,1	+ 12,5	+ 4,1	—	—	S.S.O.	—
15	25,87	25,80	25,78	+ 6,4	+ 12,2	+ 4,7	—	N.O.	N.	—
16	25,75	25,74	25,75	+ 8,0	+ 13,3	+ 5,6	N.	N.N.O.	N.N.O.	—
17	25,75	25,67	25,58	+ 6,0	+ 11,1	+ 5,0	N.N.O.	O.N.O.	S.S.V.	—
18	25,48	25,38	25,33	+ 7,5	+ 14,0	+ 8,2	V.S.V.	S.V.	—	Halfkl.
19	25,38	25,45	25,51	+ 7,7	+ 9,5	+ 6,0	—	—	—	Regn
20	25,57	25,61	25,65	+ 7,3	+ 15,1	+ 7,2	—	—	—	Klart
21	25,70	25,69	25,66	+ 10,1	+ 15,3	+ 8,0	—	S.O.	S.	—
22	25,63	25,67	25,68	+ 9,5	+ 15,0	+ 12,0	N.	N.	N.N.O.	—
23	25,65	25,66	25,71	+ 11,0	+ 16,7	+ 9,8	N.N.O.	O.S.O.	S.V.	—
24	25,70	25,71	25,73	+ 14,0	+ 22,0	+ 13,0	—	O.N.O.	S.	—
25	25,70	25,68	25,65	+ 18,0	+ 25,2	+ 13,2	—	S.	S.	—
26	25,68	25,64	25,62	+ 17,0	+ 20,1	+ 12,7	S.S.V.	S.S.O.	S.O.	—
27	25,57	25,52	25,48	+ 14,2	+ 21,0	+ 14,2	O.	S.	S.S.O.	—
28	25,42	25,39	25,36	+ 17,0	+ 25,0	+ 17,8	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	—
29	25,38	25,38	25,42	+ 19,5	+ 24,0	+ 16,0	S.S.O.	S.	S.	—
30	25,46	25,49	25,53	+ 19,3	+ 24,1	+ 16,1	—	S.S.O.	S.S.O.	—
31	25,54	25,55	25,60	+ 18,2	+ 21,8	+ 14,5	—	O.	N.N.O.	—
Me- dium	25,554	25,556	25,555	+ 8,59	+ 14,04	+ 7,83	Nederbörden = 0,411 dec. tum.			
	25,555			+ 10,15						



paged incorrectly from here

ÖFVERSIGT

AF

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1858.

N. 7 & 8.

Onsdagarne den 14 September och 12 October.

Föredrag.

1. *Virginia, ett nytt algsläkte.* — Hr ARNSCHOUG hade insänt följande meddelande:

»Det var lätt att förutse, att bland de botaniska samlingar, som Fregatten Eugenie till fäderneslandet hemfört, algerna skulle utgöra en jämförelsevis ringa och obetydlig del. Expeditionens ende botanist, Hr Mag. ANDERSSON, som med förkärlek studerar de högre växterna, ansåg med skäl i främsta rummet sin pligt vara, att, under den korta tid fartyget qvarlåg uti någon hamn, beresa landets indre delar och undersöka deras vegetation; hvarje uppehåll vid hafskusten skulle i samlingsväg hafva medfört en förlust af land-växter, som äfven den rikaste algskörd ej kunnat uppväga.

Men oaktadt svårigheten att dela en kort och begränsad tid mellan två så olika sysselsättningar som insamlandet af både alger och landväxter, och trots de rika samlingar, som af dessa sednare hemfördes, blefvo dock de förra ej alldeles förgätna. De hembragta arterna, till antalet visserligen få, men intressanta, voro dock vid ankomsten till Stockholm af fukt och väta nära att förstöras; de afsändes derföre genast till mig att, om möjligt, räddas från fullkomlig förstöring.

Sedan detta sednare någorlunda lyckats mig, vågar jag för denna gång fästa Kongl. Akademiens uppmärksamhet på en, uti nämnda samling befintlig, så till släkte som art — för så vidt min erfarenhet sträcker sig — alldeles ny Laminarié, funnen i hafvet nära St Francisco.



Laminarieernas familj innefattar växtformer, utmärkta ej mindre för deras storlek i allmänhet än den olika karakter de tilldela hafsvegetationen på skilda punkter af jordklotet. Den solfjäderlika *Laminaria buccinalis*, med flera alnar lång, ihålig stam; *Microcystis*-arterna, som blifva understundom mer än hundra famnar långa, och som skulle obegränsadt tillväxa i längd, derest de icke af hafsvågorna afsletos eller stammens nedra del slutligen af ålder förtärdes; *Lessonierna*, karakteriserande södra Amerikas sydliga spets, ända till tio fot höga, trädlika, greniga, med tjock stam och långa jemnbreda blad försedda alger, — alla dessa hafva redan längesedan väckt den på södra hemispherens haf resande forskarens uppmärksamhet. Atlantiska Oceanens norra del saknar väl ej representanter af denna familj, ehuru de sällan uppträda under så kolossala former; väldigare äro dock de, som tillhöra stora Oceanens nordligaste del, der, vid Asiens och Amerikas kuster, den underbara *Neoreocystis Lütkeana*, uppkallad efter befälhafvaren under ryska fregatten Seniavin's verldsomsegling 1826—29, FR. LÜTKE, utmärker sig framför alla sina samslägtingar. Den har en stam, ej sällan 45 fot lång, slutande sig uti en blåsa, ända till tre alnar i längd, och från hvilkens topp en mängd bladknippen utgå, tjenande såväl egentliga hafsdjur som uttrar till skydd och fristad.

Närmast denna sednare står i systemet den nya Laminarié, som jag ofvanföre omnämnt. Önskande åt denna ett namn, som, på samma gång det erinrar om den första svenska verldsomsegling, tillika förvarar, äfven inom Floras område, minnet af den man, som i egenskap af expeditionens befälhafvare med så varm välvilja understödde de åtföljande vetenskapsmännens bemödanden, drager jag ej i betänkande att, på Mag. ANDERSSONS tillrådan, benämna den

VIRGINIA.

Char. gen. Callus radicalis fibris ramosis dense intertextis constructus, hemisphaericus. Stipes simplex, teres, cavus, spice foliosus. Folia divisione longitudinali multiplicata, simplicia. Fructus

Frons ut folium stipitatum simplex inchoare videtur, cujus stipes sensim amplificatur cavusque fit, et cujus lamina iterata divisione longitudinali in folia numerosa dividitur.

Genus, ut supra diximus, *Nereocysti* sine dubio maxime affine et ab eo stipite cavo nec non vesiculæ absentia diversum. Ceterum apex ipsius stipitis in foliorum petiolos quasi solutus, cum contra *Nereocystis* folia in fasciculos in apice vesiculæ distantes sunt collecta.

VIRGINIA Palma Maris ARNOLD.

Hab. in mari Californico prope St Francisco. *Exp. Eugenia.*

Plantæ facies Palmæ cujusdam, bi-tripedalis. Callus radicalis e fibris ramosis densissime implicatis apiceque sæpe incrassatis formatus, hæmisphæricus, uni-l. multiceps. Stipes 8-16-pollicaris, unceiam fere diametro æquans, subcylindraceus l. apicem versus paululum attenuatus, per totam longitudinem cavus, apice in folia solutus. Folia usque 12 pollices longa et $\frac{3}{4}$ poll. lata, 30-50 l. forsan plura, fissura adscendente sine dubio iterum iterumque divisa, petiolata, petiolo tereti-compresso 1-2-pollicari, linearia, utrinque attenuata, crassiuscula, longitudinaliter densissime plicato-rugosa (ut in *Macrocyti* pyrifera), margine remote dentato-ciliata.

Fructus in nostris speciminibus haud invenimus, aut propter eorum defectum, aut quia putredine paululum dissoluta fuerint specimina.

Tab. 4 framställer ett yngre exemplar i naturlig storlek. Bladens longitudinella veck äro ej tecknade.

2. Om oändliga serier, hvilkas termer äro continuerliga functioner af en reel variabel mellan ett par gränser, mellan hvilka serierna äro convergerande, — hade Hr E. G. BJÖRLING insändt följande uppsats:

1. I en uppsats, med rubrik »*Bemerkungen zur Convergenz der unendlichen Reihen*», införd i *Grunert's Archiv* Th. XX (1852), har Hr F. ARNDT i Stralsund fäst att uppmärksamheten derpå, att Hr CAUCHY's bekanta theorem *)

»Lorsque les différents termes d'une série sont des fonctions d'une même variable x , continues par rapport à cette variable dans le voisinage d'une valeur particulière pour laquelle la série est convergente, la somme S de la série est aussi, dans le voisinage de cette valeur particulière, fonction continue de x »

*) *Anal. algèbr.* pag. 131.

måste förklaras »unrichtig»; och till bevis för detta påstående anför han exempelvis icke allenast den i hithörande afseende ofta åberopade serien

$$(1) \quad \sin \phi, -\frac{1}{2} \sin 2\phi, \frac{1}{6} \sin 3\phi, \text{ etc.}$$

utan ock serien

$$(2) \quad x^{2m}(1-x), x^{2m+2}(1-x), x^{2m+4}(1-x), \text{ etc.}$$

förmenande, dels att denna serie för hvarje positiv x -värde < 1 (äfvén *indefinit* nära intill 1) är convergerande och har till summa $\frac{x^{2m}}{1+x}$, dels ock att den, till följe deraf, utgör ett slående bevis för hans påstående, alldenstund denna series termer äro continuerliga functioner af x i granskapet af värden $x=1$, men ändock dess summa discontinuerlig i samma granskap, »da sie für diesen Werth» ($x=1$) »verschwindet, während $\frac{x^{2m}}{1+x}$ gegen die Grenze $\frac{1}{2}$ convergirt, wenn x sich der Einheit nähert.»

Anmärkning. Innan vi gå vidare, är af vikt att anmärka, att, alldenstund (identiskt)

$$(\alpha) \quad 1-x+x^2(1-x)+x^4(1-x)+\dots+x^{2p}(1-x) \text{ är } = \frac{1-x^{2p+2}}{1+x},$$

man tydligen har

$$(\beta) \quad 1-x+x^2(1-x)+x^4(1-x)+\text{etc.} = \lim_{(n=\infty)} \frac{1}{1+x} (1-x^{2n});$$

hvaraf är klart, att serien (2) visserligen för hvarje *uppgifvet* x numeriskt < 1 är convergerande och kan sägas hafva till summa

$$\frac{x^{2m}}{1+x},$$

(äfvensom att den för $x=1$ har till summa 0), men icke så för ens positiva x -värder, som supponeras *indefinit* litet understiga enheten, eftersom

$$\lim_{(n=\infty)} \frac{x^{2m}}{1+x} (1-x^{2n})$$

för sådana x -värder tydligen är ett *indeterminerat* medium mellan 0 och 1.

Ehuru det sålunda är *orätt* att påstå, att äfven för positiva x -värder, som indefinit litet understiga enheten, formeln

$$(2) \quad x^{2n}(1-x) + x^{2n+2}(1-x) + x^{2n+4}(1-x) + \text{etc.} = \frac{x^{2n}}{1+x}$$

skulle vara en sanning, och ehuru man således icke kan medgifva Hr ARNDTS' ofvan citerade *prémis*; förblir dock hans *conclusion*, att neml. serien (2) är ett slående bevis på otillförlitligheten af det citerade Cauchy'ska theoremet, onekligen sann, alldenstund man icke kan neka, att denna series termer äro continuerliga functioner af x i granskapet af $x=1$, för hvilken partikulära x -värder serien är convergerande, men man ändock icke kan säga, att »la somme de la série est aussi, dans le voisinage de cette valeur particulière, fonction continue de x ,» då nemligen för x -värder »dans le voisinage de cette valeur particulière» serien icke är convergerande och således icke ens har någon bestämd *summa* (d. s. gräns, hvartill dess termsumma, vid indefinit växande term-antal, indefinit närmar sig). —

Vidare har Hr CAUCHY sjelf, i Franska Vetenskaps-Akademiens séance d. 14 sistl. Mars *), i anledning af en anmärkning mot samma theorem, framställt af Hrr BOUQUET och BAIOT, medgifvit detsammas ofullständighet, men tillika visat, huru det bör modifieras för att icke mera lemnas rum för något undantag. Och innefattas denna modifikation i följande då uppgifna nya énoncé af theoremet:

»Si les différents termes de la série

$$(3) \quad u_0, u_1, u_2, \dots, u_n, u_{n+1}, \dots$$

sont des fonctions d'une même variable réelle x , continues, par rapport à cette variable, entre des limites données, si, d'ailleurs, la somme

*) Se »Compte rendu» för nämnde dag. Uppsatsen heter: *Note sur les séries convergentes dont les divers termes sont des fonctions continues d'une var. réelle ou imaginaire, entre des limites données.*

(4) $u_n + u_{n+1} + \dots + u_{n'-1}$
devient toujours infiniment petite pour des valeurs infiniment grandes des nombres entiers n et $n' > n$, la série (3) sera convergente, et la somme S de la série (3) sera, entre les limites données, fonction continue de la variable x .

Vid samma tillfälle har ock Hr CAUCHY erinrat, att genom en sådan énoncé af theoremet man icke kan komma att af den omständigheten, att seriens

$$(4') \quad \sin \phi, \frac{1}{2} \sin 2\phi, \frac{1}{3} \sin 3\phi, \text{ etc.}$$

termerna äro continuerliga functioner af ϕ i granskapet af t. ex. $\phi=0$, för hvilken ϕ -värden serien är convergerande, draga den falska slutsats, att »la somme de la série est aussi, dans le voisinage de cette valeur particulière, fonction continue de ϕ .» Han visar nemligen, att i detta fall vilkoret, i det nya theoremet, »si d'ailleurs la somme - - - - - infiniment grandes des nombres entiers n et $n' > n$,» icke är uppfyllt för ϕ -värden indefinit nära intill 0, eller — hvilket tydligen är detsamma — att serien (4') i sjelfva verket icke är convergerande för sådana ϕ -värden. —

Anmärkning. Af det i förra Anmärkningen yttrade är tydligt, att detsamma kan sägas angående serien (2) eller, för enkelhets skull, serien

$$(5) \quad (1-x), x^2(1-x), x^4(1-x), x^8(1-x), \text{ etc.}$$

För denna serie antager nemligen summan (4) i det nya theoremet formen

$$(4') \quad x^{2n}(1-x) + x^{2n+2}(1-x) + x^{2n+4}(1-x) + \dots + x^{2n'-2}(1-x),$$

och den förblir icke »*toujours infiniment petite pour des valeurs infiniment grandes des nombres entiers n et $n' > n$* »

För $n' = \infty$ är den nemligen, ehvad helt tal n må vara,

$$= x^{2n}(1-x)[1+x^2+x^4+\dots] = \frac{x^{2n}}{1+x},$$

och således, t. ex. för $x = 1 - \frac{1}{2n}$,

$$= \frac{\left(4 - \frac{1}{2n}\right)^{2n}}{2 - \frac{1}{2n}},$$

hvilken expression, då man nu låter n växa indefinit, ingalunda förblifver »infiniment petite,» utan tvärtom närmar sig indefinit till limes $\frac{1}{2e}$. —

2. Under sådana omständigheter torde det icke synas opassande, att jag vågar upptaga Kongl. Akademiens tid med följande utdrag, i översättning, af en min afhandling »*Doctrinae serierum infinitarum exercitationes, P. 1:ma,*» införd redan år 1846 i K. Vetenskaps-Societetens i Upsala *Nova Acta Vol. XIII, Fascic. 1*, alldenstund detta utdrag på det närmaste berör det ämne, som utgör föremålet för ofvannämnde tvenne uppsatser af Hrr CAUCHY och ARNDT.

På sid. 65 och följ. i nämnde vol. XIII förekommer följande theorem med bevis jemte nedanstående, dithörande, not under texten:

»Theorem. Om en serie af reela termer

$$(6) \quad f_1(x), f_2(x), f_3(x), \text{ etc.}$$

»är convergerande för hvarje reel x -värde från och med x_0 , »still och med X , och derjemte dess särskilda termer äro continuerliga functioner af x mellan nämnda gränser; så måste »nödvändigt sjelfva summan

$$(7) \quad f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \text{ etc.}$$

»vara continuerlig function af x mellan samma gränser*).

*) »För detta i serietheorien högst vigtiga theorem har man egentligen Hr CAUCHY att tacka. Dock kan emot den sats, som utgör »Hr CAUCHY's redaction af detta theorem (se hans *Anal. Algèbr. p. 131*), åtskilligt med fog invändas. Så t. ex. är tydligt, att — »såsom redan ANAL. (*Oeuvr. compl. T. I p. 71*) anmärkt — summan af serien

$$(a) \quad \sin x, \frac{1}{2} \sin 2x, \frac{1}{3} \sin 3x, \text{ etc.}$$

»icke kan vara någon i granskapet af $x = \text{vare sig } 2k\pi \text{ eller}$

»Bevis. Emedan serien (6) är convergerande för hvarje x -värde från och med x_0 till och med X , måste — ehvad x -värde än må tilldelas x , blott att den icke öfverskrider nämnde gränser — summan

$$f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + f_{n+3}(x) + \text{etc.},$$

— $2k\pi$ (k helt tal eller 0) continuerlig function af x , eftersom denna summa t. ex. för hvarje x -värde inom gränserna π och 0 är $= \frac{\pi-x}{2}$, men $= 0$ för $x=0$; och likväl kan icke nekas, att denna series termer äro continuerliga functioner af x i gränsskottet af den partikulära värdet $x=0$, för hvilken äfven sjelfva serien är convergerande.

»Att det ofvanstående theoremet är oberoende af detta slags objectioner, inses lätt af detsammes bevis. — Så t. ex. är väl serien (a) convergerande för hvarje uppgifven x -värde inom gränserna 0 och 2π ; men ingalunda är man derföre berättigad till det omdöme, att serien är convergerande för hvarje x -värde från och med den ena gränsen till och med den andra. Tvärtom kan man just på grund af vårt ofvanstående theorem vara förvissad att så icke är. —

»I sammanhang härmed må vid detta tillfälle erinras om en i serietheorien ganska vigtig omständighet, hvarvid författare understundom befinnas ännu icke fästa tillbörlig uppmärksamhet, ehuru å andra sidan torde få antagas, att man om sjelfva saken redan länge varit temligen öfverens, den omständigheten nemligen, att, sedan man tilläfsventyrs funnit en serie, hvars termer äro functioner af en variabel x , vara convergerande för hvarje x -värde intill en viss gräns X , man icke må tilltro sig att deraf sluta till seriens convergens äfven för x -värder indefinit nära intill nämnda gräns. Att sådan slutsats icke är legitim vid sådana serier, som äro divergerande för $x=X$, derom synes intet tvifvel vara; t. ex. vid serien

$$(b) \quad \cos x, \frac{1}{2} \cos 2x, \frac{1}{3} \cos 3x, \text{etc.},$$

som är convergerande för hvarje uppgifven x -värde inom gränserna 0 och 2π , men divergerande för sjelfva dess gränsvärder. Men att serien (a), som väl kan sägas vara convergerande äfven för dessa gränsvärder, ändock icke är convergerande för x -värder, som, begränsade af 0 och 2π , supponeras närma sig derintill indefinit, är icke så alldeles självklart. I sådana fall kan vårt ofvanstående theorem esomoftast tjena till undanröjdande af all tvekan. — Emedlertid, i en sak, så bekant som denna, om dock icke alltid nog uppmärksammas, behöfves ingen vidlyftighet; det torde dock icke vara utan sin nytta att en gång hafva i tydliga ord omnämmt förhållandet.

— — — — —

»för ett visst n och hvarje större, vara numeriskt mindre än ett (på förhand) uppgifvet tal, huru litet som helst, $\frac{\omega}{2}$. Detta n är naturligtvis olika stort för olika x -värder, i allmänhet; men säkert är, att mot en viss x -värde (eller flere) svarar *maximum* af n . Låt ξ vara en sådan x -värde.

»Då är således icke allenast

»summan $f_{n+1}(\xi) + f_{n+2}(\xi) + \text{etc.}$, kortligen R_n , numeriskt $< \frac{\omega}{2}$,

»utan ock — hvilka andra x -värder, begränsade af x_0 och

» X , än ξ och ξ' må vara — de båda summorna

$$\left. \begin{array}{l} f_{n+1}(\xi) + f_{n+2}(\xi) + \text{etc.} \\ f_{n+1}(\xi') + f_{n+2}(\xi') + \text{etc.} \end{array} \right\} \text{hvardera numeriskt } < \frac{\omega}{2},$$

»och således skillnaden mellan dessa båda sistnämnda summor

»med all säkerhet numeriskt $< \omega$. —

»Detta förberedelsevis. — Nu till saken!

»För att förvissa sig om theoremets sanning, behöfver man tydiligen allenast bevisa, att — hvilka x -värder, begränsade af x_0 och X , än x och $x+a$ må beteckna — man städse genom ett visst a och hvarje numeriskt mindre kan göra differen-

»sen $S - S^{(x)}$ numeriskt mindre än ett (på förhand) uppgifvet tal,

»huru litet som helst, 2ω (Med $S^{(x)}$ beteckna vi den ifrågak-

»rande seriens summa för $x=x$). — Se här detta bevis!

»Emedan de båda serierna

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \text{ etc.}$$

$$f_1(x+a), f_2(x+a), f_3(x+a), \text{ etc.}$$

»näro convergerande, så är ock serien

$$f_1(x+a) - f_1(x), f_2(x+a) - f_2(x), f_3(x+a) - f_3(x), \text{ etc.}$$

»convergerande, och

$$S - S^{(x)} = [f_1(x+a) - f_1(x)] + [f_2(x+a) - f_2(x)] + \dots + [f_n(x+a) - f_n(x)] + r_n$$

$$\text{neml. } r_n = [f_{n+1}(x+a) - f_{n+1}(x)] + [f_{n+2}(x+a) - f_{n+2}(x)] + \text{etc.}$$

»Låt nu n betyda ett så stort tal, att för detta (och hvarje större) den ofvannämnda summan R_n är numeriskt $< \frac{\omega}{2}$. (Detta

» n är således function af ξ och ω , men *oberoende af α* . Då när ock *sjelfva* r_n numeriskt $< \omega$, enligt hvad förberedelsevis här ofvan nämndes. — Ehvad välör nu må tilldelas α (sådan neml. som ofvan nämndes), måste naturligtvis en (eller flere) af termerna

$$f_1(z+\alpha)-f_1(z), f_2(z+\alpha)-f_2(z), \dots, f_n(z+\alpha)-f_n(z)$$

»vara numeriskt den största. Utmärkes den med

$$f_m(z+\alpha)-f_m(z),$$

»då således m betyder ett helt tal, som kan vara function af α , men som åtminstone icke öfverstiger n ; så är med all säkerhet

$$\overset{(z+\alpha)}{S} - \overset{(z)}{S} - r_n \text{ numeriskt icke } > \text{num. val. af } n[f_m(z+\alpha)-f_m(z)].$$

»Och som $f_m(x)$ var continuerlig mellan x_0 och X (och n oberoende af α); så är uppenbart, att α kan tilldelas så liten numerisk välör, att

$$\text{num. val. af } n[f_m(z+\alpha)-f_m(z)] \text{ blir } < \omega.$$

»Det öfriga är sjelfklart». —

Man finner häraf, ej allenast att frågan om behofvet af någon modifikation af det ursprungliga Cauchy'ska theoremet redan år 1846 varit väckt inom Vetenskaps-Societeten i Upsala och att ett försök att afhjelpa detta behof blifvit genom dess »*Nova acta*» för samma år offentliggjordt, utan ock att resultatet af detta försök, neml. det nyss citerade theoremet helt och hållet öfverensstämmer med det i art. 4 af denna uppsats citerade, af Hr CAUCHY i år uppgifna nya theoremet, så vickt de neml. båda angå serier med *reela* termer. Ty hvad beträffar den skenbara olikheten mellan dessa båda theoremer, att neml. det ena — det i *Nova acta* — statuerar, att om serien (6) är *convergerande för hvarje x -välör från och med den ena gränsen till och med den andra, så etc.*, men det andra, eller Hr CAUCHY's nya theorem, att om, för hvarje x -välör mellan gränserna, *summan*

$$(4') \quad f_n(x) + f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \dots + f_{n-1}(x)$$

städse blir indefinit liten för indefinit stora helt-tals-valörer af n och $n' > n$, så är serien convergerande för hvarje sådan x -valör, och etc., så består uppenbarligen denna olikhet endast i ett olika sätt att uttrycka samma villkor, älddenstund serien (6) endast då är convergerande, när den i Hr CAUCHY's theorem nämnda egenskapen hos summan (4') eger rum. — Härvid bör dock icke lemnas onämndt, att Hr CAUCHY's nya theorem är i så måtto vidsträcktare än det i *Nova acta*, att det sednare — både till énoncé och bevis — är inskränkt till serier med endast reela termer, då deremot det förra omfattar äfven serier med imaginära termer (neml. imaginära functioner af en reel variabel). I hvilket afseende likväl må erinras, att man, för att göra theoremet i *Nova acta* lika vidsträckt, endast behöfver i dess énoncé uttaga orden »af reela termerna» och efter det ofvan citerade beviset — hvars grundlighet, i anseende till sökens vikt, väl torde förtjena uppmärksamhet — tillägga den anmärkning, att när termerna (6) icke äro reela, men likväl (enligt suppositionen) continuerliga functioner af x mellan limites, dels enhvar af dem nödvändigt kan sättas under formen

$$\varphi_n(x) + i \psi_n(x),$$

neml. hvardera af $\varphi_n(x)$ och $\psi_n(x)$ en sådan function af x , som $f_n(x)$ i det föregående beviset supponerades vara ^{*)}, dels ock hvardera af serierna

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \varphi_3(x), \text{ etc.}$$

$$\psi_1(x), \psi_2(x), \psi_3(x), \text{ etc.}$$

nödvändigt är en sådan, som i samma bevis serien (6) supponerades vara, hvarefter conclusionen är själfklar. — Erkänns bör ock, att Hr CAUCHY i samma sin uppsats omedelbart efter det nu omnämnda theoremet angående serier, hvilkas termer äro functioner af en reel variabel, i korthet deducerat ett ana-

^{*)} Se t. ex. min afhandling »Om det Cauchy'ska kriteriet på de fall, då functioner af en variabel låta utveckla sign etc. mot slutet af art. 2 (Vetensk. Akademiens Handl. för år 1852, sid. 175.)

logt theorem äfven för serier, hvilkas termer äro functioner af en imaginär variabel. —

3. Men Hr ARNDT's ofvannämnda uppsats föranleder särskildt ännu ett par andra citationer ur förbemälda afhandling i *Nova acta*.

Såsom redan i den förra af de båda anmärkningarne i art. 4 här ofvan blifvit antydt, synes Hr ARNDT icke lägga tillbörlig vikt på det försigtighetsmåttet att, sedan man funnit en serie af formen

$$(6) \quad f_1(x), f_2(x), f_3(x), \text{ etc.}$$

vara convergerande för hvarje uppgifven reel x -värde inom ett par gränser x_0 och X , icke deraf obetingadt sluta till series convergens äfven för x -värder (inom gränserna) indefinit nära intill någondera gränsen, t. ex. X , icke en gång om sjelfva serien

$$f_1(X), f_2(X), f_3(X), \text{ etc.}$$

skulle kunna sägas vara convergerande. — Utom hvad i detta afseende redan blifvit erinradt i den citerade noten under texten vid mitt i art. 2 här ofvan reproducerade theorem (ur afhandlingen i *Nova acta*), torde här icke vara olämpligt fästa uppmärksamheten derpå, att, om detta försigtighetsmått icke vore af nöden, man icke allenast — på grund af det nyssnämnda theoremet eller, som är detsamma, af Hr CAUCHY's nya theorem, om hvars pålitlighet åtminstone det här ofvan citerade beviset icke lär lemna några dubier öfriga — skulle vara nödsakad medgifva, att t. ex. seriesumman

$$\sin \varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi + \frac{1}{3} \sin 3\varphi + \text{ etc.}$$

vore en continuerlig function af φ mellan gränserna $\varphi=0$ och $\varphi=\pi$, utan ock — på grund af nedanstående korta raisonnement *) — skulle nödgas medgifva den orimligheten, att för $\varphi=0$ denna summa skulle vara $= \frac{\pi}{2}$, allidenstund formeln

$$\frac{\pi-\varphi}{2} = \sin \varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi + \frac{1}{3} \sin 3\varphi + \text{ etc.}$$

*) Detta raisonnement innesfattas i följande utdrag ur *Pars 2:da af mina Doctrinae serierum infinitarum exercitationes* (*Nova acta*, T. XIII, 1846, pag. 157):

gäller för hvarje uppgifven reel ϕ -värde inom nyssnämnda gränser, och $\lim \frac{\pi-\phi}{2}$, vid indefinit emot 0 convergerande ϕ , är $\frac{\pi}{2}$. —

Vidare, ehuru Hr ARNDT icke, såsom Hr CAUCHY i sin »Note», uppgifvit någon ny redaktion af det ofvannämnda, med rätta tadlade, Cauchy'ska theoremet i sin allmänlighet, har han likväl för den speciela händelsen, att serien är en sådan som fortgår efter de stigande digniteterna af en reel variabel, statuerat ett theorem analogt med det ur *Nova acta* här ofvan citerade, dock med bifogadt vilkor att serien förblir convergerande äfven efter dess termers utbytande mot deras numeriska värder. — I anledning af denna sistnämnda omständighet, må det tillåtas mig att dels anmärka, att obehöfligheten af detta särskilda förbehåll, i hvarje fall då serien (6) är utan afbrott convergerande för hvarje x -värde från och med den ena limes till och med den andra, är till fullo ådagalagd genom det ofvan citerade theoremet ur *Nova acta*, dels ock särskildt erinra i afseende på serier, som fortgå efter de stigande

»Om man funnit, att följande equation med reela termer

$$(c) \quad F(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \text{etc.}$$

är sann för hvarje uppgifven reel x -värde från och med någon gräns $x = x_0$ ända till $x = X$ (exclusive), och om seriens i detta sednare memrum termer äro continuerliga functioner af x mellan dessa gränser x_0 och X , samt om derjemte denna serie förblifver utan afbrott convergerande för hvarje x -värde (mellan limites) ända till och med $x = X$; så vet man af Theor. II i *Paras 11-ma* (d. v. s. det här ofvan i art. 2 citerade theoremet), att sjelfva summan

$$(d) \quad f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \text{etc.}$$

nödvändigt måste vara continuerlig function af x mellan nyssnämnda gränser. — Och eftersom nu $F(x)$ rätt uttrycker denna summa för hvarje uppgifven x -värde (mellan gränserna) ända till $x = X$ (exclusive) — hvaraf, enligt nyssnämnda Theor. II, följer att denna $F(x)$ är continuerlig mellan $x = x_0$ och $x =$ en uppgifven värde hvilken som helst inom gränserna x_0 och X —; är tydligt, att, om $F(x)$, vid indefinit mot X (ifrån x_0 -hållet) convergerande x , sjelf convergerar indefinit mot någon finit och determinerad gräns »lim $F(x)$ », man, för att finna summan af den convergerande serien

$$(e) \quad f_1(X), f_2(X), f_3(X), \text{etc.},$$

»endast behöfver uppsöka denna gräns.»

digniteterna af x , att, om en sådan befunnits vara convergerande för någon speciel x -värde $= X$, den verkligen är convergerande för hvarje x -värde (utan afbrott), som icke ligger utom gränserna $x=0$ och $x=X$ "); hvarföre man ock utan tvekan kan, sedan man funnit en sådan serie vara convergerande för någon speciel x -värde $= X$, deraf sluta, att seriens summa är en continuerlig function af x mellan gränserna $x=0$, $x=X$.

Slutligen torde, med anledning af de näst före anmärkningen i början af närvarande uppsats citerade orden ur Hr ARNDT's afhandling, få som hastigast vidröras ännu ett moment af serietheorien, som man icke sällan finner vara lemnadt å sido. Man synes nemligen understundom obehörigen identificera en seriesumma

$$(6) \quad f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \text{etc.}$$

med den function $F(x)$, som man tilläfsventyras funnit vara congruent med denna seriesumma mellan vissa gränser **), då det likväl ganska ofta kan inträffa, att serien

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \text{etc.}$$

*) Denna sats äfvensom det bevis för densamma, som jag uppgifvit i *Nova acta* T. XIII pag. 158, utgöra hvardera en af behöfvet påkallad ny redaktion af ABEL's motsvarande sats och bevis (*Oeuvr. compl.* T. I p. 69).

**) Så t. ex. synes Hr ARNDT i de nyssnämnda citerade orden (tagna i sammanhang med det näst förut i hans uppsats yttrade) vilja bedömma naturen af seriesumman

$$x^{2m}(1-x) + x^{2m+2}(1-x) + \text{etc.}$$

efter functionen

$$\frac{x^{2m}}{1+x}$$

äfven för x -värder *indefinit* nära intill 1, då likväl för sådana x -värder dessa båda alldeles icke äro identiska (se *anmärkn.* näst efter de citerade orden).

Samma inadvertens måste man med allt skäl tillvita enhvar, som angående serien (1) påstår dess summa vara $= \frac{1}{2} \varphi$ äfven för φ -värder *indefinit* nära intill π eller $-\pi$. Man kan visserligen säga, att summan

$$\sin \varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \sin 3\varphi - \text{etc.}$$

är $= \frac{1}{2} \varphi$ för hvarje *uppgifven* x -värde numeriskt $< \pi$, men all-

är convergerande mellan ett par gränser $x=x_0$ och $x=X$, ja, till och med att derjemte dess särskilda termer äro continueliga functioner af x deremellan, men att ändock seriesumman (6) icke kan rätt uttryckas med *samma* $F(x)$ hela detta intervall igenom. Ett enda exempel torde göra tillfyllest. Såsom Hr SCHLÖMILCH rätteligen anmärker i *Grunert's Archiv* Th. X pag. 47, är summan af den för hvarje reel x -värde convergerande serien

$$\frac{1}{2} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right), \frac{1}{2.4} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)^3, \frac{1.3}{2.4.6} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)^5, \frac{1.3.5}{2.4.6.8} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)^7, \text{ etc.}$$

= x från och med $x=0$ till och med $x=1$,

men = $\frac{1}{x}$ för hvarje x -värde ofvanom $x=1$ (inclusive). —

Redan häraf inses, huru nödvändigt det är att, sedan man tilläfsventyrs funnit att summan af en mellan vissa gränser x_0 och X convergerande serie (6) är, så länge man håller sig inom någon del af detta intervall, städse = en viss $F(x)$, icke deraf utan särskild undersökning sluta, att detsamma gäller för hela nämnde intervall.

Just deraf, att man måste vakta sig för nämnda obehöriga identificering, inses ock, hurusom i det raisonnement, som i den första af noterna under denna art. 3 blifvit citeradt, förbehållet om *functionens* $F(x)$ *convergering mot en finit och determinerad gräns* (i det att x närmar sig indefinit till X) verkligen var af behovet påkalladt, för att man af eqv. (c) måtte i den dervid förhandenvarande händelsen kunna med säkerhet göra den på samma ställe nämnda slutsatsen eller, kortligen,

$$F(X) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \text{etc.}$$

Utan detta förbehåll hade man ju sig der *intet annat* bekant om naturen af $F(x)$, än att den rätt uttryckte summan af serien

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \text{ etc.}$$

deles icke för φ -värder indefinit nära derintill, såsom ock redan i det ofvanstående är förklaradt. — Man kan icke frikalla Hr AARH från att hafva begått denna inadvartens (se *Grunert's Arch.* Th. XX p. 44). —

för hvarje uppgifven x -värer från och med x_0 ända till X (exclusive), och att den således var en continuerlig function af x mellan $x=x_0$ och en uppgifven x -värer hvilken som helst inom gränserna x_0 och X ; och deri ligger ju alldeles icke inclusive, att $F(x)$ är, såsom seriesumman (d), continuerlig utan afbrott ända fram till gränsen $x=X$.

Men, å andra sidan, följer ock directe ur det i midten af denna art. 3 och i nyssnämnda not under dess början anförda, att man icke behöfver, såsom Hr ARNDT i sin uppsats (*Grunert's Archiv* T. XX pag. 49) ansett nödigt, söka sig någon alldeles speciel väg, för att af en sådan eqvation som

$$l(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \text{etc.} \quad (-1 < x < 1)$$

blifva förvissad om sanningen af formeln

$$l(2) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \text{etc.}$$

Ur nyssnämnda not i förening med den i midten af denna art. 3 åberopade satsen, att, om en efter de stigande digniteterna af x fortgående serie befunnits vara convergerande för $x=X$, den också är convergerande för hvarje x -värer, som icke ligger utom gränserna $x=0$ och $x=X$, följer nemligen directe, för sådana serier, detta (i *Nova acta* T. XIII p. 159 redan upptagna)

Coroll. »Om eqvationen

$$F(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \text{etc.},$$

med reela termer,

»befunnits vara sann för hvarje uppgifven x -värer (från o »räknadt) ända till $x=X$ (exclusive), och derjemte serien

$$a_0, a_1X, a_2X^2, a_3X^3, \text{etc.}$$

»är convergerande; så behöfver man, för att finna denna series summa, endast uppsöka $\lim F(x)$, så ofta som $F(x)$, »vid indefinit mot X (ifrån o-hållet) convergerande x , sjelf »närmar sig indefinit till någon finit och determinerad gräns » $\lim F(x)$ ».

**3. Om functioners maximi- och minimi-värd-
rer.** — Hr BJÖRLING hade insändt följande skriftliga med-
delande:

Hr Lector LINDMAN har i art. 2 af »Öfversigten» för d.
44 sisl. Maj vidrört ett af de ömtåligare ämnen i analysen.
För att till en början icke tala om frågan om maxima och
minima vid functioner af flere variabler, observera vi, att man
i läran om maxima och minima af functioner af en enda reel
variabel, såsom den hittills blifvit framställd, visserligen och
med rätta statuerat, att man, för att finna en functions $F(x)$
alla möjliga maximi- och minimi-värder, har att undersöka
1:o alla de x -värder, som göra derivatan $=0$, och 2:o sär-
skildt alla dem, för hvilka $F(x)$ eller dess derivata icke är
continuerlig (continuerlig, nemligen, i den stränga mening att
den är reel på ömse sidor om den considererade x -värdet)*).
Att man likväl, vid tillämpningen af denna föreskrift, i ett
visst fall underlåtit att fästa tillbörlig vikt vid en omständig-
het, visar sig lättast genom ett enskildt exempel, låt vara, $Ex.$
4 i Hr LINDMANS ofvan citerade uppsats.

Om fråga vore att finna alla de maximi- och minimi-
värder, som functionen

$$\frac{1}{ab} \left(\frac{a^2}{b^2} y^2 + \frac{b^2}{a^2} x^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (a > b),$$

kan erhålla genom reela x - och y -värder, som satisfiera villkoret

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

*) Att functioner finnas, som icke uppfylla detta villkor i granskapet
af en x -värd, för hvilken de likväl äro continuerliga [se min af-
handl. om det Cauchy'ska kriteriet på de fall, då functioner af en
variabel låta utveckla sig i serie etc., införd i Vet. Akad. Handl.
för år 1852], derpå är functionen

$x + \sqrt{x^2 + (x - \sqrt{x^2}) i}$, (neml. i den imaginära enheten),
ett sådant exempel. Den är nemligen continuerlig för hvarje
reel x -värd; för $x=0$ är den själf $=0$, och för hvarje positiv
 x -värd är den reel och $=2x$, men imaginär och $=2xi$ för
hvarje negativ x -värd.



eller, som är detsamma, att finna de maximi- och minimi-valörer, som functionen

$$\frac{1}{ab} \left\{ a^2 - x^2 \left(1 - \frac{b^2}{a^2} \right) \right\}^{\frac{1}{2}} = u$$

kan erhålla genom reela x -valörer, som numeriskt icke öfverstiga den positiva *quant.* a ; så finnes lätt, att, så länge man icke öfverskrider gränserna $x = \pm a$, hvarken u eller den function, som rätt uttrycker dess derivata för hvarje x -valör mellan dessa gränser, upphör att vara continuerlig (i ofvan nämnda strängaste mening)*), och således har man — för att, på sätt hittills skett, tillämpa ifrågavarande föreskrift — allenast att considerera de x -valörer mellan $\pm a$, som göra $\frac{du}{dx} = 0$. Men som blott *en* sådan finnes, nemligen $x = 0$, och deremot svarar maximi-valören $u = \frac{a^2}{b}$; så föranledes man deraf, såsom ock Hr LINDMAN anmärkt, till det falska omdömet, att u icke har någon minimi-valör för något x mellan berörde gränser. — Behörig rättelse härutinnan vinnes genom att så förstå »2:o») i ofvannämnda föreskrift, att man under de deruti antydda valörerna af variabeln subsumerar äfven sjelfva gränsvalörerna $\pm a$, mot hvilka ju i sjelfva verket — alldenstund variabeln sjelf der upphör att existera (för den fråga, som är för handen) — svara veritabla »valeurs d'arrêt» af functionen, ehuru den (så väl som dess derivata) skenbart, d. v. s. då man endast ser på functionens form — utan att göra afseende derpå, att x^2 deruti icke kan öfverstiga a^2 — är continuerlig (i den nämnda strängaste meningen) äfven för hvardera af dessa $x = \pm a$. Genom att sålunda särskildt undersöka de mot $x = \pm a$ svarande functionsvalörerna, finner man nemligen minimi-valören $u = \frac{b^2}{a}$.

Detta enda exempel gör tillfyllest för att angifva den omständighet, hvarpå man i *det fall* att fråga är om finnandet af

*) I sjelfva verket inträffar ju intet afbrott i denna continuitet förrän vid

$$x^2 = \frac{a^2}{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

de maximi- eller minimi-valörer, som en $F(x)$ kan erhålla genom reela x -valörer mellan vissa uppgifna gränser, hittills underlåtit att fästa tillbörlig vikt. Till undvikande af all förvillelse, torde man göra klokast att, för detta fall, till de båda momenterna 1:o) och 2:o) i ofvan citerade allmänna föreskrift bifoga ett nytt moment: 3:o) att särskildt undersöka, om icke mot sjelfva gräns-valörerna af variabeln svarar någon maximi- eller minimi-valör af functionen.

Behandlar man sålunda *Ex. 2* i Hr LINDMANS uppsats, nemligen (efter eliminering af y^2) frågan att finna alla de maximi- och minimi-valörer, som functionen

$$\frac{3}{5}(2-3x) + l(1+x) = u$$

kan erhålla genom reela x -valörer, som icke öfverstiga $\frac{3}{7}$; så erhålles följande resultat:

$$1:o) \frac{du}{dx} = 0 \text{ gifver } x = -\frac{4}{9}, \quad u = 2 + l\left(\frac{9}{5}\right) = \text{maximum.}$$

2:o) Functionen blir discontinuerlig för $x = -1$. Deremot svarar en minimi-valör af $u = -\infty$.

3:o) Mot gränsvalören $x = \frac{3}{7}$ svarar $u = \frac{3}{7} + l\left(\frac{10}{7}\right)$, som afvenledes finnes vara ett minimum, deraf att differensen

$$u_{\frac{3}{7}-\varepsilon} - u_{\frac{3}{7}}$$

är positiv för hvarje positivt ε under en viss gräns, eller (med andra ord) deraf att $\frac{du}{dx}$ för $x = \frac{3}{7}$ har negativ valör.

Och dermed är, som man ser, functionens samtliga maximi- och minimi-valörer, som söktes, funna.

Likaså *Ex. 3* i Hr LINDMANS uppsats, nemligen (efter eliminering af y^2) frågan att finna alla de maximi- och minimi-valörer, som functionen

$$\frac{1}{5}(8-3x) + l(x + \sqrt{1+x^2}) = u$$

kan erhålla genom reela x -valörer, som icke öfverstiga 2. Resultatet blir följande:

$$1:o) \frac{du}{dx} = 0 \text{ gifver } x = \pm \frac{4}{3}, \quad u_1 = \frac{4}{5} + l(3) = \text{maximum},$$

$$u_2 = \frac{12}{5} - l(3) = \text{minimum}.$$

2:o) För hvarje reel x -värde äro så väl functionen som dess derivata continuerliga.

3:o) Mot gräns-värdet $x = 2$ svarar $u = \frac{2}{5} + l(2 + \sqrt{5})$, som finnes vara ett *minimum*, deraf att $\frac{du}{dx}$ för $x = 2$ har negativ värde.

Detta om maxima och minima af functioner af en enda reel variabel. —

Hvad åter beträffar functioner af flere variabler, de må nu vara sins emellan oberoende eller ej, så är redan af det nu anförda tydligt, att i alla händelser, då fråga är att finna alla de maximi- och minimi-värden, som en sådan function kan erhålla genom reela värden af variablerna *mellan vissa uppgifna gränser*, man nödvändigt städse bör i detta afseende särskildt undersöka de functionens värden, som motsvara dessa gräns-värden af variablerna. Derom är dock icke här stället att vidare orda. Tvärtom ville jag, i anledning af de sista orden i Hr LINDMANS uppsats, här fästa uppmärksamheten derpå, att, när vid fråga om maxima och minima af någon function af flere reela variabler *inga* andra förbehåll om dessa variabler eller deras begränsning förekomma än de rent analytiska, som innefattas i de problemet tillhörande villkors-equationer för variablernas inbördes beroende, man icke allenast, såsom Hr LINDMAN med sin vanliga grannlagenhet antyder, *synes* böra, utan verkligen — vid äfventyr att eljest förbigå en eller flere maximi- eller minimi-värden af functionen — nödvändigt *måste* särskildt undersöka, om icke tilläfventyrs någon maximi- eller minimi-värde af functionen motsvarar sådana värden af de såsom independenta antagna variablerna, att för dem, till följe af nyssnämnda villkors-equationer, en eller flere ibland de öfriga variablerna upphöra att vara continuerliga functioner af de förra.

Är nemligen frågan att finna functionens

$$F(x, y)$$

alla maximi- och minimi-valörer för de reela x - och y -valör-
rer, som satisfiera villkoret

$$(1) \quad f(x, y) = 0;$$

så kan man, som bekant är, genom att ur eqvationerna

$$(2) \quad \begin{cases} \left(\frac{dF}{dx} \right) \frac{dx}{ds} + \left(\frac{dF}{dy} \right) \frac{dy}{ds} = 0, \\ \left(\frac{df}{dx} \right) \frac{dx}{ds} + \left(\frac{df}{dy} \right) \frac{dy}{ds} = 0 \end{cases}$$

eliminera den ena af $\frac{dx}{ds}$, $\frac{dy}{ds}$ och genom att derefter sätta den
qvarvarandes coefficient $= 0$, icke med säkerhet finna några
andra af de x - och y -valörer, som kunna göra functionen till
ett maximum eller minimum, än på sin höjd *) dem, för hvilka
 $F(x, y)$ är continuerlig function af den till independent vari-
abel antagna s "); och således för hvilka först och främst
sjelfva x och y äro continuerliga functioner af s (väl förståen-
des continuerliga i den ofvan nämnda strängare meningen).
Följaktligen, om så är att villkors-equationen (1) utvisar, att
den ena af x och y är discontinuerlig för någon ifrågavarande
valör af den andra (t. ex. imaginär för hvarje valör af denna
sednare ofvanom en viss gräns), kan man icke vänta sig, att
denna x - eller y -valör skall finnas genom det ofvannämnda
förfarandet. Och således *måste* man ju, för att icke riskera,
att en eller flere maximi- eller minimi-valörer af functionen
 $F(x, y)$ skola undgå uppmärksamheten, särskildt undersöka icke
blott sådana systemer af x - och y -valörer, som göra sjelfva
 $F(x, y)$ discontinuerlig, utan äfven sådana, för hvilka, enligt
vilkors-equationen (1), den ena variabeln icke är con-

*) Att man derigenom icke ens finner alla sådana, i allmänhet,
utan blott dem, för hvilka äfven derivaten $\frac{dF(x, y)}{ds}$ är continuer-
lig, det är nogsaamt bekant.

**) Complette evidens erhåller detta lilla raisonnement, om man till
independent variabel (s) tänker sig sjelfva x eller sjelfva y antagen.

tinuerlig function af den andra. (Om detta iakttages i de exempel, som Hr LINDMAN anført, så komma inga af functionernas maximi- eller minimi-valörer att förbigås, såsom Hr LINDMAN ock själf i de sista orden antydt).

För vårt föresatta ändamål gör detta tillfyllest. Då likväl Hr LINDMAN, så vidt jag vet, har förtjensten af att först hafva offentligen uttalat här vidrörda dubier, och då — som bekant är — teorien för maxima och minima af functioner af flere variabler, åtminstone då dessa sednare icke äro helt och hållet oberoende af hvarandra, ännu, så intressant den än är, laborerar med åtskilliga bristfälligheter, till följe hufvudsakligen deraf att man i denna del lemnat *continuiteten* nog mycket ur sigte; kan jag icke underlåta att vid detta tillfälle för min del uttala den önskan, att Hr LINDMAN måtte egna detta ämne i sin helhet en fortsatt grundlig undersökning, och densammans resultater vid lägligt tillfälle offentliggöra.

4. *Kemiskt-tekniska försök med lim.* — Hr PALMSTEDT meddelade följande uppsats af Läraren i kemi vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg Hr C. HYLÉN-CAVALLIUS.

1. »En ljum lösning af lim uti 4 à 6 gånger dess vikt vatten coaguleras vid tillsats, i pulverform, af antingen neutralt kolsyradt eller vinsyradt kali, eller ock af neutralt kolsyradt natron, vinsyradt kali-natron, svafvelsyrad talkjord m. fl. salter. Coaguleringen synes i desse fall allenast härröra deraf, att de nämnda, lösliga salterna mekaniskt undantränga limmet ur dess lösning (S. l. n.).

2. Mättas en varm lösning af lim (uti 6 gånger dess vikt eller mera vatten) med något af de följande salterne, nemligen chlornatrium, chlorammonium, chlorbarium, salpetersyradt kali, tvefaldt kromsyradt kali, m. fl., så gelatinerar icke limlösningen vid kallnandet, utan bibehåller sig flytande. Tort lim löses äfven, ehuru långsamt, i mättade lösningar af dessa salter.

3. Försättes en ljum, mycket stark limlösning (1 del lim på ungefär 3 delar vatten) med en koncentrerad lösning af alun eller något annat lerjordssalt, så utfälles limmet partielt såsom en genomskinlig, färglös, styf massa. En mera utspädd, temligen sval limlösning (4 del lim på 12 delar vatten), segnar starkt vid en mindre tillsats af upplöst lerjordssalt. Tillsättes deremot dylikt i större mängd på en gång, så blir verkan mindre märkbar. En ringa tillsats af någon syra, t. ex. ättiksyra, hindrar all verkan af lerjordssalter. Till jernoxidsalter förhåller sig lim på likartadt sätt, som till lerjordssalter, men det utfällda limmet är nu köttfärgadt.

Lerjords- och jernoxid-salters egenskap att coagulera limlösning härrör deraf, att föreningar med limmet bildas, som äro svårslösligare än rent lim. Dessa föreningar skilja sig äfven i andra afseenden ifrån dylikt. De äro nemligen olösliga i mättad koksaltlösning. Försättes derföre en med koksalt mättad limlösning med något upplöst lerjords- eller jernoxid-salt, så uppkommer en ymnig fällning, synnerligast om äfven lösningen af fällningsmedlet mättats med koksalt. I detta fall gifver en lösning, som allenast innehåller $\frac{1}{100}$ lim, en tydlig fällning med alun. Sker utfällandet med ett alunhaltigt afkok på något färgträd, så är limfällningen starkt färgad.

Anm. Utspädda lösningar af de under 1 omnämnde salterna, falla icke en lösning af lim i koksalt. Af detta och andra skäl synes troligt, att de icke förenas med lim.

Anm. Lim, som innehåller lerjordssalt, är föga bindande. Af detta skäl bör vid limkokning alun icke begagnas för klärningen.

4. Försättes limlösning med en mindre quantitet utspädd syra, såsom chlorvätesyra, svafvelsyra, indigosvafvelsyra, salpetersyra, vinsyra, citronsyra, m. fl., så inträffar icke någon yttre förändring hos limmet och detta gelatinerar, såsom vanligt, då lösningen kallnar. Samma förhållande eger rum, om limlösning försättes med upplöst kopparsalt, ehuru limmet deraf blir grönt. Limlösningarne förhålla sig likväl nu i vissa fall annorlunda än en lösning af rent lim. Mättas de nemligen med koksalt, så

uppkommer ett mer eller mindre ymnigt coagulum, som af de färglösa syrorna är ofärgadt, men af indigosvafvelsyran blått och af kopparsaltet grönt. Var tillsatsen af dessa ämnen ringa, så blir härvid vätskan i det närmaste färglös.

Ofvannämnde limfällningar kunna lämpligare erhållas derigenom, att till en klar lösning af lim och koksalt sättes, under omröring, något af de nyes uppräknade syrorna. På detta sätt har ock författaren framställt desamma.

Af dessa fakta vill synas att lim kan direkt förenas med åtskilliga så väl oorganiska som organiska syror, samt dessutom med salter, till sammansättningar, som ofta till det yttre likna rent lim, men skilja sig ifrån dylikt genom olöslighet eller åtminstone mindre löslighet i mättad koksaltlösning.

5. Om lim löses uti t. ex. sex gånger dess vikt af ett starkt afkok på vissa färgträn, såsom gul bresilia, ljung (*Erica vulgaris* L.), fernbock, brun bresilia, m. fl. och derefter limvätskan upphettas under tillsats af upplöst tvefaldt kromsyradt kali, så styfnar den genast till ett mörkt, olösligt gelée. Försättes lim med upplöst svafvelsyrad jernoxidul och sedan med tvefaldt kromsyradt kali, så utfälles limmet såsom en brun, olöslig massa.

Nedställas limskifvor, som innehålla en tillräcklig mängd af ofvannämnde färgämnen eller af svafvelsyrad jernoxidul, uti en kall lösning af tvefaldt kromsyradt kali, så blifver äfvenledes limmet olösligt. Denna omständighet har gifvit anledning till två, af författaren uppfunna snällgarfningsmetoder, färggarfning och mineralgarfning.

6. Kokas limlösning några minuter med släckt kalk, så förlorar den egenskapen att gelatinera, och gifver vid afdunstning en gummilik, färglös massa, som löses i kallt vatten och äfven i mättad koksaltlösning. Sättes något lerjordssalt (alun) till dess lösning i koksalt, så uppkommer ett ymnigt coagulum, hvilket likväl löses i rent, kallt vatten.

Försättes ofvannämnde gummilika lim med en afpassad mängd rent lim, så blifver blandningen till beskaffenheten lik

vanligt draglim. Den gifver nemligen efter torkning en oböjlig, glasig massa, som fugtar under vissa årstider, blir klibbig emellan läpparne (hvarföre den passar till munlim), samt löses till en del i kallt vatten. I vanligt draglim bildas den gummilika inblandningen dels, såsom bekant är, genom den långvariga kokningen vid beredningen, dels äfven genom inverkan af den kaustiska kalk, som finnes qvar i limlädret, så framt detta icke blifvit väl rengjort eller länge förvaradt. Stundom fås limmet icke att stelna. Orsaken tillskrifves då i allmänhet åska i luften, men torde snarare härröra af närvarande kalk.»

5. *Nya svenska Lepidoptera.* — Hr S. M. Adj.

WALLENGREN meddelade genom Hr BOHEMAN följande bidrag till kännedomen om vår Lepidopterfauna.

Oncya v nigrum (FABR.): alis niveis, anticis ad finem cellulæ discoidalis v nigro notatis.

Liparis v nigrum OCHS. Schm. III 200.

Hab. in sylvis Blekingiæ, ut videtur rarissime. In silva fagina ad Sölvesborg specimen unicum, ab avibus insectivoris l. insectis raptatoriis abdomine læsum, die 11 Julii hujus anni inveni.

Luperina testacea (W. V.): alis cinereis, testaceis, maculis ordinariis minoribus, pellidis, ut etiam strigis duplicatis aream mediam terminantibus, fasciaque externa; posticis albis. ♀.

Apamea testacea TREITSCH. Schm. V. 2, 107.

Hab. ad Trolle Ljungby Scaniæ mense Junio rarissime.

Obs. Macula discoidalis obsoleta, de qua TREITSCHKE l. c. mentionem fecit, in specimine meo vestigium nullum reliquit.

Manestra infesta (TREITSCH.): alis anticis supra cinereo fuscoque nebulosis, macula ordinaria rotundata et reniformi albido-cincta, fasciaque postica pallide testacea, bidentata; posticis sordide albis, fascia postica lata fuscescente. ♂♀.

Apamea infesta TREITSCH. Schm. V. 2, 112.

Hab. ad Trolle Ljungby et V. Wram Scaniæ mensibus Junio et Julio rarius.

Cosmia affinis (LIN.): alis anticis fusco-ferrugineis stigmatibus distinctis, puncto nigro notatis, striolis 4 tenuissimis albis ad costam, strigis transversas indicantibus (harum tertia valde angulata), serieque postica punctorum nigrorum, minutissimorum; posticis nigris, basi dilutioribus, flavescentibus, fimbriis flavidis; omnibus infra nigris, marginibus flavidis. ♀. L. al. exp. 27 millim.

Noctua affinis LIN. S. N. I. 2, 848, 144. *Cosmia affinis* TREITSCHKE, Schm. V. 2, 389.

Hab. in Scania rarissime. Ad Trolle Ljungby mense Augusto hujus anni semel capta.

ERASTRIA paula (HUEBN.): capite thoraceque albis; alis anticis albis, griseo-nebulosis, fasciis duabus albo-fuscoque duplicatis; posticis griseis, postice obscurioribus. ♂♀.

Erastria paula TREITSCH. Schm. V. 3, 268.

Hab. ad Trolle Ljungby mense Julio rarius. In area sepulcrali nova, ubi *Gnaphalium arenarium* viget, specimina nonnulla, vespere circumvolantia, collegi.

LAURENTIA aquearia (H. — S.): capite collarique fusco-griseis; thorace albo; alis anticis albis, strigis abbreviatis, confluentibus, fuscis, costa et flamma transversa, in apicem excurrente, fusco-griseis, punctoque discoidali nigro; posticis albidis fusco-undatis. ♂♀.

Acidalia aquata TREITSCH. Schm. VI. 2, 64. *Laurentia aquearia* H. — S. Geom. p. 175.

Hab. in Scania rarissime. Ad V. Wram, in silva fagina, et ad Trolle Ljungby, inter *Sarothamnum scoparium*, mensibus Junio et Julio specimina inveni.

ACIDALIA sylvestraria (BORKH.): alis albis, lineis fusco-flavidis transversis, puncto discoidali nigro plerumque in omnibus, et margine externo interdum nigro-punctato. ♂♀.

Cabera sylvestrata TREITSCH. Schm. VI. 2, 306. H. — S. Geom. p. 23.

Hab. rarius in sylvis Dalecarliæ — Scaniæ mensibus Junio et Julio. E Dalecarlia et Westmannia a Dom. FREDRICHSSON missa.

EUPITHECIA obrutaria (H. — S.): alis anticis fusco-cinereo-alboque stristo-undulatis, margine externo late fusco-cinereo, albo-undulato, posticis albis, late fusco-cinereo marginatis. ♀.

Eupith. obrutaria H. — S. Geom. f. 145. *Geom. piperata* Anglor.

Hab. ad Trolle Ljungby Scaniæ rarissime. Die 29 Junii specimen unicum inveni.

Obs. *Laurentia intricata* ZETT. Ins. Lapp. 962, 6, huic speciei, saltem secundum descriptionem, valde affinis et haud distinguenda.

CIDARIA elutaria (HUEBN.): alis anticis viride brunneis, fascia media maculaque externa dilutioribus, lineola interrupta nigra ad apicem; posticis cinereo-fuscis. ♂♀.

Acidalia elutata TREITSCH. Schm. VI. 2, 20.

Hab. in Scania mense Julio passim.

TORTRIX spectrana (TREITSCH.): thorace dilute cinereo-fusco; alis anticis flavescenti-albidis, atomis fuscis hinc inde adpersis, fascia media, ad marginem interiorem obsolete, maculaque costali fuscis; posticis flavescenti-albidis, postice obscurioribus. ♂♀.

Tortr. spectrana TREITSCH. Schm. VIII, 77. *Tortr. costana* H. — S. Tortr. p. 164.

Hab. ad Trolle Ljungby Scaniz mense Julio rarius. Ad Holmiam in Humulo lupulo a Dom. BONEMAN 7—10 Julii sat frequenter lecta.

TORTRIX diversana (H.—S.): thorace alisque anticis ochroleuco-flavescentibus, maculis duabus costalibus maculaque majore communi, dorsali, fusco-testaceis; posticis infuscatis. ♂.

Tortr. diversana H.—S. Tortr. p. 161 (var. flava).

Hab. ad V. Wram Scaniz rarissime. Specimen unicum die 7 Julii inveni.

EUDOREA sudetica (ZELL.): alis anticis subangustioribus, acutis, canis, fusco lutescentique pulvereis, strigis duabus albis, posteriore serrata sub-arcuata, punctisque duobus signoque 8 nigris griseo expletis; posticis albo-cinereis, striga dilutiore, incompleta. ♂.

Eudorea sudetica ZELLER. Isis 1839. Lin. Ent. I, 304. TENGST. Finlands fjärl-f. p. 102.

Hab. ad Trolle Ljungby Scaniz rarissime. Die 17 Julii specimen unicum cepi.

TINEA spretella (W. V.): capillis lutescentibus; alis anticis pallide flavescentibus, atomis fuscescentibus crebre adpersis, maculisque distinctioribus quatuor fuscis, ciliis costalibus obsolete pallido-strigulatis; posticis cinereis, postice obscurioribus, flavido-micantibus. ♂♀.

Tinea spretella W. V. 142, 10. ZELLER. Lin. Ent. VI, 154.

T. fuscipunctella H.—S. Tineid. f. 300. *Tim. farcitella* W. V. 139, 41.

Hab. in Scania passim mensibus Majo et Junio.

SWANNEDANIA oxyacanthella (MANN.): capillis albis; thorace cinereo; alis anticis fusco-cæsiis, albido subirroratis, macula postica obsoletissima costali albida; posticis cinereis.

Tinea oxyacanthella ZELLER. Isis 1839.

Hab. in foliis Oxyacanthæ ad Trolle Ljungby Scaniz initio Junii rarius.

OECOPHORA arietella (ZELL.): Isis 1839 = *Oecoph. xanthocephalella* WALLENGER. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förhandl. 1852, p. 81.

DEPRESSARIA depunctella (PODEV.): alis anticis flavidis atomis fuscis et ferrugineis, macula ad costam ferruginea obsoleta, fimbriisque rubris; posticis albis.

Hæmylis depunctella TREITSCH. Schm. IX. 1, 260.

Hab. ad Trolle Ljungby Scaniz mense Julio rarissime.

DEPRESSARIA badiella (HUEBN.): capite thorace alisque anticis fusco-corticeis, his atomis albidis obsoletis hinc inde adpersis, puncto obsoleto in medio costisque nigrescentibus; posticis infuscatis, margine anteriore dilutiore.

Hæmylis badiella TREITSCH. Schm. X. 3, 180.

Hab. ad Trolle Ljungby rarissime.

GELECHIA velocella (TISCH.): palpis flavidis, apice fuscis; fronte flavescente; antennis fuscis; alis anticis cinereo-fuscis, costis nigre-

scutibus, fascia postica undulata, subinterrupta, albida, ambriis costalibus albido-strigulatis, punctisque albidis obsolete intra-marginalibus; posticis cinereis.

Gelech. velocella ZELLER. Isis 1839. TENGST. Finl. Fjäril-F. p. 125.

Hab. locis aridis initio Maji. Ad Trolle Ljungby Scaniz sat frequens.

GELECHIA gallinella (TISCH.): palpis fusco-cinereis, apice dilutioribus; fronte subflavescente; antennis fuscis; alis anticis fusco-cinereis, griseo adpersis; punctis minutis albidis obsolete, nigris adjacentibus, hinc inde notatis, puncto nigro distinctiore macula adjacente albida in medio, punctisque seriatis albidis intramarginalibus nigris adjectis, obsolete; posticis cinereis.

Lila gallinella TREITSCH. Schm. IX. 2, 79. *Gelech. gallinella* ZELLER. Isis 1839. TENGST. Finl. Fjäril-F. p. 125.

Hæmylis nubilella ZETT. Ins. Lapp. p. 998, 1 (certe sec. Mus. Zell.)

Hab. in ericetis initio Junii. Ad Gualöf Scaniz parcius. In Lapponia Lulensi et in Ostrogothia, locis aridis DOM. BOHRMAN.

GELECHIA Manniella (F. R.): palpis fuscis; fronte albido; antennis fuscis, apice cinerascens; thorace alisque anticis fusco-cinereis atomis albidis crebre adpersis; his maculis tribus, longitudinaliter positis, albis, areis interjacentibus fuscis, maculaque versus apicem costæ alba; posticis cinereis.

Gelech. manniella ZELLER. Isis 1839.

Hab. ad Trolle Ljungby Scaniz versus finem Junii rarius. In Gottlandia et Smolandia DOM. BOHRMAN.

GELECHIA leucomelanella (ZELL.): palpis albidis; fronte ejusdem coloris; antennis fuscis; alis anticis fusco-cinereis nigro-variegatis, maculis duabus subdorsalibus, triangularibus, cohærentibus, fasciaque postica subinterrupta albis; posticis cinereis.

Gelech. leucomelanella ZELLER. Isis 1839.

Hab. ad Trolle Ljungby, Gualöf et Ilvetofta Scaniz mense Junio non infrequens. In Smolandia, Lapponia Lulensi et ad Holmiam DOM. BOHRMAN.

GELECHIA galbanella (F. R.): palpis antennisque fusco-cinereis; alis anticis micantibus, orichalceo-osseis, punctis duobus atomisque fuscis adpersis, fascia postica flavida, obsoleta; posticis cinereis.

Gelech. galbanella ZELLER. Isis 1839. *Gelech. serrulatella* TENGST. Finl. Fjäril-F. p. 128?

Ad V. Wram Scaniz initio Julii semel lecta. Prope Holmiam DOM. BOHRMAN.

GELECHIA tenebrella (HUEBN.): palpis, capite, antennisque fusco-viridibus, nitentibus, his apud feminam apice niveis; thorace chalybeo; alis anticis fuliginosis, cupreo-micantibus, certo situ chalybeo-nitentibus; posticis fuscis.

Gelech. tenebrella TENGST. Finl. Fjäril-F. p. 132. *Tinea tenebrella* HUEBN. Tin. t. 65, f. 434 (mas, non fem. ut TREITSCH.

voluit.) *Oecophora tenebrella* TAYLOR. Schm. X. 3, 216 ♂.
Gelechia tenebrella ♂ et *Gelechia tenebrosella* ♀ ZELLER. Isis
 1839.

Hab. in pratis Scaniae medio Junii haud infrequens.

Obs. *Gelechia tenebrella* HUBN. est mas et *Gelechia tenebrosella* F.
 R. est femina ejusdem speciei, ut e copulatione, a me
 saepe observata, satis apparet. Dom. TENGSTROM jam an-
 tea idem observavit.

GELECHIA dimidiella (HUBN.): palpis, capite, thoraceque flavis; antennis
 fuscis; alis anticis flavis, punctis duobus minutissimis fuscis in
 disco, striga costali, pone medium alae desinente, margineque toto
 postico late fusco-brunneis; posticis fuscis.

Gelechia dimidiella ZELLER. Isis 1839.

Hab. ad Trolle Ljungby rarissime. Tantum semel capta.

GELECHIA inopella (ZELL.): palpis capiteque albidis; antennis albedo-ci-
 nereis; thorace albedo, flavide-maculato; alis anticis albidis, sto-
 mis fuscis parce adspersis, flavedine densae strigulatis; posticis
 cinereis.

Gelechia inopella ZELLER. Isis 1839.

Hab. ad Trolle Ljungby initio Junii non infrequens.

GELECHIA naviferella (ZELL.): palpis antennisque fuscis; capite thorace-
 que brunneis, nitidis; alis anticis fusco-castaneis, aureo-micanti-
 bus, fasciis transversis subtribus, obsoletissimis, argenteo-submi-
 cantibus, macula dorsali majore maculaque postica in disco mi-
 nore croceis, maculaque costali versus apicem alae flavida; posticis
 fuscis.

Gelechia naviferella ZELLER. Isis 1839. DOUGL. Transact. I, 61.

Hab. ad Gualöf Scaniae mensibus Junio et Julio ($\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$) rarissime.

COLEOPHORA albicans (ZELLER): antennis totis albidis (non fusco-annula-
 tis) sine penicillo; palporum fasciculo tertiam articuli terminalis
 partem aequante; alis anticis albidis, passim fusco-squamulatis,
 costis dilatatis obsolete lutescentibus apice subobscurioribus, li-
 nea costali tenui albidior.

Coleoph. albicans ZELLER. Lin. Ent. IV, 372.

Hab. ad Trolle Ljungby medio Junii rarissime.

Obs. Interstitia alarum anticarum nunc obsoleta nunc di-
 stincta variant.

BUCCULATRIX cristatella (F. R.): capillis luteis, per medium fuscis; an-
 tennis griseis, conchula modica, dilute grisea; alis anticis griseo-
 scentibus, sericeis; posticis cinereis.

Bucculatr. cristatella ZELLER. Lin. Ent. III, 300.

Hab. ad Trolle Ljungby Scaniae rarius. Ad aream sepulcralem
 novam, locum arenosum, lichenibus repletum, medio Junii a
 me capta. Prope terram sole occidente circumvolat.

PTEROPHORUS mictodactylus (W. V.): alis anticis fuscescenti-cinereis, an-
 tice obscurioribus, striola in medio, macula diffuente ad fissu-

ram lineolaque laciniae anterioris longitudinali nigro-fuscis; digiti tertii ciliis breviusculis.

Pteroph. mictodactylus ZELLER. Lin. Ent. VI, 358.

Hab. ad Trolle Ljungby initio Junii rarius. In prato nunc exarato specimina nonnulla anno præterlapso collegi.

6. *Nya svenska Homoptera.* — Hr BOHEMAN inlemnade en af Studenten CARL STÅL under förestående titel författad uppsats:

»Oaktadt de många bidrag, som i sednare tider blifvit lemnade till kännedomen af de svenska Hemipterarterna, påträffas dock understundom ännu nya, serdeles bland Homoptera. Då i år några nya arter af sistnämnde grupp blifvit upptäckta, och ett par förut finnas i Riks-Musei och min samling, får jag här på dessa lemna beskrifningar:

1. *DELPHAX smaragdula*: elliptica, pallide virescens; vertice producto, antennis pedibusque dilute flavescens; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, apice late rotundatis, albidis. ♀. Long. 5, Lat. $1\frac{1}{2}$ Millim.

Ad Experimentalfältet prope Holmiam specimina sex a Dom. BOHEMAN capta.

Feminæ *Delph. truncatipennis* statura similis. Pallide virescens. Caput thorace angustius, antice productum, angustatum, postice sinuatum, basi bifoveolatum, supra utrinque carinatum, carinis antice convergentibus; fronte reclinato-declivi, plana, tricarinata; oculis sat magnis, irregulariter reniformibus, fuscis, postice glaucescentibus. Antennæ capitis longitudine, pallide flavescens, seta fuscescente. Thorax antice productus, angustatus, lateribus obliquis, paullo rotundatis, postice sinuatus, supra convexiusculus, longitudinaliter tricarinatus, basi biimpressus. Scutellum magnum, late triangulare, convexiusculum, dorso longitudinaliter tri-carinatum, lateribus leviter sinuatum, apice acutum. Hemelytra oblongo-quadrata, ante medium abdominis abbreviata, apice extus lata, intus magis rotundata, albida, nervis distinctis, elevatis, margine toto dilute lutescente. Abdomen supra segmento singulo apice dilute flavomarginato; pectus læte virescens. Pedes pallide flavescens; tibiis posticis dilute virescentibus; unguiculis infuscat.

2. *DELPHAX sordidula*: pallide flavescens; capite, thorace scutelloque albido-tricarinatis; fronte utrinque infra oculos puncto nigro; vertice thoraceque bifoveolatis; hemelytris abdomine multo brevioribus, albidis, margine dilute flavescens, apice rotundatis; pectore plus minus nigro-vario; abdomine in mare nigricante,

linea dorsali margineque flavescens, in femina plus minus nigrovario. ♂. Long. $3\frac{1}{2}$, Lat. $1\frac{1}{2}$, ♀. Long. 4, Lat. $1\frac{1}{2}$ Millim.

In Uplandia ad Upsalam loco arido minus frequenter legi; prope Holmiam ad Bellevue a Dom. BOREMAN etiam capta.

Delph. collina simillima, at major. Caput antice productum, sub-obtusum, pallide testaceum; vertice basi foveolis duobus, transversim positis, antice carinis quatuor, mediis approximatis; fronte rostrique basi tricarinatis, hac utrimque infra oculos puncto nigro; oculis fusco-cinereis. Antennae extus sensim incrassatae, testaceae, seta dilute fuscescente. Thorax brevis, antice productus, rotundatus, pallide testaceus, albido-tricarinatus, carinis lateralibus obliquis, obsoletioribus, media recta evidentiore, utrimque foveolatus. Scutellum late triangulare, tricarinatum, apice attenuatum, medio albidescens. Hemelytra ovalia, abdomine breviora, albido-hyalina, pallide flavomarginata. Pectus nigrovarium. Abdomen maris nigricans, linea dorsali margineque flavescens, feminae plus minus nigrovario. Pedes pallide testacei; tarsi apice infuscati.

Variat femina fere tota dilute flavescens.

3. *DELPHAX collaris*: nigrofusca, subnitida; capite albido-quadricarinato; thorace postice albido, hemelytris abdomine dimidio fere longioribus, apice rotundatis, sordide albido-hyalinis, fusconervosis; pedibus pallide testaceis, dilute fuscovariis. ♂♀. Long. 4, Lat. 1 Millim.

In Gottlandis, Dom. BOREMAN et ipse. In Uplandia etiam, rarius tamen, a me lecta.

Colore corporis *Delph. moesta* similis. Caput testaceum, albido-quadricarinatum, rostro basi tricarinato, oculis fusco-grisescens. Antennae testaceae, seta dilute fuscescente. Thorax brevissimus, antice productus, subrotundatus, tricarinatus, postice late albomarginatus. Scutellum magnum, nigrofuscum, subnitidum, subtiliter confertim punctulatum, lateribus anguste apiceque sordide albidis, medio leviter carinatum. Hemelytra abdomine dimidio longiora, sordide albido-hyalina, nervis margineque imo dilute fuscescentibus. Abdomen nigricans, subtus margine obsolete sordide flavovario. Pedes pallide testacei, dilute fuscovariati; tarsi apice fuscis.

4. *ATHYSANUS obtusifrons*: oblongus, fuscus (♂), vel pallidus (♀); capite obtuse triangulari, antice inter oculos nigro; thorace antice scutelloque flavescens, vittis duabus fuscis; hemelytris flavonervosis, interstitiis fusco-ocellatis (♂), vel pallidioribus (♀). ♂ Long. 5, Lat. $2\frac{1}{2}$. ♀ Long. 6, Lat. $2\frac{1}{2}$ Millim.

In Scania ad Landscronam individua plura d. 4 Aug. a me lecta.

Sat magnus, *Athysano grisescens*, *transverso* et *plebejo* certe affinis, ab omnibus tamen capite magis obtuso, ut et colore certe distinctus. Caput breve, latum, apice obtuse triangulare, griseo-flavescens; vertice apice linea transversa arcuata nigra; fronte in mare nigrobrunneo, medio transversim subtiliter luteolineato,

in femina dilutiore; oculis ovatis, fuscis. Antennæ testaceæ, seta fusca. Thorax brevis, transversus, antice rotundatus, postice late leviterque sinuatus, antice flavescens, utrimque striga parva transversa nigra, postice fuscescens, vittis quatuor longitudinalibus obscurioribus. Scutellum magnum, triangulare, vittis tribus fuscis. Hemelytra deflexa, apice rotundata, in mare abdomine longiora, pallido-nervosa, interstitiis fuscis, medio dilutioribus, apice fumata; in femina abdominis longitudine, similiter picta ac in mare, at dilutiora et absque fuscescentia apicis. Corpus maris sublus nigrofuscum, feminae fuscovariegatum. Pedes testacei, parce fuscovarîi; tarsis fusco-annulatis.

5. *TYPHLOCTBA pictilis*: albida, nitida; capite triangulariter producto, vertice, prothoraceque lateribus anguste nigromarginatis; hemelytris basin versus vitta obsolete fuscescens, medio margine lineâ obliqua fusca, apice fuscolineatis, et maculatis; abdomine flavescens, supra nigrovario; tibiis posticis tarsisque omnibus apice fuscescentibus. ♀. Long. 4, Lat. 1½ Millim.

Specimen unicum d. 24 Juli a Dom. BOHEMAN loco umbroso ad Experimentalfaltet prope Holmiam lectum.

Species elegantissima et distinctissima. Caput antice triangulariter productum, apice subobtusum, albidum, antice anguste nigromarginatum; oculis fusco-glaucescentibus. Antennæ capite cum thorace nonnihil longiores, albidæ, seta extrorsum dilute fuscescens. Thorax latitudine vix dimidio brevior, antice productus, rotundatus, postice levissime sinuatus, convexiusculus, albidus, lateribus anguste nigromarginatus. Scutellum magnum, late triangulare, sordide albidum, basi lineis quatuor sat latis, longitudinalibus, dilute fuscis. Hemelytra corpore dimidio longiora, albedo-hyalina, certo situ dilute fusco-aurescentia, vitta obliqua basali, ante medium abbreviata margineque interiore basin versus dilute fuscescentibus; medio lineâ obliqua, curvata, apice lineis quinque obliquis maculis duobus, quarum una in margine interiore longe pone medium, altera apicali, fuscis. Abdomen dilute flavescens, supra fuscovarium. Pedes albidî; tibiis posticis imo apice tarsisque omnibus art. ultimo fuscis.

6. *TYPHLOCTBA placidula*: dilute flavescens; capite triangulariter producto, supra macula irregulari nigropurpurea; thorace medio vitta lata sordide purpurascens; hemelytris vitta suturali mox pone medium abbreviata, dilute rubescens; abdomine supra nigricante. ♀. Long. 3, Lat. ¾ Millim.

In Scania Dom. BOHEMAN.

Caput antice triangulariter productum, subobtusum, flavescens, supra basi macula subquadrata cum alia minore apicali, fere cruciata, confluenta, nigropurpureis. Antennæ flavescens, seta dilute fusca. Thorax latitudine vix dimidio brevior, convexiusculus, dilute flavescens, antice productus, leviter rotundatus, postice truncatus, medio vitta lata, sordide purpurascens. Scutellum triangulare, nigropurpurascens. Hemelytra albida, hyalina, basin

basin versus flavescentia, vitta sat lata suturali, mox pone medium desinentes, dilute rubescente. Corpus subtus dilute flavum, abdomen supra nigricans, limbo latius, segmentorumque apicibus anguste flavescentibus. Pedes dilute flavescentes.

7. *TYPHLOCTYA Wallengreni*: pallide flava; capite antice subrotundato-producto; thorace latera versus dilute fusciscente; hemelytris ad basin macula oblonga, obliqua, medio margine macula irregulariter quadrata, fasciaque lata intra apicem dilute fusciscentibus. Long. $2\frac{1}{2}$, Lat. $\frac{3}{4}$ Millim.

In Scania. Dom. WALLENGREN.

Caput antice late triangulariter productum, lateribus leviter rotundatum, dilute flavum, oculis brunnescentibus. Antennæ flavescentes, seta obscuriore. Thorax latitudine dimidio brevior, dilute flavescentia, latera versus vitta latiore dilute fusciscentia. Scutellum triangulare, basi dilute fusciscentia. Hemelytra albidia, hyalina, nervis sat validis, pone basin vitta obliqua abbreviata, pone medium macula laterali irregulari, apice macula majore transversa, alias nonnullas minores albidias includente, fusciscentibus. Corpus dilute flavum. Pedes flavescentes, tarsis apice obsolete fuscis.

7. *Bref från resande naturforskare.* — Hr WAHLBERG meddelade följande utdrag ur tvenne bref från Hr Mag. N. J. ANDERSSON, det ena dat. Capstaden den 9 April, det andra Plymouth den 9 Juni detta år.

»Medan vi befunno oss i China (den 9—28 Decemb.) herrskade der den för blommorna ogynnsamma vintern. Vål märktes detta föga på skogarne och lunderna, som ännu bibehöllo sin täta gröna dräkt, fastän höstens rödt och gult skimrade fram mellan löfhalvfen här och der. Men så mycket ögonskenligare blefvo årstidens härjningar då botanisten på marken sökte spåren af den Flora, som smyckar dessa trakter under skönare och gynnsammare årstider. Der stodo nu blott några höstlikt afbitna, halft förvissnade qvarlevor, endast ormbunkarne, gräsen och några cosmopolitiska Compositæ höllo sig manhaftigt, och *Ixora* lyste röd på Chinesernas grafvar. Kring

Wampoa, hvarest fregatten låg förtöjd mesta tiden, och kring Canton, dit jag några gånger i båt begaf mig, var det mig för innevånarnes afvoghet näppeligen möjligt att göra några utvandringar mera än på vallarne invid stranden och risfälten och de allranärmast liggande kullarne, som, ehuru annars kala, syntes gröna af *Pinus sinensis*. Om dagen var hettan olidelig, om natten nedgick den till 8° C. Men kring Hongkong egde jag frihet att löpa på bergens toppar och branta sidor, i dalarna mellan dem och de små slätterna. Der sammanbragtes ock en liten collection, som ytterligare ökades genom bidrag af en Hr BOWRING, som äfven sänder en samling af de trakten egendomliga insekter och lofvat mera, om han från oss erhöle nordiska Coleoptera, särdeles Carabici. OSBECK har i sin ännu för närvarande tid mästerliga resebeskrifning temligen fullständigt omnämnt Florans fysiognomi i dessa trakter, så att en recapitulation deraf här synes mig öfverflödig.

Tio dagar (d. 4—14 Januari) qvarlåg vi i Manila. Derunder företog jag en lång och visserligen särdeles kostsam, men högst intressant färd, så långt den knappa tiden medgaf att komma i det inre af denna herrliga ö, än hvilken jag knappast sett något mera storartadt. Jag begaf mig uppföre floden Pasig, som genomströmmar Manila, öfverfor dess källa, den ofantliga insjön Laguna di Baji, och genomkorsade de höga bergstrakterna (ända till 6000 fot höga) och de vidsträckta skogarne och slättmarkerna söder om densamma. Vegetationen är här i högsta grad tropisk; allt blott väldiga träd och yfviga buskar, utan åtkomliga blommor, en förvånande rikedom på Palmer, Calami, Aroideer och parasitiska Orchideer (men ej nu i utveckling), Bambuser och sköna Ormbunkar m. m. Vädret var hela tiden oupphörligt regnigt; jag måste färdas till häst, kunde transportera blott litet papper, hade svårt om utrymme i kojorna och tid om qvällarne, fick samla litet i blomma och det jag fick föll som vanligt härute sönder under pressningen, så att huru mycket jag såsom betraktare njöt af den storartade och undersköna naturen, så föga måste jag såsom insamlare

vara belåten med min utflygt. Men det var nödvändigt att alltså sig från trakten af hufvudstaden, der allt är odladt.

MEYEN har lemnat fullständiga vegetations-skildringar af Philippinernas vegetation, CUMING har till Europa öfverfört rika blomsterskatter derifrån, och MANUEL BLANCO deröfver lemnat en fullständig Flora. Mycket nytt finnes således här troligen icke, eller mycket obekant att härom säga, men få länders växtverld erbjuder så intressanta betraktelseämnen som dessa öars, ty den är en sammansättning af Oceaniens, Chinans och Ostindiens Floror. Den företer också det i tropiska trakter allmänna förhållandet, att vara ytterst mångformig, ega få arter fördelade på många släkten och familjer. Öarne hysa nemligen icke mera än 1034 species, men dessa höra till 557 genera och af de sistnämnde finnas 334, som blott representeras af en art. Bland de mest intressanta observations-ämnena är utan tvifvel att tillse vegetationens förändring från slättlandet mot de höga bergstopparne, något hvarifrån jag var förhindrad. Rikedomen på skiljda lokaliteter är här särdeles stor och detta inverkar naturligtvis på vegetationens hela skiftande mångfald. — En framställning af Philippinernas växtgeografiska egenheter skulle vara ett viktigt arbete; få se om de bidrag jag dertill i land och på lediga stunder om bord samlat, kunna leda till något resultat.

Vi anlände till Singapore den 25 Jan., och samma dag nödgades jag intaga sjukbädden och var således urståndsatt att se något af den på ön varande vegetationen. Alldeles utan representanter från Singapore-floran är jag dock icke; jag utsände nemligen en dag mina vanligen på excursionerna åtföljande karlar och dessa sammanbragte flera vackra saker. In i skogarne och busksnåren vågar sig ingen för de här ymniga tigrarne, och Floran är till följe deraf ännu ej särdeles undersökt. Vi afseglade d. 30 Januari.

Ungefär på samma sätt gick det mig i Batavia, hvarest vi vistades d. 4—13 Febr. Jag var visserligen nu qvitt se-

bern, men så matt och plågad af magkrämpor, att jag fann det nödigt för mig att flytta i land och inandas den stärkande helsosamma landtluften. Mina få utvandringar i stadens omedelbara närhet vore naturligtvis ytterst litet gifvande, eftersom hvarje fläck der är odlad. Jag fick således se nästan intet af Javas herrliga natur, särdeles som jag ej egde krafter att medfölja på en utfärd till Buitenzoorg, der en stor vidtberömd botanisk trädgård och en liten samling af Javas vilda djur finnes midt ibland de skönaste, rikaste dalar och brinnande skyhöga vulcaner. Mina samlingar härifrån kunna således, lika som från Singapore, ej vara annat än obetydliga.

Nästa ställe vi besökte var Keeling — l. Kokosöarne (d. 23 —25 Febr.). Det var första gången under resan vi besökte en verklig atoll, och der jag kunde få något begrepp om växtligheten på korallöar så här i vester, nära Ostindien. Lagunen, af en 4—6 eng. miles längd, omkransades af större eller mindre högst en half eng. mil breda, låga och platta holmar, ända till oegnomtränglighet bevuxna af gamla och unga kokospalmer. Sedde på afstånd sågo de visst inbjudande ut i vegetativt hänseende, men närmare undersökte egde de ingen annan än enformighetens och fattigdomens märkvärdighet. Till de af DARWIN observerade 22 växterna kunde jag icke lägga mera än fyra, ty jag blef första dagen af solhettan så uppbränd, att jag fick ligga i olidlig sveda en vecka till sängs och ej kunde andra dagen gå i land att komplettera iakttagelserna. Märkvärdigt är, att alla här förekommande växter härstamma från Sumatra eller Java och gjort färdan hit på det sätt, att de med den ena monsunen först vaggats till nordvestkusten af Nya Holland, och sedan med den andra hit. — Större samlingar gjorde Dr KINBERG af snäckor, insekter (mera än 30 togos, DARWIN uppgifver blott 13), fiskar och lägre sjödjur. Ett etablissement för kokosolje-beredning finnes här, egdt af en engelsman, Kapt. Ross, som sysselsätter 300 malajske arbetare.

Afsigten var först att från dessa öar gå rakt till Cap, men sedan vi seglat i denna kurs ungefär fjorton dagar bröts

den plötsligen af och fregatten vändes mot Mauritius. Vi fingo ön i sigte d. 12, men inkommo ej förr än d. 14 Mars, i Port Louis och qvadröjde der endast tre dagar. Att derunder något bevändt och dugligt kunde uträttas var omöjligt. Mauritius är både på afstånd och nära sedd nära nog den älskligaste och täckaste lilla fläck jag sett. Den utgöres af tre afdelningar: 1) den mot hafvet sluttande, i norr mycket utvidgade och utplattade strandremsan, öfversållad af de skönaste odlingar och boningar; 2) bergen, som med nära 3000 fot höga toppar (La Pouce, Petter Botte &c.) lik en skyhög mörk, men oändligt pittoresk ram omsluter 3) en cirkelrund 300 fot öfver hafvet belägen högslett, yppigt odlad som ett af Englands herrligaste landskap, och skönt så som det endast under tropikernas sol kan vara det. Fordom odlades kaffe, muskot, ingefära, m. fl. kryddväxter, men nu endast sockerrör, hvaraf plantager inalles producera öfver 70,000 $\%$ om året. Vegetationen på slättlandet är naturligtvis förträngd af de odlade fälten, på hvilka och från hvilka en mängd invandrande växter spridt sig öfver ön; men betesmarkerna öfverflöda på gräsarter och Mimosæ och på bergens sluttande, tätt skogbevuxna sidor har man en rik och yppig Flora. Anmärkningsvärdt är att jag på intet af oss besökt ställe längre öster ut anträffat så många gamla bekanta från Galapagos-örarne som här, visserligen ej många! Hvad som dernäst är intressant är, att man inom ett par eng. mils distans har tillfälle att så märkbart se huru växtligheten i dessa klimater skiftar med tilltagande höjd. Nedst är det trädartade Leguminoser, Palmer och en intrasslad mängd Pandani (30 st.), längre upp äro Myrtaceerna öfvervägande, så komma (vid 1500 fots höjd) de resliga trädartade Ormbunkarne, som här voro de vackraste jag någonsin sett, och Orchideerna; derpå följer en region med ganska förkrympta dvergträd, mest Rubiaceæ, och sist på bergens hjessa och toppar en Ljungart, Junci och små Scirpi.

Port Louis eger en Vetenskaps-Societet med ett ganska godt Museum. Dess föreståndare är W. M. BOJER, om hvars



vetenskapliga förtjenster endast det torde böra erinras, att han är den, som här ordnat den bot. trädgården och Museum. Han är nära nog den ende, som botaniserat på Madagascar och Bourbon (tre gånger) och har skrivit en Flora öfver Mauritius »Hortus Mauritanus». Han yttrade sig gerna vilja mot svenska och europeiska lemna växter från dessa trakter. I hans sällskap besökte jag den sju mil aflägsna i Pompelmous distrikt belägna botaniska trädgården, en ypperlig, ja förvånande anläggning, som innesluter de flesta Javas, Ostindiens, Madagascars, Sechellernas m. fl. ögrubbers märkvärdigheter och underhålles med 24,000 R:dr sv. årligen. Föreståndaren, M:r DUNCAN, gaf mig en samling af 400 frösorter, mest från Madagascar. Nära derintill är Paul och Virginies graf, — jag kunde ju ej underlåta att äfven besöka den.

Vi ankommo till Cap just i brytningen mellan tvenne, af intet hvardera utmärkande skiljbara årstider, den torra nemligen och den regniga, hvilken sednare här med Måj månad inträder. För ett studium af vegetationen var denna tid den mest ogynnsamma, och fastän i detta subtropiska klimat växtlifvet väl aldrig totalt slumrar, utan ständigt visar åtminstone några spår af sitt nescit occasum, så var det dock märkbart, att blomstergudinnan, nu i sin torftigaste och svårmodigaste skrud, halförtorkad och utblottad på fägring »bad till himmelen efter regn.» Vi qvarlägo från d. 9 till d. 21 April, och detta uppehåll begagnade jag, så vidt det var mig möjligt, att i Capstadens närhet bestiga de skyhöga bergen och något längre bort ifrån densamma undersöka slätterna och höjderna invid småstäderna Stellenbosch och Simonstown. Med undantag af fyra dagar, då, liksom under högvintern, det ena skyfallet efter det andra nedstörtade, gynnades jag hela tiden af den herrligaste varmaste väderlek.

Goda Hoppsudden bildar yttersta spetsen af en triangulär lång och smal landtunga, i vester badad af Atlantiska oceanen, i öster sköljd af den vidsträckta False bay; basen omgifves af Table bay invid Capetown. Hela denna halfö är

ytterst bergig och ifrån Table bay — der Taffelberget, Djefvulsberget och Lejonberget stå såsom de trenne sidorna af en djup krater, hvori, invid hafskanten, staden ligger — sluttar den höga fjellkammen ut till Goda Hoppsudden. Ungefär på midten af denna halfös östra kust invid False bay är den lilla staden Simonstown belägen, en ypperlig hamn för den här stationerade engelska flottafdelningen. Nedanför dessa bergklumpar, inåt landet till, är en enda snart sagdt omätlig slätt, som i öster och vester sträcker sig längre än ögat förmår öfverskåda, men mot nordost begränsas af den ena bergskedjan efter den andra med skyhöga, spetsiga, sonderkarfvade toppar och mellanliggande djupa dalar. Invid foten af dessa berg ligger den täcka, angenämt lummiga, helt och hållet gammaldags holländska staden Stellenbosch. Sådan är fysiognomien af Caps föga angenäma omgifningar, hvilka jag under mitt vistande besökte och hvars vegetation jag nu närmare skall omtala.

De yttersta delarne af Capstaden äro fulla af ganska täcka trädgårdar; gatorna äro planterade med alléer af Populus, Ek och Casuarina — ett vackert möte af nord och söder — och utanföre de längst ut belägna husen ser man små gröna täppor af flera vanligare blomsterväxter, buskager af den resliga *Nicotiana glauca* och en och annan Dadelpalm. Vinrankan slingrar sig inbjudande utanföre verandahspaliererna och allt här i allmänhet ett af hortikulturens välsignelse försköndadt och förädladt utseende. Flera offentliga trädbevuxna platser finnas, jemte en s. k. botanisk trädgård, som dock egentligen är endast en utomordentligt täck och väl underhållen engelsk park och promenadplats, der man med det omätliga hafvet framför sig och det höga, dystra Taffelberget öfverhängande bakom sig, i många hänseenden finner behagliga ögonfägnader. Den nu döde Baron Luvvigs trädgård, förr så välbekant äfven för Europas botanister, är nu raserad och öfvergifven. Följer man de präktiga vägarne, som från staden slingra sig genom dess närmaste omgifningar, så vandrar man förbi flera af dessa engelska land-cottages der husens behagliga arkitektur, träd-

gårdarnes snygga och nätta prägt, med ett ord allt talar om komfort och njutning deraf. Häckar af ett par *Opuntia*-arter, *Foucroya* och *Agave*, *Cassia* och *Acacia capensis* gifva landskapet ett slags tropiskt utseende, som det dock helt och hållet förlorar, när man med mera uppmärksamhet vandrar öfver de sterila backarne och de nakna bergsslutningarne, der, åtminstone nu, en särdeles torr och stickande risig vegetation gör gåendet enformigt och mödosamt. Dessa backar, som kring Cap egentligen ingenting annat äro än de ojemna slutningarne af de trenne förutnämnda kring staden halfcirkelformigt ställda bergen, äro på sin nedersta region be vuxna af temligen vidsträckta barrskogs-planteringar i stora fyrkanter, hvilka på afstånd se särdeles reguliera ut, annars utgöres trädvegetationen af några popplar och *Alnus glutinosa* kring loppet af ett par små bäckrännilar, i hvilka stå *Cyperus textilis*, en *Patamogeton*, *Canna indica* och *Aristea eriophora*, *Kigillaria africana* i stenrösen jemte *Virgilia africana*; de större busksnåren bildas af arter af *Rhus* (mest *lucida*), *Psoralea pinnata*, *Celastrus pyracantha*, *Phylica buxifolia* och de lägre af *Rubus rosæfolius* (som ock var allmän på Mauritius) och ett par *Brunonia*-arter, mellan hvilka marken för öfrigt betäcktes af diverse *Mesembryanthema*, flerfaldiga högst kuriösa *Restio*-arter, *Oxalis grandiflora*, den högröda praktväxten *Leonotis Leonurus*, *Solanum sodomæum*, *Physalis somnifera*, arter af *Chenopodium*, *Scirpus*, *Cyperus* och *Juncus*, samt *Cynodon dactylon* och några få *Panicum*. De högre slutningarne af dessa torra backar, omedelbart nedanför bergens brant nedstupande sidor, hafva en alldeles egen blågrå färg af den silfverbladiga *Protea argentea*, som der, i träd af ofta 30 fots höjd och deröfver, och med mer än manstjocka ringlade stammar, bilda mer eller mindre täta skogar, der för öfrigt *Royena glabra*, *Indigofera cytisoides*, *Protea canescens* och *incompta*, *Polygala myrtifolia*, *Leucadendron adscendens*, *Muraltia Heisteri*, *Myrtus communis* och *Salvia paniculata* bilda den tätare buskvegetationen, bland hvilka följande lägre örter äro de allmännaste: en slingrande buskartad

Asparagus, *Phusanus compressus*, en *Bubon*, trenne *Thesia*, *Gomphocarpus arborescens*, ett par *Gnidiæ* (särdeles *G. aurea*), *Restiones* och *Ficinia*, den gullgula *Euriops abrotanifolia* och ett par *Seneciones* (mest *rigidus*), *Stapelia variegata* och *Euphorbia Caput Medusæ*, *Oxalis livida* och *falcata*, flera *Diosmæ* särdeles *D. alba*, *Polygala Garcini* och tvenne *Sisyrinchia*, ett stort antal *Stoebe*arter, en *Stipa*, *Lobelia lutea* och *pinifolia*, den täcka *Gladiolus brevifolius* och den prydliga *Hæmanthus coarctatus*, af ormbunkar *Lomaria capensis*, *Pteris capensis* och högre upp *Allosorus hottentottus*, *Schizea tenella* och *pectinata* samt *Todea africana*. Här är nästan rätta lokalen för ett stort antal vida tufvor bildande skönlommiga *Ericæ* (*Chimochilus*, *Blæria*) ehuru flertalet af dem ej nu var i blomma. Slutligen uppe på bergets (jag talar här egentligen om Taffelbergets) som ett dansgolf flata topp, som täcktes af sönderspruckna hållar, på hvilka man lika tydligt som på stenarne nere vid stranden ser spår af hafvets frätande förmåga, finner man inga buskar eller träd mera, men åtskilliga egendomliga *Ericæ* (*flava*, *flabellaria*), ett par *Osteospermæ*, flera *Helichrysa* (mest *multiflorum*), *Othonna pectinata*, *Selago corymbosa*, *Disa grandiflora*, flera egna *Restiones*, en *Villarsia*, *Arnica tabularis*, *Protea acaulis*, *grandiflora* och den väldiga *cynaroidea*, ett par *Cotyledon*-arter, tre *Hermas*-arter, *Prismatocarpus nitida* och en *Wahlenbergia*. Man ser häraf, att i afseende på släkten och arter äro *Compositæ* särdeles öfvervägande, då deremot vegetationens physiognomi alldeles bestämmes af *Proteaceæ*, *Ericineæ*, *Restiaceæ*. *Liliaceernas* tid var redan förbi. Öfverensstämmelsen med Sidneys *Proteaceer* och *Epacrideer* är visserligen i ögonen fallande; här såsom der utgöres allt af torra, stickande, till örten obehagliga växter, men blommorna stråla af de mest bländande färger, ehuru nu årstiden var så ogynnsam för deras rätta fördelaktiga exposition, och man endast kunde svagt ana huru skiftande och praktfull den växtmatta måtte vara, som här under sommarmånaderna sveper in berg, dal och slätt.

Nu var gult särdeles öfvervägande, här och der uppblandadt med något lysande rött.

Så torra och sterila som bergen äro på sina toppar och den vestra sidan, äro de ej på den östra. Der samla sig regnmolnen oftare och tätare, och derifrån nedströmma följaktligen strida och mera vattenfyllda bäckar, vattnande och upplifvande den underliggande närmaste trakten, hvilken ock beklädes af en grönskande lummighet, så skuggrik och yfvig, att man ej tror det vara sannt att detta är Cap. Herrliga dungar af Pinus och Casuarina, väldiga alléer af vår Quercus, bland hvilka ett par nyholländska Eucalypti (som här på 6 år skjuta upp till 20 alnars höjd) bilda dessa svalkande lundar, hvilka dock ej skulle funnits här, om ej människans hand ursprungligen planterat dem. Bland andra täcka landtgårdar, tillhörande Capstadens förnäma och rika, som här gömma sig under löfhalvven, är ock Mariadal, vår allmänt värderade Consul J. LETTERSTEDTS egendom, hvarest jag uppehöll mig ett par dagar, men för botanisten är här alldeles intet originelt att finna.

I detta hänseende äro de i Goda Hoppsuddens mera omedelbara närhet liggande bergen och högplatåerna bakom Simonstown mera intressanta och lärande. Jag hade ej tillfälle att mera än en half dag här uppehålla mig (ty dyrheten af transport från det ena stället till det andra, mat och logis någonstädes, är särdeles nu här ytterlig), och fann äfven vegetationen till hufvudsakliga drag alldeles densamma som på bergen och höjderna närmare staden. Erica-arterna voro uppe på högslätterna särdeles förtjusande och ymniga (jag insamlade vid pass 50 arter blommande, hvaraf jag ej säkert känner flera än Plukenetii, decora, cordifolia, cerinthoides, monadelpha, pulchella, purpurea, hirtiflora, tubiflora, sepana, baccans och mucoides). Proteæ och Leucadendra voro nästan desamma, Leucospermum conocarpon ymnigare; Viscum capense satt på grenar af Targinanthes camphorata och Helichrysum argenteum och vestitum försilfrade klipporna, Mundia spinosa stack allestädes, Cyclopia och Soulanchia, Stilbe pinastrum, Trichocephalus

och *Aulacorrhynchus jemte Harveya* voro här nyheter. Annars var karakteren samma torra taggighet, saftlösa färgprakt och öfvermått af vissa förherrskande individer. Märkvärdigast af allt syntes mig dock utbredningen af *Ericæ*; de särskilta arterna växte nästan alltid sällskapligt ihop med hvarandra, sällan två arter inom samma tio kvadrat-alnars rymd, vexlande efter olika bredd och höjd på bergen. Att närmare fullfölja detta skulle varit intressant; tid felades mig nu.

Den stora slätten af vid pass 34 eng. miles bredd från Capetown till den lilla staden Stellenbosch invid foten af bergskedjorna, som parallelt draga sig på ungefär samma afstånd från kusten, är den mest dystra och sterila man kan se, mot hvilka ljunghedarne i Halland äro leende paradis, ehuru väl botanisten här har att glädja sig åt ej få skönblommande rariteter, åtminstone under den företrädesvis s. k. vackra årstiden. De öfvertäckas af stora tjocka massor af *Mesembryanthema*, särdeles den väldiga *edule*, de halfuttorkade saltgölarne fyllas af *Salicornia*-artade växter, sanddrifvorna af gigantiska tufvor af *Restio* (ymnigast *tectorum*), och något upphöjdare och hårdare backar beklädas af en otrolig massa individer af *Ericæ*, hvaraf nu särdeles en ovanligt gul- och en annan rödblommig voro särdeles praktfulla, *Gnidia*, *Struthiola*, *Passerina* och ett par *Gladioli*. Som jag endast i omnibus passerade denna slätt, hade jag ej tillfälle att derom förskaffa mig en noggrannare kännedom, hvilket ock nu näppeligen syntes löna mödan.

Kring Stellenbosch deremot uppehöll jag mig ett par dagar och hade der — tyckte jag — full valuta för mina vackra, svårsläppliga *guinéer*. Sjelfva staden är en sådan der vinort, der de vidsträckta tomtarna intagas af praktiga trädgårdar och vinfält; gatorna äro planterade med resliga ek-alleer, i hvilkas skugga de trefliga holländska husen gömma sig, och, betraktad uppifrån de nära liggande bergen, är den verkliga som tyckte man sig se en profbit af Afrika i dess verkliga gestalt — en ändlös öcken och en oas. Närmast omgifves den af torra låga bäckar, alldeles liknande dem på den vida slätten, med den

skillnad likväl, att här ej finnas några flygsandsdrifvor, att de äro ännu hårdare och följaktligen den taggiga buskvegetationen, uppblandad med några liljor här kan fullare utveckla sig, och att några af dem verkligen lysa helt gröna af stora fält af *Sisyrinchium*. Bergen, som här nå en anseelig höjd, så att de till och med om vintern stundom äro snöbetäckta, och väsendtligt skilja sig från Taffelbergets sandstenslager, i det att de här utgöras af granit och feltspath, samt således synas tillhöra en annan epok, förete ock ganska många växter, som ej träffas närmare Cap, och af hvilka jag vill uppräknå några: fyra arter *Pelargonium* (deribland mest *cucullatum* och den lilla *athamantoides*), *Arctotis acaulis*, fem arter *Oxalis* (deribland *O. monophylla* och *multiflora*), flera *Metalsiæ*, *Metrosideros angustifolia*, *Leucadendron ovale* och *plumosum*, *Protea lepidocarpa*, *Brunia lanuginosa*, *Asparagus albus*, *Lobelia coronopifolia*, *Brunswigia*, flera nya *Restiones* o. fl. I dalarne mellan de mångtoppade bergskedjorna framrassla steniga bergsströmmar, och kring dem framstår en ännu yppigare vegetation af *Canonia capensis*, *Solanum verbascifolium* och *giganteum*, *Phyllica plumosa*, *Rhus rosmarinifolia* och *fastigiata*, *Salix capensis*, *Myrica serrata*, *Indigofera psoraloides*, *Virgilia sylvatica*, *Olea verrucosa*, *Epilobium*, *Cyclopia tenuifolia*; och på sluttningarne ofvan dessa mera leende ställen träffas många vackert belägna landt gårdar, på hvilkas utmarker *Rubus Bergii* och *R. chrysocarpus*, *Helichrysum foetidum*, *Osteospermum imbricatum* j. fl. äro temligen allmänna.

Sådan är i största allmänhet den sednaste höstvegetationen kring Capkoloniens hufvudstad. Här likasom öfverallt var vårt vistande alltför kort att några betydliga samlingar kunde göras (jag tror mig ej hafva inlagt mera än vid pass 400 arter) och här likasom annars är min kännedom af hvad jag sett och skördat alltför inskränkt att sätta mig i tillfälle att mera tillfredsställande redogöra för mina utvandringar och deras resultat.

Söndagskvällen d. 4 Maj sågo vi S:t Helenas klippmassa uppskjuta ur hafvet och påföljande morgon inlupo vi på James-

towns redd, samt qvarlågo der till påföljande qväll den 3. Hvad jag således har att om denna lilla ös vegetation omförmåla inskränker sig ej till mer än knappast ett tredjededels dygns iakttagelser. På något afstånd sedd företer denna ö det kalaste, otrefligaste och ohyggligaste yttre man kan tänka sig; allestädes stupa de branta bergen i hafvet rödgrå och dystra, ej ett grässtrå upptäckes der, och endast innerst i djupet af de trånga, krokiga, afgrundsligt djupa dalarne framskymta några gröna tecken till lefvande lif, likasom man öfverst på hjessan af den höga ön ser spår af små mörka skogsdungar. Så afskräckande första utseendet än är och så hopplöst det än ser ut att här söka och finna ringaste spår af ett tropiskt klimats yppiga alster, så förändras dock scenen betydligt när man öfverskådar ön från det inre. I centern af den 12 eng. mil breda öplattan reser sig den, jag tror minst 3—4000 fot höga Dianas peak; här är knuten för det bergssystem, som bildar skelettet till St: Helena (och något annat finnes nästan icke), och härifrån utgå till alla kanter af densamma höga, skarpa, slingrande åsar, lemnande mellan sig förfärliga djupa dalar. Närmast dessa centralberg är ön täckt af en nästan yppig vegetation, rika täta skogar, hvilka tränga sig ner i de närmaste afgrunderna och der och på åsarne, bilda täcka situationer, hvarest tjugande villor pittoreskt framsticka. Blickar man åt norr, så ser man mot hafskanten de dit löpande åsarne utplatta sig i en temligen bred högslätt, der det allbekanta Longwood är beläget; närmare Diana-piken öppnar sig den vackra dal der NAPOLEONS graf ligger. Ser man deremot åt motsatta sidan, så öfverblickar man en trakt af den hiskligaste nakenhet, hvilken ej bättre kan skildras än om jag liknar den vid ett ögonblickligen plötsligt stelnadt, af stormen skakadt eldhaf, spets vid spets, afgrund invid afgrund, allt rödt, bart och sönderbrutet — detta är utseendet. De öfriga dalarne äro någorlunda drägliga, men endast åt ett håll, nemligen åt Longwood till, förekomma odlingsbara fält af någon utsträckning.

Det är tydligt att den korta tiden af ett dygn, särdeles under den ogynnsammaste perioden af året, ingalunda skulle kunna lemna några tillfällen att bilda sig något fullständigt begrepp om denna ös Flora. Jag har sett uppgifvas, att den skulle uppgå till något öfver 700 arter; mig var det omöjligt att under mitt dygns uppehåll sammanbringa mera än vid pass 400, hvilka dock så der temligen kunna lemna en reducerad aning om karakteren deraf, nemligen att den ej på minsta vis är egendomlig, utan sammansatt af diverse kolonister, mest från England, hvarifrån öns alla cultur-, ogräs- och vildmarks-växter härleda sig, till den grad, att man alldeles tycker sig vandra på en engelsk jord, i all hennes magerhet. Det är endast i skogarne kring Dianas pik man kan finna några ursprungliga växtalster. De utgöras hufvudsakligen af fyra stora träd-syngenesister, och en massa (jag fann fjorton) arter Ormbunkar, hvaribland en palmlik *Cyathæa*, som bildar riktiga alléer uppe på den höga, som en mager hästrygg smala bergåsen; för öfrigt gömma sig der tvenne egna *Campanulæ*, och *Rubus pinnatus* bildar oegenomträngliga snår. Den trädvegetation, som för öfrigt här och der framstår, utgöres af en i täta dungar odlad Tall (som man planterat, sedan för vid pass 400 år sedan de från England hitförda getterna uppätit, enligt uppgift, den trädvegetation, som då lærer betäckt äfven lägre delar af ön), en Ek, massor af en *Eucalyptus*, en *Podocarpus*, *Salix babylonica*, *Acacia heterophylla* och *Cydonia japonica*. Vägar och odlingsfält inhägnas af nyssnämnde *Rubus pinnatus* (alldeles som *R. discolor* &c. i England) och *Buddleja saligna*, som hitfördes för fyra år sedan, har nu spridt sig öfver hela ön i de tätaste snår. Hvad som åt höjderna ger ett högst eget utseende är de yfviga och frodiga massor af *Ulex europæus*, som ej allenast bland de gröna skogarne inmänger sina gula färger och förlänar dem en angenäm, nästan höstlikt skiftande färg, utan äfven förgyller de annars så nakna och eufor-miga bergsidorna och sandfälten, der för öfrigt en stor busk-artad *Osteospermum* (tror jag) är särdeles allmän. Gräsmattan,

som på högre mera fuktiga ställen är särdeles yppig, består nästan uteslutande af *Cynodon dactylon* (för öfrigt insamlade jag åtta *Gramineæ*), och i djupet af dalarne, der de sparsamma bäckrännilarne äro för små att framkalla någon frodigare växtlighet, trifvas *Cyper*i och *Scirpi*, en buskartad *Hibiscus* och en *Iberis*.

Lägger man härtill att lavaklipporna närmare kusten tätt öfverdras af rika smådungr af en *Salsola*-art och en storbladig *Pelargonium*, att en stickande *Opuntia* här och der infesterar dalarne och att *Mesembryanthemum edule* öfverallt bildar tjocka feta mattor, samt att här och der träffas tvenne gula *Oxalis*-arter, *Gomphocarpus arborescens* och *Helichrysum fulgidum*, likasom odlade exemplar af *Virgilia sylvatica* och en trädartad *Erythrina* med taggig stam, så har man, tror jag, uppräknat alla märkeligare växter man här denna tid på året kan finna under 48 timmars vandring. Och om det också icke för vettgirigheten är så fögnande och förökande, så är det dock i sanning för många andra sinnen glädjande att här, inom vändkretsarne, i södra hemisferen, påträffa en massa gamla bekanta, hvilka likasom komma en till mötes och bringa en helsning från det kära hemland, dit kölen nu vänder sig och dit långtan flyger fortare än det framilande skeppet. I åkrarne igen finner man en *Nolana*, en *Euphorbia*, *Stachys arvensis* och *Fumaria officinalis*; *Solanum nigrum* och *sodomæum*, flera *Chenopodia*, *Apargia hispida*, *Convolvulus arvensis*, en *Lepidium*, *Vinca major*, en *Verbascum*, *Physalis*, *Rumex acetosella* och *Anthoxanthum odoratum*?, en *Datura* jemte ofvannämnde *Ulex* och ännu flera fylla raden.»

Akademiska angelägenheter.

Sammankomsten den 14 September.

Præsens tillkännagaf, att Akademien genom döden förlorat, i första klassen, Professoren vid *Conservatoire des arts et des métiers* i Paris, R. N. O. Hr T. OLIVIER, samt i åttonde klassen, Hr JOHN SWARTZ d. 15 Augusti.

Sammankomsten den 12 October.

Præses tillkännagaf, att Akademien genom döden förlorat, i första klassen, Direktören vid Observatorium i Paris, R. N. O. Hr F. J. D. ARAGO d. 2 October, och i sjette klassen, Professoren vid Universitetet i Halle, Hr E. F. GERMAR, d. 8 Juli.

Inlemnade arbeten.

Sammankomsten den 14 September.

Af Hr CHARLES J. ANDERSON, berättelse om, hans resa i sällskap med Hr GALTON i det inre af södra Africa.

Remitterades till Hrr SUNDRVALL och LOVÉN.

Af Hr Bruksinspektoren BJÖRKMAN, meteorologiska observationer för åren 1849—1852, anställda vid Tolffors bruk nära Gefle.

Öfverlemnades till det astronomiska observatorium.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Anmälta den 14 September.

AF H. M. KONUNGEN.

CHENU, Illustrations Conchyliologiques. T. I—VI, et livrais, 75—83. Paris. Fol. (m. t.)

AF H. M. Konungen af Preussen.

Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, von LEPSIUS. *Tafeln*: Lief. 33—41. Berlin. Fol.

AF Stor-Britanniska Regeringen.

Geological Survey of Great Britain. Fortsättning: 5 kartor och 15 sections.

Memoirs of the geol. survey. Dec. IV, VI. 4:o (m. t.)

Records of the school of mines. I: 2. With prospectus of the school, 2:d session.

AF Franska Regeringen.

Voyage au Pol sud. Hist. du voy. T. 8—10. Geol. et Minér. 1 T. 8:o.

Atlas: Geologie, livr. 1—3. Anthropol. 10. Botanique, 11, 12. Zoologie 23—26. Fol.

Annales des mines. 4:e Sér. Table des matières. 1842—51. 8:o.

AF Nederländska Regeringen.

Flora Batava. Aflev. 170—172. 4:o.

Af

Af K. Danske Videnskabernes Selskab.

Oversigt 1849, 1850, 1852. 8:o.

Af Royal Society i London..

Philosophical Transactions. 1852. P. 1, 2. 4:o.

Proceedings. VI: 83—93. 8:o.

List of members 1852. 4:o.

Af R. Astronomical Society i London.

Memoirs. Vol. XX, 1851, 4:o.

Monthly Notices. Vol. XI, 1851. 8:o.

Af R. Geographical Society i London.

Journal. Vol. XXII, 1852. 8:o.

Af Chemical Society i London.

Quarterly Journal. V: 4, VI: 1. 1853. 8:o.

Af R. Irish Academy i Dublin.

Transactions. Vol. XXII: 3, 4. 1852, 53. 4:o. (m. t.)

Proceedings. V: 2. 1852. 8:o.

Catalogue of stars near the Ecliptic. Vol. I, 1851. 8:o.

Af Académie des sciences i Paris.

Comptes Rendus. 1849: 2. 1850: 1, 2. 1851: 1, 2. 1852: 1, 2. 4:o.

Af Société d'agriculture &c. i Lyon.

Annales, sec. Sér. T. III: 1, 3. 8:o.

Af Académie des sciences i Lyon.

Mémoires, nouv. série. Classe des sc. I. Classe des lettres I, 1851. 8:o.

Af Société Linnéenne i Lyon.

Annales. Années 1850—51. 8:o.

Af K. Akademie der Wissenschaften i München.

Abhandlungen der math. phys. Classe. VII: 1. Münch. 1853. 4:o.

Bulletin. 1853. N:o 1—25. 4:o.

Af Physikalische Gesellschaft i Berlin.

Die Fortschritte der Physik in J. 1849. V Jahrg. Berlin 1853. 8:o.

Af K. Gesellschaft der Wissenschaften i Göttingen.

Abhandlungen. B. V. 1851—52. Gött. 1853. 4:o. (m. t.)

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 10. N:o 7 & 8.



Af Accademia R. della scienze i Turin.

Memorie. Ser. II. T. 9—13. Torino 1848—1853. 4:o.

Af État major des Ingénieurs des Mines i Petersburg.

Annales de l'observ. physique centr. 1849: 1—3. 1850: 1, 2.
Compte rendu annuel par M. KUPFFER. Années 1851, 52. 4:o.

Af K. Sundhets-Kollegium.

Berättelse om Medicinal-Verket i riket. Sthm 1853. 4:o.

Af Författarne.

- ANDERSSON, N. J., Plantæ Scandinaviæ descriptæ et delineatæ. Fasc. II. Cum tabb. — Skandiniaviens växter. Häft. 2. Med afbildningar. Sthm 1852. 8:o.
- ASBJÖRNSSEN, P. CHR., Bidrag til Christianiafjordens Litoralfauna. 8:o. — Vildrenen. 12:o.
- DE LA BECHE, SIR HENRY T., The geological observer, sec. edit. Lond. 1853. 8:o.
- DUVERNOY, Mém. sur le syst. nerv. d. moll. acephales. (Mém. de l'Institut.)
- FARADAY, MICHAEL, Experim. researches in Electricity. Ser. 28 & 29. (Philos. Trans.) — On the lines of the magnetic force. (Phil. Mag.)
- FLAUTI, VINC., Osservazioni su' metodi per le curve inviluppi. Modena 1848. 4:o. — Su due libri di Apolonio pergeo. Modena 1851. 4:o.
- HAUSMANN, Neue Beiträge z. metallurg. Krystallkunde. Gött. 1852. 4:o.
- LEWY, B., Tre afhandlingar ur Annales de chimie et de physique och Comptes rendus.
- MALM, A. W., Zoologiska observationer. Häft. 2. Gbg 1853. 8:o.
- MULSANT, E., Histoire naturelle des coléoptères de France. Paris 1846. 8:o.
- NILSSON, S., Skandinav. Fauna. Del. IV. Fiskarne, 2. Lund 1853. 8:o.
- RINK, H., Om den geographiske Beskaffenhed af de Danske Handelsdistrikter i Nord-Grønland, tillige med en Udsigt over Nord-Grønlands Geognosi, med en Charta. Kiöbenhavn 1852. 4:o.
- SCHMITZ, J. W., Das Weltall. — Astronomie für Alle. — Ansicht der Natur. — Der kleine Kosmos. — Die Natur. Köln 1852, 53. 8:o.
- SCHNEIDER, TH., Lehrb. der Metallurgie. Lief. 1—9. Braunsch. 1846—53. 8:o.
- SWELLENGREBEL, J. G. H., Neun verschiedene Coordinatensysteme in Zusammenhang untersucht. Bonn 1853. 4:o (m. t.).
- WISTRAND, A. T. och A. H., Handbök i rättsmedicin. H. 2. Sthm 1853. 8:o.

Af Utgifvarne.

- Astronomical Journal. N:o 58—61. Camb. 1853. 4:o.
- Archiv z. Kunde von Russland. XII: 3.
- Botaniska Notiser. 1853. N:o 4—7.

Flora. 1853. N:o 13—18. Regensburg.

BRANDEL, La myriade. Exposé par F. A. EWERLÖF. Copenh. 1853. 8:o.

Af Hr N. J. Andersson.

En samling småskrifter och handlingar upplysande Australiens statistik och geologi.

Af Hr S. Lovén.

Esercitazioni accademiche degli aspiranti naturalisti diretti dal dottor COSTA. Vol. I, II: 1, 2. Con Atlante in 4:o. Napoli 1839—42.

Af Hr M. G. Morton i Boston.

Statements on his claim to the discovery of the anæsthetic properties of Ether. Wash. 1853. With appendix.

Anmälda den 12 October.

Af Kongl. Civil-Departementet.

Karta öfver Sverige i 10 blad. Af AUG. HARR. 1:sta häftet. Sthm 1853. Fol.

Af Kongl. Norska Universitetet i Christiania.

Saga Olafs Konungs en Helga. Christ. 1853. 8:o.

Af K. Akademie der Wissenschaften i Berlin.

Abhandlungen. Aus d. J. 1852. Berlin 1853. 4:o.

Monatsbericht. 1852: 11, 12. 1853: 1—7. 8:o.

Af K. sächs. Gesellschaft der Wissensch. i Leipzig.

Abhandlungen der math. phys. Classe. B. IV. Bogen 14—19. 8:o.

Bericht üb. die Verhandlungen. 1852: II. 1853: I. 8:o.

Af k. k. Geologische Reichs-Anstalt i Wien.

Jahrbuch. 1853: N:o 1. 4:o.

Af Associazione Medica degli Stati Sardi.

Atti del secondo Congresso Generale, Ottobre 1852. Torino 1853. 4:o.

Af Utgifvaren.

Archiv für wissenschaftl. Kunde von Russland, von ERMAN. B. XII. H. 4.

Af Hr Anatole Demidoff.

Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée. Atlas: Livr. 13—16. Fol.

Af Författarne.

- MAURY, Paper on the gulf stream and currents of the sea. (Southern
Liter. Messenger. Vol. X. No 7). 8:o.
VAUQUELIN, De l'application de la suture enchevillée. Paris 1853. 8:o.
ZANON, BART, Rinvenimento dell' Achilleina. Venezia 1851. 4:o.
SANTESSON, CARL, Anteckningar rörande de förnämsta Medicinska Sko-
lorna uti Italien, Frankrike, Holland och England. Sthm 1850. 8:o.
DANIELSSON HILL, C. J., Om relation mellan bågen (b) och dess tangent
(t). Halfarket 38. 4:o.
-

**Till Rikets Naturhistoriska Museum.
Zoologiska afdelningen.**

Anmälta den 14 September.

Af Hr Jägmästaren A. Jahnsson.

- En Vespertilio borealis.
Två bon med ägg af Sylvia schoenobaenus.

Af Hr Doctor Åberg.

- En Acipenser huso fångad vid Norrköping.

Af Hr Professor Huss.

- En Fringilla ciris.

Af Hr Magister Andersson.

- En Testudo från Cap.

Af en okänd gifvare.

- Två ex. af Falco subbuteo från Ulriksdal.
-

Anmälta den 12 September.

Af Hr Professor Huss.

- En Fringilla cardinalis från Vestindien, samt tre Estrildæ från Afrika.

Af Hr Hof-Rätts-Rådet Hindbeck.

- En Orthoceratit från närheten af Svartå bruk i Nerike.
-

Botaniska afdelningen.

Anmälda den 14 September.

. Af Hr Professoren Blume i Leyden.

Två växtsamlingar, den ena af 175 Japaniska arter, förnämligast träd och buskar, hvaribland *Prunus*, sju arter, *Acer* fem, *Quercus* tio, *Carpinus* fyra, *Alnus* två, *Rhus* fyra, *Pinus* tre, *Podocarpus* sju, *Euonymus* sex, *Ilex* nio, *Viburnum* tretton, *Ligustrum* tre o. s. v.; den andra af 263 sällsyntare träd och buskar från Java, Borneo, Celebes, Amboina, Timor och Nya Guinea, hvaribland femtioåtta *Myrtaceæ*, sextiosex *Melastomaceæ*, tjugu *Memecyleæ*, fjorton arter af *Quercus*, fyra af *Castanea*, tio af *Gnetum*, fjorton af *Jasminum*, åtta af *Podocarpus*, tio af *Nepenthes*, sju af *Connarus* o. s. v.

Af Hr Rådman Beurling.

Tjugufyra sällsyntare arter från trädgårdar i Stockholms-nejden.

Af Hr Studeranden Lindberg.

Sextioåtta arter från nejderna af Stockholm, Salems socken och Rosersberg, t. ex. *Hedera helix*, *Viscum album*, *Rubus corylifolius*, *Asparagus officinalis*, *Allium ursinum*, *Schedonorus erectus* och *asper*, *Blitum capitatum*, *Galium sylvestre*, *Festuca gigantea*, *Batrachium fluitans*, *Veronica maritima*, *Ruppia rostellata* m. fl., samt femtio arter mossor från nejderna omkring Stockholm.

Af Botanicens Intendenten.

Fyrtiosex sällsyntare arter från trädgårdar och orangerier i Stockholms-trakten, t. ex. *Veronica speciosa*, *salicifolia* och *Andersoni*, *Diclytra spectabilis* m. fl., samt

Trettiofire arter från Södermanlands skärgård, t. ex. *Silene viscosa*, *Sorbus hybrida*, *Rubus pruinosis* och *nemorosus*, *Taxus baccata*, *Cephalanthera rubra*, *Platanthera chlorantha*, *Lathyrus maritimus*, *Aira bottnica*, *Schedonorus asper*, *Salsola kali*, *Cochlearia danica*, *Glyceria distans* var. *pulvinata*, *Carex arenaria* m. fl.

Anmälda den 12 October.

Af Studeranden Hr Fredrik Björnström.

Fyrtioen arter från Södermanlands skärgård och Stockholms-nejden, fjorton phanerogamer och tjugusju cryptogamer.

Af Studeranden Hr E. Boheman.

Trettio sällsyntare arter phanerogamer från Stockholms omgifningar.

Af Studeranden Hr S. O. Lindberg.

Sexton arter mossor från Stockholms-trakten.

Af Hr Medicinal-Rådet af Pontin.

En frukt af Cucurbita ovifera.

Af Hr Trädgårdsmästaren Fahlström.

En frukt af en art af Cucurbita, hvilkens frön hitkommit från Mallaga, hvarest växten odlas för fruktens användbarhet till föda.

Mineralogiska afdelningen.

Anmälta den 12 October.

Af Hr Rink i Köpenhamn.

Etthundradeåttiofem stuffer mineralier och bergarter från Grönland.

Af Hr Magister Andersson.


Sjuttio stuffer bergarter insamlade under Fregatten Eugenie's jordomsegling.

Af Hr Löjtnant Skogman.

Sju stuffer bergarter insamlade under samma expedition samt en portion vatten från Cocos-öns lagun.

Rättelser.

Pag. 7, rad 7	uppifr.	står:	slätten	läs:	fjällen.
» » » 8	nedifr.	»	nordöstra	»	nordvestra.
» 9 » 11	nedifr.	»	Waiwanentaki	»	Waiwanenlaki.
» » » 1	nedifr.	»	nibella	»	rubella.
» 10 » 3	nedifr.	»	Rattowuoma	»	Kattowuoma.
» » » 2	nedifr.	»	styrde	»	styrde sedan.



ÖFVERSICHT
AF
KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS
FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1853.

N. O.

Onsdagen den 9 November.

Föredrag.

1. *Spongocladia, ett nytt algsläkte*). — Hr
Areschoug hade insänt följande meddelande:

»Den växt, hvarpå jag nu tager mig friheten fästa Kongl.
Vetenskaps-Akademiens uppmärksamhet, påträffades för snart
tio år sedan uti en samling alger, hemförda från Mauritius.
Då föga intresserad för spongiernas studium och anseende den
tillhöra de senares på arter så talrika klass, bortlade jag den,
utan någon strängare granskning. Det spongielika utseendet,
lukten af brändt hår, kiselnålars närvaro och flera andra, från
algerna afvikande egenskaper, syntes mig skäl nog, att anvisa
honom en plats inom spongiernas område. Först sedan den
länge omtvistade frågan om dessa senares djuriska eller växt-
liga natur stegrat min lust att närmare studera dessa under-
bara former, (som ännu alltjemt sätta den organiska natur-
forskningen på ett hårdt prof), framtogs den ånyo till vidare
undersökning. Längre dröjde det dock innan jag blef fullkomligt
öfvertygad, att jag hade framför mig en verklig alg och vågade
anse de afvikande egenskaperna icke såsom undantag från den
allmänna regeln, utan såsom en följd af främmande orsaker.

Utan betänkande vågar jag derföre meddela följande syste-
matiska beskrifning, förbehållande mig att sedermera få yttra

några ord rörande anledningen till min ovisshet om denna växts rätta plats uti de lägre organismernas långa kedja.

SPONGOCLADIA ARESCH.

Char. gen. Alga viridis, adnata, cæspitosa, digitato-dichotoma, filis cellularibus laxè implexis contexta. Fila unica cellularum serie constructa, inferne parce ramosa, acrogenia; cellulæ inferiores breviores, superiores longissimæ, tubuliformes, vaucheriazformes, utraq̃ue intus granulis chlorophyllinis vestitæ. Schizogonidia seu zoosporæ in cellulis tubuliformibus formatæ.

Genus *Acrosiphonia* J. Ag. seu *Spongomorphæ* KUTZ. sine dubio proximum et notis abunde diversum, quamquam ipsa diversitas charactere seu verbis difficiliter exprimitur. Nostrum genus et *Acrosiphonia* in eo conveniunt quod cellulæ florum inferiores sunt ætate provectiores, superiores contra juniores, unde vegetatio utriusque est in apice sita. Sed in *Acrosiphonia* cellulæ inferiores membrana tenui constructæ sunt et superiores l. supremæ interdum brevissimæ; in *Spongocladia* cellulæ inferiores non raro adeo crassa constructæ sunt membrana, ut cellula tenui fistulositate percursa videatur, et cellulæ superiores l. supremæ tam sunt longæ, ut plantam pluries sub microscopio examinatam, nullo invento geniculo, ad *Vaucheria*s pertinere facile credas. Hoc etiam in causa fuit, cur eandem ad *Siphonias* referendam diu suspicatus sim, donec, inventa florum ad basin articulatione, veram ejus perspiciebam affinitatem.

1. SPONGOCLADIA VAUCHERIEFORMIS ARESCH. Tab. II.

Hab. ad littora insulæ Mauritiæ, *Lithothamnii* innascens.

Descr. E strato per *Lithothamnii* effuso fibroso-spongioso horizontali, nudoque oculo *Codium adherenti* non absimili erecta. Thallus extus coloris griseo-flavescentis l. griseo-albidi, intus viridis, 2—3-pollicaris, cæspitosus, a basi digitato-dichotomus, 2—4 lineas crassus, teres l. compressus, apicibus nunc subattenuatis, nunc incrassatis l. incrassato-truncatis et tunc ipsa planta capiti *Brassicæ floridæ* non dissimilis. Fila exteriora plus minusve grisea, interiora viridia, omnia unica cellularum serie constructa, inferne ramosa, laxè implexa; cellulæ inferiores breviores, longitudine diametrum 2—3-plo excedentes, membrana plerumque crassissima constructæ, superiores longissimæ, vaucheriazformes, membrana tenuiori confectæ. Materies chlorophyllina in cellulis florum exteriorum plerumque omnino nulla, in interiorum vero cellulis parietem sæpe per spatia tantum abrupta obvelans. — Schizogonidia in ipsa cellula matrice, ut sæpe in *Confervis*, germinantia a me sunt observata.

Obs. In nostris speciminibus duæ res dignæ videntur, quas paucis verbis attingamus. Primo in ipsa planta observantur interdum quasi pori, ostiola spongiarum in memoriam bene revocantes, qui utrum accidentales sint an normales, pro certo dicere non possumus; forsitan per illos egrediuntur schizogonidia; secundo spicula silicea, recta l. leviter curvata, longissima et utrinque paululum attenuata, cum granulis in-

termixtis filis extus incumbentia, in nonnullis plantæ speciminibus ejus superficiem dense investientia — unde forsan color griseus — in aliis apices incrassatos thalli politos reddentia. Videntur hæc spicula plantæ heterogenea, quamquam natura eorum non facile percipiatur; forsan sunt spongiæ cujusdam.

Sedan jag sålunda meddelat växtens systematiska beskrifning torde det tillåtas mig att ingå uti en mera detaljerad framställning af densammas structur och öfriga beskaffenhet, och på samma gång visa såväl omöjligheten att anse de nämnda kiselnålarna tillhöra växten, som ock svårigheten att tillfredsställande förklara deras uppträdande.

Structuren, ehuru framställd uti den ofvan meddelade systematiska beskrifningen, förtjenar att närmare beröras. Hela växten utgöres af sammanvecklade trådar, sinsemellan insnodd, försåvidt jag kunnat förstå, ungefär på samma sätt som trådarne hos *Ectocarpus tomentosus* eller *Conserva congregata* Ag., ehuru, såsom vi förmoda, detta förhållande är hos denna alg alldeles normalt, och ej, som hos sistnämnda *Conserva*, en följd af yttre och tillfälliga orsaker. Tecken till någon hufvudtråd, intagande thalli och dess grenars axel, och från hvilken de trådar, som ligga i eller närmare thalli periferi, skulle kunna tänkas utgående — har jag ej kunnat upptäcka. Deruti, att dessa trådar ej äro med hvarandra sammanvuxne i form af maskor uti ett nät, skiljer sig denna alg, andra kännetecken att förtiga, från de hornartade spongiernas structur, och öfverensstämmar med sina samslägtingar. Mot thalli centrum äro trådarne greniga, enklare deremot ju närmare de ligga periferien, som bildas af trådarnes långa, vaucherielika toppcelluler. Trådarnes, i det inre af thallus belägna celluler, således de nedre, äro jemförelsevis korta, ehuru ofta två till tre gånger längre än breda, någongång af en längd lika med bredden, men alltid längre i samma mån som de ligga närmare trådens topp, eller, som är detsamma, närmare thalli periferi; trådarnes toppcelluler äro, som nämndt blifvit, de allra längsta — och så långa (troligen ända till 50 gånger längre än deras bredd) och vaucherielika, att man lätt af dem kan förmedlas att anse

växten tillhöra Siphoneernas familj. De äro för öfrigt i växtens lefvande tillstånd otvifvelaktigt cylindriska, ehuru på mina exemplar, troligen genom torkning, platta; deras bredd ända till 0,20 och deröfver, men ofta mycket smalare.

Cellul-membranens sammansättning. Professor J. AGARDE har, uti ett särskildt, för läran om växtcellulen högst viktigt arbete *), visat att cellul-membranen hos en stor del alger är sammansatt af ytterst fina, på olika sätt inväfda fibriller. Undersöker man under mikroskopet Spongocladians i vatten väl uppblötta celluler, så märker man uti desammas membran longitudinella strimmor (fig. 3 a, 4), som otvifvelaktigt häntyda på en dylik sammansättning. Behandlade med utspädd svafvelsyra, upplösas cellulernas membraner uti dylika fibriller, så att i detta hänseende intet tvifvel återstår (jfr fig. 5).

Cellul-membranens förtjockning. Vi ha redan uti den meddelade beskrifningen antydtt, att trädarnes inre eller nedre celluler ha betydligt tjockare membraner än de öfre vaucherielika cellulerna. Detta förhållande gäller i allmänhet, ehuru ett och annat spår till lagens modifikation kan påträffas, hvilket dock synes föga betyda. Men i allmänhet känna vi ingen alg med så tjocka cellul-membraner, som ifrågavarande. De nedre, kortare cellulernas membraner befinnas ofta till den grad förtjocknade, att diametern af cellulens lumen ej utgör mera än en tredjedel af cellulens diameter. Men äfven hos de öfre, mera långsträckta cellulerna, kan en dylik förtjockning inträffa; sådane finnas, hos hvilka lumen är dels reduceradt till ett nästan hårfint rör (fig. 6), dels alldeles försvunnet, så att den ursprungliga cellulen blifvit helt och hållet solid (fig. 7).

Cellulernas innehåll. De celluler, som ligga på växtens yta antingen innesluta uti sitt inre ett till form och beskaffenhet obestämbart, i ringa mängd uppträdande, pulverartadt ämne, eller äro de alldeles tomma, då deremot de, som äro dolda i växtens inre, innehålla en större eller mindre quantitet

*) De cellula vegetabili fibrillis tenuissimis contexta. Lund. 1852.

chlorophyll samt mer eller mindre utbildade sporidia. Att dessa senare bildas, liksom hos Conferverna och flera närslägtade alger, inuti sjelfva cellulerna och genom ett porformigt hål på desamma lemna modercellulen, visande det bekanta rörelsefenomenet, lider väl så mycket mindre något tvifvel, som jag en gång funnit hos denna växt sporidia, groende uti cellulens inre (fig. 8); ett förhållande, som, enligt Thuners mästertliga arbete öfver algernas zoosporer, äfvenledes hos flere Conferväer eger rum.

Kiselnålarne, eller de nålformiga kristallerna äro, såsom vi redan anført, det för denna växt eller åtminstone för de exemplar af densamma, som kommit oss i handom, mest utmärkande. De äro vidhäftade cellul-trådarne, liggande dels transverselt, dels longitudinelt utanpå dem, och detta såväl på de trådar, som utgöra växtens yta, som ock på dem, hvilka finnas inuti densamma. De uppträda ibland i största mängd på topparne af thalli grenar, hvilka i följd häraf synas för blotta ögat liksom öfverdragna med en ytterst tunn, slät, nästan kalkartad skorpa (fig. 1, a). På dessa senare ställen ligga de härs och tvärs öfver hvarandra, tätt packade, utan ringaste tecken att vara på minsta vis ordnade i form af maskor uti ett nät, något så vanligt hos de Spongier, hvilkas sceleton nästan uteslutande är bildadt af kiselnålar. Ytterst små, till form högst olika, än fria än sammangyttrade granula, som synas vara dels af organisk, dels af oorganisk beskaffenhet, äro, synnerligast på thalli toppar, blandade bland kiselnålarne, och återföra tanken på de granula — t. ex. de gröna cellulerna hos Spongillan —, som så rikt uppträda hos Spongierna (fig. 9). Till formen äro kiselnålarne mot båda ändarne något spetsigt afsmalnande, alldeles raka eller bågformigt böjda. De längsta jag iakttagit hafva varit $= 0,353$ och deras bredd $= 0,008$.

Betraktade under mikroskopet visa dessa kiselnålar ej någon inre struktur, utan synas, åtminstone under vanliga bättnemikroskoper, alldeles homogena och genomskinliga. Men underkastas de först blåsrörets inverkan, visa de sig helt annor-



lunda. Inuti dem ser man nemligen ett contentum, mer eller mindre stötande i brunt eller mörkbrunt, som visserligen före denna behandling uppfyllde kiselnålens inre och i sin helhet egde dennas form, men som nu på oregelbundet vis blifvit förvandladt till ett grynformigt ämne. Kiselnålens yttre form blir genom denna behandling alldeles oförändrad; den liknar nu en nålformig cellul, med tydlig och genomskinlig membran, inneslutande inom sig det nämnda bruna contentum (fig. 40). Spongiernas kiselnålar, hvilka jag framdeles torde få tillfälle att närmare beröra, visa, vid dylik behandling, alldeles samma företeelser. Det torde derföre vara tvifvel underkastadt, huruvida de böra anses som kristall-nålar; för min del synes saken kunna annorlunda förklaras. De synas mig vara långsträckta celluler, hvilkas membran förr eller senare blifvit omgifven af ett lager kiselsyra, egande i afseende på ljuset ungefär samma brytningsförmåga som nålens contentum, hvilket haft till följd, att de flesta Spongiers kiselnålar hitintills blifvit ansedda som homogena.

Äro dessa kiselnålar att betrakta såsom för Spongocladian främmande eller tillhöra de denna växt? — Detta är en fråga, på hvilken vi måste försöka att afgifva ett svar, om ock detta ej skulle till alla delar utfalla fullt tillfredsställande. Visserligen känner man några få alger, hos hvilka nålformiga kristaller, enligt författarnes försäkran, lära förefinnas, men dels äro dessa nålar föga undersökte, dels äro de uteslutande funna hos de röda algerna; hos de gröna och bland dessa dem, hvilka Spongocladian står närmast, *Conservæ*, hafva dylika, så vidt vi känna, aldrig blifvit iakttagna. Detta upphäfver visserligen icke möjligheten af ett undantag och skulle föga bevisa, derest icke giltigare bevis vore förhanden. Dessa innefattas uti följande omständigheter: 1:o att kiselnålarne uppträda i största mängd utanpå Spongocladian (på topparna), samt sparsammare inuti själfva thallus; 2:o att, såväl då de finnas utanpå som inuti thallus, sitta de fästade utanpå de trådar, hvaraf växten består, och så löst, att de med ett tjenligt instrument lätt kunde

bortskrapas, men ligga ej inuti desamma; 3:o att man ej har någon enda analogi, med tillhjälp af hvilken man skulle kunna förklara möjligheten af kiselnålarnes uppkomst utom och emellan Spongocladians trådar.

På grund häraf nödgas jag anse dessa kiselnålar såsom något för Spongocladian främmande. Att säga hvad de äro, är svårare; att de fullt öfverensstämma med Spongiernas kiselnålar, har ofvanföre blifvit anfördt, men att förklara dem in summa för en spongia, möter ock svårigheter. Hvarje spongia uppträder under en mer eller mindre bestämd yttre form och bildar ett afslutet helt; dylika, äfven parasitiska, äro ej sällsynta och välkända så för algologer som zoologer; men att förklara mer eller mindre spridda eller hopade kiselnålar för ett slutet helt, en spongia, låter sig knappt göra. Kiselnålarnes spridda förekomst såväl utanpå Spongocladian som mellan trådarne inuti densamma blir oförklarlig, så vida man ej tager sin tillflykt till den gissningen, att en öfver algen primitivt utbredd tunn, membranartad spongia, genom den förres tillväxande i omfång, slutligen blifvit söndersprängd och dess fragmenter dels quarsittande på växtens yta dels öfvervuxna af dennes trådar, hvarigenom kiselnålar kommit att införas uti växtens inre.

Spongocladian, sådan vi ofvanföre beskrifvit den, visar en del egenheter, förklarliga af de främmande kiselnålarnes närvaro, hvilka jag med några ord anser mig böra närmare vidröra. Det är ett hos spongierna bekant och länge känt faktum, att om tvänne grenar komma att beröra hvarandra, så sammanväxa de uti beröringspunkten. Samma förhållande eger rum hos Spongocladian, och om den ofvan framställda gissningen är riktig, så är troligen den parasitiska spongian i främsta rummet orsak dertill, ehuru något dylikt kan ega rum äfven hos algerna.

Vid Spongocladians förbränning utvecklas lukten af brändt horn eller hår; visserligen kan detta, såsom redan LAMOUROUX anmärkt, vara händelsen äfven med en del alger (jag har iakttagit detta synnerligast hos *Ceramium clavulatum* Ag.), men de

med vår alg närbeslägtade *Confervæ* antyda ej något dylikt. Man skulle således lätt kunna antaga, att några bland kiselnålarna befintliga spongie-artade ämnen gifva anledning till denna lukt. På ett och annat exemplar af dem jag haft tillfälle att undersöka, synas på thalli yta mer eller mindre tydliga porer, ej olika spongiernas ostiola, och som tyckas antyda närvaron af ett slags canaler uti det inre af thallus. Måhända utföras genom dem sporidierna från de trådars celluler, som ligga inuti växten. Dock måste jag uppriktigt tillstå, att jag ej blifvit fullkomligt öfvertygad att de äro normala bildningar; kanske äro de att betrakta som tillfälliga, alldenstund de helt och hållet saknas på en del exemplar.

Det kan måhända synas underligt att jag så länge uppehållit mig vid beskrifningen af en tydlig alg och en på densamma parasiterande spongia. Jag medgifver det gerna, endast anmärkande, att de förhållanden, hvilka dessa båda organismer i förening med hvarandra frambringa, äro så afvikande från den vanliga ordningen, att jag trott saken förtjena en särskilt uppmärksamhet. Föröfrigt gifves hos denna växt något spongie-artadt, som, i förening med kiselnålarnes uppträdande och ifall dessas närvaro skulle få en annan förklaring än den vi ofvaföre gifvit, lätt skulle kunna tagas som bevis på algernas och spongiernas nära släktskap. Det gifves nämligen spongier, hvilkas fibrer äro fistulösa och sammansatta af longitudinella fibrer: detta senare är hos *Spongocladian* normalt, och att understundom cellulernas inre rum, genom väggarnes förtjockning, sammandrages till en smal, longitudinel kanal, d. ä. blifva fistulösa, har ofvan blifvit anmärkt. Här torde således vara att söka en analogi, naturenligare än den, hvilken BOWERBANK trott sig finna vid jemförelsen mellan strukturen af spongiernas fibrer och de vertebrerade djurens ben».

Förklaring öfver Tab. II.

Figg. 1 och 2 visa växten i naturlig storlek; vid *a*, *a* fig. 1 äro topparne något förtjockade eller tvärhuggna, en följd af de kiselnålar, hvarmed de äro öfverdragna; fig. 2 *a*, *a*, *a* äro ställen, hvarses närgränsande grenar sammanväxt med hvarandra.

Fig. 3, en af de trådar, hvaraf växten består, de nedre cellulerna korta, den öfversta mycket lång och på längden strimmig; en antydning af den fibrillösa texturen.

- 4, detsamma som föregående, men ändcellulen kortare.
- 5, de nedre cellulerna af en tråd, behandlade med utspädd svavel-syra och derigenom upplösta i fibriller.
- 6 a, b, c, långa celluler med betydligt förtjockade väggar, så att deras lumen bildar en lång och smal kanal.
- 7, en långsträckt cellul, hvars väggar vid a blifvit till den grad förtjockade, att det inre rummet alldeles försvunnit.
- 8, öfra delen af en cellul, innehållande germinerande sporidia.
- 9 a, en långsträckt cellul, beklädd med kiselnålar; 9 b och 9 c, kiselnålar, beklädande grenarnes toppar (fig. 1 a).
- 10, kiselnålar, efter glödning visande innehållet i form af ett ringa, pulverformigt ämne.

2. *Nya Hemiptera från Cafferlandet.* — Hr

Studenten CARL STÅL meddelade genom Hr BOHEMAN följande:

»Bland den värdefulla samling af Insekter, som Ingeniör J. A. WAHLBERG hemfört från Cafferlandet, intaga Hemiptera ett utmärkt rum. Deras artantal stiger till omkring 520, och äro de till största delen obeskrifne och för samlare okända. Då Professor BOHEMAN i sitt arbete *Insecta Caffrariæ* nu beskriver de Wahlbergska Coleoptera och det är skada, att så mycket utmärkt af de andra klasserna redan så länge stått och ännu står magasinerad, oordnad och obestämd, så gafs mig uppdrag, att bearbeta Hemiptera, hvilket jag så mycket heldre gör, som jag med förkärlek studerat dessa djur. De uppsatser öfver dessa, hvilka jag, alltestersom min tid medgifver, kommer att utarbета, kunna då tillsammans anses såsom ett ej ovigtigt bidrag till kännedomen af Cafferlandets Hemipterfauna.

SCUTELLEROIDES.

SPHÆROCORIS (BURN.)

1. *S. hamiferus*: supra ruber; capite macula triangulari nigra, punctum rubrum includente, antennis fuscis, artic. 1 toto, 2 basi dilute rufo; thorace litura coronæformi nigra, antice maculas 4 rubras includente; scutello basi nigro, sex-rubromaculato, pone medium fascia transversa undulata nigra, ramulum medium, po-

sticeque ramulos 2 emittente; subtus cum pedibus flavotestaceis. Long. 11, lat. 8 millim.

Habitat in Caffraria.

2. *S. caffer*: sordide flavotestaceus; capite rubescente, margine lineisque 2 longitudinalibus mediis nigris, antennarum art. 3 ultimis fuscis; thorace antice inæqualiter rubescente, ibique postice abrupte nigromarginato, basi maculis 4 rubescentibus, mediis antice, exterioribus extus et antice nigromarginatis; scutello maculis 12, plerisque rhomboideis, rubris, nigrocinctis; pectore cinerascens, abdomine piceo, apice dilutius; pedibus testaceis. Long. 8, lat. 6 millim.

Habitat in Caffraria.

3. *S. adpersus*: sordide ochraceus, vage nigroadpersus; capite thoraceque antice dilutioribus; subtus niger, flavovariegatus; pedibus nigrofuscis, geniculis dilutioribus. Long. 8, lat. 6 millim.

Habitat in Caffraria.

Statura fere *S. tigrinae*, eique similis, sed obscurior, absque maculis fuscis; variat interdum dilutior, punctis nigris paucioribus, pedibusque testaceis.

LIBYSSA (DALLAS.)

1. *L. Signoreti*: supra viridi-cærulea, nitida, punctata, antennis nigris, articulo 1 miniato; thorace lateribus miniato, maculis 2 anticis rotundatis et 5 posticis oblongis, nigris; scutello lineæ media, maculisque 6 nigris, apice nigroviolacescente; subtus pectore chalybeoviridi, medio miniato-variegato, abdomine miniato, segmento singulo utrimque macula triangulari chalybea, apice viridi; femoribus dilute miniatis, tibiis tarsisque obalybeis. Long. 15, lat. 7 millim.

Habitat in Caffraria.

Variat colore viridescens in obsolete purpurascentem migrante.

2. *L. Bohemani*: supra obscure chalybeo-violascens, punctata; antennis nigris; thorace lateribus ultra medium luteomarginato, maculis 8, scutello maculis 6, nigris; subtus pectore chalybeo, abdomine luteo, macula media nigra, segmento singulo utrimque macula ovata chalybea; pedibus nigrochalybeis, femoribus longe ultra medium luteis. Long. 14, lat. 7 millim.

Habitat in Caffraria interiore.

CHOEROCORIS (DALLAS.)

1. *C. personatus*: citrinus; capitis apice, basi lineisque 2 longitudinalibus mediis, thoracis maculis 2 irregularibus anticis, scutelli maculis 6, quarum 2 basalibus majoribus approximatis, 4 mediis semicirculariter positae, antennisque nigris; pectore nigrescente, luteomaculato; abdomine subtus utrimque vitta lata obliqua postice cum opposita connexa, punctisque marginalibus duplici serie positae, nigris; pedibus nigris, tibiis extus flavescentibus. Long. 12, lat. 7½ millim.

Habitat in Caffraria.

BOLBOCORIS (Am. & Stæv.)

1. *B. sordidus*: lividus, rude rugosus, nigrofusco-punctatus; capite inæquali, lineis 2 longitudinalibus mediis impressis, basin versus divergentibus, antennis testaceis; thorace inæqualiter impresso; scutello antice callis 2 sordide albidis, utrimque oblique impresso; subtus fuscovarius, femoribus fuscis, tibiis basi excepta tarsisque pallidis. Long. 5, lat. 4 millim.

Habitat in Caffraria.

2. *B. xanthopus*: niger, rude rugosopunctatus; capite longitudinaliter bicanaliculato; thorace antice impressionibus pluribus inæqualibus, medio longitudinaliter carinato; scutello medio carinato, antice utrimque oblique profunde impresso; pedibus dilute fulvis, basi nigris. Long. 5, lat. $3\frac{1}{2}$ millim.

Habitat in Caffraria.

3. *B. misellus*: sordide flavescens, fuscopunctatus; capite ænescente, lineis 2 longitudinalibus impressis inter oculos oblitteratis, antennis testaceis; thorace antice maculis 2 transversis, viridiænescentibus, fasciaque media transversa dilutiore, parcius punctata; scutello basi punctis 3 albidis; abdomine subtus ænescente-nigro, margine sordide flavescente, fuscopunctato; pedibus stramineis. Long. $4\frac{1}{2}$, lat. 3 millim.

Habitat in Caffraria.

EURYGASTER (Laf.)

1. *E. natalensis*: griseoluteus, rugulosopunctatus; capite margine laterali lineisque 2 longitudinalibus mediis nigrofuscis; thorace scutelloque vittis sæpe abruptis, obsoletis, e punctis nigrofuscis compositis. Long. 11, lat. 6 millim.

Habitat in Caffraria.

Variat interdum obscurior, totus etiam nigrescens.

PODOPS (Laf.)

1. *P. spinicollis*: fuscus, punctatus; capite convexo, apicem versus subangustiore; thorace antice utrimque acute spinoso, mox pone medium unidentato, impressione transversa media; scutello utrimque parum sinuato; subtus nigropiceus, grisescente-sericeus, pedibus nigris, tibiis posterioribus tarsisque testaceis. Long. $7\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ millim.

Habitat in Caffraria.

Variat supra fere nigropiceus.

2. *P. natalensis*: fusco-griseus, punctatus; capite subconcano, quadrato; thorace antice utrimque spina parva subporrecta, medio subbidentato, rugis 2 inæqualibus mediis, impressionem transversam includentibus; scutello abdomine brevior, apicem versus angustior; abdomine disco nigrofusco; antennis pedibusque testaceis. Long. 8, lat. $4\frac{1}{2}$ millim.

Habitat in terra Natalensi.

CORIMELENA (WARR.)

1. *C. impicta*: fere semiglobosa, ænescentenigra, punctatissima, opaca; antennis fuscoferrugineis; thorace antice callis 2 irregularibus, depressis, politis; subtus cum pedibus nigra, tarsis fuscoflavescentibus. Long. $3\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ millim.
Habitat in Caffraria.

COPTOSOMA (LAP.)

1. *C. sex-notatum*: convexum, nigrum, nitidum, parce subtiliter punctatum; capite maculis 2 anteocularibus antennisque flavotestaceis; thorace maculis 2 apicalibus, lineis 2 obliquis transversis, margineque furcate, dilute luteis; scutello ænescentenigro, margine, humerorum excepto, flavo, maculis 4 basalibus, quarum 2 mediis majoribus luteis, lateralibus flavis; abdomine subtus ænescentenigro, margine maculisque parvis lateralibus luteis; pedibus testaceis, basi piceis. Long. 4, lat. $3\frac{1}{2}$ millim.
Habitat in Caffraria.
2. *C. bisignatum*: punctatissimum, nigrum vel nigropiceum; antennis pedibusque testaceis; thorace maculis 2 apicalibus marginibusque lutescentibus; scutello maculis 2 basalibus margineque posteriori dilute luteis; subtus ænescente-nigrobrunneum, abdominis margine punctisque lateralibus dilute luteis. Long. $3\frac{1}{2}$ —4, lat. $2\frac{1}{2}$ —3 millim.
Habitat in Caffraria.
3. *C. limbatellum*: punctatum, nigrum; capite maculis 2 anteocularibus flavis, antennis pedibusque testaceis, femoribus basi infuscat; thorace lateribus, scutelloque posteriori anguste flavomarginatis; abdomine subtus ænescente-nigro, margine maculisque lateralibus dilute luteis. Long. $3\frac{1}{2}$, lat. 3 millim.
Habitat in Caffraria.
4. *C. circumductum*: punctatum, nigrum; capite margine anteoculari, antennis pedibusque flavotestaceis, femoribus basi leviter infuscat; thorace maculis 2 apicalibus lateribusque anguste flavis; scutello pone medium flavomarginato; subtus abdomine ænescente-nigro, margine maculisque lateralibus lutescentibus. Long. $2\frac{1}{2}$ —3, lat. 2—3 millim.
Habitat in Caffraria.
5. *C. costale*: punctatum, nigrum; capite marginibus reflexis, antennis pedibusque fuscopiceis; thorace medio transversim leviter impresso; scutello apice subsinuto; hemelytris costa flava; abdomine basin versus flavomarginato. Long. $3\frac{1}{2}$, lat. $3\frac{1}{2}$ millim.
Habitat in terra Natalensi.

PLATASPIS (WESTW.)

1. *P. Wahlbergi*: valde convexa; tota nigra, confertim luteomaculata et reticulata, subtiliter vage punctata; capite modice concavo, antennis rufotestaceis; thorace antice angulariter late emarginato,

lateribus rotundato explanato; scutello oblique ampliato, posterius sensim rotundato, apice obtuso, vix sinuato; subtus pectore glaucescente, abdomine luteo, segmento singulo basi tenuissime nigro, et utrimque linea abbreviata, similiter colorata. Long. 13, lat. 12 millim.

Habitat in Caffraria interiore.

2. *P. semiglobosa*: convexa, subtiliter crebre rugosopunctata, nigra; capite utrimque impresso, parce luteopunctato, antennis nigris, basi testaceis; thorace antice emarginato, lateribus rotundato-explanato, pone apicem maculis 2 dilute sanguineis; scutello lateribus obliquis, posterius sensim rotundato, apice obtuso; subtus pectore griseopruinoso, abdomine fuscocastaneo, margine extimo luteopunctato; femoribus dilute sanguineis, tibiis tarsisque fuscis. Long. 12, lat. 10 millim.

Habitat in Caffraria.

PHYMATOCORIS (Nov. Gen.)

(*φῦμα*, tuberculum et *κόρις*, cimez.)

Caput subquadratum, fere perpendiculare, antennis mediocribus, art. 1 crassiore, 2, 3 et 4 longitudine æqualibus, ultimo parum longiore, elliptico. Thorax convexus, antice valde declivis, angulis posticis productis, rotundatis. Scutellum mediocre, triangulare, basi gibbum, apice tuberculo instructum. Membrana coriacea. Abdomen subconvexum, segmento singulo lateribus turgido. Pedes validi, tarsi mediocres.

1. *P. strumosus*: fere quadratus, totus tuberculatus, verrucosus, fuscus; antennis ochraceis; scutello basi longitudinaliter impresso; membrana nigrofusca; subtus cum pedibus spinosis ochraceus, rude fuscopunctatus. Long. 6, lat. 4½ millim.

Habitat in Caffraria interiore.

PENTATOMOIDES.

CANTHECONA (Am. & SERV.)

1. *C. miniatescens*: miniatescens, dilute fuscopunctata; capite vitta media ochracea vittisque 2 chalybeis; thorace vittis 6 latis dilute ochraceis, utrimque spinoso, anterieus ut et impressione obliqua supra spinas laterales nigrochalybeo-punctato; scutello basi maculis 4, quarum 2 mediis majoribus, quadratis, nigrochalybeo-punctatis, lateribus dilute ochraceo; hemelytris dilute sordide miniatescentibus, margine fortius ochraceo-punctatis, membrana fuscescente; pectore pedibusque chalybeo-variis, abdomine subtus medio lineis nonnullis transversis, macula fere apicali spiraculisque chalybeis. Long. 12, lat. 6½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

GLYPsus (DALLAS.)

1. *G. pictiventris*: cuprescente-fuscoferrugineus, punctatus, hemelytris exceptis subnitidis; capite rugis 3 longitudinalibus; antennis ru-

fotestaceis, fuscoannulatis; thorace postice utrimque spina magna, oblique truncata, antice utrimque crenulato, rugulis parvis flavescens parce sparso; scutello maculis 3 basalibus parvis, aliisque minoribus lutescentibus praesertim posterius parce sparso; hemelytris griseoferrugineis, parce pallido-variis, membrana fusca; abdomine subtus crebre aeneopunctato, maculis rufescentibus septuplo serie positis. Long. 13—15, lat. 7—8 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

Variat interdum ruga magna transversa flavescens in medio thoracis.

EURHINOCORIS (Nov. Gen.)

(*Ευρίτις*, cui magnus est nasus, et *κόρις*, cimex.)

Caput elongatum, subparallelum, cylindricum, spina ad originem antennarum armatum; antennis art. 2, 3 et 4 longitudine subaequalibus, ultimo longiore. Thorax convexus, transversus, antice emarginatus, lateribus obliquis pone medium gibbosis, postice leviter bisinatus, utrinque angulariter productus. Scutellum sat magnum, triangulare, apice rotundatum. Abdomen subtus convexus, lateribus inflexum.

1. *E. straminipes*: obovatus, densissime punctatus et rugulosus, aeneocuprescens; antennis, rostro pedibusque flavescens; thorace medio litura magna coronaeformi, elevata, lutea; scutello apice luteovario; hemelytris fuscobrunneis, parce testaceovariis, membrana nigrofusca; abdomine subtus punctato, lateribus inaequali, nigrocuprescente. Long. 10, lat. 5 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

ARTHUS (DALLAS.)

1. *A. tartareus*: ovalis, latus, parum convexus, punctatus, ater, nitidus; capite ocellis rufopiceis, antennis fuscis; thorace lateribus fere rectis, apicem versus rotundatis, parce setoso; hemelytris margine ad humeros setosis, membrana fuscocuprescente. Long. 12, lat. 8 millim.

Habitat in terra Natalensi.

2. *A. porosus*: ovalis, convexiusculus, ater, sat forte punctatus; antennis fuscoferrugineis, breviusculis; thorace medio transversim leviter impresso, disco excepto fortius punctato, margine laterali setoso; membrana dilute fuscescente; tarsi ochraceis. Long. 6, lat. 4 millim.

Habitat in terra Natalensi.

3. *A. opacus*: ovalis, ater, punctatus, planiusculus; antennis fuscoferrugineis, extrorsum dilutioribus; thorace nitido, punctato, disco laevi, margine parce piloso; membrana dilute fuscescente; pedibus nigropiceis, tarsi ochraceis. Long. 6½, lat. 4 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

4. *A. difficilis*: ovalis, niger, punctatus, margine parce pilosus; antennis fuscoferrugineis; thorace antice, lateribus et basin versus

punctato, medio transversim sub-bidepresso, basi picescente; hemelytris piceis, membrana dilute fuscescente; tarsis dilute ochraceis. Long. $7\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ millim.

Habitat in terra Natalensi.

5. *A. picinus*: ovalis, rufopiceus, planiusculus, margine parce pilosus; antennis ochraceis; thorace nitido, disco excepto subtiliter parce punctato, basi dilutiore; scutello hemelytrisque densius punctatis, membrana dilute fuscescente; subtus obscurior, pedibus ferrugineis, tarsis dilute ochraceis. Long. $5-6\frac{1}{2}$, lat. $3-4$ millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

6. *A. lepidus*: ovalis, nigropiceus, punctatus, subnitidus, margine pilosus; antennis fuscis, crassiusculis; thorace medio subimpresso, basi ochraceo-marginato; hemelytris dilutioribus, membrana sordide albida; pedibus ferrugineis, tarsis flavis. Long. $4\frac{1}{2}$, lat. 3 millim.

Habitat in Caffraria interiore.

SCIOCORIS (FALL.)

1. *S. rusticus*: ochraceus, fuscopunctatus; capite semicirculari, basi fuscescente; thorace lateribus leviter rotundatis, medio transversim subimpresso; scutello litura triradiata, obsoleta, dilutiore; membrana hyalina, albida; abdomine subtus dilute ferrugineo, margine dense fuscopunctato, medio nigro. Long. $4\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ millim.

Habitat in terra Natalensi.

PARAMECOCORIS (STÄL.)

(PARAMECUS (FIEBER.))

1. *P. phaleratus*: ovalis, griseoflavescens, fuscopunctatus; capite scutelloque vitta media, thorace vittis 3 lævibus flavescens; antennis extrorsum fuscescentibus; subtus cum pedibus flavotestaceus, fuscopunctatus. Long. 11 , lat. $6\frac{1}{2}$ millim.

Hab. in terra Natalensi.

2. *P. fatidicus*: subovatus, supra dilute ochraceus, fuscopunctatus; antennis rufescentibus; thorace mox pone apicem punctis 2 approximatis nigris; hemelytris subinfuscatis, membrana fuscescente, obscurius maculata; abdomine subtus sordide luteo, vitta utrimque laterali, abbreviata punctisque marginalibus nigris. Long. $12-14$, lat. $7-8$ millim.

Habitat in terra Natalensi.

3. *P. lutulentus*: late ovalis, ochraceus, brunneopunctatus; antennis articulis 2 ultimis fuscis; scutello apice lutescente; abdomine subtus ochraceo, margine nigrovario, lateribus brunnescente; pedibus fuscopunctatis, tarsorum articulo ultimo nigropiceo. Long. 11 , lat. 7 millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. *P. ellipticus*: ellipticus, testaceus, dense fuscopunctatus; antennis ochraceis, articulo ultimo, basi excepta, fusco; membrana fusce-

ascente; subtus utrimque vitta laterali apicem versus abbreviata. fuscescente. Long. 9, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

ATELOCERA (Laf.)

1. *A. lentiginosa*: rugosopunctata, nigrofusca, luteoverrucosa; capite apice hispidoso, lateribus, carina media punctisque 2 basalibus luteis, antennis articulis 3 apice, 4 toto ochraceis; thorace lateribus leviter sinuatis, antice crenulatis, angulis humeralibus supra oblique impressis; membrana silacea, valide fusconervosa; abdominis margine luteomaculato; pedibus fuscoferrugineis, geniculis sordide flavotestaceis. Long. 17, lat. 9 millim.

Habitat in terra Natalensi.

2. *A. natalensis*: nigrofusca, dilute flavoverrucosa, subtiliter albidopunctata; capite apice subtruncato; thorace lateribus leviter sinuatis, antice crenulatis, angulis humeralibus supra oblique impressis; membrana albida, nervis fuscis; abdomine subtus cum basi pedum ferrugineo, illius limbo late nigroænescente, margine sordide flavo-vario. Long. 16, lat. 9 millim.

Habitat in terra Natalensi.

3. *A. caffra*: nigrofusca, punctata, parce dilute flavoverrucosa; capite apice submarginato; thorace angulis humeralibus supra oblique impressis; membrana fusca, nervis nigris; subtus ferruginea. Long. 15, lat. 9 millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. *A. Spinola*: ochracea, fuscopunctata et variegata; capite apice emarginato, antennis nigrofuscis; thorace lateribus leviter sinuatis, ante medium impressione transversa rugaque media longitudinali obsolete ochracea, in scutellum etiam decurrente; membrana fuscescente, nervis obscurioribus; abdominis margine nigrovario; subtus ferruginea, macula utrimque magna albidosericea vel mucorea; pedibus ferrugineis. Long. 16, lat. 9 millim.

Habitat in terra Natalensi.

AGONOSCELIS (Spin.)

1. *A. puberula*: ovalis, supra ochracea, crebre nigrofuscopunctata, tota pilosa; capite antennis nigris; thorace medio leviter transversim impresso; scutello lateribus apiceque dilutioribus; membrana albida, fusconervosa; abdomine margine luteo- et nigro-vario; subtus dilute flavescens, seriatim nigropunctata; pedibus sordide flavis, parce fuscopunctatis et maculatis, tarsis fuscis. Long. 8½, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

CÆNOMORPHA (DALLAS.)

1. *C. ochripes*: silacea, dense æruginoso-punctata; capite margine elevato, silaceo, antennis sat longis, articulis 2 ultimis apice fuscescentibus;

scentibus; thorace antice lateribus crenulato, pone medium angulato; membrana ænescente; pedibus dilutioribus, tibus longitudinaliter nigro-ænescente-lineatis. Long. 18, lat. 11 millim.

Habitat in terra Natalensi.

MORMIDEA (Am. & SERV.)

1. *M. albidomaculata*: supra griseoflavescens, fuscopunctata; capite apicem versus subangustiore, antennis ochraceis; thorace apice lateribusque anguste flavomarginato, medio utrimque spina acuta nigrofusca; scutello basi utrimque macula elevata apiceque flavo-albidis; membrana sordide albida; subtus sordide flava, abdomine vittis 3 æneo-fuscescentibus, fortiter punctatis; pedibus flavotestaceis. Long. 8½, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

2. *M. albidofusca*: supra fuscocastanea; capite fere parallelo, utrimque subsinuato, antennis ochraceis; thorace antice flavescente-rugoso, utrimque spina acuta nigrofusca armato; scutello litura elevata flavescens, anterieus fuscata; subtus sordide flava, vittis 3 fuscobrunneis, media angustiore; pedibus testaceis, subtiliter fuscopunctatis. Long. 9, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

3. *M. boschjesmana*: dilute flava, fuscopunctata; capite fere parallelo, ante oculos sinuato, antennis flavotestaceis; thorace utrimque spina acuta subproducta, rubescens, apice nigrofusca; scutello basi utrimque impunctato, flavo; hemelytris dilute ochracescentibus, membrana hyalina; subtus parce nigropunctata, abdomine utrimque macula sericea, segmentoque singulo apice ciliato; pedibus testaceis. Long. 7—9½, lat. 4—5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

EYSARCORIS (HAHN.)

1. *E. misellus*: obovatus, griseoflavescens, fuscopunctatus; capite subquadrato, apice rotundato, ænescente; thorace apice rugis 2 obliquis ænescente-nigris, medio fascia angusta irregulari albida; scutello basi utrimque macula parva obsoleta albida; membrana albido-hyalina; subtus vitta intramarginali, interdum obsoleta, abdominisque disco ænescente-nigris; pedibus flavotestaceis, fuscopunctatis. Long. 4½, lat. 3 millim.

Habitat in Caffraria interiore.

ÆLIA. (FABR.)

- A. bella*: oblongo-ovata, virescens; capite apice leviter emarginato, flavocincto; thorace lateribus dilute testaceis; scutello apice pallescente; hemelytris ad humeros testaceis, membrana sordide albida; pectore utrimque punctis 2 albidis, abdomine subtus medio pallescente; tibus tarsisque subrufescentibus. Long. 7½ lat. 4 millim.

Habitat in Caffraria interiore.

2. *A. griseoflava*: obovata, griseoflavescens, dilute fuscopunctata; capite vitta antice attenuata nigrofusca, per lineam mediam flavescens divisa, antennis testaceis; thorace lateribus obliquis, antice utrimque rugis 2 transversis, carinaque media longitudinali obsoleta, medio leviter transversim impresso, posterius crebrius fuscopunctato; scutello basi lineis 2 obliquis, vittaque apicali subfuscis, interdum obsoletis; membrana sordide albida, fusco-nervosa; subtus cum pedibus silacea, parce pilosa et fuscopunctata; pectore lateribus fusco. Long. 6, lat. 4 millim.

Habitat ad Boschjesmans Rand.

3. *A. natalicola*: obovata, griseoflavescens, crebre fuscopunctata; capite vitta antice attenuata, per lineam mediam flavescens divisa, antennis ochraceis; thorace margine laterali, carina media longitudinali, in scutellum etiam decurrente, rugisque utrimque 2 anticis, quarum una transversa, altera longitudinali obliqua, flavescens; scutello vittis 3 fuscis, quarum 2 lateralibus obliquis, postice abbreviatis; membrana albida, hyalina; subtus cum pedibus silacea, lateribus fortius griseopunctata, pectore utrimque punctis 4 serie positis. Long. 6½, lat. 4½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. *A. pumila*: obovata, flavescens-grisea; capite apice leviter emarginato, lateribus vittisque 2 approximatis fuscis; thorace quadri-fuscovittato, antice leviter depresso, utrimque rugis 2 obliquis, et 5 longitudinalibus obsoletis; scutello medio albido-carinato, utrimque fusco; membrana albida; subtus margine seriatim fuscopunctata. Long. 5, lat. 3 millim.

Habitat in terra Natalensi.

PENTATOMA. (PAL. BEAUV.)

1. *P. canosula*: late ovalis, flavo-grisescens, vage fuscopunctata; capite fere quadrato, apice leviter rotundato, antennis subochraceis; thorace lateribus parum sinuatis, callis inæqualibus obsoletis transversis; scutello irregulariter flavescens-rugoso; subtus sordide flava, cum pedibus parce fuscopunctata, abdominis margine supra nigrovario. Long. 7½, lat. 5 millim.

Habitat ad Rondebosch.

2. *P. inquinata*: ovalis, griseoflavescens, æneo-fuscopunctata; capite lateribus obliquis, apice late rotundato, antennis fuscescentibus; thorace medio transversim levissime depresso; scutello apice fulvo; membrana fuscescente; subtus cum pedibus dilute virescente-flava, abdomine parce subtiliterque fuscopunctato; femoribus apicem versus punctis nigris. Long. 7½, lat. 4 millim.

Habitat ad Rondebosch.

3. *P. blanda*: late ovalis, griseoflavescens, dense fuscopunctata; capite fere triangulari, lateribus fusco-æneopunctato, antennis pedibusque flavescens, illarum apice fusca; thorace anterioribus callis 2 parum elevatis nigro-æneis, maculam flavam includentibus, marginibus rugulisque transversis mediis dilutioribus, minus

dense fuscopunctatis; scutello basi utrimque macula parva al-bida; membrana dilute fuscescente; subtus dilute flavescens, æneo-punctata, abdomine basi macula nigroænea, margine punctis ni-gris. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. *P. moerens*: ovalis, sordide griseo-flavescens, punctata, nitida; ca-pite subrotundato; thoracis medio lineis 2 parallelis, transversis, undatis, scutellique apice dilutioribus; hemelytris rufotestaceis, costa ultra medium dilute flavescente, membrana dilute fusce-scente, nervis obscurioribus; subtus medio vitta nigrofusca, pun-ctisque nonnullis serialibus nigris; femoribus basi punctis nigro-fuscis, tarsis apice picescentibus. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. 4 millim.

Habitat in terra Natalensi.

5. *P. Limpoponis*: late obovata, sordide griseo-flavescens, vage fusco-punctata; capite oblongo-quadrato, lateribus leviter sinuato; tho-race lateribus anguste flavo, angulis posticis subproductis, rotun-datis, nigrofuscis; scutello basi callis 3 albidis, medio longitudi-naliter minus dense fuscopunctato; membrana dilute fuscescente, nervis obscurioribus; subtus cum pedibus pallide flava fusco-punctata, abdomine medio maculis irregularibus fusco-ænescen-tibus, margine fuscovario. Long. 8, lat. 5 millim.

Habitat ad Boschjesmans Rand et in tractibus fluvii Limpopo.

6. *P. trigemmis*: late ovalis, supra fuscogrisea, fuscopunctata; capite fere parallelo, antennis testaceis; thorace antice lateribus flavo, utrimque posterius producto, rotundato, nigrofusco; scutello basi utrimque macula elevata apiceque albidis; membrana fusco-æne-scente; subtus cum pedibus sordide flava, fuscovariegata et pun-ctata. Long. 8, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

7. *P. Mulsanti*: obovata, griseoflavescens, rude fuscopunctata; capite punctatissimo, lateribus subsinuato, antennis flavotestaceis; tho-race margine laterali, fasciaque angusta media flavoalbidis, utrim-que obtuse subangulato; scutello vittis lateralibus obliquis, medio apicem versus confluentibus, flavis; pectore fuscescente, abdomine subtus dilute flavo, vittis 3 fuscoæneis. Long. $8\frac{1}{2}$, lat. 4 millim.

Habitat in terra Natalensi.

8. *P. subrufa*: ovalis, dilute cinnabarina, vage punctata; capite sub-triangulari, apice rotundato, antennis apicem versus fuscescen-tibus; thorace medio punctis 2 nigris, pone medium fuscescente; scutello maculis 4 parvis nigrofuscis; hemelytris præsertim basi nigropunctatis, membrana fusco-ænescente; pedibus testaceis. Long. $7\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ millim.

Habitat in terra Natalensi.

9. *P. natalensis*: fere ovalis, dilute flavovirescens; capite apicem ver-sus sensim angustiore, antennis rufescentibus, apicem versus fu-scis; thorace antice maculis 4 parvis nigrofuscis, pone medium dense fuscopunctato, utrimque spina porrecta purpurascente; scu-



tello flavescente, basi maculis 3 albidis; hemelytris fusco-virescentibus, vitta irregulari dilute carnea, membrana dilute fusca. Long. 9, lat. 5½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

10. *P. inops*: late obovata, sordide viridi-flavescens, fuscopunctata; capite lateribus obliquis, apice subrotundato, antennis ochraceis, basi dilute virescentibus; thorace medio transversim ochracecente, angulis posticis parum prominulis, subobtusis; scutello apice virescente; membrana sordide albida; subtus parce viridi-punctata, pedibus dilute virescentibus, parce fuscopunctatis. Long. 6½, lat. 4½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

11. *P. lineaticollis*: late ovalis, supra nigro-ænea, punctata; capite triangulari, lineis 3 basalibus longitudinalibus flavis, margine anteculari luteo, antennis extrorsum fuscis; thorace lineis 7 longitudinalibus, antice abbreviatis, margineque antico flavis, macula apicali lutea; scutello lateribus, linea longitudinali media apiceque flavis, maculis 2 ante medium limboque apicali luteis; hemelytris margine humerali, litura media apiceque luteis, membrana fusca; subtus sordide flava, longitudinaliter nigrovario; pedibus dilute virescente-flavis, femoribus apice luteis annuloque fusco. Long. 6½, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

12. *P. lutulenta*: obovata, sordide ochracea, fuscopunctata; capite oblongo-quadrato; thorace angulis posticis subprominulis, rotundatis; scutello litura magna triangulari, minus punctata, dilutior; membrana sordide albida, obsolete fusconervosa; subtus cum pedibus dilutior, lateribus parce fuscopunctata. Long. 7—8½, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

13. *P. patruelis*: subovalis, sordide griseo-flavescens, fuscopunctata; capite lateribus obliquis, apice rotundato, antennis dilute ochraceis; thorace angulis posticis productis, supra nigris; scutello apice flavescente, membrana dilute fusca; subtus punctis æneovirescentibus parce adspersa; pedibus dilute virescentibus, parce fuscopunctatis. Long. 7½, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

STRACHIA. (Hann.)

1. *S. Wahlbergi*: late ovalis, supra nigra, confertim punctata; capite oblongo-triangulari, vittis 2 luteis; thoracis marginibus, cruce media, scutelli lateribus, linea longitudinali media, hemelytrorumque margine, vitta, apiceque luteis; membrana nigrofusca; subtus lutea, abdomine lateribus, segmentisque 3 ultimis macula basali nigris; pedibus nigropiceis, femoribus ultra medium flavotestaceis. Long. 10½, lat. 6½ millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

2. *S. tibialis*: ovalis, fuscopicea, punctata; capite lateribus obliquis, apice truncato; thorace lateribus anguste, basi latius luteomarginato, medio transversim leviter impresso et fortius punctato; antennis fusciscentibus; scutello apice subluteo; hemelytris macula media albida, membrana subhyalina; abdomine subtus brunnescente, pedibus fuscis, tibiis basi excepta flavescens. Long. 5, lat. $3\frac{1}{2}$ millim.

Habitat in terra Natalensi, in Nubia etiam a Dom. HEDENBORG inventa.

RHAPHIGASTER. (LAP.)

1. *R. orbis*: obovatus, supra flavescens, crebre punctulatus; capite subtriangulari, apice rotundato, basi utrimque macula virescente; thoracis maculis 3, quarum media subcordiformi, scutelli maculis 3 basalibus, quarum media majore rhomboidea, hemelytrorumque macula fere apicali, virescentibus; membrana albida; subtus cum pedibus antennisque viridis, harum art. 3 apice, 4 et 5 fere totis fusciscentibus. Long. 13, lat. $7\frac{1}{2}$ millim.

Habitat in terra Natalensi.

2. *R. fuscoirroratus*: obovatus, griseoflavescens, sat rude punctatus; antennis testaceis, articulis ultimis apice infuscatis; thorace antice rugis 2 transversis, linea media longitudinali, in scutellum etiam decurrente, dilutior; scutello basi maculis 2 approximatis, apice fusco; hemelytris membranaque fuscomaculatis; subtus lateribus parce fuscopunctatus, tarsis dilute picescentibus. Long. 9—11, lat. 4—5 millim.

Habitat in terra Natalensi et ad Boschjesmans Rand.

3. *R. fuscosparsus*: late ovalis, griseoflavescens, punctatus; antennis rufescentibus, art. 1 flavescens, 3, 4 et 5 apice fuscis; thorace lateribus leviter rotundatis, margine fuscomaculato; scutello basi maculis 2 fuscis, linea longitudinali media dilutior; hemelytris fuscosparsis, membrana sordide albida, obsolete fuscomaculata; subtus fuscopunctatus; tarsis apice fusciscentibus. Long. 10, lat. $6\frac{1}{2}$ millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. *R. flavulus*: obovatus, flavescens, sat subtiliter punctatus; capite subrotundato, ante oculos subsinuato, antennis art. 3 ultimis rufotestaceis; membrana albido-hyalina; pectore parce subtiliter fuscopunctato, spiraculis nigris. Long. 8—10, lat. $5\frac{1}{2}$ —7 millim.

Habitat in terra Natalensi.

5. *R. purus*: ovalis, dilute rufotestaceus, supra subtilissime fuscopunctatus; capite longiore, rotundato, antennis art. 3 apice, 4 et 5 totis dilute rufescentibus; thorace posterius obscurior; membrana albida, hyalina; abdomine margine supra punctis fuscis, obsolete. Long. 8, lat. 5 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

Variat dilute flavescens, tarsis picescentibus.

6. *R. decoratulus*: ovalis, niger, punctatus; capite lateribus obliquis, subsinuatis, apice late rotundato, lineis 2 basalibus flavis, callo longitudinali medio apiceque rufis, antennis pedibusque testaceis, illarum art. 3 ultimis fuscis; thorace antice lateribusque rufomarginato, fascia obliqua laterali, maculisque disci irregularibus, flavis; scutello basi maculis 3, quarum media flava, lateralibus lutescentibus, posterius macula lyriformi flava; hemelytris praesertim basi flavovariis, membrana sordide albida, fascia obsoleta fuscescente; abdomine subtus macula media magna flava, margine luteovario, pedibus flavotestaceis. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ millim.
Habitat in tractibus fluvii Limpopo.
7. *R. amoenus*: fere obovatus, ænescente-niger, punctatus; capite lateribus ante oculos sinuato, apice late rotundato, margine vittisque 2 basalibus flavis, antennis fuscotestaceis; thorace antice lateribusque flavomarginato, dorso transversim flavovariegato; scutelli maculis 5 et apice, hemelytrorumque macula media flavis; membrana fuscescente; pectore flavovario, abdomine vittis 2 obliquis margineque serie macularum flavis; pedibus luteis. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ millim.
Habitat in terra Natalensi.
8. *R. scurrilis*: subovalis, griseoflavescens, brunneopunctatus; capite ante oculos sinuato, apice late rotundato, basi utrimque viridi-ænescente; antennis extrorsum leviter infuscat; thorace antice macula fulva, callis 2 obsoletis, obliquis, irregularibus, nigrovirescentibus; scutello basi macula utrimque fulva, ante apicem albidam maculis 2 nigrofuscis; hemelytris ad membranam maculis 2 fuscis, hac obsolete fuscofasciata; subtus sordide flavus, lateribus nigropunctatus, abdomine luteovario, macula pone medium margineque brunnescentibus. Long. 7, lat. 4 millim.
Habitat in Caffraria interiore.

LAMUS (Nov. Gen.).

Caput subtriangulare, apice rotundatum, supra planum, marginibus leviter reflexis; antennis breviusculis, 5-articulatis, art. 1 capite brevior, 2 minimo, praecedentis dimidia longitudine, 3 longior, subcompressa, 4 hoc nonnihil brevior, 5 longitudine 3tiii, subfusiformi; rostro brevissimo. Thorax lateribus obliquis, antice subsinuatus, postice basin scutelli tegente. Scutellum triangulare, æquilaterum, apice subito angustatum, truncatum. Membrana hyalina, nervis longitudinalibus. Mesosternum carinatum, carina postice parum, antice magis elevata; metasternum sat latum, antice angulariter productum, postice emarginatum, spinam abdominis basalem accipiens. Pedes validi, tarsi 2-articulatis.

1. *L. Dallasi*: fere obovatus, subtiliter punctatus, dilute viridi-flavescens; antennis pedibusque pallide rufescentibus; thorace limbo extimo subtilissime serrato, nigro; scutello apice puncto dilute rubescente; membrana albida. Long. 27—28, lat. 14—15 millim.
Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

GONIELYTRUM (Nov. Gen.)

(*gnathia*, *angulus* et *fluvior*).

Caput subtriangulare, apice late rotundatum, supra anterieus concavum; antennis brevibus, 4-articulatis, art. 1 minimo, 2 hoc triplo fere longiore, subcompresso, utrimque nonnihil dilatato, 3 minore, 4 longiore, subfusiformi; rostro brevissimo. Thorax antice profundius sinuatus, postice basin scutelli tegens, lateribus dilatatis, rotundato-ampliatis. Scutellum triangulare, æquilaterum, apice subito angustatum, truncatum. Hemelytra basin versus margine angulum obtusum formantibus (unde nomen generis), membrana hyalina, nervis longitudinalibus. Mesosternum foliaceo-carinatum, carina basi minus, antice magis elevata. Metasternum concavusculum. Abdomen subcircularè, posterius nonnihil angustatum, lateribus subdilatatum. Pedes sat validi, tarsi 2-articulatis.

1. *G. circuliiventris*: late ovatum, subtiliter rugulosum, dilute virescente-flavum; antennis articulo ultimo dilute rufescente; scutello flavotestaceo; hemelytris punctis nonnullis fuscis parce vage sparsis; membrana albida. Long. 27, lat. 19 millim.

Habitat in terra Natalensi.

CYCLOPELTA. (Am. & Grav.)

1. *C. patruelis*: supra rubropicea, rugulosa, punctata; capite, pedibus antennisque, articulo ultimo fulvo excepto, nigris; thorace lateribus obscuriore; scutello apice fulvo; membrana nigrofusca. Long. 15, lat. 10 millim.

Habitat in terra Natalensi.

ASPONGOPUS. (Lap.)

1. *A. monachus*: piceus, rugulosus, punctatus; antennis nigris, articulis 2 ultimis helvolis; membrana nigrofusca, subænescente, basi maculis testaceis; pedibus nigris. Long. 20—22, lat. 12½—14 millim.

Habitat in tractibus fluvii Gariep.

2. *A. sutor*: fuscoferrugineus, rugulosus; antennis nigris, articulis 2 ultimis luteis; membrana sordide ochracea, nervis fuscopunctatis; subtus nigrofusus, pedibus nigris. Long. 18, lat. 11 millim.

Habitat in terra Natalensi.

3. *A. sartor*: fuscoferrugineus, rugulosus, punctatus; antennis dilute rubris, articulis basalibus obscurioribus; membrana magna, silacea; tarsi dilute ferrugineis. Long. 19, lat. 12 millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. *A. pullus*: fuscocastaneus, rugulosopunctatus; capite apice, antennis pedibusque rufoferrugineis; thoracis abdominisque margine laterali, scutelli apice dilute citrinis; pectore fusco-ænescente, abdomine subtus dilute rubrotestaceo. Long. 12, lat. 7½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

PRIONOGASTER. (Nov. Gen.)

(πρίων, serra et γαστήρ, venter).

Caput subplanum, apice bifidum, ante oculos spina armatum; antennis validis, 4-articulatis, compressis, dilatatis, art. 1 brevi, 2 longissimo, aliisque latiore, 2 ultimis brevioribus, oblongo-ovatis, apicali acuto; rostro brevi, pedes intermedios vix attingente. Thorax latitudine dimidio brevior, modice convexus, antice emarginatus, lateribus dilatatus, postice late leviter rotundatus. Scutellum mediocri, triangulare, apice reflexo, bifido. Membrana sat magna. Pedes validi, tarsorum art. 1 reliquis latior et longior. Abdomen subtus valde convexum, lateribus dilatatum, segmento singulo utrimque biserrato.

1. *P. Westwoodi*: ovalis, rugosus, fuscoferrugineus; antennis ferrugineis; membrana nigra; subtus cum pedibus ferrugineus. Long. 19, lat. 12 millim.

Habitat in terra Natalensi.

PHYLLOCEPHALA. (LAP.)

1. *P. porosa*: subovalis, forte punctata et rugosa, fuscoferruginea, cinereo-variegata; capite oblongo-triangulari, fere plano, impressionibusque triangularibus anticis thoracis cinerascentibus; antennis fuscipiceis; membrana sordide albida, fuscovaria; subtus sordide ochracea, pedibus cinerascentibus. Long. 17, lat. 9 millim.

Habitat in terra Natalensi.

2. *P. lentiginosa*: ovalis, rugosopunctata, dilute ochracea, fuscosparsa; capite postice convexo, anterieus plano, lobis extus rotundatis, apice distantibus, antennis apice fuscis; thorace antice utrimque et posterius dilute fusco-cinerascente; membrana sordide albida, fuscopunctata; pedibus fuscosparsis. Long. 14, lat. 7½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

3. *P. fasciata*: late ovalis, punctata, flavo-testacea; capite subconvexo, lobis extus rotundatis, antennis apice fuscescentibus; thorace pone medium fuscocinerascente, antice lateribus nigropiceo; scutello hemelytrisque fuscoirroratis, membrana dilutior, parce fuscopunctata; pectore cinereo, nigropunctato, abdomine subtus singulo latere maculis fuscis, serie positis, interdum ad vittam confluentibus. Long. 12—13, lat. 8 millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. *P. natalensis*: subovalis, punctata, sordide ochracea; capite subtriangulari, lobis planis, subacuminatis, distantibus; antennis subrufescentibus; thorace ante medium maculis 2 nigris, posterius fuscescente; scutello vittis lateralibus dilutioribus; hemelytris fuscis, membrana dilutior, fusco-punctata; subtus vittis 2 nigricantibus; pedibus fuscoferrugineis. Long. 12½, lat. 6½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

BASICRYPTUS. (H. SCHÄFF.)

1. *B. russatus*: obovatus, rugosopunctatus, dilute rufescens; antennis art. 4 apice, 5 toto fuscis; thorace antice dilutior, transversim

rugoso, ruga media elevatiore; hemelytris margine anguste albido, membrana albida, punctis nigris parce sparsa. Long. 17, lat. 11 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

2. *B. canosus*: obovatus, rugosopunctatus, sordide flavotestaceus; capite thoraceque antice pallidioribus, parce nigropunctatis, antennarum art. 4 apice, ultimoque toto fuscis; hemelytris margine anguste albido, apicem versus cum membrana albida parce subtiliterque nigropunctatis; tarsis rufis vel ochraceis. Long. 13—16, lat. 8—10 millim.

Habitat in tractibus fluvii Gariep.

Præcedenti valde similis et affinis, statura minore, colore punctisque parvis nigris hemelytthorum tamen diversus; an ejus varietas?

TETRODA. (AM. & SERV.)

1. *T. daemon*: ovalis, coriacea, punctato-rugosa, nigra; capite concavo, subcirculari, lobis parum distantibus, antennis piceis; thorace angulis anticis prominulis, lateribus subrotundato; hemelytris margine cinereo-pulverulento; membrana sordide albida. Long. 18, lat. 10½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

2. *T. angulicollis*: ovalis, fuscotestacea, punctata; capite concavo, lobis extus rotundatis, antennis subpiceis; thorace angulis anticis prominulis, ante fasciam mediam transversalem flavotestaceam maculis 2 irregularibus, nigrofuscis, nitidis, postice elevato, fusco-punctato; membrana fusca; pectore nigropunctato, abdomine subtus fusco; pedibus fuscoferrugineis. Long. 12—13, lat. 7½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

MACRINA. (AM. & SERV.)

1. *M. hottentotta*: oblonga, fuscopicea; capite plano, rugosopunctato, lobis apice rotundatis, antennis ochraceis, basi fuscis; thorace transverso, fortiter transversim rugoso, ruga media elevatiore, lateribus crenulato, ultra medium oblique ampliato, dein angulato; hemelytris dilutioribus, membrana sordide albescente, nervis parce fuscopunctatis. Long. 17, lat. 8½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

2. *M. mantis*: elliptica, fuscopicea; capite basi convexo, lobis planis, subacutis, antennis rufotestaceis, basi fuscis; thorace rugosopunctato, costis 2 mediis transversis, lateribus obliquis, dein rotundato, anterieus transversim depresso; scutello rugis 3 longitudinalibus dilutioribus; hemelytris fuscis, membrana pallescente, parce fuscopunctata; subtus sordide lutea, pectore fuscovario, vitta laterali flavescente; pedibus fuscopiceis. Long. 15, lat. 7 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

3. *M. rubens*: oblonga, ruguloso-punctata; capite plano; sordide ochraceo, lobis approximatis, antennis rufescentibus; thorace antice declivi, sordide ochraceo, lateribus antice crenulato, medio utrimque spina magna producta, supra nigra, armato, basi dilute sanguineo; scutello hemelytris dilute sanguineis; pectore sordide albido, abdomine subtus dilute rufescente, pedibus obscurioribus. Long. 18, lat. 7 millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. *M. affinis*: oblongo-obovata, punctata, dilute rubescens; capite plano, antennis ochraceis; thorace antice declivo, spina magna producta, apice supra nigra, utrimque armato; hemelytris extus obscurioribus, membrana subfusco-nervosa, subtus cum femoribus fuscopunctata. Long. 15, lat. 6 millim.

Habitat in terra Natalensi.

DICHELORHINUS. (Nov. Gen.)

(διχρηλος, bifidus et ριν, nasus).

Caput longe triangulare, lobis lateralibus longissimis, acutiusculis, subcylindricis, parum vel vix distantibus; antennis capite vix longioribus, crassiusculis, art. 1—4 longitudine subæqualibus, ultimo longiore, fusiformi; rostro coxas anticas attingente, crassiusculo. Thorax antice sinuatus, posterius transversim elevatus. Scutellum oblongo-triangulare. Pedes longitudine mediocres, crassiusculi, tarsis 3-articulatis, art. intermedio minimo, 1 et 3 longitudine fere æqualibus.

1. *D. histicus*: oblongo-ovalis, ruguloso-punctatus, dilute luteus; capite vitta media nigrofusca, antennis rufescentibus, art. ultimo subtus fuscosericeo; thorace maculis 2 basalibus transversis, apicali subquadrata, lateribusque, nigrofuscis; scutello fusco, basi abrupte luteo-trilineato, apice luteovario; hemelytris ochraceis, fuscomarginatis; subtus ochraceus, seriatim nigrovariegatus, tibiis præsertim anticis infuscat. Long. 14, lat. 6½ millim.

Habitat in tractibus fluvii Gariép.

DICHELOCEPHALA. (Nov. Gen.)

(διγρηλος, bifidus et κεφαλη, caput).

Caput elongato-triangulare, lobis lateralibus longissimis, acutis, apicem versus distantibus; antennis capite vix dimidio longioribus, sat gracilibus, art. 1 minimo, 2 hoc duplo fere longiore, 3 præcedentibus ambobus longitudine æquali, 4 hoc nonnihil minore, 5 subfusiformi; rostro coxas intermedias superante. Thorax antice sinuatus, lateribus obliquis, rectis. Scutellum oblongo-triangulare. Pedes mediocres, tarsis 3-articulatis, art. 1 maximo, 2 hoc triplo, 3 dimidio brevioribus.

1. *D. virescens*: elliptica, punctata, subrugulosa, luteo-virescens; capite lateribus ocellisque nigris, antennis rufis, apice fuscis; thorace lateribus anguste griseoluteo, linea intramarginali, ante medium abbreviata, nigra, maculis 2 pone apicem triangularibus

ochraceis, aliam virescentem singulo includentibus; hemelytris flavescens, ochraceopunctatis, membrana albida, hyalina; sub-
tus flavescens, vitta utrimque laterali virescente, pectore singulo
latere punctis 3 serialibus, nigris; geniculis rufescentibus, tibiis
posticis apice supra nigris. Long. 17, lat. 6 millim.

Habitat ad Boschjesmans Rand.

3. *Coturnix i Sverige.* — Hr C. G. LÖWENHJELM
hade i bref till Hr SUNDEVALL meddelat, att han i början af
sistlidne Juni månad hört ljudet af *Vakteln* (*Perdix coturnix*
LATH.) vid Klockhammar, något öfver en mil vester om Örebro,
och att en hel kull af denna fogel träffades d. 5 Oktober på
egorna till byn Södra Sanna i Kumla socken, något öfver en
mil söder om Örebro. Nämnde dag fälldes, under jagt för
rapphönshund, sex stycken vaktlar, af hvilka fyra blefvo upp-
stoppade. Tvänne af dessa förvaras nu i Hr LÖWENHJELMS egen
samling och tvänne vid Carolinska skolan i Örebro. Utom de
exemplar af denna fogelart, som omtalas i Vet. Ak:s Öfversigt
1847 sid. 201, hafva andra blifvit hörda eller sedda i samma
trakter af Nerike åren 1848, 1849 och 1850. Vakteln kan
således nu med säkerhet uppföras på listan öfver djur, som
årligen förekomma i mellersta Sverige.

4. *Anas fulcaria, funnen i Sverige.* — Från
Apothekaren Hr DYER i Skellefte hade Hr SUNDEVALL under
sommaren emottagit underrättelsen, att en hanne af *Anas ful-*
caria PALL. blifvit skjuten i trakten af Skellefte i slutet af
April månad, och att den nu befanns uppstoppad i Hr DYERS
samling. Till undvikande af hvarje möjligt misstag blef exem-
plaret sednare med en resande afsändt hit till Stockholm, hvari-
genom Hr S. vann full visshet, att det var af den nämnda
arten, som tillhör östra delen af Asien, nemligen Daurien,
China o. s. v. och som ej förr veterligen blifvit funnen i Eu-
ropa. Den liknar någorlunda vår vanliga Årta (*A. querque-*
dula). Hannen är lätt igenkänlig genom halsens färg, som är

hvit med svart ring, samt genom de långa skulderfjädrarna, som nedhånga halfcirkelformigt böjda öfver vingen. Honan, som lättare skulle kunna förväxlas med den af Anas qverqvedula eller crecca, skiljer sig dock genom sin större, svarta, föga grönglänsande vingspegel.

5. *Acipenser huso* i Sverige. — Vidare anförde Hr SUNDEVALL, att Doktor O. W. ÅBERG i Norrköping under sommaren skänkt till Zoologiska Museum en *Acipenser huso* af fyra alnars längd, som vid medlet af Juli månad blef fångad i Bråviken. Denna Stör-art, som till betydlig mängd fångas uti Wolga och andra större floder i Ryssland, och som lemnar största mängden af den i handel förekommande Husblåsen samt Caviaren, är hittills icke antecknad såsom förekommande vid Sverige; men Dr ÅBERG har sig bekant, att ett annat lika stort exemplar blifvit fångadt, äfven i Bråviken, för tolf till femton år sedan. Denna art skiljer sig från den vanliga Stören (*Ac. sturio*) genom sin korta och breda nos, som, sedd ofvanifrån, har en trubbigt rundad form. Den vanliga Stören uppnår dessutom aldrig, eller åtminstone sällan, en så betydlig storlek.

Akademiska angelägenheter.

Till utländsk ledamot i femte klassen kallades genom anställt val, Öfverintendenten för bergverken i Finland, Statsrådet, R. N. O. Hr N. NORDENSKJÖLD.

Hr Frih. WREDE afgaf å egna och Hr WALLMARKS vägnar uttalande om den af Herrar SCHRUTZ far och son uppfunna, och på Hr BERGSTRÖMS mekaniska verkstad utförda räknemaschin.

Hr FRIKS hade insändt aderton stycken af de under hans inseeende utförda målningar af svenska svamparter.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af Kongl. Sjöförsvars-Departementet.

Maritime Conference held at Brussels Aug. et Sept. 1853. 4:o.

Af Kongl. Norska Universitetet.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. VII: 4. VIII: 1. 8:o.

Michael Skjelderup. Christ. 1853. 8:o.

Af K. K. Akademie der Wissenschaften i Wien.

Sitzungsberichte der histor. Cl. IX: 3—5. X: 1.

— der mathem. Cl. IX: 3—5. X: 1, 4—5.

Archiv z. Kenntniss österr. Geschichte, IX: 1.

Af K. K. Geologische Reichsanstalt i Wien.

Jahrbuch, 1852. N:o 4. 4:o.

Af K. K. Sternwarte i Wien.

Annalen. Theil 32. Wien 1849. 4:o.

Af Naturforschende Gesellschaft i Halle.

Abhandlungen. I: 1. Halle 1853. 4:o.

Af Société des Sciences i Haarlem.

Natuurkundige Verhandelingen. Deel VIII. 1853. 4:o.

Extr. du programme. 1853. 4:o.

Af Académie Royal des Sciences i Bruxelles.

Mémoires. T. 27. 1853. 4:o.

Bulletins. 19: 3. 20: 1. 1852—53. 8:o.

Mémoires couronnés. V: 1, 2. VI: 1. 1852. 8:o.

Annuaire de l'Académie p. 1853. 12:o.

Af Academia Pontificia de' nuovi Lincei i Rom.

Atti dell' accademia. Anno I, IV: 1—9. V: 1—3. Roma 1851—52. 4:o.

Af British Association.

Report of the twentysecond Meeting. 1852. 8:o.

Af Linnean Society i London.

Transactions. XXI: 2. 1853.

Proceedings. N:o 48—50. (1851—52).

List of the society. 1852. 8:o.

Af Chemical Society i London.

Quarterly Journal. N:o 22. (VI: 2).

Af Société Imp. d'Archéologie i Petersburg.

Mémoires de la Société. T. XVI—XVIII. 8:o.

Af Société Imp. des Naturalistes i Moskau.

Bulletin. 1852 N:o 2.

Af Société Vaudoise i Lausanne.

Bulletin de la société. N:o 27. 1852.

Af Smithsonian Institution i Washington.

Smithsonian Contributions to knowledge. Vol. V. Wash. 1853. 4:o.

Sixth annual report of the Board, for the year 1851. Wash. 1852. 8:o.

OWEN, Report of a geol. Survey of Wisconsin &c. Philad. 1852. 4:o.
— With Illustrations.

STANSBURY, H., Exploration and Survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah. Philad. 1852. 8:o. — With maps.

FOSTER & WHITNEY, Report of the Geology of the Lake Superior Land. P. II. Wash. 1851. 8:o. — With maps.

Report of the Light House Board. Wash. 1852. 8:o.

Report of the commiss. of patents. 1851. P. I, II. Wash. 1852. 8:o.

Catalogue of Reptiles in the mus. of the Smiths. Instit. P. I. Serpents. 8:o.

Meteorolog. Tables, by GAGOR. Wash. 1853. 8:o.

Occultations of Planets & Stars by the Moon 1853. Wash. 1853. 4:o.
Maps of the Territory of New-Mexico. 1851. Fol.

Af The Commissioner of Indian Affairs i Washington.

SCHOOLCRAFT Indian Tribes. P. III. Philad. 1853. 4:o.

Af National Observatory i Washington.

LYNCH, Report of the Dead Sea expedition. Baltimore 1852. 4:o.

MAURY, Sailing Directions. 4th edit. Washington 1852. 4:o.

— Whale Charts. Series F. N:o 1—4.

RINGGOLD, Charts of California. Wash. 1852. 8:o.

Af The Superintendent of the Coast Survey i Washington.

Annual report of the superintendent. Wash. 1852, 8:o. — With sketches.

Af American Association.

Proceedings of the sixth Meeting. Wash. 1852. 8:o.

Af American Philos. Society i Philadelphia.

Transactions. Vol. X. p. 2. 1852. 4:o.

Af Academy of natural sciences i Philadelphia.

Proceedings. Vol. VI: 3—7. 8:o.

Af American Academy of Arts & Sciences i Boston.

Memoirs. Vol. I. p. 1. 1853. 4:o. — With Map of Tornado.

Af Författarne.

- BAUMGÄRTNER, K. H., Lehrbuch der Physiologie. Stuttg. 1853. 8:o. —
Mit Atlas in Querfol.
DANA, On coral reefs and islands. New-York 1853. 8:o.
FORCE, P., Grinnel Land. 8:o. — With map.
GUGGENBÖHL, Dr., Die Cretinen-Heilanstalt auf dem Abendberg. Bern
1853. Fol.
MANNERHEIM, Insectes coléoptères de la Sibérie Orient. Moscou 1852. 8:o.
NORTON's Literary Register for 1853. New-York 1853. 8:o.
QUETELET, Annuaire de l'observ. de Bruxelles, 1853. 12:o.
— Rapport sur les travaux. 1852. 8:o.
— Notice sur M. E. SMITS. 4:o.
— Observations des phénomènes périodiques. 1851. 4:o.
SCHWEIZER, G., Bericht üb. die Expedition nach Machnowka. 8:o.
DE VRIESE & HARTING, Monographie des Maranthiacées. Leide 1853. Fol.
WARREN, Dr J. C., The Mastodon giganteus. Boston 1852. 4:o.

Af Utgifvarne.

- Archiv der Mathem. u. Physik. VON GRAUNERT. XXI: 1, 2.
Flora. 1853. N:o 19—31.
Nya Botaniska Notiser. 1853. N:o 8; 9.
The American Journal. By SILLIMAN & DANA, 2d Series. N:o 1—27, 29,
33—36, 40—45. New-Haven 1846—1853. 8:o.

Af Hr S. Levén.

- BERLOLONI, Dissertatio de Insectis quæ sata tritici vastarunt. Bonon.
1837. 4:o (m. t.).
FISCHER, G., Anatomie der Maki. B. I. Frankfurt 1804. 4:o (m. t.).
— Lettre ou cit. GEOFFROY sur une nouv. espèce de Loris.
May. 1804. 4:o (m. t.).
SAVI, P., Osservazioni sopra tre Antilopi Viventi. Pisa 1828. 8:o (m. t.).

Af Hr Dr Kinberg.

- WALL, W. S., History and description of the skeleton of a new Sperm-
Whale. Sydney 1851. 8:o (m. t.).

Af Hr Tranberg i Malmö.

- MUNTING, Abr., Beschryving der Aerdgewasser. Leiden 1696. Fol. (m. t.).

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Jägmästaren Lundberg.

- Bon af Turdus torquatus, Parus candatus och Alauda cristata.

Af Professor Huss.

- En Spermestes cucullata från Afrika.

Af Konsul Bartoloni i Kairo.

En samling af trehundredesextio stycken foglar från Egypten, Nubien, Sennaar och Fazoglu.

Af Friherre C. J. Cederström.

En samling af yngel af åtskilliga fiskarter frambragt genom artifiel befruktning.

Botaniska afdelningen.

Af Stadsläkaren Dr C. A. Drakenberg.

Åtskilliga exemplar af *Festuca sylvatica*, funnen i nejden af Carlshamn.

Af Magister Mathesius i Skara.

Några sällsynta arter från Vestergöthland: två arter af *Mentha*, *Arenaria gothica*, *Salix hastata* m. fl.

Af Magister C. Hartman i Gefle.

Tjugusex sällsyntare arter från Helsingland, t. ex. *Hieracium prenanthoides*, *Viola montana*, *Astragalus glycyphyllos*, *Mulgedium alpinum*, *Petasites frigida*, *Carex tenuiflora*, *microstachya* m. fl.

Trettio arter från Tyskland, mest från Rhentrakterna.

Åtta arter från Frankrike.

Trettiofyra arter från England.

Trettionio arter från Azorerna, de flesta från St Vincent och samlade af T. C. HUNT, deribland många af de af LOWE, HOCHSTETTER sen., WATSON, WEBB m. fl. beskrifna arter, t. ex. *Rubus Hochstettorum*, *Viola maderensis*, *Laurus canariensis*, *Lotus macranthus*, *Tolpis nobilis*, *Ammi Huntii*, *Thymus micans*, *Myosotis azorica*, *Luzula azorica*, *Carex lævicaulis*, *C. Vulcani* m. fl.

Af Fru Govenius i Torneå.

Många exemplar af *Primula sibirica* från Uleåborg.


Af Botanices Intendenten.

Femtio tre arter phanerogamer och tjugusex arter lavar, samlade på Öland af Studeranden FLOREUS.

*Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i Juni 1853.*

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltall.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkning- sär.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,62	25,63	25,59	+13,3	+16,1	+11,7	N.N.O.	O.	N.O.	Klart
2	25,55	25,50	25,47	+13,1	+21,1	+12,1	—	—	S.	—
3	25,46	25,46	25,47	+15,0	+21,9	+13,3	S.S.O.	S.S.O.	—	—
4	25,49	25,48	25,53	+15,0	+23,0	+16,2	—	S.O.	—	—
5	25,56	25,61	25,63	+16,0	+18,3	+12,0	S.S.O.	N.N.O.	N.N.O.	—
6	25,66	25,64	25,61	+13,0	+18,0	+12,7	N.N.O.	O.S.O.	S.	—
7	25,66	25,72	25,78	+12,0	+13,7	+ 9,1	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
8	25,83	25,82	25,79	+11,0	+18,1	+12,9	N.N.O.	S.S.V.	S.S.V.	—
9	25,72	25,65	25,62	+15,3	+22,4	+15,8	V.S.V.	V.N.V.	—	Halfkl.
10	25,60	25,58	25,59	+16,0	+22,2	+16,0	O	O.N.O.	N.	Klart
11	25,67	25,71	25,75	+13,0	+16,1	+12,0	N.N.O.	O.N.O.	—	—
12	25,75	25,75	25,73	+14,5	+18,0	+16,3	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
13	25,68	25,64	25,57	+17,7	+21,8	+16,0	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
14	25,57	25,59	25,55	+15,7	+19,8	+15,0	O.S.O.	—	O.N.O.	Regn
15	25,50	25,41	25,44	+15,3	+19,5	+14,6	O.N.O.	O.N.O.	V.N.V.	—
16	25,44	25,46	25,49	+15,0	+22,0	+16,4	V.S.V.	V.S.V.	V.N.V.	Halfkl.
17	25,53	25,57	25,59	+16,3	+20,4	+15,1	N.O.	S.S.O.	S.	Klart
18	25,59	25,57	25,55	+17,6	+23,9	+17,0	—	V.S.V.	S.V.	—
19	25,52	25,50	25,48	+19,5	+26,6	+20,1	—	—	S.	Halfkl.
20	25,45	25,47	25,49	+19,0	+18,7	+17,8	N.O.	N.O.	N.O.	Regn
21	25,46	25,45	25,44	+17,0	+22,0	+20,0	N.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	Klart
22	25,41	25,38	25,37	+19,4	+25,0	+18,9	N.N.O.	O.S.O.	—	Halfkl.
23	25,30	25,21	25,18	+18,2	+23,1	+20,0	S.S.O.	S.S.O.	O.S.O.	—
24	25,13	25,11	25,08	+18,2	+19,9	+16,0	N.	—	S.S.V.	—
25	25,02	24,97	24,94	+19,0	+23,1	+15,1	S.S.V.	V.S.V.	S.	—
26	24,93	24,90	24,90	+15,5	+20,5	+13,7	S.S.V.	S.S.O.	S	Regn
27	24,72	24,72	24,83	+12,3	+14,6	+12,2	N.V.	N.V.	V.	—
28	24,96	25,00	25,07	+17,0	+20,2	+17,0	V.S.V.	S.V.	V.	—
29	25,17	25,13	25,15	+18,0	+21,2	+14,6	V.	S.S.O.	V.	—
30	25,16	25,18	25,21	+17,0	+21,2	+16,3	S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
Med- delt	25,437	25,427	25,430	+15,63	+20,41	+15,20	Nederbörden = 1,584 dec. linn.			
	25,431			+17,15						

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 10. N:o 9.



i Juli 1853.

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkning- Sär.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,24	25,26	25,25	+17,1	+22,1	+17,3	V.S.V.	S.V.	S.V.	Halfkl.
2	25,25	25,26	25,25	+16,5	+19,6	+15,3	V.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	—
3	25,27	25,30	25,40	+16,5	+19,7	+16,4	S.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Rega
4	25,46	25,47	25,45	+17,6	+22,7	+17,0	N.V.	V.N.V.	V.S.V.	Klart
5	25,45	25,42	25,38	+19,0	+23,2	+19,0	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
6	25,32	25,30	25,26	+17,0	+20,1	+18,7	V.N.V.	V.N.V.	V.S.V.	—
7	25,25	25,27	25,30	+18,0	+22,0	+20,0	V.S.V.	V.	V.	—
8	25,27	25,27	25,34	+17,0	+20,3	+17,0	V.S.V.	V.S.V.	V.N.V.	—
9	25,45	25,48	25,51	+14,7	+19,1	+18,0	V.N.V.	V.N.V.	V.S.V.	—
10	25,54	25,50	25,46	+15,0	+20,0	+14,0	N.N.V.	O.N.O.	S.S.O.	Halfkl.
11	25,44	25,44	25,46	+19,0	+19,0	+16,0	V.S.V.	O.	S.	—
12	25,49	25,49	25,49	+20,0	+23,0	+19,0	—	—	V.S.V.	—
13	25,49	25,48	25,49	+21,2	+21,5	+17,0	—	V.	S.S.O.	Rega
14	25,49	25,49	25,48	+18,0	+20,7	+17,0	—	O.	S.S.O.	Dimma
15	25,44	25,38	25,33	+18,5	+21,6	+17,7	O.S.O.	O.	S.O.	Rega
16	25,38	25,39	25,39	+17,5	+20,8	+17,5	V.S.V.	N.	S.V.	—
17	25,39	25,39	25,38	+20,8	+23,0	+17,6	—	S.V.	V.S.V.	—
18	25,38	25,38	25,39	+17,0	+22,0	+15,6	V.S.V.	S.V.	S.S.V.	Klart
19	25,36	25,34	25,33	+18,5	+23,2	+15,3	S.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	—
20	25,34	25,33	25,38	+19,0	+20,4	+14,5	—	O.S.O.	—	—
21	25,38	25,40	25,43	+14,5	+22,0	+18,0	N.N.O.	N.N.O.	N.	—
22	25,43	25,42	25,43	+17,0	+25,1	+17,3	N.	N.N.V.	S.S.O.	—
23	25,43	25,44	25,46	+20,4	+25,6	+19,3	—	V.S.V.	V.S.V.	—
24	25,48	25,45	25,47	+20,5	+27,0	+20,0	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
25	25,45	25,46	25,44	+21,7	+25,0	+20,2	V.S.V.	V.S.V.	S.V.	—
26	25,36	25,37	25,39	+22,0	+23,0	+18,9	S.	S.S.O.	V.N.V.	Rega
27	25,43	25,38	25,42	+17,2	+20,0	+18,0	V.S.V.	S.S.V.	S.V.	—
28	25,44	25,46	25,37	+17,5	+22,0	+19,0	S.V.	V.S.V.	S.	Klart
29	25,11	25,09	25,10	+18,0	+23,6	+17,5	S.V.	S.V.	V.S.V.	Rega
30	25,22	25,22	25,11	+16,1	+19,3	+18,0	V.S.V.	S.V.	S.	—
31	25,02	25,06	25,04	+15,0	+19,3	+14,6	S.V.	S.V.	S.V.	—
Me- dium	25,369	25,367	25,367	+17,99	+21,80	+17,44	Nederhänden = 0,743 dec. to			
	25,368			+19,08						

i Augusti 1853.

	Barometern reducerad till 0°. Decimalum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmär- ningar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	24,99	25,14	25,22	+13°3	+16°9	+14°8	V.N.V.	V.N.V.	V.S.V.	Regn
2	25,22	25,19	25,02	+16,0	+17,3	+12,2	S.S.O.	S.S.O.	N.N.O.	—
3	25,15	25,28	25,36	+11,0	+18,0	+15,5	V.N.V.	O.N.O.	V.	—
4	25,37	25,36	25,30	+14,0	+21,0	+13,2	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Klart
5	25,29	25,30	25,36	+13,6	+18,2	+12,5	V.S.V.	V.N.V.	V.N.V.	Regn
6	25,39	25,42	25,44	+11,0	+17,6	+12,5	V.N.V.	V.N.V.	S.S.O.	Klart
7	25,44	25,45	25,49	+14,0	+19,5	+14,0	—	S.S.V.	N.O.	Regn
8	25,56	25,63	25,66	+15,0	+19,2	+13,7	O.N.O.	O.N.O.	—	—
9	25,71	25,73	25,70	+13,0	+21,6	+14,0	—	S.S.V.	S.S.V.	Klart
10	25,67	25,67	25,70	+15,4	+22,1	+15,0	S.S.V.	V.S.V.	N.O.	—
11	25,74	25,73	25,65	+12,0	+21,9	+15,0	N.N.V.	N.N.V.	V.S.V.	—
12	25,61	25,58	25,57	+16,2	+23,7	+15,3	V.S.V.	O.S.O.	—	—
13	25,55	25,53	25,49	+14,5	+15,6	+11,3	N.O.	N.	V.N.V.	Regn
14	25,47	25,45	25,40	+12,8	+18,5	+15,4	V.N.V.	V.S.V.	V.	Halfkl.
15	25,32	25,28	25,30	+13,4	+14,0	+10,9	V.N.V.	N.O.	V.N.V.	Regn
16	25,29	25,29	25,27	+ 9,0	+17,2	+12,0	V.N.V.	V.N.V.	V.	Klart
17	25,22	25,19	25,22	+12,0	+18,0	+13,6	S.O.	S.S.V.	V.S.V.	Regn
18	25,23	25,25	25,23	+12,7	+18,8	+15,2	N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
19	25,17	25,22	25,18	+13,0	+13,3	+13,4	—	N.	N.	—
20	25,26	25,34	25,40	+13,2	+18,1	+12,1	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	—
21	25,37	25,33	25,30	+11,9	+21,0	+15,3	—	—	V.	—
22	25,30	25,30	25,30	+15,1	+20,0	+16,3	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Klart
23	25,32	25,31	25,31	+14,5	+20,1	+16,1	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
24	25,12	25,07	25,26	+13,7	+16,2	+13,3	O.S.O.	V.	V.N.V.	Regn
25	25,34	25,32	25,34	+13,8	+19,7	+12,7	V.	V.	—	Klart
26	25,38	25,40	25,39	+13,6	+20,0	+14,9	—	V.S.V.	S.S.V.	Halfkl.
27	25,32	25,18	25,11	+14,0	+16,0	+15,1	S.S.O.	O.S.O.	V.S.V.	Regn
28	25,08	25,09	25,11	+13,0	+18,6	+14,0	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Halfkl.
29	25,12	25,19	25,26	+15,0	+20,0	+13,9	S.S.V.	S.V.	S.V.	—
30	25,28	25,31	25,32	+14,0	+18,0	+14,0	—	S.V.	S.S.V.	Regn
31	25,33	25,35	25,36	+12,3	+14,0	+12,0	S.S.V.	V.S.V.	S.V.	—
Me- dium	25,342	25,351	25,349	+13°42	+18°52	+13°86	Nederbörden = 3,111 dec. tam.			
	25,349.			+15°27						

i September 1853.

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Årshöjden- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,35	25,33	25,34	+13°0	+15°0	+10°7	S.S.V.	S.	V.	Reg
2	25,34	25,38	25,40	+11,8	+18,8	+12,3	V.	V.N.V.	N.O.	Klar
3	25,37	25,41	25,49	+11,0	+17,4	+11,6	N.N.V.	N.O.	N.	—
4	25,56	25,65	25,72	+11,0	+12,2	+ 9,7	N.	N.	N.N.V.	Reg
5	25,77	25,79	25,80	+ 8,7	+16,6	+11,5	N.N.V.	V.N.V.	V.	Klar
6	25,78	25,78	25,72	+ 9,6	+17,9	+14,0	N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Dima
7	25,61	25,52	25,45	+11,7	+15,3	+12,1	V.S.V.	V.	V.	Håll
8	25,45	25,49	25,54	+11,6	+15,2	+10,6	N.N.O.	N.	N.	Mak
9	25,55	25,58	25,60	+11,1	+17,0	+10,8	N.	O.N.O.	—	Klar
10	25,57	25,61	25,65	+10,2	+20,6	+11,9	—	N.N.O.	N.N.O.	—
11	25,71	25,76	25,76	+ 9,0	+17,9	+12,0	N.N.O.	S.O.	V.S.V.	—
12	25,74	25,73	25,69	+11,2	+18,0	+13,2	V.N.V.	V.	V.N.V.	—
13	25,65	25,66	25,69	+11,0	+20,1	+13,6	N.N.O.	N.N.O.	O.N.O.	—
14	25,70	25,70	25,72	+11,9	+16,6	+11,0	—	O.S.O.	O.N.O.	Håll
15	25,72	25,69	25,66	+ 9,7	+17,2	+13,0	—	N.N.V.	N.N.V.	Klar
16	25,66	25,66	25,65	+ 8,1	+17,1	+ 9,7	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	—
17	25,65	25,65	25,64	+ 8,9	+16,4	+11,1	N.	O.N.O.	V.	Dima
18	25,54	25,41	25,27	+11,5	+15,8	+12,4	S.S.V.	V.S.V.	V.	Mak
19	25,23	25,26	25,24	+ 9,9	+14,0	+10,5	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Reg
20	24,99	24,84	24,96	+10,7	+19,4	+14,0	S.S.V.	V.	V.	Klar
21	25,20	25,28	25,27	+10,2	+14,9	+13,5	V.N.V.	V.N.V.	V.S.V.	—
22	25,29	25,29	25,29	+11,5	+14,0	+14,8	V.N.V.	V.	V.	Mak
23	25,15	25,17	25,17	+12,2	+17,9	+15,0	S.	S.V.	V.	—
24	25,17	25,22	25,17	+10,2	+14,9	+12,6	S.V.	S.	S.	—
25	25,15	25,14	25,14	+ 8,1	+14,2	+ 9,0	S.	S.S.V.	S.S.V.	Håll
26	25,07	24,94	24,84	+10,0	+12,0	+10,0	S.S.V.	S.O.	S.O.	Reg
27	24,74	24,81	24,89	+10,8	+11,9	+ 7,3	S.S.O.	S.V.	V.	—
28	25,01	25,16	24,99	+ 4,9	+11,0	+10,1	V.	V.N.V.	S.S.V.	—
29	24,77	24,80	24,82	+11,0	+13,1	+ 9,0	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
30	24,96	25,07	25,13	+ 3,9	+10,0	+ 6,0	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klar
Me- dium	25,382	25,393	25,390	+10°15	+15°72	+11°43	Nederbörden = 0,978 dec. tr			
	25,388			+12°43						

ÖFVERSIGT

AF

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1853.

N: 10.

Onsdagen den 14 December.

Föredrag.

1. *Anteckningar angående Ellipsen.* — Herr Lector CH. F. LINDMAN hade insänt följande meddelande, som af Hr EDLUND föredrogs.

Är de böcker öfver integral-räkning, som jag haft tillfälle att se, visas, huru man skall finna ytan af en figur, som begränsas af ellipsen, storaxeln och två mot honom vinkelräta ordinatorer. Genom att gifva integralens gränсор passande värden samt från honom subtrahera ett trapezium kan man naturligtvis sålunda finna yta af hvilket segment som helst och sedan, genom att dertill addera eller derifrån subtrahera en triangel, ytan af en sektor, dess spets må nu ligga i medelpunkten eller i fokus. Då fråga är om sektorer, tyckes det ikväl vara naturligast och med saken mest öfverensstämmande att använda polarkoordinater. Detta sätt att qvadrera sektorer med spetsen i fokus visas flerstädes, och Professor GRUNERT *) är för ej längesedan utförligt behandlat denna sak. Jag skall nu söka visa bekvämligheten af polar-koordinaters användning vid qvadrering af elliptiska sektorer, då spetsen ligger i medelpunkten, så mycket mera som jag derigenom får tillfälle att bevisa ett theorem, som utan tvifvel redan länge varit

*) Archiv der Mathematik und Physik. Tom. XVII. pag. 313.

bekant, ehuru jag ingenstädes kunnat finna det antecknad, äfvensom att behandla några andra frågor, som med dylika sektorer äga gemenskap.

Om man i ellipsens vanliga eqvation

$$a^2y^2 + b^2x^2 = a^2b^2$$

sättes $y = r \sin \phi$, $x = r \cos \phi$, hvarest ϕ är den vinkel, som den från medelpunkten dragna radius vector r gör med den position hälften af storaxeln, så öfvergår denna eqvation till

$$r^2(a^2 \sin^2 \phi + b^2 \cos^2 \phi) = a^2b^2. \quad (1),$$

som är ellipsens polar-eqvation, då medelpunkten toges till pol. Då man i den vid polar-koordinaters användning vanliga formeln för kvadratur

$$S = \frac{1}{2} \int r^2 d\phi$$

insätter värdet på r^2 ur (1), så fås

$$S_a = \frac{a^2b^2}{2} \int_0^a \frac{d\phi}{a^2 \sin^2 \phi + b^2 \cos^2 \phi},$$

hvarest a är vinkeln, som *den* radius vector, hvilken begränsar sektorn, gör med den positiva hälften af storaxeln. Då man dividerar med $\cos^2 \phi$ och integrerar, så erhålles

$$S_a = \frac{1}{2} ab \left\{ \text{Arctg} \left(\left(\frac{a \tan \alpha}{b} \right) \right) - \text{Arctg} ((0)) \right\}.$$

Om u är den minsta positiva båge, hvars tangent är $= \frac{a \tan \alpha}{b}$, så är $\text{Arctg} \left(\left(\frac{a \tan \alpha}{b} \right) \right) = k\pi + u$: likaledes är $\text{Arctg} ((0)) = k'\pi$, hvarest hela talen k, k' måste bestämmas i enlighet med problemets villkor. Antager man $\pi > \alpha > 0$, så är tydligen $\pi > u$, $\frac{1}{2} \pi ab > S_a > 0$ eller $\pi > u + (k - k')\pi > 0$, hvaraf följer, att $k - k'$ är $= 0$ och således

$$S_a = \frac{1}{2} ab \text{Arctg} \frac{a \tan \alpha}{b}. \quad (2),$$

om man med Arctg utmärker den minsta positiva båge, hvars tangent är $= \frac{atga}{b}$. För sådana värden på α , som öfverstiga π , inses lätt, att man får

$$S_{\alpha} = \frac{1}{2} ab \left\{ \pi + \text{Arctg} \frac{atga}{b} \right\}$$

med samma förbehåll som nyss angående Arctg.

Om nu β är en annan vinkel, som uppfyller villkoret $\pi > \beta > \alpha$, så finner man på samma sätt

$$S_{\beta} = \frac{1}{2} ab \text{Arctg} \frac{atg\beta}{b}$$

och således

$$S_{\beta} - S_{\alpha} = \frac{1}{2} ab \left\{ \text{Arctg} \frac{atg\beta}{b} - \text{Arctg} \frac{atga}{b} \right\} \quad (3),$$

hvilken eqvation ger ytan af en sektor, som inneslutes af två radii vectores, dragna från medelpunkten, då ingendera af de vinklar, som de bilda med den positiva hälften af storaxeln, öfverstiger två räta. Frågar man nu, för hvilka värden på α , β , som denna sektor blir $\pm \frac{1}{4}$ af hela ellipsen, så har man att i (3) i stället för $S_{\beta} - S_{\alpha}$ insätta $\frac{1}{4} \pi ab$ och finner då

$$\frac{\pi}{2} = \text{Arctg} \frac{atg\beta}{b} - \text{Arctg} \frac{atga}{b}.$$

I följe af ofvan gjorda villkor öfvergår denna eqvation till

$$b^2 + a^2 \text{tg}\alpha \text{tg}\beta = 0 \text{ eller } \text{tg}\alpha \text{tg}\beta = -\frac{b^2}{a^2}, \quad (c)$$

som är den kända relationen mellan de vinklar, som två konjugat-diametrar göra med samma hälft af storaxeln. Häraf följer nu detta theorem: *konjugat-diametrar dela ellipsen i fyra lika delar.*

Ehuru det icke synes sannolikt, kunde man under sådana omständigheter fråga, om de bågar, som konjugat-diametrar afskära, äro lika eller icke. Då man för den skull i den vanliga formeln



$$s = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \sqrt{r^2 + \frac{dr^2}{d\varphi^2}}$$

insätter värdena på $r^2, \frac{dr^2}{d\varphi^2}$ ur (1), erhålles

$$s = ab \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \sqrt{\frac{a^4 \sin^2 \varphi + b^4 \cos^2 \varphi}{(a^2 \sin^2 \varphi + b^2 \cos^2 \varphi)^2}},$$

hvaräst β är $> \alpha$ och dessa båda vinklar äro förbundna genom eqvationen (c).

För att de bågar, som konjugat-diametrarne afskära, skola vara lika för alla värden på α, β , som satisfiera eqvationen (c), erfordras tydligen, att s är konstant för alla dylika värden på α, β . Om man således antager α till oberoende variabel, så bör, efter eliminering af β , $\frac{ds}{d\alpha}$ vara identiskt $= 0$.

Sätter man nu

$$\sqrt{\frac{a^4 \sin^2 \varphi + b^4 \cos^2 \varphi}{(a^2 \sin^2 \varphi + b^2 \cos^2 \varphi)^2}} = f(\varphi),$$

så befinnes

$$\frac{ds}{d\alpha} = ab \left(f(\beta) \frac{d\beta}{d\alpha} - f(\alpha) \right),$$

hvaräst $f(\beta)$ och $\frac{d\beta}{d\alpha}$ böra uttryckas i α med biträde af eqvationen (c). Då erhålles

$$\frac{d\beta}{d\alpha} = \frac{a^2 b^2}{a^4 \sin^2 \alpha + b^4 \cos^2 \alpha}, \quad f(\beta) = \frac{a^4 \sin^2 \alpha + b^4 \cos^2 \alpha}{ab(a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha)^{\frac{3}{2}}}$$

och alltså

$$\frac{ds}{d\alpha} = \frac{ab(ab - \sqrt{a^4 \sin^2 \alpha + b^4 \cos^2 \alpha})}{(a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha)^{\frac{3}{2}}}.$$

Emedan således $\frac{ds}{d\alpha}$ icke är indentiskt $= 0$, följaktligen de ifrågavarande bågarne icke lika, så måste de hafva maximum

och minimum. De deremot svarande värdena på α erhållas, om man sätter $\frac{ds}{d\alpha} = 0$, och man finner då

$$\cos \alpha = \pm \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Genom förnyad differentiation inses, att bågen har sitt största värde för det öfre, sitt minsta för det undre värdet på $\cos \alpha$. Af detta ses vidare, att man har

$$\operatorname{tg} \alpha = \pm \frac{b}{a}, \operatorname{tg} \beta = \mp \frac{b}{a},$$

hvaraf följer, att de båda lika konjugat-diametrarne dela ellipsens omkrets i delar, som äro hvarandra mera olika, än de bågar, som afskäras af ett annat par konjugat-diametrar hvilket som helst, äfvensom att af de nämnda bågarne den är störst, som skäres af den mindre axeln, och den minst, som skäres af den större.

I sammanhang härmed kan man fråga, för hvilket värde på α *) sektorn S_α blir midtituskuren af ordinatan för bågens ändpunkt, äfvensom af kordan, som sammanbinder bågens yttersta ändar. I båda fallen blir halfva sektorn en triangel. Den förre triangeln är rätvinklig och hans hypotenusan är r samt den mot ordinatan stående vinkeln $= \alpha$. Denne triangelns area ($= T$) är således $= \frac{1}{2} r^2 \sin \alpha \cos \alpha$ eller, om värdet på r^2 ur (1) insättes,

$$T = \frac{a^2 b^2 \sin \alpha \cos \alpha}{2(a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha)}.$$

Emedan nu T skall vara $= \frac{1}{2} S_\alpha$, så fås

$$\frac{ab \sin \alpha \cos \alpha}{a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha} = \frac{1}{2} \operatorname{Arctg} \frac{a \operatorname{tg} \alpha}{b}.$$

Sätter man $\operatorname{Arctg} \frac{a \operatorname{tg} \alpha}{b} = \psi$, så erhålles

$$\frac{\operatorname{tg} \psi}{1 + \operatorname{tg}^2 \psi} = \frac{1}{2} \psi \text{ eller } \sin 2\psi = \psi.$$

*) Med α menas alltjemt den vinkel, som radius vector gör med den positiva hälften af storaxeln.

Denna eqvation är alldeles lika en, som förekommer hos EULER *), hvilken funnit

$$\psi = 54^{\circ}18'6'',8786.$$

Abscissan för den punkt, hvori r råkar ellipsen, är

$$= r \cos \alpha = \frac{ab \cos \alpha}{\sqrt{a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha}} = a \cos \psi \text{ eller oberoende af } b,$$

 hvaraf ses, att den blir densamma i alla ellipser med storaxeln $= 2a$.

I sednare fallet är triangeln $= T = \frac{1}{2} ar \sin \alpha$, och emedan
 T skall vara $= \frac{1}{2} S_\alpha$, så blir, då värdet på r insättes,

$$\frac{2a \sin \alpha}{\sqrt{a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha}} = \operatorname{Arctg} \frac{a \operatorname{tg} \alpha}{b}.$$

Sätter man nu $\operatorname{Arctg} \frac{a \operatorname{tg} \alpha}{b} = \omega$, så fås

$$2 \sin \omega = \omega$$

eller om man gör $\omega = 2\psi$

$$\sin 2\psi = \psi.$$

Detta är samma eqvation som nyss, och det var vid upplösningen af ett dylikt problem angående en cirkel-sektor, som EULER erhöft denna eqvation. Abscissan för den punkt, hvori r råkar ellipsen, är nu $= a \cos \omega$ eller oberoende af b . Således är hon äfven nu densamma i alla ellipser med storaxeln $= 2a$.

Då man upplöser dessa båda problem för en cirkel med radien $= a$, så blir alltså i förra fallet $\alpha = \psi$, i sednare $\alpha = 2\psi$. Faller man sedan från ändpunkten af den ena radien, som begränsar sektorn, en vinkelrät linia på den andra radien och öfver denna sednare såsom halfva storaxeln beskriver en ellips, så är den punkt, hvori ellipsen träffas af den nämnda vinkelräta linien, just den punkt, som i dessa båda problem sökes.

*) Introductio in Analysin infinit. Tom. II. Cap. XXII probl. II.
 Se äfven CAENON, Trigonometrie, Paris 1786. pag. 218.

2. Försök öfver magnetiseradt jerns ledningsförmåga för elektricitet. — Hr EDLUND anförde härom följande:

För några år sedan meddelade MAGGI *) den vigtiga iakttagelsen, att värmeledningsförmågan hos mjukt jern förändras genom magnetisering. Han fann nemligen, att värmets forplantas hastigast i en riktning, som är vinkelrät mot förbindningslinien emellan magnetens poler och långsammast utesluter samma linie. I afseende på magnetismens inverkan på ledningsförmågan för elektricitet observerade J. W. FISCHER **), att gnistan från en svag elektricitetsmachin öfverhoppade lättare mot midten af en 8 tum lång stålfjeder än mot punkter belägna närmare fjederns ändar, och slöt deraf, att magnetismen, som »var starkast mot nålens ändar», gjorde stålet till sämre elektricitetsledare. Genom ett dylikt försök hade ABRAHAM ***), någon tid förut funnit, att stål i magnetiskt tillstånd leder elektriciteten bättre än i det naturliga. Till följe af det sätt, hvarpå dessa experimenter blifvit anställda, ingifva de föga förtroende och stå dessutom med hvarandra i strid. I sednare tider har denna fråga blifvit upptagen af WARTMANN †), hvilken fann, att den elektriska ledningsförmågan genom magnetismens inverkan icke undergår någon förändring. Då emellertid det magnetiserande jernets värmeledningsförmåga synes antyda ett motsatt förhållande, ansåg jag det vara skäl, att efter en noggrann och tillförlitlig method ånyo anställa försök till sakens utredande, isynnerhet som WARTMANN'S undersökning endast afser ledningsförmågans förändring i en riktning, som är parallel med förbindningslinien emellan magnetens poler.

*) Arch. des sciences physiques et naturelles. XIV, 132. Berättelse om Framstegen i Fysik för 1850. sid. 81.

**) Arch. für die gesammte Naturlehre; von Dr K. W. G. KANTNER. 3 B. sid. 421.

***) Ibid. sid. 426. Poëc, Ann. I, sid. 357.

†) Arch. des sc. ph. et nat. XIII, sid. 35.

3. *Om växternas gröna färg.* — Hr ÅNGSTRÖM hade insänt följande meddelande, som föredrogs af Hr WALL-MARK *).

»Bland de mångfaldiga föremål för forskningen, hvilka naturvetenskaperna erbjuda, gifves det knappast något, som på sednare tider blifvit med större framgång studeradt än ljuset. Också har optiken härigenom ej blott i theoretiskt hänseende vunnit en utbildning, som låter densamma täflande uppträda vid sidan af astronomen, utan den har äfven inom andra vetenskapsgrenar blifvit ett viktigt medel för forskningen. För mineralogen, för kemisten, och i allmänhet inom hvarje vetenskap, som mer eller mindre sysselsätter sig med beskaffenheten och anordningen af materiens minsta delar, gifves det icke något *reagens*, som i finhet kan täfla med ljuset. Upptäckten af det polariserade ljusets egenskaper har isynnerhet varit rik på viktiga användningar, äfven inom det tekniska området; men äfven det alldagliga fenomenet af en kropps färg, dess absorption af ljuset, kan i många fall lemna viktiga bidrag till samma kropps kännedom. Dertill fordras likväl att samma färg underkastas en noggrann analys, emedan blotta utseendet gifver ett högst ofullkomligt begrepp om en färgs sammansättning.

Ett af de märkvärdigaste exemplen härpå lemnar växternas gröna färg. Redan 1833 har BREWSTER i Phil. Trans. gifvit en analys af chlorophyllets färg, utdraget medelst alkohol. Han kommer dervid till det viktiga resultat, att NEWTONS teori för färgernas uppkomst icke kan vara riktig. Enligt densamma skulle växternas gröna färg vara ett grönt af tredje ordningen, och således af samma slag som interferensfärgerna hos tunna lameller, och blott innehålla en tillblandning af gult och blått; i stället visade BREWSTER, att denna färg äfven innehölle rött, och att ljusspectrum, efter att hafva passerat ett lager af vättskan, vore genomdraget af flera mörka band, allt i strid med

*) Hårtill Tab. III.

NEWTONS antagande. Sedermera har BREWSTER äfven upptäckt chlorophyllets egenskap att rikligen dispergera rött ljus, och har denna egenskap nyligen varit föremål för en intressant afhandling af STOKES.

Då emellertid chlorophyllets märkvärdiga sätt att absorbera ljuset hittills visat sig tillhöra detta ämne ensamt, låg den föreställningen nära, att man kunde begagna dessa absorptionsfenomener såsom ett reagens för chlorophyll. Denna tanke har gifvit anledning till följande korta undersökning, som som jag härmedelst har äran att meddela Kongl. Vetenskaps-Akademien.

Det torde ibland naturforskare vara en i allmänhet erkänd sanning, att på djur- och växtlifvets lägsta stadier formerna så sammanflyta, att det äfven för den mest mikroskopiska undersökning blir omöjligt att afgöra, huruvida desamma tillhöra djur eller växter. Af så mycket större värde vore derföre ett experimentum crucis, hvarigenom denna fråga kunde i tvifvelaktiga fall afgöras. Ett sådant erbjuder sig själfmant i chlorophyllets optiska egenskaper, förutsatt likväl, att detta ämne alltid och uteslutande tillhör växterna. Den fråga jag på optisk väg sökt besvara är derföre tvåfaldig: 1:o) kan chlorophyllet anses uteslutande tillhöra växterna? och 2:o) hvilka resultat kan man i sådant fall häraf draga i afseende på djur- och växtrikets ömsesidiga begränsning?

Först torde det likväl vara nödigt att nämna något om själfva observations-sättet. Den apparat, som begagnades för det gröna extractet, bestod hufvudsakligen af en messings-cylinder, hvars ena ända var tillsluten medelst en glasskifva. I samma cylinder rörde sig en annan mindre, som äfven var tillsluten i ena ändan, och så att de båda planglasen genom den mindre cylinderns rörelse kunde bringas i contact eller afägsnas ifrån hvarandra. Härigenom kunde den emellan glasen inneslutna vätskepelaren gifvas den tjocklek man behagade. Framför de båda ändarne af apparaten fästades dessutom två skärmar med två smala vertikala öppningar, så att ljuset

blott genom den kunde passera apparaten. Till ljuskälla begagnades, i brist af solljus, lampa eller stearinljus; hvarvid den brandgula linien, som nära sammanfaller med *D* i solspectrum, bragtes till minimum af deviation. Härtill begagnades ett flintglasprisma af MEYER, detsamma som jag förut begagnat vid mina optiska undersökningar. Då nu läget af de mörka banden uppmättes samtidigt med den brandgula linien, och de Fraunhoferska liniernas lägen voro mig af föregående mätningar bekanta, så har jag i de bifogade figurerna kunnat utsetta läget af linierna B, C, D och F; och motsvarar en millimeter i figuren en minut i deviationsvinkeln.

Jag öfvergår nu till sjelfva observationerna, hvilka kunna fördelas i följande tre grupper:

1:o Undersökning af det gröna extractet på bladen af *Trifolium pratense*, af *Potamogeton perfoliatum* samt af barren på *Taxus baccata*.

2:o af infusoriet *Euglena viridis*.

3:o af tre species bland de lägre Algerna, nemligen *Conserva glomerata*, ett species af släktet *Zygnema* samt ett af släktet *Vaucheria*.

1:o Då BREWSTER redan gifvit en teckning af ljusspectrum, motsvarande de fanerogama växternas gröna färg, kunde en ny teckning här anses öfverflödigt, men dels har jag i fig. 1 sökt återgifva detta spectrum, ej blott för en viss bestämd tjocklek af den absorberande vätskan, såsom fallet är med den Brewsterska figuren, utan äfven sökt åskådliggöra gången af sjelfva absorptionen, dels har jag äfven ansett denna figur nödvändig för jemförelsen med fig. 2. Betäcker man nemligen fig. 1 så, att blott en smal öppning på längden är synlig, och låter denna öppning öfverfara teckningen uppifrån nedåt, så får man ljusspectrum sådant det visar sig då vätskepelarens höjd mer och mer ökas. Man ser sålunda, att slutligen blott tre ljusa band äro synliga, det ena i det röda och de två andra i det gula och gröna ljuset. Jemföres nu denna figur, som uteslutande är gjord efter observationerna på *Trifolium*

pratense, med den Brewsterska som refererar sig till bladen af *Prunus laurocerasus*, så visa sig i båda teckningarna ingen väsendtlig skillnad, hvad läget af de mörka banden I, II och III vidkommer, men IV saknas helt och hållet i den sednare teckningen. Deremot innehåller densamma ett band bredvid F åt den violetta sidan, och ett annat vid G åt rött till. Det sistnämnda har jag icke kunnat observera, sannolikt i anseende till den svaga ljuskällan; bandet vid F motsvarar troligen det jag i fig. betecknat med V, och som tillika utgör gränsen af det synliga spectrum. Extractet af *Potamogeton* gaf ett spectrum fullkomligt likt det nyss beskrifna, blott att gränsen af det synliga spectrum här inträffade vid V' och således i närmare öfverensstämmelse med den Brewsterska teckningen. STOKES anför, att bandet IV, som saknas på den sistnämnda teckningen, afven skulle vara det, som delar det grön-gula fältet i de två ljusa banden, hvilka man slutligen observerar, men detta synes helt och hållet vara ett misstag; åtminstone har i alla de observationer jag varit i tillfälle att anställa, denna delning uppkommit genom bandet III.

Som alkoholen blott med svårighet utdrager det gröna färgämnet utur barren på *Taxus baccata*, var extractet mycket svagt färgadt; icke destomindre visade sig tydligt banden I, II, III och IV. Den stora olikheten i de tre undersökta växtämnena synes emellertid berättiga till den slutsats, att absorptionsbanden I—IV tillhöra utan undantag de fanerogama växternas chlorophyll.

2:o Extractet af *Euglena* visade vid yttre påseende samma egenskaper som det af *Trifolium*. I mindre quantitet visade det sig grönt, i större quantitet åter rött, samt dispergerade afven rikligen rött ljus. Dess verkningar på spectrum voro emellertid icke identiska med de i 1:o beskrifna. Jag har i fig. 2 sökt åskådliggöra detta förhållande. Väl visa sig banden i det röda ljuset I och II fullkomligt på sin plats, men bandet III saknas alldeles. Häraf blir också en följd, att, då det gröna extractet af de fanerogama växterna lemnar slutli-

gen tre ljusa band, så lemnar extractet af *Euglenan* blott två, *det ena i grönt och det andra i rött*. Väl visa sig, då lagret af vätskan är mycket tuont, svaga spår till de två mörka band i det gröna och gula ljuset, såsom fig. 2 utvisar, men dessa försvinna då lagrets tjocklek ökas, och likasom undanträngas af den från båda sidor öfverhandtagande absorptionen.

En väsendtlig olikhet förefinnes således i de verkningar fanerogamerernas chlorophyll utöfvar på ljusspectrum och de, som tillhöra *Euglenan*; men denna olikhet, är den af natur att äfven kunna bestämma gränsen emellan växt- och djurriket? Att så icke är händelsen visa följande observationer.

3:o) Det gröna färgämnet hos de tre förut uppräknade algerna underkastades samma behandling, som i det föregående blifvit beskrifven, och verkningarna på ljusspectrum iakttagos. Dervid framstod det märkvärdiga förhållandet, att de *tre algernas spectra voro fullkomligt identiska med det i fig. 2 aftecknade för Euglena viridis*. Då å ena sidan något tvifvel om dessa algers växtliga natur, likasom å andra sidan om *Euglenas* djuriska, icke torde förefinnas, så följer häraf, att *chlorophyllet, i dess olika modifikation, icke kan anses utslutande tillhöra växterna*.

Resultatet af närvarande undersökning är således helt och hållet negativt, så vidt densamma afsåg att finna ett skiljemärke emellan växt- och djurverlden, och den tjänar i stället att bekräfta den gamla satsen: *natura non facit saltus*.

Utom de anförda algerna har jag äfven undersökt *Spongia lacustris*. Då, i anseende till den framlidna årstiden, jag blott haft att tillgå torkade exemplar, hvarur det gröna färgämnet med svårighet utdrages, har jag kunnat erhålla allenast en ytterst svag lösning; likväl visade sig tydligen samma verkningar, som jag förut observerat hos algerna.

Märkvärdigt är att *Spongian*, likasom äfven de tre algerna, enligt en upplysning af Hr ARESCHOU, hvilken äfven haft godheten att namngifva de cryptogama växterna och in-

fusoriet, alla hafva rörliga sporidier, och att de sålunda under ett af sina utvecklingsstadia stå infusorierna mycket nära.

Slutligen får jag ännu nämna, att extractet af de guldade bladen af poppeln icke visar ringaste spår till chlorophyllens absorption och att således detta ämne undergått en väsendtlig förändring».

4. Copulationen hos Zygnemaceæ. — Hr ARSCHOU hade i bref till Hr WAHLBERG meddelat följande *).

»Den fysiologiska företeelse hos Zygnemaceæ, som vanligen benämnes copulation, observerades först af den bekanta danska zoologen MÜLLER, och beskrefs sedermera på ett för den tiden lika noggrant som utförligt sätt af VAUCHER, uti hans förträffliga *Histoire des Conferves d'eau douce*. Den består, som bekant är, deri, att tvenne zygnuma-trådar lägga sig bredvid hvarandra; att från alla eller en del af hvardera trådens artiklar (=celluler) en protuberance utbryter, som mer eller mindre förlänges; att de från hvardera trådens motliggande artiklar utskjutande protuberancerna sammanväxa med topparna; att den således af tvenne membraner bestående skiljeväggen dem emellan småningom resorberas, hvarigenom en rörformig kanal uppkommer, som tillåter en fri kommunikation mellan de båda på detta vis förenade eller kopulerade artiklarnas inre rum. Dessa senare innesluta hvar för sig ett innehåll (contentum), som förnämligast består af chlorophyll. Innehållet i den ena artikeln förenar sig med innehållet i den andra till bildande af en spora. Detta sker antingen på det sätt, att innehållet i den ena artikeln uttömmes genom copulationskanalen in i den andra artikeln, hvarest blandningen af båda artiklarnes innehåll, slutligen omklädd af en tydlig cellul-membran, blir liggande som färdigbildad spora; eller ock derigenom, att båda artiklarnes innehåll utföras till och samman-

*) Hårtill Tab. IV.

smälta uti copulations-kanalens midt, hvarest den slutligen färdigbildade sporan får sin plats *).

Detta är i korthet författarnes beskrifning på Zygnemernas copulation. Jfr Hugo v. MOHL, die Veg. Zelle p. 269 och VAUCHERS Histoire des Conf. d'eau douce pag. 44. Och ehuru denna kopulations-akt vid första påseendet tyckes visa en viss analogi med växternas befruktnings-fenomen, så har man dock i allmänhet ej vågat tillerkänna densamma betydelsen af något dylikt. Sålunda anser SCHLEIDEN (Grundzüge der wissenschaftl. Botanik) hela kopulationen vara en alldeles oväsentlig akt, påstående, att sporer bildas äfven uti de artiklar, som med andra ej stå uti någon kommunikation, äfvensom att understundom tvenne sporer träffas uti en och samma artikel, m. m. dyl. Huru denna författare kommit till detta resultat, skola vi nedanför få tillfälle erfara.

H. v. MOHL yttrar sig på anförda stället p. 268—69 sålunda: Eine weit grössere Complication der Erscheinungen tritt uns entgegen, wenn wir einen Blick auf die Sporen der Algen werfen, wenn gleich auch hier noch keine Zusammenwirkung zweyer Geschlechter vorkommt. Es könnte dieses letztere zwar bey einer Reihe von Algen, bey welchen eine sogenannte Copulation vorkommt, zweifelhaft erscheinen, allein eine nähere Betrachtung dieses Vorgangs lässt doch keine Analogie mit einer geschlechtlichen Zeugung erkennen.

Öfvertygad, att en företeelse, så normalt uppträdande hos denna familj och så karakteristik som Zygnemernas copulation, ej kunde vara något oväsentligt eller tillfälligt, och detta så mycket mindre som ett temligen likartadt förhållande eger rum hos Desmidiaceæ, företog jag mig i Maj och Juni månader 1852, att i främsta rummet studera det sätt, hvarpå innehålllet uti den ena af de två med hvarandra copulerade artiklarne

*) Hos Mougeotia försiggår saken något annorlunda. Här bildas nemligen inga protuberancer; trädarna böja sig knäformigt och de motliggande vinklarna sammanväxa.

larne blandar sig, till bildande af en spora, med innehållet uti den andra artikeln. Jag kunde nemligen ej föreställa mig att saken skulle försiggå så mekaniskt som alla författare och sist Mom. påstått. Denna sednares beskrifning låter som följer: — — worauf die Scheidewand in dem Verbindungsast resorbiert wird und der feste Theil des Inhaltes beider Zellen (artiklarne) sich entweder in der Höhlung der einen Zelle oder im Verbindungsaste zu einer Masse zusammenballt, welche sich mit einer Cellulosenmembran umkleidet und auf diese Weise in eine Spore umwandelt (H. v. M. p. a. st.)

För ofvannämnda ändamål valde jag tvenne former ur Zygnemernas familj, den ena tillhörande Zygnema (Conjugata) longata VAUCH., den andra Spirogyra nitida Ag. eller Conjugata princeps VAUCH., båda ingalunda sällsynta och nästan öfverallt till hands för dylika undersökningar. — Då jag först undersökte denna senare befarade jag att SOMMERENS påstående om copulationens oväsentlighet skulle vinna bekräftelse; jag urskiljde nemligen följande olika förhållanden.

1. Tvenne copulerade artiklar, den ena tom, den andra hysande i midten en elliptisk spora, uppkommen således genom föreningen af båda artiklarnes innehåll.
2. Tvenne copulerade artiklar, hvardera inom sig hysande en nästan sferisk cellul, i öfrigt af nästan samma utseende som den omtalade sporan, bestående af en tydlig membran, omslutande ett innehåll. Dessa sferiska celluler hafva af flera författare*) blifvit ansedda för sporer, bildade genom transformation af artiklarnes innehåll.
3. Tvenne motliggande artiklar, med mot hvarandra riktade men ej förenade protuberancer, inneslutande hvardera en sferisk cellul af samma beskaffenhet som i förhållandet 2, straxt ofvan.

*) Jfr. BRAUN, Betrachtungen über die Erschein. d. Verjüngung in der Natur. p. 368. g.

4. Tvenne copulerade artiklar, den ena tom, den andra inneslutande tvenne (2) sferiska celluler, alldeles af samma beskaffenhet som uti fallen 2 och 3.

Jag misstänkte genast, att endast den uti fallet 4 omtalade sporan vore att anse för en verklig spora, d. v. s. uppkommen genom transformation af tvenne artiklars förenade innehåll, men att de sferiska och i hög grad aporlika, uti fallen 2 och 3 ofvan omtalade cellulerna, ehuru af en del författare ansedda för sporer, ej egentligen voro att anse för dylika. Jag föreställde mig möjligheten, att innehållet i hvardera af de copulerade artiklarna, innan den ena artikeln innehåll förenas med det i den andra till bildande af en spora, först transformeras till en sferisk cellul. Men först efter flera dagars förlopp lyckades det mig att finna något stöd för denna förmodan. Då jag nemligen hade lagt tvenne kopulerade trådar af *Zygnema longatum* under microscopet, erfor jag snart, att alla likartade sferiska eller elliptiska celluler uti den ena trådens artiklar, hade nedskickat en längre eller kortare tubformig förlängning genom copulations-kanalen, och som här och der, mer eller mindre hade inträngt uti de sferiska celluler, som lågo uti den andra trådens artiklar (fig. 1); men någon vidare förändring fick jag ej tillfälle att iakttaga; preparatet behöll sig väl någon tid, men alldeles oförändradt.

Spirogyran undersöktes ånyo. Lyckligtvis påträffades hos denna artiklar, som visade ett enahanda förhållande som det hos *Z. longatum* nyss beskrifna. Uti den ena af tvenne med hvarandra copulerade artiklar (fig. 2 a) låg en elliptisk cellul (fig. 2 b.) och uti den andra artikeln (fig. 2 c.) afvenledes en cellul (fig. 2 d.) af nästan äggrund form, nedskjutande genom copulationskanalen en tubformig förlängning (fig. 2 e.), som inträngde uti den förra cellulens inre. På kortare tid än en half timma nedgled denna tubformigt sig förlängande cellul allt mer och mer, och inträngde derjemte småningom uti den andra cellulens inre, tills slutligen endast den öfversta ändan syntes öfrig, bildande på den andra cellulen (fig. 2 b.) en

vårtlik utväxt, som äfven snart försvann. — Den genom denna process bildade sporan antog, efter några dagars förlopp, samma form och utseende som sporan uti den närgränsande artikeln (fig. 2 f).

Det syntes mig nu temligen klart, att författarne alldeles oriktigt tänkt sig det sätt, hvarpå innehållet i den ena af tvenne med hvarandra copulerade artiklar förenar sig med innehållet uti den andra artikeln, ty af det anförda finner man utan svårighet, att detta alldeles icke sker så mekaniskt som VAUCHERS och efter honom flera andra algologers beskrifningar gifva vid handen. Jag slöt häraf, och, som jag förmodar, med skäl: 1:o att innehållet i hvardera artikeln först transformeras till en mer eller mindre sferisk eller elliptisk cellul, och 2:o att sedermera den ena af dessa celluler intränger uti den andras inre, samt 3:o att denna senare genom denna process blir en verklig spora.

Sanningen af denna förmodan bestyrktes än vidare. Händelsevis påträffades tvenne copulerade trådar, af hvilkas artiklar tvenne med hvarandra copulerade inneslöto i deras midt hvar sin sferiska cellul (fig. 3). Mellan dessa sferiska celluler kunde ej skönjas den minsta olikhet i afseende på struktur och innehåll; de bestodo båda af en i ett tidigt bildningsstadium varande, men som det tycktes, dock verklig cellulosemembran, hvilkens inre vägg var beklädd med större och mindre chlorophyll-korn. Men under det jag betraktade den sferiska cellulen uti öfra trådens artikel (fig. 3 a.), bildade sig nedåt på densamma en vårtlik utväxt, som synbart förlängdes, riktande sig mot copulations-kanalens öfra mynning; snart inträngde han deri, nedträngande allt längre och längre genom densamma, och i samma mohn förminskades den i moder-artikeln qvarvarande delen. Just vid detta tillfälle observerades på den uti den andra artikeln liggande sferiska cellulen en, i förhållande till artikelnas längd-axel, transverseelt liggande, ljus, aflång fläck (fig. 4 a), som jag genast ansåg vara den punkt, i hvilken den nedskjutande tuben skulle intränga.

Men olyckligtvis hade denna cellul — förmodligen af någon yttre orsak — blifvit förd åt ena sidan, så att jag genast befara- de, att den nedskjutande tuben ej skulle träffa nämnda punkt. Så skedde ock. Tuben fortsatte att nedtränga, men träffade ej fläcken, utan cellulens sida (fig. 4); straxt började tubens nedträngande spets att klotformigt uppsvälla (fig. 4 b.); denna klotformiga uppsvällning utvidgades i samma mohn som tuben nedgled, och dess öfra ända aftog i diameter; omsider var i tubens öfra ända allt tecken till den ursprungligen sferiska cellulen borta, och slutligen nedsjönk äfven denna, numera tubformiga ända, och snart derefter låg den öfra artikelns sferiska cellul (fig. 3 a), på nu beskrifna sätt förflyttad, i undra artikeln (fig. 5 a) bredvid denna senares äfvenledes sferiska cellul (fig. 5 b).

Hela denna process försiggick från början till slut under microscopet och på något kortare tid än en half timma. Ut det inre af den nedträngande cellulen kunde jag under tiden ej märka någon förändring; chlorophyll-kornen tycktes vara fast vidfästade den inre väggen och råkade ej under nedträngandet på minsta vis uti olag. — Att denna, på beskrifna sätt nedglidande eller nedskjutande cellul, borde hafva inträngt i det inre af den undra (undra i fig.) artikelns sferiska cellul, torde jag utan motsägelse få antaga på grund af de redan meddelade iakttagelserna på såväl *Zygnema longatum* som *Spirogyra*. Ett vidare bevis för antagandets riktighet blir den omständighet, att dessa båda bredvid hvarandra i undra artikeln liggande celluler (fig. 5 a et b) ej transformerades till form af sporer (fig. 2 f. g.), utan upplöstes utan att undergå någon vidare förändring.

Det torde nu ej blifva svårt, att förklara de fyra olika förhållanden hos copulerade *Spirogyra*-trådar, hvilka jag ofvan anmärkt såsom äfven af mig iakttagna och hvilka föranledt *SCHLEIDEN* att anse kopulationen för en alldeles oväsentlig akt. Uti fallet 4 är en spora bildad derigenom, att den ena copulerade artikelns cellul nedträngt uti den andra artikelns

cellul (jfr fig. 2, hvarest artiklarne *f* och *g* hysa hvar sin spora, men artiklarne *h* och *i* äro tomma). — Uti fallet 2 funno vi i hvarje artikel en sferisk cellul; här har således mellan dem båda ännu ingen beröring egt rum, d. v. s., den ena har ännu ej genom copulations-kanalen inträngt uti den andra (jfr fig 3). — Uti fallet 3 funno vi likartade celluler, en i hvardera af de motliggande artiklarne, men protuberancerna ej förenade till en copulations-kanal. Detta fall är således detsamma som 2, enda skillnaden är, att protuberancerna ej ännu med hvarandra sammanvuxit eller ock blifvit af yttre orsak lösslitna från hvarandra. — Hvilketdera varit orsaken, kan jag ej afgöra. — Uti fallet 4 funno vi tvenne celluler uti en artikel. Detta förhållande är lätt förklaradt. Den ena cellulens inglidning uti den andra har misslyckats, såsom vi ofvan sett att det understundom kan ske, och båda cellulerna ha i följd häraf kommit att ligga bredvid hvarandra (jfr fig. 5), i stället för att den ena skulle hafva inträngt uti den andras inre. Man får således ej taga hvarje, en spora snarlik, cellul uti Zygnemernas artiklar för en verklig spora.

Har det sålunda lyckats mig att beröfva SCHLEIDEN'SKA bevisen för copulationens oväsendtlighet deras gällande kraft, så torde det kunna påstås, att det ännu är långt ifrån afgjort, att hos Zygnemaceæ en verklig spora kan bildas utan föregående copulation. Enligt min erfarenhet är denna akt ett nödvändigt vilkor för sporans frambringande, och består ej blott deri, att en copulations-kanal uppträder, som förenar de båda artiklarne och att — såsom författarne påstå — den enas innehåll blandas med den andras, utan copulationens mest karakteristiska egenskap är, att, i stället för denna mekaniska blandning, innehållet i hvardera artikeln först transformeras till en cellul, och att af dessa båda celluler den ena sedermera intränger uti det inre af den andra — hvilken senare genom denna akt blir en verklig spora *).

*) Utvecklingen af dessa Zygnemernas sporer till verkliga Zygema-trådar, längesedan så väl beskrifven af VAUCHEA, men sedermera betviflad, har nyligen blifvit bestyrkt af AL. BRAUN, m. fl.

Men en dylik beröring mellan tvenne celluler, som till resultat gifver en spora, är ett fenomen, som närmast kan betraktas som befruktnings-akt. — De fanerogamiska växternas befruktning består i beröring mellan tvenne celluler, embryosäcken och pollenkornet, af hvilka det senare medelst en tubformig förlängning — pollen-slangen — intränger till eller in i den förra. — Äfven hos flera s. k. Cryptogamer — Rhizocarpeæ, Filices, Lycopodiaceæ etc. — har man i senare tider trott sig finna spår till embryosäck, nedträngande pollenslang eller åtmiustone befruktande organer — antheridia. — Zygnermernas copulation skall framdeles från detta håll ej sakna jämförelse-punkter. Men kan knappt betvifla det. Organismernas mest karakteristiska egenkap är den oförklarliga befruktningen; all förökning utan denna föregående akt, är tillfällig och oväsendtlig — och snart nog skola Cryptogamerna ej längre betraktas som undantag från den allmänna regeln.

Förklaring öfver Tabellen.

- Fig. 1. Tvenne copulerade trådar af *Zygnema longatum* (Vauch.); cellulerna *a* och *b* nedskjutande genom copulations-kanalen till de elliptiska celluler, som ligga uti undra trådens artiklar; *c* och *d* celluler, som redan till största delen inträngt i det inre af de uti den undra trådens artiklar liggande elliptiska cellulerna.
- Fig. 2. Copulerade trådar af *Spirogyra nitida* (Ag); uti hvardera af artiklarne *f* och *g* en färdigbildad spora; uti artikeln *c* en cellul *d*, som tubformigt nedskjuter genom copulations-kanalen och intränger uti cellulen *b*, som ligger uti artikeln *a*.
- Fig. 3. Tvenne copulerade artiklar af samma *Spirogyra*, och uti hvardera en sferisk cellul.
- Fig. 4. Samma object som fig. 3, sedt $\frac{1}{2}$ timma senare; cellulen *a* uti förra figuren visas här genom copulations-kanalen nedskjutande in i undra artikeln; uti denna senare ligger till höger samma cellul som uti förra figurens undra artikel (fig. 3 *b*), men nu utvisande vid *a* en ljus fläck
- Fig. 5. Samma object som uti fig. 4, sedt $\frac{1}{2}$ timma senare. Uti öfra artikeln ingen, uti undra tvenne celluler; den med den ljusa fläcken, liggande till höger, är densamma som i fig. 4 *a*; den till venster är den i fig. 4 från öfra artikeln tubformigt nedskjutande cellulen, som nu återtagit sin sferiska form.

5. *Nya Genera bland Hemiptera.* — Hr Studerande C. STÅL meddelade genom Hr BOHEMAN följande.

Sedan jag i sistlidne September hade den äran att till Kongl. Akademien inlemna början af en afhandling innehållande beskrifningar på nya Hemiptera från Cafferlandet, har fortsättningen af detta lilla arbete oafbrutet fortgått och så framskridit, att blott få arter af Hemiptera Heteroptera numera återstå att beskrifva. Arternas beskrifning är väl sålunda ännu ej fullständigt afslutad, men på de nya släkten, hvilka det varit nödvändigt att bilda, äro karaktererna utarbetade, och jag hoppas, att det ej måtte finnas olämpligt att förutskicka dessa, under hopp, att till våren få framlämna arternas diagnoser fullständigt. Härtill har jag äfven fogat beskrifningar på några nya släkten bland Homoptera, den andra stora afdelningen bland Hemiptera.

SPARTOCERIDES (Am. & SERV.)

ELASMOGASTER.

(ἐλασμός, lamina et γαστήρ.)

Caput quadratum, convexiusculum, tuberculis antenniferis prominulis. Antennæ validæ, 4-articulatæ, articulo 1 cylindrico, 2 et 3 triquetris, his omnibus longitudine æqualibus, ultimo brevior, fusiformi. Rostrum coxas anticas attingens. Thorax basi late rotundatus, lateribus obliquis. Abdomen subcirculare, lateribus dilatatum. Pedes sat validi, tarsis 3-articulatis, articulo 1 longissimo. (Spec. 1.)

HOMOEOCERIDES (Am. & SERV.)

PETALOCNEMIS

(πέταλον, folium et κνημὶς, tibia.)

Corpus planiusculum, oblongum. Caput quadratum. Antennæ brevæ, 4-articulatæ, articulis, præsertim basali, crassis, 1, 2 et 3 longitudine subæqualibus, ultimo his dimidio brevior, acutiusculo. Rostrum breve, coxas anticas vix superans, articulis 1 et 2 reliquis parum crassioribus. Thorax latitudine longior, postice late rotundatus, lateribus obliquis. Membrana nervis longitudinalibus, furcatis, inter se irregulariter reticulatis. Pedes mediocres, femoribus crassiusculis, subcompressis, tibiis, præsertim posticis, intus et basi magis quam apicem versus dilatatis; tarsis 3-articulatis, articulis 1 et 3 longitudine subæqualibus, 2 his minore. (Spec. 1.)



NEURODEDERRHIS.

(νευρώδης, nervosus et δέρρις, membrana).

Corpus planiusculum, oblongum. Caput quadratum. Antennæ breves, 4-articulatæ, articulis, præsertim basali, crassis, 1, 2 et 3 longitudine subæqualibus, ultimo nonnihil brevior, acutiusculo. Thorax longitudine nonnihil brevior, postice late rotundatus, lateribus obliquis. Hemelytra nervis validis, membrana nervis numerosis, irregulariter reticulatis. Pedes mediocres, tarsis 3-articulatis, articulo 1 longissimo, 2 brevissimo. (Spec. 1.)

RHYPAROCHROMIDES (AM. & SERV.)

ATRACTOPHORA.

(ἄτρακτος, fusus et φέρον.)

Caput quadratum, tuberculis antenniferis productis, acutis. Antennæ corpore vix breviores, articulo 1 capite ter longiore, apice incrassato, 2 et 3 primo brevioribus, 4 primi vix dimidia longitudine. Rostrum coxas anticas non superans. Thorax anterieus sensim paulo angustatus, subconvexus, pone medium transversim parum impressus. Femora antica posterioribus dupplo longiora, valde incrassata, sublus spinulosa. Tarsorum articulus 1 reliquis duobus ad unum dupplo longior. (Spec. 1.)

PYRRHOCORIDES. (AM. & SERV.)

DERMATINUS

(δερμάτινος, coriaceus.)

Corpus ovatum. Caput triangulare, convexum. Antennæ corpore dimidio fere breviores, articulo 1 vix capitis longitudine, 2 hoc parum longiore, 3 et 4 longitudine æqualibus, præcedente parum brevioribus. Rostrum coxas posticas superans, articulis 1 et 2 longitudine subæqualibus, 3 minore, 4 minimo. Thorax antice et postice truncatus, parum convexus, lateribus obliquis. Hemelytra apice truncata, coriacea, nervis omnino inconspicuis, membrana nulla. Pedes mediocres, tarsorum articulo, 1 reliquis duobus ad unum dupplo longiore, 2 minimo. (Spec. 3.)

CAPSIDES. (AM. & SERV.)

SPHINCTOTHORAX

(σφινκτός, constrictus et θώραξ.)

Caput nutans, sat magnum, oblongo-triangulare. Antennæ corporis longitudine, artic. 1 brevissimo, 2 hoc ter longiore, 2 ultimis hoc dimidio brevioribus, inter se longitudine æqualibus. Rostrum coxas intermedias attingens, articulis 1, 2 et 3 longitudine æqualibus, ultimo longiore, basali reliquis crassiore, sublus dilatato. Thorax medio constrictus, anterieus multo angustior. Pedes graciles, tarsorum articulis 1 et 3 longitudine subæqualibus, intermedio parum brevior. (Spec. 1.)

REDUVIDES. (AM. & SERV.)

PHONERGATES.

(φόνος, cædes et ἐργάτης, operarius.)

Caput subtriangulare, ante oculos subconico-productum, pone oculos late rotundatum, subito constrictum, collo brevissimo. Antennæ vix corporis dimidia longitudine, articulis 1 minimo, 2 hoc quater fere longiore, ultimis 2 secundo nonnihil brevioribus, inter se longitudine æqualibus, setaceis. Rostrum validum, crassum, articulis 1 et 2 longitudine subæqualibus, ultimo brevior. Thorax convexiusculus, medio transversim constrictus, ut et impressione longitudinali media instructus, lateribus obliquis, angulis posticis oblique truncatis. Scutellum apice spinosum. Femora anteriora et præsertim antica valde incrassata. Tibiæ anteriores fossula spongiosa apice instructæ. Tarsorum articuli 1 et 2 longitudine æquales, ultimus nonnihil longior. (Spec. 1.)

CLOPOPHORA.

(κλοπή, furtum et φέρω.)

Caput subcylindricum, ante oculos valde productum; pone oculos late rotundatum, subito constrictum, collo brevissimo. Antennæ vix corporis dimidia longitudine, art. 1 brevissimo, 2 hoc ter fere longiore, ultimis brevioribus, inter se longitudine æqualibus, setaceis. Rostrum validum, articulo intermedio basali vix vel parum longiore, ultimo brevissimo. Thorax convexiusculus, medio constrictus et utrimque sinuatus, impressione longitudinali in disco instructus, lateribus obliquis, angulis humeralibus oblique truncatis. Scutellum apice spinosum. Femora antica valde incrassata, subtus spinulosa. Tibiæ anticæ fossula spongiosa apice instructæ. Tarsorum articulus ultimus basalius longior. (Spec. 2.)

ECTRICHODIDES. (AM. & SERV.)

GLYMMATOPHORA

(γλύμμα, sculptura et φέρω.)

Caput nutans, oblongo-subtriangulare, pone oculos late rotundatum, constrictum, collo brevi. Antennæ corporis dimidia fere longitudine, pilosulæ, 6-articulatæ, art. 2 basali longiore, 3 hoc fere dimidio brevior, 4, 5 et 6 hoc brevioribus, inter se longitudine æqualibus. Thorax pone medium transversim, medio etiam longitudinaliter impressus. Scutellum transversim impressum, apice emarginatum. Hemelytra et alæ desunt. Femora anteriora incrassata. Tibiæ anteriores fossula spongiosa apice instructæ. Tarsorum articuli basales longitudine æquales, ultimus longior. (Spec. 3.)

CLEPTRIA

(κλέπτειν, fur.)

Corpus subparallellum. Caput oblongo-subtriangulare, tuberculis antenniferis productis, pone oculos late rotundatum, constrictum, collo brevi. Antennæ corpore tertis parte breviores, pilosulæ, 8-articulatæ,

art. 2 basali nonnihil longiore, 3 hoc dimidio, 4 et 5 adhuc brevioribus, 6, 7 et 8 brevissimis, inter se longitudine æqualibus. Rostrum art. inter se longitudine fere æqualibus, sed art. 2 reliquis subcrassiore. Thorax convexiusculus, cruce media impressa instructus, lateribus obliquis, angulis humeralibus longitudinaliter impressis. Scutellum apice emarginatum, bispinosum. Tibiæ anteriores fossula spongiosa apice instructæ. Tarsorum articulus 1 brevissimus, 3 fere longissimus. (Spec. 3.)

HARPACTORIDES. (AM. & SERV.)

PANTOLEISTES.

(παῦς, omnis et ληΐς, prædor.)

Caput cylindricum, thorace parum longius, collo partis capitis anteocularis longitudine. Antennæ corpore parum breviores, art. 1 quam brevissimo, 2 capitis longitudine, 3 hoc ter brevior, 4 reliquis ad unum omnibus longitudine fere æquali. Rostrum sat validum, curvatum, art. 1 capitis dimidia longitudine, 2 hoc dupplo fere longiore, 3 brevissimo, primo dimidio breviora. Thorax convexiusculus, ante medium transversim constrictus, basi late rotundatus, lateribus obliquis, angulis humeralibus rotundatis. Scutellum subtriangulare. Hemelytra abdomine angustiora. Abdomen lateribus rotundatum, præsertim medio et pone medium valde dilatatum. Pedes longiusculi, tarsorum art. 1 brevissimus, ultimus longissimus. (Spec. 1.)

HARPAGOCORIS.

(ἄρπαξ, rapax et κόρις.)

Corpus longiusculum. Caput ante oculos subconico-productum, pone oculos basia versus sensim angustatum, collo breviusculo. Antennæ corpore breviores, art. 1 capitis longitudine, 2 hoc quater longiore, 3 et 4 primi longitudine. Rostrum art. 1 et 2 longitudine æquales, ultimus brevior. Thorax convexiusculus, apice utrimque tuberculatus, ante medium constrictus, lateribus obliquis, angulis humeralibus oblique truncatis. Hemelytra abdomine longiora, nervis validis. Tarsorum art. 1 brevissimus, ultimus longissimus. (Spec. 1.)

PHONOCTONUS

(φωνοκτόνος, qui per eandem interficit.)

Corpus subellipticum, planiusculum. Caput ante oculos subtriangulariter productum, apicem versus declinatum, pone oculos basin versus sensim angustatum, collo brevi. Antennæ vix corporis longitudine, art. 1 capite dupplo longiore, 2 et 3 hoc dimidio brevioribus, ultimo vix longitudine primi. Rostrum art. 1 et 2 longitudine subæquales, ultimus brevior. Thorax planiusculus vel parum convexus, marginatus, ante medium transversim impressus, lateribus obliquis, angulis posticis oblique truncatis. Tarsorum art. 1 brevissimus, ultimus longissimus. (Spec. 1.)

SPHAGIASTES.

(σφαγιάζω, mactō.)

Caput cylindricum, thoracis longitudine, collo oculos versus bispinoso. Antennarum art. 1 capite longior, spinulosus et setulosus,

2 hoc parum brevior. (Art. ultimi desunt.) Rostri art. basalis et apicalis longitudine subæquales, intermedius his dupplo longior. Thorax convexus, spinosus, ante medium subconstrictus, lateribus obliquis, anterieus et basin versus bituberculatus, tuberculis spiniferis. Abdomen segmento singulo et præsertim apicalibus foliaceodilatatis. Femora subtus spinulosa, apice spinis 2 instructa. Tibiæ posteriores basin versus intus ciliatæ. Tarsi breves, graciles, art. 1 quam brevissimo. (Spec. 1.)

LAPHYCTES.

(λαφύκτης, belluo.)

Caput cylindricum, thoracis longitudine. Antennæ corporis fere longitudine, art. 1 capite longiore, 2 et 3 singulo præcedente dimidio brevioribus, ultimo longitudine primi. Rostrum subcurvatum, art. 1 et 2 æqualibus, ultimo brevissimo. Thorax ante medium subconstrictum, lateribus obliquis, angulis posticis spinosis. Pedes longiusculi, tarsi brevis, gracilibus, art. 1 quam brevissimo. (Spec. 1.)

CONORRHINIDES. (AM. & SERV.)

TRIBELOCEPHALA.

(τριβελήσ, tres cuspides habens, et κεφαλή.)

Caput ante oculos conico-productum, apice acute spinosum, tuberculis antenniferis valde productis, pone oculos subquadratum, basi subito valde constrictum, collo brevissimo. Rostri art. 1 et 2 longitudine subæquales, ultimus minimus. Antennæ capite nonnihil longiores, art. 1 capite vix dimidio brevior, crasso, reliquis 3 singulo præcedente dimidio brevioribus, subsetaceis. Thorax latitudine brevior, transversim subimpressus, basi truncatus, lateribus obliquis. Hemelytra abdomine breviora, basi solum coriacea, membrana maxima. Pedes breviusculi, tarsorum art. 1 et 2 longitudine subæquales, ultimus longior. (Spec. 1.)

STENOPODIDES. (AM. & SERV.)

LOPODYTES.

(λοποδύτες, grassator.)

Caput cylindricum, thorace longius. Antennarum art. 1 capitis longitudine, 2 et 3 singulo præcedente dimidio breviores, (art. ultimus deest). Rostrum rectum, art. basali et apicali longitudine subæqualibus, intermedio his sexies longiore. Thorax convexus, basi bispinulosus, lateribus subobliquis. Pedes longi, graciles, tarsorum art. 1 brevissimus, ultimus longissimus. (Spec. 1.)

GERRIDES. (AM. & SERV.)

TENAGOGONUS.

(τέναγος, locus humidus et γένωμα.)

Corpus subellipticum. Caput subtriangulare, convexiusculum, tuberculis antenniferis parum productis. Antennæ corpore longiores, articulis inter se longitudine fere æqualibus, capite nonnihil longio-

ribus; inter articulum 2 et 3 articulus minimus, globosus adest. Rostrum capite ter fere longius, art. 1 capite vix dimidio brevior, 2 hujus dimidia longitudine, 3 capite nonnihil longiore, 4 hoc plus dimidio brevior. Thorax abdomine multo longior, convexus, lateribus subobliquis. Hemelytra et alae desunt. Abdominis segmentum penultimum utrimque ramulum emittens. Pedes posteriores longissimi; tarsi antici breves, crassiusculi, posteriores longiores, graciliores. (Spec. 1.)

NEPOIDÆ. FIEBER.

ILYOTREPHEs.

(Ἰλύς, limus, et τρέφω.)

Corpus magnum, ellipticum. Caput thorace latius, ante oculos breviter cylindrico-productum, oculis angulos apicales thoracis fere amplectentibus. Antennae brevissimae, art. 1, 2 et 3 globosis, his 2 ramulum curvatum, subcylindricum, emittentibus, 4 oblongo, subconico. Tarsi omnes biungiculati, tarsorum anticorum unguiculo externo interno brevior. Cetera ut in Belostomate. (Spec. 1.)

LYSTROIDES. (SPIN.)

HYPSELOMETOPUM.

(ὕψηλός, altus et μέτωπον, frons.)

Caput prothorace angustius. Vertex antice late rotundatus, basi late emarginatus, concavus, triimpressus, marginibus elevatis, margine antico utrimque subsinuato, ad oculos parum dilatato. Frons magna, subquadrata, basin versus subconvexiuscula, inaequalis, basi obtuse triangulariter producta. Labrum triangulare, medio parum convexum, marginibus lateralibus subelevatis. Antennae breves, art. ultimo brevissime cylindrico, setifero. Prothorax brevis, transversus, longitudinaliter obsolete tricarinatus, ad carinam mediam utrimque foveolatus. Hemelytra abdomine vix dupplo longiora, pone medium subdeflexa, cellulis numerosis quadratis vel oblongoquadratis instructa. Tibiae anteriores subtus nonnihil dilatatae. (Spec. 1.)

CIXIIDÆ. (SCHAUIM.)

SIMOTETTIX.

(σιμόξ, simus et τέττιξ, cicada.)

Caput prothorace dimidio angustius. Vertex angustus, longitudinalis, concavus, marginibus elevatis, reflexis. Frons longe obtriangularis, apice processu filiformi, triquetro, sursum producto instructa, marginibus lateralibus elevatis, reflexis. Labrum oblongotriangulare, convexum, medio longitudinaliter carinatum, marginibus subelevatis. Oculi subglobosi. Antennae art. ultimo cylindrico-globoso. Prothorax capite plus dimidio brevior, medio longitudinaliter alte carinatus. Mesothorax prothorace ter fere longior, triangularis. Hemelytra abdomine vix dupplo longiora, vitrea, nervis longitudinalibus, apicem versus furcatis et aliis transversis conjunctis. Femora compressa, pedes antici utrimque dilatati. (Spec. 1.)

STRONGYLODEMAS.

(στρογγύλος, rotundus et δέμας, corpus.)

Corpus late ovale, vel fere circulare. Caput antice nonnihil productum, apice rotundatum. Vertex marginatus, medio longitudinaliter carinatus. Frons subparallela, 5-carinata, carinis basi confluentibus. Labrum fronte parum longius, medio longitudinaliter carinatum, ad medium parallelum, dein subito valde sinuatum, et apicem versus angustatum, marginibus elevatis. Antennæ art. ultimo globoso. Prothorax capite dimidio fere brevior, antice productus, cum mesothorace medio longitudinaliter carinatus. Hemelytra abdomine dimidio breviora, apice truncata, nervis elevatis, longitudinalibus, subfurcatis. Tibiæ posticæ tarsorumque posticorum articuli apice bifidi; tarsi postici anterioribus longiores, validiores. (Spec. 1.)

EMBOLOPHORA.

(ἐμβολος, rostrum navis et φέρω)

Caput prothorace parum angustius, processu cylindrico, thorace plus dupplo longiore, supra 3-, subtus 4-carinato, instructum. Frons et labrum 3-carinata. Antennæ cylindricæ, capitis latitudine parum longiores, art. 2 basali dupplo longiore. Prothorax transversus, antice nonnihil productus, cum mesothorace longitudinaliter 3-carinatus. Hemelytra abdomine nonnihil longiora, nervis longitudinalibus, furcatis. (Spec. 1.)

RHINOTETTIX.

(ῥίη, nasus et τέττιξ, cicada.)

Caput sat longe conico-productum, prothorace latius. Vertex medio longitudinaliter carinatus, marginibus elevatis, reflexis. Frons subparallela, convexiuscula, medio longitudinaliter carinata. Labrum convexum, medio obsolete longitudinaliter carinatum. Antennæ capitis latitudine vix breviores, subcylindricæ, apicem versus parum crassiores, art. ultimo basali dupplo fere longiore. Prothorax vertice longitudine æqualis, antice productus, longitudinaliter 3-carinatus. Hemelytra abdominis longitudine, opaca, nervis longitudinalibus, subfurcatis. (Spec. 1.)

HAPALOMELUS.

(ἁπαλός, tener et μέλος, membrum.)

Caput ante oculos subtruncatum. Vertex longitudinaliter carinatus, marginibus elevatis. Frons convexiuscula, 3-carinata. Labrum subquadratum, convexiusculum, longitudinaliter 3-carinatum, marginibus subelevatis. Antennæ capitis latitudine ter longiores, cylindricæ, art. ultimo basali dimidio breviora. Hemelytra abdomine dupplo longiora, medio constricta et flexa, nervis longitudinalibus. (Spec. 1.)

AMBYCOTIS.

(ἀμβλύς obtusus et κορυφή, vertex.)

Caput prothorace parum latius, inter oculos truncatum. Vertex brevis, transversus. Frons lata, subtriangularis, longitudinaliter 4-

carinata, marginibus elevatis. Labrum triangulare, longitudinaliter carinatum. Antennæ capite ter fere longiores, compressæ, art. ultimo basali dupplo longiore. Prothorax brevis, transversus, basi sinuatus, cum mesothorace obsolete tricarinatus. Hemelytra abdomine dupplo longiora, nervis longitudinalibus, subfurcatis. (Spec. 1.)

TROPIDOCEPHALA.

(τρόπις, carina et κεφαλή.)

Caput antice triangulariter productum, prothorace nonnihil longius. Vertex planus, longitudinaliter carinatus, marginibus elevatis. Frons parallela, cum labro longitudinaliter carinata, marginibus elevatis. Antennæ capitis latitudine nonnihil breviores, cylindricæ, extus nonnihil crassiores, articulo ultimo basali dupplo fere longiore. Prothorax et mesothorax planiusculi, longitudinaliter tricarinati. Hemelytra abdomine vix dupplo longiora, mox pone medium 3-tuberculata, tuberculis transversim positis, e nervis ibi elevatis formatis, longitudinaliter nervosa, nervis apicem versus subfurcatis, et nervo transverso conjunctis. (Spec. 1.)

FLATIDÆ.

ACROMETOPUM.

(ἄκρον, apex et μέτωπον, frons.)

Caput triangulariter productum, apice rotundatum, attenuatum. Vertex concavus, marginibus reflexis. Frons convexa, basin versus angustior, apice late rotundata. Labrum oblongo-triangulare. Prothorax capite dimidio brevior, medio concavus. Mesothorax subtricarinatus. Hemelytra sat lata, abdomine vix vel parum longiora, nervis costatis, longitudinalibus, subfurcatis. Tibiæ anticæ subtus nonnihil dilatatae. (Spec. 1.)

CYSTINGOCEPHALA.

(κύστις, vesicula et κεφαλή.)

Vertex ante oculos productus, subquadratus, medio longitudinaliter carinatus, marginibus elevatis. Frons valde producta, vesiculosa, valde compressa, hyalina, canaliculata, marginibus reflexis. Labrum oblongo-triangulare, compressum, tricarinatum, carina media valde elevata. Antennæ brevissimæ, art. ultimo globoso-cylindrico. Prothorax vertice vix brevior, antice bisinuatus, cum mesothorace 3-carinatus. Hemelytra deflexa, nervis longitudinalibus, subfurcatis, apicem versus parum reticulatis, margine transversim nervoso. Femora anticæ subtus dilatata. (Spec. 1.)

APHROPHORIDES. (Am. & Serv.)

PETALOCYCEPHALA.

(πέταλον, folium et κεφαλή.)

Caput valde rotundato-productum, supra planum, subtus concavusculum, longitudinaliter biimpressum. Antennæ breves, oblique ante oculos insertæ, cylindricæ, articulis longitudine subæqualibus.

Prothorax transversus, capitis longitudine, parallelus, convexiusculus, medio longitudinaliter subimpressus, basi sinuatus. Hemelytra abdomine nonnihil longiora, nervis longitudinalibus, furcatis. (Spec. 1.)

SCARIDES. (Am. & SERV.)

EVRYPROSOPUM.

(ἔυρον, latus et πρόσωπον, facies.)

Caput latissimum, breve, rectangulum, convexiusculum, perpendicularare. Antennæ breves, ante oculos in margine inferiore capitis insertæ, articulo ultimo cylindrico-globoso. Prothorax capitis latitudine, sed hoc dupplo fere longior, antierius subdeclivis. Hemelytra abdomine parum longiora, reticulato-nervosa. Tibiæ anteriores compressæ, subdilatatæ. (Spec. 1.)

6. *En döfstum och blindfödd, som talar.* —

Hr A. RYZIUS meddelade följande utdrag ur ett bref från Archæologen FREDR. TROYON, dat. Bel-air vid Lausanne den 25 October.

»För några dagar sedan hade jag ett högst sällsynt besök. En *blind och döfstum* kom att »se» min samling. Han är elev vid blindinstitutet i Lausanne, en inrättning, som högst talentfullt förestås af Doctor HIRZEL. Efter många ansträngningar har det lyckats Dr HIRZEL att kunna meddela sig åt denne olycklige, att lära honom läsa, att artikulera ljud och slutligen att tala. Medelst ett alfabet, sammansatt för fingrarnes vidröring, öfverflyttar man på honom sin tanke, hvilken han sedan muntligen upprepar och besvarar på ett sätt, som tydligen visar att han fattar, hvad man sagt honom. Vi började med att sätta en kiselstenyxa i hans händer, hvilkens bestämelse han genast fattade, samt kände, att den var af sten. Då vi frågade honom om stenens natur, upptog han ur sin ficka en flinta och sade, att den var af kisel. Genom beröring åtskildte han en mängd saker, såsom knifvar, hålmejslar, saxar, hammare, dolkar och lans-uddar. Då vi kommo till bronzafdelningen, satte jag i hans hand en bronzxyxa af enkel form, hvilken han genast igenkände och frågade om den var af metall. Sedan jag beskrifvit bronzens natur för honom miss-

tog han sig ej derpå, utan igenkände ögonblickligen värjorna, armbanden m. m. Vi gjorde honom begripligt, att verktygen af bronz äro äldre än de af jern, och visade honom äfven åtskilliga profver af det sednare, sägande, att äfven de voro mycket gamla. Slutligen förde vi honom uti Bel-Airs grafgångar och läto honom känna stenväggarna af en graf. Han kunde ganska väl göra reda för, att alla dessa föremål för länge sedan blifvit nedsatta i jorden, och att de tillhörde olika momenter af den mensklige utvecklingen. — Återkomna till mitt kabinett satte jag i hans händer ett cranium, som han genast igenkände, derefter andra menniskoben, bärande märken af gamla blessurer, hvaraf ej ett enda undgick hans uppmärksamhet. — Denne unge blinde medförde ur min samling ett mycket sundare begrepp än en stor mängd andra besökande. Han gissade till och med bestämmelsen af några saker, som ofta ej de mest klarsynta kunnat upptäcka. Detta besök har upptäckt för honom tillvaron af en forntid, som han aldrig anat. Hans förvåning, hans uttrycksfulla åtbörder, hans korta men bestämda ord och hans begrepp om praktiska ting väckte hos mig ett lifligt intresse.»

Inlemnade skrifter.

- Hr RINK i Köpenhamn hade inlemnat en uppsats öfver Grönlands Geografi och Geognosi, för hvilken innehåll Hr MOSANDER redogjorde.
- Hr Assessor E. BURMAN: Meteorologiska observationer i Neder-Calix, Nov. 1852—Nov. 1853.
Öfverlemnades till det astronomiska observatorium.
- Hr Vice-Amiral KRUEGER hade inlemnat ett tabellariskt sammandrag af de under loppet af 1852, vid åtskilliga af rikets fyrbåkar anställda observationer öfver vindarnes riktning och kraft, äfvensom öfver barometerns och thermometerens förändringar: och all den stund dessa observationer stå i ett nära samband med de på Akademiens föranstaltande äfven i gång satta observationerna öfver vattenhöjden, och, efter all sannolikhet, dermed sammaställda och jemförda, skola gifva anledning till mången vigtig upp-

upplysning, beslöt Akademien, med tacksamt erkännande af Hr Vice-Amiralens dermed hafda möda, att tillä vidare förvara detta nu inlemnade sammandrag, för att i Akademiens årstryck intagas jemte och i sammanhang med det sammandrag af vattenhöjdsobservationerna för nämnda år, hvilket Akademien snart förväntar att se sig meddeladt.

Akademiska angelägenheter.

Præses tillkännagaf, att Akademiens ledamot i nionde klassen, f. d. Statsrådet en af de Aderton i Svenska Akademien, R. N. O. Hr SAM. GRÖNNE genom döden afgått.

Till inländsk ledamot i åttonde klassen kallades Bergsrådet, C. W. O. Hr Dr J. L. ASCHAN.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af Kongl. Storbritanniska Regeringen.

Observations made at the magnet. et meteor. observatory at Toronto, in Canada. Vol. II. Lond. 1853. 4:o.

Observations made at Hobarton, in Van Diemens Land. Vol. III. Lond. 1850. 4:o.

A collection of tables ... computed in the magnetic observatory, Simla .. Umballa 1850. 4:o. (5 ex.)

Af Kejsarl. Franska Regeringen.

Annales des Mines. Année 1852, livr. 6. Année 1853, livr. 1. 8:o.

Af Finska Vetenskaps-Societeten i Helsingfors.

Acta Societatis. T. III. Fasc. 2. Helsingf. 1852. 4:o.

Notiser. Bihang till Acta. H. 2. Helsingf. 1852. 4:o.

Sveriges Rikes Landslag. Öfvers. på Finska. Utg. af LACUS. Helsingf. 1852. 4:o.

Sveriges Rikes Stadslag. Öfvers. på Finska. Utg. af LACUS. Helsingf. 1852. 4:o.

Af Royal Society i London.

Philosophical Transactions. Vol. 143. P. 1, 2. Lond. 1853. 4:o.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 10. N:o 10.

Proceedings. Vol. VI. N:o 94—96. 8:o.
Greenwich Observations. 1851. Lond. 1853. 4:o.

Of Chemical Society i London.

Quarterly Journal. VI: 3. (Oct. 1853). 8:o.

Of Société Géologique i Paris.

Bulletin. T. IX. F. 36—40. X: 4—11. Paris 1853. 8:o.

Of Société Entomologique i Paris.

Annales de la société. Sec. Sér. T. X. Par. 1852. 8:o.

Of K. K. Akademie der Wissenschaften i Wien.

Denkschriften. Mathem. naturw. V: 1. — Philos. histor. IV.
Sitzungsberichte. Mathem. nat. X: 2, 3. — Philos. histor. X: 2—4.
Archiv. IX: 2. X: 1.
Fontes rer. austr. B. VI, VII. 8:o.
Monumenta Habsburgica. Zwei Abth. B. I. Wien 1853. 8:o.

Of Académie Imp. des Sciences i Petersburg.

Mémoires de l'Académie. Sixième Sér. Sciences mathém. et phys.
T. V. Livr. 5, 6. St Petersburg. 1853. 4:o.

**Of Société Vaudoise des sciences naturelles
i Lausanne.**

Bulletin. N:o 29. Année 1853. 8:o.

Of Författarne.

BRAG, FA. TA., Bidrag till Sveriges medicinska Topografi o. Statistik.
Sthm 1853. 4:o.
BUYS-BALLOT, Meteorolog. Waarnemingen 1851 en 1852. Utrecht
1852. I. II.
HEER, O., Fyra geologiska ströskrifter.
GRAHAM, J. D., Intersection of the boundary lines of Maryland, Penn-
sylvania and Delaware. Wash. 1850. 8:o.
— — Boundary line between the U. S. and Mexico. Wash. 1852. 8:o.
ILMONI, IMM., Bidrag till Nordens sjukdomshistoria. Del. 3. Helsingf.
1853. 8:o.
PACINI, FIL., Dell'organo elettrico del Gimnoto. Firenze 1852. 8:o.
SONDÉN, C. U., Danviks Dårhus. Sthm 1853. 8:o.

Af Hr Shaw i London.

MURCHISON, Sir R. L., Address, May 1853. 8:o.

Af Hr G. R. Cooper i Dublin.

Catalogue of the stars near the Ecliptic. Vol. II. Dubl. 1853. 8:o.

Af Hr L. F. Svanberg i Upsala.

Om Svenska Masugnar. (Af Emanuel Svedenborg, 1719). 4:o. —
Handskrift.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Hr Apothekaren Hjalmarsen.

Sexton stycken uppstoppade och tio stycken spritlagda foglar, några
amfibier och fiskar i sprit, åtskilliga insekter samt mollusker m.
m., alla från Honduras.

Af Hr Professor Huss.

En *Fringilla amandava*, och
En *Fringilla senegala*, båda från Afrika.

Botaniska afdelningen.

Af Hr Professor Oswald Heer i Zürich.

Sextiotvå arter från Schweiz och södra Spanien, förnämligst nejden
af Malaga.

Etthundradeåttioåtta arter från Madera, deribland öns förnämsta träd,
som bilda skogar, såsom *Laurus canariensis*, *Oreodaphne foetens*,
Phoebe barbusana, *Ilex canariensis*, I. Perado, flera af öns busk-
arter, ifrån hafsstranden upp till bergshöjderna.

Af Hr Professor Hedenberg.

Twåhundra defemtio arter från Rhodus, förnämligast af Gramineæ, Or-
chideæ, Labiatæ, Leguminosæ, Boragineæ, Compositæ m. m.

Af Hr Magister Andersen.

Sextioåtta arter från olika länder, deribland en större mängd af Gramineæ från Mossambique.

Af Hr Apothekaren Hjalmarson.

Etthundradeaderton arter från Honduras, förnämligast af Gramineæ, Leguminosæ, Bombaceæ, Compositæ, Solanaceæ, Euphorbiaceæ, Filices, m. m.

Af Hr Studerande Goldkuhl.

Åtta sällsyntare arter från Calmar läns och Östergöthlands skärgårdar, t. ex. *Rubus horridus*, *Thymus chamædrys*, *Allium ursinum*, *Poterium sanguisorba*, *Pedicularis sylvatica*.

Af Botanices Intendenten.


Tjugutvå sällsyntare arter från Öland och Calmar län, samlade af Studerande WESTERLUND, t. ex. *Coronilla émerus*, *Plantago minor*, *Lychnis alpina*, *Cerastium glutinosum*, *Verbascum thapsiforme*, *Orchis militaris*, *Lactuca scariola*, *Juncus maritimus*, m. fl.

*Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i October 1853.*

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmär- ningar.
	Rt. 6 f. m.	Rt. 2 e. m.	Rt. 9 e. m.	Rt. 6 f. m.	Rt. 2 e. m.	Rt. 9 e. m.	Rt. 6 f. m.	Rt. 2 e. m.	Rt. 9 e. m.	
1	25,13	25,11	24,97	+ 5°0	+ 9°9	+ 7°1	V.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	Regn
2	24,78	24,99	25,09	+ 6,0	+ 6,0	+ 3,2	V.S.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
3	25,14	25,23	25,32	+ 0,7	+ 9,0	+ 4,1	—	V.	V.	Klart
4	25,41	25,46	25,49	+ 1,0	+ 9,6	+ 5,2	V.S.V.	V.S.V.	S.V.	—
5	25,40	25,43	25,48	+ 7,6	+ 10,2	+ 8,2	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Mulet
6	25,47	25,46	25,43	+ 6,6	+ 9,9	+ 7,9	S.S.V.	S.S.O.	N.O.	—
7	25,38	25,42	25,49	+ 7,0	+ 10,0	+ 7,0	N.O.	N.O.	N.O.	—
8	25,35	25,59	25,64	+ 6,6	+ 8,6	+ 8,0	N.O.	N.O.	N.O.	—
9	25,67	25,70	25,68	+ 7,0	+ 9,0	+ 7,2	N.O.	N.O.	N.N.O.	—
10	25,64	25,61	25,58	+ 7,0	+ 8,1	+ 6,1	O.N.O.	O.N.O.	N.	Regn
11	25,48	25,43	25,37	+ 6,7	+ 7,5	+ 7,0	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	—
12	25,26	25,29	25,37	+ 4,7	+ 5,1	+ 3,4	N.N.O.	N.	N.	—
13	25,40	25,40	25,40	+ 3,0	+ 3,9	+ 3,0	N.	N.	N.	—
14	25,40	25,43	25,42	+ 1,2	+ 2,2	+ 1,3	N.	V.N.V.	V.N.V.	—
15	25,40	25,39	25,42	+ 3,0	+ 8,5	+ 6,1	S.S.V.	V.S.V.	S.	Mulet
16	25,37	25,33	25,29	+ 8,0	+ 9,7	+ 9,1	S.	S.	S.	—
17	25,16	24,99	24,96	+ 7,9	+ 9,2	+ 6,6	S.S.O.	S.S.O.	S.S.V.	Halfkl.
18	25,03	25,00	24,95	+ 4,2	+ 10,1	+ 10,1	S.	S.	S.	—
19	24,86	24,99	25,22	+ 8,2	+ 6,1	+ 4,1	S.S.V.	V.S.V.	V.N.V.	Regn
20	25,35	25,35	25,26	— 0,5	+ 5,3	+ 5,2	—	V.N.V.	O.N.O.	—
21	25,22	25,35	25,49	+ 4,8	+ 5,0	+ 2,6	N.N.O.	N.N.O.	N.N.V.	Mulet
22	25,55	25,53	25,55	+ 9,5	+ 10,1	+ 9,0	S.	S.	S.S.V.	Regn
23	25,55	25,66	25,65	+ 9,0	+ 13,2	+ 11,0	S.S.V.	S.V.	S.V.	Halfkl.
24	25,55	25,63	25,73	+ 11,0	+ 13,3	+ 10,1	S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Mulet
25	25,71	25,66	25,59	+ 10,1	+ 14,0	+ 7,5	V.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Halfkl.
26	25,51	25,52	25,56	+ 7,4	+ 10,0	+ 9,5	S.V.	V.S.V.	V.	—
27	25,58	25,59	25,53	+ 9,2	+ 11,3	+ 7,3	V.S.V.	S.V.	S.V.	Mulet
28	25,46	25,46	25,45	+ 7,2	+ 9,2	+ 7,1	V.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	—
29	25,37	25,36	25,35	+ 7,6	+ 10,3	+ 8,7	S.	S.S.V.	S.S.V.	Regn
30	25,37	25,44	25,53	+ 9,5	+ 12,0	+ 7,1	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Mulet
31	25,67	25,79	25,85	+ 2,0	+ 7,3	+ 1,9	—	—	V.S.V.	Dimma
Me- dium	25,381	25,406	25,422	+ 6°01	+ 8°83	+ 6°51	Nederbörden = 1,362 dec. tum.			
	25,403			+ 7°12						

i November 1853.

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkn- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,90	25,90	25,88	+ 2 ²	+ 6 ¹	+ 7 ⁵	S.	S.	O.S.O.	Dimma
2	25,81	25,78	25,77	+ 8,0	+ 7,9	+ 7,0	S.S.O.	S.	V.S.V.	—
3	25,77	25,74	25,75	+ 5,1	+ 8,2	+ 7,8	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Mulet
4	25,75	25,76	25,75	+ 4,5	+ 2,7	+ 2,0	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
5	25,71	25,73	25,78	+ 3,0	+ 0,3	+ 0,1	V.N.V.	V.N.V.	N.N.O.	Dimma
6	25,83	25,87	25,92	— 0,4	+ 2,0	+ 3,0	V.S.V.	V.S.V.	V.	—
7	25,91	25,87	25,81	+ 3,9	+ 5,9	+ 4,3	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Mulet
8	25,74	25,66	25,55	+ 3,3	+ 4,2	+ 4,0	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
9	25,24	25,03	25,15	+ 4,5	+ 4,2	+ 3,2	S.S.V.	S.S.V.	V.N.V.	Regn
10	25,28	25,46	25,64	+ 2,0	+ 2,3	+ 1,5	N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Sol
11	25,74	25,74	25,65	0,0	+ 4,0	+ 5,0	S.S.V.	S.S.V.	S.V.	Half
12	25,60	25,64	25,66	+ 6,2	+ 5,1	+ 1,1	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Klar
13	25,64	25,66	25,67	+ 2,9	+ 6,1	+ 1,0	V.S.V.	V.S.V.	V.	Mulet
14	25,69	25,71	25,67	+ 3,4	+ 5,3	+ 3,0	S.S.O.	S.	S.S.O.	—
15	25,52	25,46	25,49	+ 4,3	+ 4,3	+ 2,4	S.O.	S.O.	S.S.O.	Regn
16	25,51	25,52	25,51	+ 3,4	+ 5,0	+ 4,1	O.S.O.	O.S.O.	S.O.	—
17	25,49	25,46	25,43	+ 3,2	+ 3,8	+ 4,0	S.O.	S.S.O.	O.S.O.	—
18	25,36	25,39	25,46	+ 4,4	+ 5,1	+ 2,1	S.	—	—	—
19	25,55	25,59	25,61	— 0,7	+ 2,6	+ 2,7	V.N.V.	V.N.V.	V.S.V.	Mulet
20	25,64	25,64	25,66	+ 3,0	+ 3,7	+ 3,0	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
21	25,68	25,69	25,73	+ 2,2	+ 2,9	+ 0,4	—	—	N.N.V.	—
22	25,74	25,76	25,76	+ 1,2	+ 2,5	+ 2,0	N.	N.	N.	Regn
23	25,76	25,80	25,88	— 1,0	— 0,8	— 0,9	N.N.V.	N.N.V.	S.S.V.	Half
24	25,91	25,91	25,93	0,0	+ 1,3	+ 1,0	—	S.S.V.	S.S.V.	Sol
25	25,96	25,98	26,00	+ 0,4	+ 2,0	+ 3,2	N.N.V.	—	O.S.O.	Half
26	26,00	26,02	26,01	+ 1,0	+ 1,9	+ 1,0	O.	—	O.	Klar
27	26,00	25,98	25,96	+ 0,4	+ 2,9	— 2,0	—	N.N.O.	N.	—
28	25,91	25,88	25,88	— 3,0	+ 0,5	+ 0,4	N.	—	N.N.V.	—
29	25,91	25,92	25,89	0,0	+ 0,3	— 0,6	N.N.V.	—	V.S.V.	Mulet
30	25,82	25,78	25,77	+ 0,9	+ 2,8	+ 2,8	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
Me- dium	25,712	25,711	25,721	+ 2 ²⁸	+ 3 ⁵⁰	+ 2 ⁵⁴	Nederbörden = 0,450 dec. to			
	25,715			+ 2 ⁷⁷						



Tab. II.

4.

5.

6c.

6b.

6a.




Fig. 1.










Fig. 2.





ÖFVERSIGT
AF
KONGL.
VETENSKAPS-AKADEMIENS
FÖRHANDLINGAR.
ELFTE ÅRGÅNGEN.
1854.

Med fem taflor.

^c
^ STOCKHOLM, 1855.
P. A. NORSTEDT & SÖNER,
Kongl. Boktryckare.

1877, Jan 2.
Gift of the
Academy

EMERSON

G. A. R.

EM.

CLM, 1877
EDT & 2074
BOSTON

Innehåll.

	Sid.
AGARDH, J. G., om Monocotyledonernas stam	21.
— — nya Algformer	107.
ASEJÖRNSSEN, hafsaunan vid Norges kust	121.
BLOMSTRAND, bidrag till Sverges mineralgeografi	296.
BOHEMAN, insekternas förhållande under cholera-epidemien	12.
— — Utvecklingen af <i>Pipunculus fuscipes</i>	302.
CARLEMAN, fotografi på koppar	70.
EDLUND, luftelectriciteten och jordmagnetismen under cholera-epidemien	5.
ERDMANN, vattenståndet i mälarn och saltsjön 1853	13.
— — ref. OLBERS, om ett jodhaltigt mineralvatten	81.
FORSHÆLL, flottholmen i sjön Ralången	256.
FAIES, två nya skandinaviska växter	255.
— första supplementhäftet till <i>Flora danica</i>	43.
HAMMARGREN, färgvarieteter af hare och björktrast	19.
— — om <i>Parus borealis</i> och brämsfällningen	216.
HOLMGREN, om gamla grufvor igenvallade af mossor	355.
IGELSTRÖM, mineralier från Elfdals härad	66.
— — nya svenska mineralier	156.
LILJEBERG, Kullens hafsmollusker	18.
LINDMAN, förslag till tidens bestämmande	1.
— — om trigonometriska tabeller	183.
— — numeriska eqvationer af tredje graden	333.
MALE, hundrans kroppsbyggnad	173.
MEVES, färgförändring hos foglar	258.
MOSANDER, ref. VILLE recherches s. la végétation	344.
OLBERS, om Torpa saltkälla	81, 219.
RETZIUS, A., ref. HYATL om monotremiernas arterier	72.
— — om cranier af Avarer och Hunner	73.
— — fossilt os petrosum af en hval	111.
— — fettdroppen i fiskarnas ägg	113.
STÅL, Sverges <i>Delphax</i> -arter	189.
— nya Hemiptera	231.
SUNDEVALL, djurs förhållande under cholera	6.
— — om svalans hibernation	135.
SVANBERG (A.) och EKMAN, salpetersyrans inverkan på terpentinolja	271.
— — och BERGSTRAND, om furfuring	309.
THORELL, om hannen af <i>Scytodes thoracicus</i>	197.
THOYON, nya fornynd i Schweiz	305.

	Sid.
WAHLBERG (P.), insekters förhållande under choleraan	12.
— — Sphecomyia i Norden	151.
— — de nordiska humlorna	199.
— — om nordiska Diptera	211.
WAHLBERG (J.), bref under resa till södra Afrika	159, 352.
WALLENGREN, Sphinx Euphorbiae L.	16.
— — land- och sötvattens mollusker i n. ö. Skåne	118.
— — Skandinaviens Corisæ	140.
WALLMARK, svenska fotens, kannans och skålpundets historia	86.
WIKSTRÖM, Pleurospermum austriacum i Sverige	46.
ÅNGSTRÖM, etherns motstånd och småplaneternas attractioner	53.

Inlemnade skrifter: ANDERSON, 224, 325; BÖRLING, 163, 224; CAUSELL, 47; K. förvaltn. af Sjöärendena, 125; JOHANSON, 224; KREGER, 105; LILJEBORG, 163; LÖWENHJELM, 163; v. POST, 47, 105; v. SCHEELE, 47, 125; STENHAMMAR 105.	
Med döden afgångne ledamöter: LEYONMARCK, 105; MANNERHEIM, 266; MELLONI, 266; OWEN, 105.	
Invalda ledamöter: CARLSUND, 163, LANÉ, 41; LEJUNE-DIACHELET, 46; LEON DUFOUR, 41; v. PLATEN, 266; VIRGIN, 105.	
Sekreteratens berättelse på högtidsdagen	93.
Hr REUTERDAHL nedlägger præsidium	93.
Hr ÅKERMAN väljes till præsæs	93.
Berzelianska stipendiaten BLOMSTRAND afgår, 125; BERGSTRAND tillsättes, 358.	
Det florinanska priset tilldelas Prosectoren WAHLGREN	105.
Det Lindbomska tilldelas Hr ÅNGSTRÖM	105.
Akademiens reseanslag tilldelas Hrr ÅNGSTRÖM och HOLMGREN	105.
Hr N. P. ANGELIN deponerar ett försegladt convolut	325.
Skänker till Akademiens Bibliothek: 47, 105, 130, 163, 224, 266, 325, 358. — Fysikaliska kabinettet: 106, 166.	
Skänker till Riks-Museum: Zoologiska afdelningen: 49, 131, 166, 228, 327, 359. — Botaniska afdelningen: 49, 132, 167, 229, 268, 328, 359. — Mineralogiska afdelningen: 50, 106, 229, 360. — Ethnografiska afdelningen: 168, 268.	
Meteorologiska observationer	51, 133, 169, 329, 361.

Rättelser:

- Sidan 258 andra rad. nedifrån i st. för: **) Nanmannia I, etc. läs: **) Nanmannia II,
 — 266 andra rad. uppfifrån i st. för: Ero ritade läs: är ritadt,

ÖFVERSIGT
AF
KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS
FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

N. 179. 2.

Onsdagarne den 11 Januari och 8 Februari.

Föredrag.

1. Förstag till tidens bestämmande. — Hr Lector C. F. LINDMAN i Stregnäs hade insändt följande meddelande.

»För tidens bestämmande finnas redan många metoder uppgifna, bland hvilka man har att välja allt efter de instrumenter, som man har tillfälle att begagna. Beqvämligheten vid bruket och noggrannheten i tidsbestämningen göra, att Passage-instrumentet vid ett Observatorium väl uteslutande begagnas. På resor, samt af dem, som ej ega den mängd af instrumenter, som ett välförsedt Observatorium har att erbjuda, måste oftast andra metoder anlitas, och då är det viktigt, att methoderna äro så många som möjligt, på det att förlägenhet ej lätt må uppstå i följe af det inskränkta instrument-förrådet. Till och med vid ett Observatorium, som ej är dess bättre försedt, kan förlägenhet uppstå, om t. ex. blott *ett* Passage-instrument finnes och dettas vattenpass går sönder, men tidsbestämning behöfves, innan det hunnit åter göras brukbart. Methodernas användbarhet på resor beror naturligtvis dels af deras lätthet att använda, dels på möjligheten att vid dem bruka de instrumenter, som på resor vanligen medföras. Dessa äro, om jag ej misstager mig, dels Sextanter, dels Universal-instrumenter och Theodoliter. Det förslag, som jag nu tar mig friheten framställa, — och framställer med så mycket mindre tvekan, som



grundidéen icke tillhör mig — detta förslag har endast afseende på det sednare slaget af instrumenter.

Enligt CRONSTRANDS uppgift *) har OLBERS i Monatliche Correspondenz, Band. III, pag. 124, föreslagit, att bestämma tiden genom att observera fixstjernors passage förbi ett terrestert objekts lodräta kant, hvars azimuth är gifven. Genom att följande dag observera samma stjernors bortskymning finner man urets gång på det enklaste sätt, och urets stånd kan äfven, såsom CRONSTRAND visat, erhållas, då azimuth är bekant. Men emedan dylika objekter sällan stå till buds och, äfven om så vore, deras azimuth först måste bestämmas, så erbjuder denna method, som är så beqväm, då frågan är att finna urets gång, rätt många svårigheter vid bestämningen af urets stånd. Då man eftertänker, huruvida methoden skulle kunna användas, äfven då ett terrestert objekt af ofvannämnda beskaffenhet saknas, så finner man genast, att ett Universal-instrument eller en Theodolit med tuben på axeländan blefve en fullgod ersättning. I fall den horizontela cirkelns gradering icke ger azimuth med erforderlig noggrannhet eller om, i brist på ett af de ofvannämnda instrumenterna, man måste nöja sig med en tub med hårkors i focus, och således ej kan finna urets stånd på ofvannämnda sätt, så kan detta likväl ske på följande vis genom användning af tvenne stjernor, hvilkas apparenta positioner äro bekanta jemte ställets polhöjd. Man antage nemligen, att tvenne stjernor, hvilkas apparenta rectascensioner äro $=\alpha_1, \alpha_2$, och apparenta declinationer $=\delta_1, \delta_2$, blifvit observerade i samma, för öfrigt obekanta, azimuth $a (>0)$ vid urtiderna $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ (\mathfrak{S}_2 korrigerad för dragningen under tiden $\mathfrak{S}_2 - \mathfrak{S}_1$). Om man med γ utmärker urets stånd i anseende till stjerntid vid tiden \mathfrak{S}_1 och med t_1, t_2 de observerade stjernornas timvinklar vid $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ resp., så har man

$$t_1 = 15 (\mathfrak{S}_1 - \alpha_1 + \gamma)$$

$$t_2 = 15 (\mathfrak{S}_2 - \alpha_2 + \gamma).$$

*) Handbok i Praktiska Astronomien, Häftet 2 pag. 61.

Gör man nu $15 (\vartheta_1 - \alpha_1) = \beta_1$, $15 (\vartheta_2 - \alpha_2) = \beta_2$, $15 \gamma = x$ samt betecknar polhöjden med φ , så fås i följe af en bekant formel eqvationerna

$$\cot a = \frac{\sin \varphi \cos (\beta_1 + x) - \cos \varphi \operatorname{Tg} \delta_1}{\sin (\beta_1 + x)},$$

$$\cot a = \frac{\sin \varphi \cos (\beta_2 + x) - \cos \varphi \operatorname{Tg} \delta_2}{\sin (\beta_2 + x)}$$

eller, efter eliminering af $\cot a$ och division med $\cos \varphi$,

$$\frac{\operatorname{Tg} \varphi \cos (\beta_1 + x) - \operatorname{Tg} \delta_1}{\sin (\beta_1 + x)} = \frac{\operatorname{Tg} \varphi \cos (\beta_2 + x) - \operatorname{Tg} \delta_2}{\sin (\beta_2 + x)}. \quad (1)$$

Ur denna eqvation skall nu x bestämmas, hvilket beqvämast tyckes kunna ske sålunda. Man bortskaffar först bråk och upplöser $\sin (\beta_1 + x)$ etc. samt öfverflyttar, så fås

$$(\operatorname{Tg} \delta_1 \sin \beta_2 - \operatorname{Tg} \delta_2 \sin \beta_1) \cos x + (\operatorname{Tg} \delta_1 \cos \beta_2 - \operatorname{Tg} \delta_2 \cos \beta_1) \sin x = \operatorname{Tg} \varphi \sin (\beta_2 - \beta_1).$$

Sätter man nu

$$\operatorname{Tg} \delta_1 \sin \beta_2 - \operatorname{Tg} \delta_2 \sin \beta_1 = r \sin \psi$$

$$\operatorname{Tg} \delta_1 \cos \beta_2 - \operatorname{Tg} \delta_2 \cos \beta_1 = r \cos \psi$$

så fås

$$\sin (\psi + x) = \frac{\operatorname{Tg} \varphi \sin (\beta_2 - \beta_1)}{r}. \quad (2)$$

För att veta, i hvilken qvadrant $\psi + x$ bör tagas, måste man hafva en approximerad kännedom om urets stånd. Den behöfver likväl icke vara noggrannare än på 6^a, och derom behöfver man aldrig vara okunnig.

Genom att observera tre stjernor i samma azimuth, tyckes det, som om både tiden och polhöjden skulle kunna bestämmas. Om man nemligen antager, att en tredje stjerna, hvars apparenta rectascension och declination är $= \alpha_3, \delta_3$, blifvit observerad vid urtiden ϑ_3 (korrigerad för dragningen under $\vartheta_3 - \vartheta_1$), så erhöles man eqvationen

$$\cot a = \frac{\sin \varphi \cos (\beta_3 + x) - \cos \varphi \operatorname{Tg} \delta_3}{\sin (\beta_3 + x)},$$

*) Denna räkning kan synas besvärlig; men genom begagnande af Zaccas Tafeln der Additions- und Subtractions-Logarithmen blir besväret ringa.

hvilken, förbunden med de två första, efter eliminering af $\text{Cot } a$ och division med $\text{Cos } \phi$, ger

$$\frac{\text{Tg } \phi \text{ Cos } (\beta_1 + x) - \text{Tg } \delta_1}{\text{Sin } (\beta_1 + x)} = \frac{\text{Tg } \phi \text{ Cos } (\beta_2 + x) - \text{Tg } \delta_2}{\text{Sin } (\beta_2 + x)},$$

$$\frac{\text{Tg } \phi \text{ Cos } (\beta_2 + x) - \text{Tg } \delta_2}{\text{Sin } (\beta_2 + x)} = \frac{\text{Tg } \phi \text{ Cos } (\beta_1 + x) - \text{Tg } \delta_1}{\text{Sin } (\beta_1 + x)}.$$

Då man här eliminerar ϕ , så erhålles

$$(\text{Tg } x + \text{Tg } \beta_1)(\text{Tg } \delta_1 \text{ Sin } (\beta_2 - \beta_1) - \text{Tg } \delta_2 \text{ Sin } (\beta_1 - \beta_2) + \text{Tg } \delta_2 \text{ Sin } (\beta_2 - \beta_1)) = 0.$$

Häraf skulle nu följa antingen

$$\text{Tg } x + \text{Tg } \beta_1 = 0$$

eller

$$\text{Tg } \delta_1 \text{ Sin } (\beta_2 - \beta_1) - \text{Tg } \delta_2 \text{ Sin } (\beta_1 - \beta_2) + \text{Tg } \delta_2 \text{ Sin } (\beta_2 - \beta_1) = 0 \quad (k).$$

Som det förra uppenbarligen är omöjligt, så *måste* det sednare ega rum. I sjelfva verket, om poldistancerna införas i stället för declinationerna, så blir detta en lätt härledd formel. Drager man nemligen genom en vinkelspets i en sferisk triangel en storcirkelbåge, som skär motstående sida, så delas triangeln uti två trianglar, hvilkas genom den nämnde vinkelspetsen gående sidor må i ordning utmärkas med a , b , c och vinkeln mellan a och b med y , vinkeln mellan b och c med x . De vinklar, som b gör med den ifrågavarande triangelns tredje sida, äro hvarandras supplementer, och deras Cotangenter således lika, men af motsatta tecken. I följe deraf, samt medelst den vanliga formeln mellan två sidor och två vinklar, af hvilka blott *en* är motstående, finner man eqvationen

$$\frac{\text{Sin } b \text{ Cot } a - \text{Cos } b \text{ Cos } y}{\text{Sin } y} = \frac{\text{Cos } b \text{ Cos } x - \text{Sin } b \text{ Cot } c}{\text{Sin } x}$$

eller efter en liten reduktion

$$\text{Cot } a \text{ Sin } x - \text{Cot } b \text{ Sin } (y + x) + \text{Cot } c \text{ Sin } y = 0,$$

som, om dessa beteckningar öfversättas i de ofvan nyttjade, återger (k) .

Observerade man ännu ett stjernpar i samma azimuth $\alpha' (> 0)$, så erhöles ännu en eqvation af samma form som (2) . För bestämningen af både ϕ och x ur dessa eqvationer synes intet theoretiskt hinder finnas; men den praktiska brukbarheten af mitt förslag saknar jag numera tillfälle att pröfva.»

2. Om cholera-epidemiens samband med naturfenomenen. — I anledning af de talrika uppgifter som man under den sist öfverståndna, liksom under föregående cholera-epidemier, hört och läst angående farsotens samband med de allmänna naturkrafterna, dess inverkan på djuren o. s. v. framställde Hr BERG en uppmaning till de af Akademiens Ledamöter, som möjligtvis kunde hafva närmare gifvit akt på dessa omständigheter, att deröfver yttra sig, på det allmänheten måtte erhålla någon grund för bedömandet af dessa uppgifters trovärdighet.

I anledning häraf anförde Hr EDLUND följande:

»Det har ofta blifvit yttradt, att på de orter, der cholera-farsoten börjat härja, ovanliga förändringar visat sig i atmosfærens elektriska tillstånd och i jordmagnetismens styrka. Man har till och med trott sig varseblifva, att vanliga stålmagneter förlorat en betydlig del af sin magnetiska kraft, ehuru de under vanliga förhållanden bibehållit den oförändrad. Så vidt mig är bekant, sakna dessa påståenden all faktisk grund och härleda sig tvifvelsutan från personer, hvilka först börjat göra iakttagelser öfver dessa fenomen, sedan farsoten uppträdt, och derföre icke ega nog erfarenhet för att bestämma, hvad som härvid kan anses ovanligt eller icke. Hvad atmosfærens elektriska tillstånd beträffar, så har man ännu så få fullständiga observationsserier deröfver, att lagarne för dess förändringar ingalunda kunna anses tillräckligt kända. Men äfven de få tillförlitliga observationer man har att tillgå synas icke antyda att några märkliga förändringar inträdt, då farsoten visat sig. I Brüssel har QUETELET anställt dagliga observationer öfver luft-elektriciteten från år 1844 till närvarande tid. Af den meddelade redogörelsen öfver dessa iakttagelser inhemtas visserligen, att atmosfæren under året 1849, då staden hemsöktes af cholera, var mycket svagt elektrisk, isynnerhet under de sex första månaderna: dock finner man tillika, att luftelektriciteten för vissa månader under andra år, då ingen farsot uppträdt, varit ännu svagare. Med ett ord: några tillförlitliga iakttagelser

ligga icke till grund för det påståendet, att cholera-farsoten står i något samband med atmosfärens elektriska beskaffenhet.

Det samma kan sägas om förändringarne i jordmagnetismens elementer, hvilka vida fullständigare blifvit studerade än de elektriska fenomenerna. Man bör härvid ihågkomma, att de hufvudsakliga variationerna i de jordmagnetiska elementerna icke uppträda lokalt utan visa sig ungefär lika på långt från hvarandra belägna orter. Detta är åtminstone regel. En förändring i jordmagnetismens elementer, hvilken visar sig på ett ställe, der cholera går, uppträder derföre äfven på ungefär samma sätt, der sjukdomen aldrig förekommit. Några iakttagelser deröfver, att de magnetiska elementerna visat egendommiga förändringar under de tider, då cholera uppträdt, hafva mig veterligen aldrig blifvit gjorda.

Att stålmagneter skulle visa sig svagare under cholera-tiden saknar helt och hållet grund, emedan, såsom jag har mig bekant, verkliga undersökningar häröfver icke hafva antydtt den minsta förändring i deras styrka.»

Om djurens förhållande under cholera-epidemien yttrade Hr SUNDEVALL följande:

»Under den sist öfverståndna cholera-epidemien har man, liksom under flera föregående, i våra så väl som i utländska tidningsblad, fått läsa en mängd uppgifter om farsotens inverkan på djuren, och serskilt har man trott sig finna, att de allmänna småfoglurne, som oftast äro föremål för iakttagelser, flytt bort eller annars betett sig på ovanligt sätt. — Dessa uppgifter äro ej nya eller ensamt gällande för cholera, ty man har alldeles dylika från äldre tider, då pest eller andra svåra och ovanliga farsoter hemsökt Europa. De skulle således kunna synas grundade på en gammal och ofta bekräftad erfarenhet, och likväl måste jag, till följe af egna, noggranna iakttagelser, helt och hållet bestrida dem och förklara dem allenast beroende på en för tillfället uppjagad inbillningskraft samt ovana vid iakttagandet af de alldagliga naturfenomenen.

Man föregaf under sista epidemien härstädes, i Augusti och följande månader 1853, att *gråsparfvarna* hade flytt undan eller visade sig i ovanligt ringa mängd, och likväl sågos de under hela tiden af mig och flera andra personer, som länge sysselsatt sig med att observera på fogelarterna, till lika mängd, och betedde sig fullkomligen på samma sätt, som hvarje annat år vid samma årstid. Ett par gånger hade jag, under sjelfva epidemien, tillfälle att visa detta för bekanta, som, utan att sjelfva ega vana vid dylika iakttagelser och således utan att förlita sig på ett eget omdöme, häröfver rådfrågade mig i anledning af de uppgifter man derom läste i tidningar. Alldeles detsamma inträffade under choleran 1834, då jag afven vistades här i Stockholm. Men sparfvarne syntes under båda dessa epidemier, som inträffade på hösten, icke så talrika, som de i Stockholm förekommo under vintern, då ett stort antal gulsparfvar inflytta från landsbygden och öka de sparflockar, hvilka då pläga hålla sig på torgen, hvarest de hafva ymnig tillgång på föda. Möjligtvis kan någon, som utan närmare kännedom härom, erinrat sig förhållandet under vintern, hafva funnit sparfvarne jemförelsevis fåtaliga i Augusti och September, då choleran härjade.

En insändare uti en tidning uppgaf, att kråkorna hade flyktat undan farsoten, och det är ganska sant, att de under denna tid föga syntes inom staden, så att man blott då och då fick se en kråka flyga öfver; men den som meddelat denna iakttagelse tyckes ej hafva känt, att detsamma inträffar hvarje år vid samma tid och att kråkorna år 1853, liksom alla andra år, redan hade flyttat bort i April eller Maj, således långt förr än choleran kunde verka på dem. Dessa foglar pläga nemligen hvarje vinter uppehålla sig temligen talrikt i de delar af staden, hvarest ymnigare afskräden äro att tillgå; men då fortplantningsdriften om våren vaknar hos dem, och dessutom landsbygden och skogarna vid denna tid lemna dem tillräcklig näring, flytta de fleste bort från staden. På senhösten, i October och November, återkomma de, då man plägar få se dem om

aftnarna slå ned i träden, t. ex. på Strömparterren, för att der tillbringa natten, och så skedde det äfven sistlidne höst.

Svalorna sades i Stockholm, liksom i flera landsorter, hafva vikit undan der choleran utbröt. Likväl såg man dem här flyga omkring, alldeles så som vanligt, ända till d. 25 eller 26 September, då de, liksom hvarje år vid samma tid, helt och hållet försvunno. Slutet af September är nemligen vid Stockholm deras vanliga flyttningstid; men choleran nådde härstädes sin största höjd redan d. 14 September.

Sädesärlorna vistas under sommaren ymnigt i Stockholm, och de funnos under hela choleratiden ganska allmänt, utan att visa någonting ovanligt i sitt beteende. De föreföllo mig till och med något talrikare än vanligt, hvilket dock möjligtvis kan härröra deraf, att jag, under föresatsen att noga gifva akt på de allmänna djurarterna, eftersåg dem uppmärksamare än under de nästföregående åren. Hvarje dag i September, serdeles på morgonen, såg man dem familjvis eller spridda på öfra delen af Carl XIII:s torg och andra platsar, hvilka de om hösten pläga besöka, hvilket fortfor ända till en vecka in i October, hvarefter de, såsom alla år plägar ske, bortflyttade.

Utom de här uppräknade fogelarterna förekomma årligen, på trädbevuxna platser inom hufvudstadeus gränser, några få andra, t. ex. Bofinken, Rödstjerten och de båda Flugsnapparearterna (*Muscicapa atricapilla* och *grisola*), hvilka alla förekommo, nu såsom hvarje annat år; men då de i allmänhet finnas till mindre antal och dessutom ofta visa sig till betydligt olika mängd under olika år, samt lefva mera dolda i trädkronorna, kunna de ej bli föremål för lika noggranna iakttagelser. Emellertid nämnas de här, emedan jag haft godt tillfälle att gifva akt på dem, utan att hos dem finna någon afvikelse från deras, för hvarje art vanliga beteende.

Uti en och annan uppsats om naturens utseende under choleratiden, hafva vi sett uppgifvet, att »foglarna upphörde att sjunga och iakttago en hemsk tystnad». Det torde knappt behöfva erinras, att småfoglarna i allmänhet upphöra att sjunga

någon tid efter midsommar, då de flesta af dem hafva ungar, och att deras tystnad på intet sätt står i sammanhang med cholera eller andra farsoter. För mig har ej den ringaste olikhet varit märkbar, under de tvenne omtalade cholera-epidemierna, emot hvarje annat år. Tvärtom hördes då, liksom vanligt i September-månad, sedan ungarna allmännare börjat flyga omkring, ett förökande af det vanliga fogelqvittret och en åter börjande, ehuru svag sång, hvilken dock märkes nästan blott om morgnarna och oftast lärer undfalla dem, som ej då vistas ute eller ej äro vande att gifva akt på de befvädrade sångarna.

Från en trakt af Stockholms läns skärgård berättades, att död fisk funnits flytande i hafvet kort före eller under cholera-riden; men att detta åtminstone icke varit förorsakadt af cholera torde man bäst kunna sluta deraf, att detsamma varit berättadt flera gånger förr, då ingen farsot varit förspord, och sednast året förut, i Augusti 1852, då hafvet häromkring visade en ovanligt stark s. k. blomning, eller alstring af små hafs-alger.

Under hela sistlidne sommar, och serdeles på hösten, visade sig flugor och insekter i allmänhet till ganska ringa mängd, hvilken omständighet man ej underlåtit att ställa i samband med choleran. Utan tvifvel härrörde den af den ovanligt torra början af sommaren och en derefter följande väderlek, som var föga varm och ej gynnsam för utvecklingen af de allmänaste insekternas ägg, larver och puppor. Deremot frodades andra arter, som trifvas väl af en sådan väderlek, t. ex. den s. k. gräsmasken (larven af *Noctua graminis*), hvärs härjningar allmänt öfverklagades kring midsommarstiden.

Alldeles motsatt var förhållandet före och under choleran år 1834. Nederbörden hade i sommarns början varit tillräcklig att under den derpå följande, utomordentligt starka sommarhettan, som fortfor ända in i September, gifva åt vegetationen en hög grad af yppighet. Flugor och de flesta insektarter framkommo i ovanligt stor myckenhet, men inga eller blott

obetydliga klagomål hördes öfver gräsmasken. Då talade och skref man om »cholera-flugor», som ansågos vara sjukdomens orsak eller nödvändiga följeslagare. Förmodligen hade man hos oss hemtat begreppet från andra länders tidningar, om dessa djur, som från flera håll omtalades såsom »aldrig förr sedda», eller »endast sedde under andra, föregående farsotery», och nu framkomme i otalig mängd. I likhet med flera andra personer som gjort entomologien till hufvudsak, sökte jag att lära känna dessa underbara varelser; men ehuru hvarken tillfälle eller god vilja saknades att observera, funno vi ingenting som kunde rättfärdiga de gjorda uppgifterna. — Genom samverkan af den ovanligt starka värman och en utmärkt saftig vegetation, hade flera arter af de hvarje år allmänna Bladlössen (*Aphis*) utvecklat sig till en utomordentlig myckenhet och serdeles visade sig här i Stockholm några af de arter, som årligen förekomma i trädgårdar, t. ex. på plommonträd, skidfrukter m. m., i större mängd än jag sett dem något annat år. I Juli och Augusti, då choleraan härjade i Göteborg, Jönköping o. fl. st., samt slutligen utbröt i Stockholm, inträffade dessa insekters vanliga tid att bli bevingade och flyga omkring, då det är sannolikt att de, just tillfölje af den betydliga myckenheten, blifvit bemärkte af personer, som ej igenkände dem, utan ansågo dem för farsotens följeslagare. Utan tvifvel har samma saga i andra länder blifvit föranledd af andra, dylika, äfvenså litet besynnerliga orsaker.

Till följe af den förut omnämnda fåtaligheten bland insekterna under år 1853, hörde vi då ingenstädes omtalas cholera-flugor, och det förtjenar anföras, att jag knappt något annat år sett bladlössen till så ringa mängd, som då, åtminstone vid slutet af sommaren, då de pläga få vingar.

Af det här anförda torde kunna inhemtas, att man icke utan en närmare pröfning kan sätta tro till de berättelser, som under en pågående farsot utspidas om ovanliga förhållanden i djurverlden, och att dessa oftast torde vara, i likhet med spökelsehistorier och mycket annat som varit allmänt trodt, blotta foster af en uppjagad inbillningskraft, eller bero på bristande

kännedom om de allmänna djurarterna och på ovana vid deras iakttagande. Det måste nemligen ofta inträffa, att man, vid ett ovanligt tillfälle, såsom t. ex. under en påstående farsot, varseblifver saker som man ej förr bemärkt, ehuru de annars hade kunnat iakttagas hvarje år. Lika ofta bör det kunna inträffa, att man vid sådana tillfällen, origtigt bedömmar de alldagliga företeelserna i naturen, som ligga utom kretsen för vår vanliga tankegång och uppmärksamhet, såsom händelsen tydligen varit med de nyss omtalade uppgifterna om kråkorna, om foglarnas sång och om cholera-flugorna.

Man torde vidare, af det här meddelade, med visshet kunna sluta, att choleran icke haft något märkbart inflytande på djurverlden i *allmänhet*. Om så varit, skulle man bland alla de djurarter, som förekomma i ymnighet, t. ex. gråsparfvar, sädesärlor o. s. v. hafva påträffat sjuka eller döda exemplar, eller åtminstone skulle de hafva varit mindre muntra eller annars visat ett ovanligt beteende, man skulle dessutom hafva märkt en ovanlig sjuklighet eller dödlighet, eller oro bland husdjuren, men intet af allt detta har inträffat.

Det synes alltså som om cholera så väl som andra farsoter bland menniskorna icke mera inverkade på djuren, än t. ex. lunggröta, fårkoppor m. fl. sjukdomar, som tillhöra enskilda djurarter, verka på de öfriga djuren och på oss. Åtminstone fordras nya och säkra iakttagelser för att utröna, huruvida choleran, eller dess orsaker, möjligtvis kan yttra någon inverkan på en eller annan serskild djurart, hvilket väl, under vissa omständigheter, torde vara möjligt.

I det föregående anfördes, att några ovanligare förhållanden verkligen inträffat bland insekterna under de båda cholera-epidemierna i Stockholm åren 1834 och 1853. Det torde ej sakna allt intresse, för det rätta bedömandet af dessa förhållanden, att just det ovanliga, vid dessa båda tillfällen, var af alldeles motsatt beskaffenhet.

Sannolikt hafva många andra, jemte mig, gjort likartade anmärkningar med dem, som här blifvit anförda, hvilka hvarken

leda till en närmare kännedom; eller ens innefatta någonting nytt, och således ega ringa värde; men de framställas här för deras räkning, som ej gjort naturalhistorien till sitt hufvudstudium och som således haft mindre tillfälle att själfva observera.»

I sammanhang med detta yttrande tillade Hr WAHLBERG, som i öfrigt fullkomligt delade de framställda åsigtarna, »att han, under cholera-farsoten år 1834, i olika trakter af Sverige hört serskilda i större mängd framkommande insekt-arter anses såsom förebud till cholera och derföre benämnas cholera-flugor, t. ex. *Aphis bursaria*, *Musca corvina* etc., äfvensom att den större dödlighet man hos den vanliga husflugan trott sig förmärka och betraktat som en följd af choleran, ingalunda deraf härrörde, utan af s. k. Muscardin, hvilken alla år, särdeles vid fuktig väderlek eller i fuktiga bergstrakter, angriper flugarterna och lätt igenkännes genom de hvita mögelringar som framkomma på flugans uppsvällda bakkropp. Gråsparfvar och svalor hade han vid Stockholm sett både talrika och lifliga under sista cholera-epidemien.»

Hr BOHEMAN, som rörande insekternas beteende och betydelse under cholera-farsotens härjningar, gjort likartade iakttagelser som Hrr SUNDEVALL och WAHLBERG yttrade dessutom: »att det vore alltförväl bekant, att inga djurs framkomst i större mängd, så mycket berodde af kosmiska förhållande, som insekternas. Det vore derföre ursäktligt om personer, som icke närmare följt dessa små varelsers utveckling och lefnadssätt, fästade alltförmycket afseende vid företeelser inom denna del af djurverlden, som voro mindre vanliga, och ofta tillade dem en betydelse, som de helt och hållit saknade. Såsom exempel härpå kan jag anföra tvenne af mig observerade större tåg af vingade myror. Det ena inträffade för omkring 20 år sedan vid Anneberg i Småland. Jag varseblef nemligen der en dag i Juli månad, liksom ett ljusst moln öfver den närbelägna, $\frac{1}{4}$ mil breda sjön. Luften var varm och klar, men vinden blåste temligen skarpt från öster. Då molnet, som sakta framdrefs, uppnådde den vestra stranden af sjön, befanns det bestå af en

otrolig mängd bevingade myror af den art, som benämnes *Formica rufa*. Hela ytan af vattnet var beströdd med deruti nedfallna djur, som af vågorna drefvos mot stranden och bildade der ganska betydliga bankar, hvilka efter några dagars förlopp öfvergingo till förruttelse, samt spridde en obehaglig lukt, som fortfor någon tid. Det andra af mig anmärkta betydligare låget af flygmyror inträffade i Stockholm för 5—6 år sedan, men var icke så talrikt som det förstnämnda. Myror nedföllö likväl då i temlig mängd flerstädes i staden. Båda dessa företeelser, som ega en naturlig och af väderleksförhållanden beroende orsak, ansågos af många såsom förebud till krig eller någon svårare farsot. Som den tron var temligen spridd, att detta sednare tåg var ett förebud till cholera-sjukdomens ankomst, erhöll jag uppmaning att i tidningarna införa en upplysande artikel i detta hänseende, hvilket ock af mig verkställdes.

Vill man göra för sig klart huru dessa otroliga massor af flygmyror framkommit, så finnes förklaringen dertill lätt i de väderleksförhållanden som egde rum flera dagar före de anförda företeelserna. För hvar och en som gifvit akt på dessa djurs lefnadssätt är det bekant, att deras hanar och honor, som isynnerhet kläckas i Juli månad, då vädret är vackert utflyga utur stackarna i den mån de framkomma, för att para sig. Inträffar åter, hvilket var händelsen nära en vecka före hvardera af de tvenne anmärkta tågen, att väderleken är kall och regnig, måste de qvarstadna i sina boningar och hela det under en längre tid tillkomna antalet utflyger samtidigt då solens värmande strålar, åter hos dem framkalla begäret, att fullborda deras lefnadsbestämmelse. Är vinden då något stark, föras de åt samma håll, och en helt naturlig orsak framkallar sålunda hos mången, som ej känner rätta förhållandet, aningar och förmodanden, som äro utan all betydelse.»

3. Vattenståndet i Mälaren och Saltsjön under år 1853. — Hr ERDMANN meddelade följande:

Tabell öfver Mälarens och Saltsjöns medelhöjd samt högsta sammandragen ur den vid Sluss-

MÄLAREN.

	Medel- stånd.		Högsta stånd.		Lägst stånd.		Dagar för	
	Fot.	tum.	Fot.	tum.	Fot.	tum.	högsta vat- tenstånd.	lägst vat- tenstånd.
Januari . .	18	3,0	18	7,5	17	5,5	15.	1.
Februari .	17	3,6	18	1,0	16	5,5	1. 2.	28.
Mars . . .	15	6,8	16	5,0	14	9,5	1.	31.
April . . .	14	6,7	14	9,5	14	5,0	1.	18-23.
Maj	15	4,9	15	7,0	15	0,0	20.	1.
Juni	14	9,2	15	4,0	14	5,0	1. 2.	26.
Juli	14	2,5	14	5,0	14	0,0	1. 2. 8.	26. 29 31.
Augusti . .	14	3,4	14	5,0	14	1,0	24.	2.
September .	14	2,2	14	4,5	14	0,0	4-6.	22. 24-26. 30.
October . .	14	4,4	14	5,5	14	0,0	5. 8. 11. 12. 24-26. 31.	17.
November .	14	3,6	14	6,0	14	2,0	10.	15. 17. 18.
December .	14	0,2	14	3,0	13	8,0	2.	23-26. 28. 30. 31.
Medium för hela året .	15	1,7						

och lägsta vattenstånd *) i fot och decimaltum under år 1853, verket i Stockholm förda Journal.

SALTSJÖN.

	Medel- stånd.		Högsta stånd.		Lägst stånd.		Dagar för	
	Fot.	tum.	Fot.	tum.	Fot.	tum.	högsta vat- tenstånd.	lägsta vat- tenstånd.
Januari . .	14	5,6	15	6,5	13	5,0	13.	31.
Februari .	13	0,6	13	7,0	12	2,0	25.	14.
Mars . . .	12	7,8	13	5,0	11	9,5	4-5.	25.
April . . .	12	4,4	13	1,5	12	3,5	19.	6.
Maj	13	1,3	13	5,0	12	8,5	11.	28.
Juni	13	0,6	14	0,0	12	7,0	27.	9. 12. 13. 16.
Juli	13	9,1	14	2,5	13	5,0	10.	28.
Augusti . .	14	2,3	14	5,0	13	9,0	{ 2. 3. 5. 6. 7. 24.	16.
September .	13	7,4	14	4,0	13	2,0		15.
October . .	14	1,3	14	8,0	13	5,5	2.	24. 28.
November .	13	7,1	14	3,0	13	0,5	10.	30.
December .	13	1,2	13	8,5	12	5,5	23.	24.
Medium för hela året .	13	4,9						

*) Se vidare härom K. V. Akad. Öfversigt 1853, sid. 33—39.

4. *Om Sphinx euphorbiæ Lin. Fn. Sv.* — Hr S. M. Adj. WALLENGREN hade insänt följande meddelande.

»Att åtskilliga djurarter blifvit af LINNÉ upptagna uti dess *Fauna Suecica* såsom obetviflade tillhörigheter för vår fauna, men sedan hans tid synas, om icke hafva helt och hållet försvunnit ur landet, åtminstone hafva aftagit i antal och blifvit mycket sällsyntare, är nogsamnt bekant. Men de gifvas ock, som man en längre tid ansett alldeles icke tillhöra vårt kalla klimat, ehuru de af honom anföras i nämnde arbete. Sådant är förhållandet inom alla djurklasser, men det torde dock mest inträffa bland insekterne och måhända aldramest ibland fjärilarne. Så har man länge icke med visshet vetat huruvida *Zeuzera æsculi* (N. pyrina LIN.) med rätta borde räknas till vår fauna, emedan denne spinnare icke sedan LINNÉs tid träffats af landets Entomologer. Att denna art emellertid normalt förekommer i Skåne är numera satt utom allt tvifvel, då den redan för några år tillbaka fanns vid Trolle Ljungby och sednast åter i år derstädes träffades. Bland dagfjärilarne har LINNÉs *Pap. cinxia*, hvilken enligt hans uppgift skulle förekomma »*sæpe frequens in horto academico*» i Upsala, gifvit anledning till många tvister, och saken är ännu icke så utredd, att man med visshet vet, hvilken art den store naturforskaren haft för ögonen, då han beskref sin *P. cinxia*. Denna gåta torde likväl ock en gång nöjagtigt kunna lösas, sedan man noga undersökt den af honom uppgifna lokalen. Bland svärmarne har LINNÉs *Sphinx euphorbiæ* förorsakat Entomologerne mycket bryderi, emedan man icke återfunnit honom i Sverige. Man har visserligen icke kunnat bestämdt neka, att LINNÉ möjligen åsyftat den af sednare författare under samma namn beskrifna art, då han uppgifver såsom kännetecken detta: »*antennæ albæ*», hvilket just vid första ögonkastet skiljer honom från den genom hela Sverige ända upp i Lappmarkerne, ehuru mindre allmänt, förekommande *Sph. galii* W. V., men man har på flera sätt sökt förklara svårigheten, som å ena sidan beskrifningen och å den andra

fyndortens

fyndortens osäkerhet uppställt. Än har man trott, att LINNÉ haft denna sednare arten för ögonen, men sett förbi olikheterna (bland hvilka han likväl accentuerar serskildt den mest framstående), och afskrifvit en förut utkastad diagnos och beskrifning till *Sph. euphorbiæ*; än har man förmodat, att han icke ens känt *Sph. galii*, utan genom misstag insatt ett från utlandet erhållet exemplar af *Sph. euphorbiæ* bland svenska fjärilar, och att arten på detta sätt fått sin plats i svenska faunan. I förra fallet har man velat draga LINNÉs beskrifning i F. Sv. såsom synonym till *Sph. galii*, stödjande sig isynnerhet på uppgiften: »habitat in Euphorbia, *Galio*»; i sednare fallet har man dragit den till *Sph. euphorbiæ* AUCT., men likväl ej ansett denna såsom funnen inom Sverige. Sjelf har jag varit böjd för denna sednare åsigt ända till dess jag förlidne October månad, då jag företog en resa till Lund, för att i dervarande rika samlingar, dels tillhöriga Hr Professor ZETTERSTEDT, dels det dervarande Universitetets entomologiska museum, för fortsättandet af beskrifningar öfver våra fjärilar studera de arter, som tillhöra LINNÉs släkten *Sphinx* och *Noctua*, i detta sednare träffade ett exemplar af *Sph. euphorbiæ* AUCT., jemte andra svenska insekter dit skänkt af Mag. THORELL. Detta exemplar, som är en hona, är enligt den af nämnde Hr Magister påfästade sedlen »taget den 2 Augusti uti Körners trädgård» i Lund. Någon förvexling kan icke hafva skett, emedan alla de af Hr THORELL dit skänkta insekter icke blifvit ur sina förvaringslådor rubbade, ej eller förefanns deribland någon utländsk art. Att arten blifvit funnen i Skåne är således säkert, och om man icke af detta enstaka fall skulle anse sig ega rätt draga den slutsats, att arten normalt tillhör vår fauna, utan skulle möjligen hit kunna hafva blifvit på ett eller annat sätt införd — en åsigt, som likväl svärligen låter försvara sig, då man icke har sig bekant, att någon *Euphorbiæ*-art hit införes för att planteras i trädgårdarne, och üfven om så någon gång skulle hända, detta dock mest lär ske genom frö, deri insektens ägg

ej kunna finnas — så gifver det åtminstone en väl grundad anledning, att antaga det LINNÉ verkligen haft ett svenskt exemplar för ögonen, då han i sin fauna beskref ifrågavarande art. Jag anser det likväl numera otvifvelagtigt, att arten normalt tillhör Skåne, isynnerhet som både *Euphorbia cyparissus* och *esula*, dess egentliga modervexter, äfvensom *Euphorbia pepylus*, med hvilken dess larv äfven håller till godo, förekomma i Skåne. Att arten likväl måste vara ganska sällsynt följer deraf, att dess båda förnämsta modervexter äro här i provinsen sällsynta. — Ingenting hindrar således numera att med fulla skäl föra LINNÉs i Fn. Sv. gifna beskrifning till denna art. Endast uppgiften, att arten skulle äfven finnas »in *Galion*» erbjuder någon svårighet. Lösningen af denna svårighet tänker jag mig sålunda: LINNÉ, utan att ännu, då han skref sin *Fauna Sv.*, känna imago, erhöll larven till *Sph. galii* och ansåg den såsom varietet tillhöra den redan af honom fullkomligt kände *Sph. euphorbiæ*, hvilkens larv den också i hast liknar, serdeles hvad varieteterna beträffar. Härutaf inslöt äfven *Galium* i uppgiften på moderplantorna. Härigenom kan man ock förklara, att i *Fauna Sv.*, som utgafs 1761, ej ett ord i beskrifningen antyder *Sph. galii*, då deremot båda arterna sammanblandas i *Syst. Naturæ*, som utgafs 1766, och i *Mus. Lud. Ulricæ*, som utgafs 1764. Jag är likväl icke i tillfälle att jemföra den af LINNÉ citerade figur hos DE GEER, och kan således ingenting bestämdt härom afgöra. Skulle denna än föreställa *Sph. galii*, är detta dock icke ett bevis emot hvad jag här ofvan anfört, då det endast bekräftar hvad tydligen synes ur *Syst. Naturæ*, att LINNÉ, åtminstone sedan, ansett båda arterna utgöra en, men år 1761 endast såsom svensk känt den ena: *Sph. euphorbiæ* AUCT.»

5. *Kullens hafsmollusker.* — Hr Professor LILJEBORG hade meddelat följande tillägg till den förteckning han lemnat i denna Öfversigt, Årg. 1851, p. 280. De här uppförda arterna äro alla samlade under Juli månad 1852.

67. *Diphyllidia ineata*, OTTO; LOVÉN; FORBES et HANLEY, British Mollusca.
68. *Akora bullata*, MUELLER; F. et H.
69. *Philina aperta* (LIN.) F. et H. = *Phil. quadripartita*, ASC., LOVÉN.
70. *Cylichna truncata* (ADAMS?) F. et H.
71. *Amphisphyra hyalina* (TURR.) F. et H. = *A. pellucida*, LOVÉN.
72. *Tornatella tornatilis* (LIN.) F. et H. = *Actæon tornatilis*, LOVÉN.
73. *Trophon clathratus* (LIN.) F. et H. = *Tritonium clathratum*, LOVÉN.
74. *Mangelia Leufroyi* (MICHAUD) F. et H.; A. MALM, Götheb. Vet. Samh:s Handl. 1853, p. 41, fig. 22.
75. *Scalaria communis*, LMK.; F. et H. = *Scal. clathrus*, LOVÉN.
76. *Aclis supranitida* (S. WOOD) F. et H.
77. *Eulima polita* (LIN.) F. et H.
78. *Eul. distorta*, DESH.; F. et H.
79. *Natica nitida* (DONOV.) F. et H.
80. *Eulimella acicula* (PHILIPPI?) F. et H. = *Turbonilla producta*, LOVÉN.
81. *Cerithium reticulatum* (DA C.) F. et H.
82. *Cer. adversum* (MONT.) F. et H., *Triforis adversa*, LOVÉN.
83. *Rissoa Beanii* (HANLEY) F. et H.
84. *R. striata* (MONT.) F. et H.
85. *R. ulvæ*, F. et H.
86. *Acmæa virginea* (MUELL.) F. et H.
87. *Pilidium fulvum* (MUELL.) F. et H.
88. *Propilidium cæcum* (MUELL.) = *Patella cæca* MUELL., LOVÉN.
89. *Chiton ruber*, LIN.; LOVÉN; F. et H.
90. *Crania anomala* (MUELL.) F. et H.
91. *Anomia striata*, LOVÉN; F. et H.
92. *A. aculeata*, MUELL.; LOVÉN; F. et H.
93. *Pecten striatus*, MUELL.; LOVÉN; F. et H.
94. *Lima Loscombei*, SOWERBY; F. et H.
95. *Crenella decussata* (MONT.) F. et H.
96. *Nucula decussata*, SOWERBY; F. et H.
97. *Cardium fasciatum*, MONT.; LOVÉN; F. et H.
98. *C. succium*, REEVE; LOVÉN; F. et H.
99. *Saxicava rugosa* (LIN.) F. et H.
100. *Montacuta bidentata* (MONT.) F. et H.

6. Ovanliga färgvarieteter af haren och björktrasten. — Hr Mag. T. HAMMARGREN hade meddelat Hr WAHLBERG följande:

»Ehuru, såsom äfven BLUMENBACH anmärker, Albinos-varieteterna inom djurverlden väl egentligen ej böra till naturalhi-



storiens område, utan till pathologien, så är det nu en gång antaget såsom en plägsed att göra detta fenomen till ett föremål för naturforskarnes undersökningar, och då äfven de svarta varieteterna torde böra räknas till samma slags företeelser, torde följande fall ej sakna intresse.

Förliden vår 1853 fångades vid en egendom här vid staden en alldeles *kolsvart hare* (*Lepus borealis*), jemte en vanlig grå, bägge ungar, och tillhörande *samma* »kull». De förvarades i en bur ute på gården och voro *hanne* och *hona*. Fram på hösten framfödde den *svarta* honan en alldeles svart unge, som likväl dog. Mot vintren undergick den grå hannen den vanliga färgförändringen, och blef *hvit*, men systren förblef *svart*, utom att några ljusa hår voro spridda här och der i pelsen. Ett af tvenne: antingen framfödas *alltid* svarta ungar af svarta mödrar, men dö då också merendels, ty ehuru i Småland och östra Sverige äfvensom i Ryssland de svarta hararna lära förekomma oftare, så har jag på Dalsland och i Wermland, h. e. i vestra delen af medlersta Sverige, *aldrig* hört någon, allt från min barndom, som sett denna varietet; eller ock framföda svarta mödrar *vanligt färgade* ungar, då den nu anförda händelsen skulle höra till sällsyntheterna. Ett tredje fall gifves väl, att nemligen svarta mödrar framföda än svarta än grå ungar, men då skulle de svarta hararna här oftare träffas, så vida man ej får antaga, att den omnämnda honan varit den enda i en stor del af landet under en längre tid, ty med dessa djurs starka produktivitet, skulle ej många svarta individer behövas, för att inom ett decennium frambringa en ganska respektabel samling af svarta harar.

För några dagar sedan observerades här vid staden en helt hvit fogel, som äfven snart fångades i utsatta donor, och befanns vara *Turdus pilaris*(?). — Endast fyra fjädrar på ryggen äro mörka och dessa bilda, eget nog, ett något snedt kors ungefär sålunda: , , , — För öfrigt är fogeln snöhvīt med en svag rost-gulaktig anstrykning på underlifvet, *vaaxgul* näbb och ben. Så färgad är han bland de skönaste foglar man

kan se; han förvaras i min samling. I Vetenskaps-Akad. Handl. för år 1808 omtalas en hvit *T. pilaris*, och efter hvad Naumannia (Archiv für die Orn. 1853, zw. Quartal pag. 456) upplyser, förekomma. väl ofta hvitfläckiga varieteter af *Turdus*arterna i Tyskland, men någon så rent hvit varietet som den nyss beskrifna, omtalas ej, utan sägas deremot sådana vara i allmänhet svåra att påträffa, och lära de vanligaste kakerlakerna förekomma bland släktena i *Alauda*, *Fringilla*, *Sylvia* (tithys), *Perdix*, *Loxia*, *Corvus*.»

7. Om byggnaden och utvecklingen af Monocotyledonernas stam. — Hr J. G. AGARPH hade insändt följande.

»Jag tar mig friheten meddela Kongl. Akademien resultatet af några undersökningar om Monocotyledonernas stambyggnad, som synas mig kasta ett nytt och, efter så många utmärkta arbeten öfver samma ämne (af MOHL, GAUDICHAUD, MENEGHINI, MIRBEL, SCHLEIDEN, UNGER, MARTIUS m. fl.), alldeles oväntadt ljus öfver dessa växters organisation. Detaljerna af mina undersökningar, hvilka redan omfatta större delen af de monocotyledona familjerna, anhåller jag att framdeles få meddela Akademien, sedan jag hunnit taga kännedom om några familjer, till hvilkas undersökning jag ännu saknar material.

Det är bekant att tvärsnitt af en monocotyledon och en dicotyledon stam visa mycket olika utseenden. Hos den monocotyledona växten ser jag kärlnippena spridda utan synbar ordning i en nära nog likformig massa. Med undantag af en större mjukhet i midten af stammen, beroende af den mindre tätheten af kärlnippena der än vid periferien, afvensom något af kärlnippets egna organisation, visar sig ingen olikhet emellan stammens inre och yttre, utan de öfvergå småningom i hvarandra. Hos den dicotyledona stammen deremot visar första ögonkastet flera skilda organsystemer. Sjelfva midten af stammen intages af mörgen, som omslutes af concentrisk vedlager,

hvilka i riktningen af radien genomskäras af märkestrålarne; utanför veden finnes en mer eller mindre tydlig bast, som mer eller mindre synbart öfvergår i barken.

Allt ifrån den första upptäckten af denna olika organisation hafva botanisterna sökt uppfatta det egendomliga deri hos hvar och en af dessa växtrikets afdelningar, och ge en förklaring deraf. Man trodde till en början (Desfontaines — De Candolle), att olikheterna berodde af ett olika väx-sätt; man föreställde sig, att hos Monocotyledonerna bildades de nya delarne i den mjuka midten af stammen, och att de yttersta partierna voro de äldsta, under det att hos Dicotyledonerna man visste, att de nya vedlagren afsattes på utsidan af de äldre, och man sökte beteckna dessa olikheter genom benämningarne Endogeneæ och Exogeneæ. I sin berömda Palm-anatomi visade H. Mohl, att denna föreställning berodde på ett misstag; att nemligen kärlnippena i sin utbredning i stammen beskrifva en båge, hvars öfre ända vidtager vid stammens periferie (för att ingå i bladet), och går derifrån emot midten af stammen, hvarifrån den åter småningom under nedstigandet i stammen utgår till dess periferi. Den korsar härvid alla äldre, i samma perpendikulära lamina af stammen löpande, kärlnippen, så att det yngsta kärlnippet kommer nedtill att ligga på utsidan om de äldre. Då således här nya delar bildas på utsidan af de äldre, så följer, att Monocotyledonerna icke kunna anses mera som endogeneer än Dicotyledonerna.

Mohl fann deremot, att hos vissa Dicotyledoner äro de olika organsystemer, som ingå i kärlnippet, anordnade på samma sätt som uti Monocotyledonernas kärlnippen; att den innåt vända delen af Palmernas kärlnippe motsvarar veden i Dicotyledonernas yngsta lager (corona); att den utåt vända delen deremot vore att anse som motsvarande basten hos Dicotyledonerna; att de emellan båda liggande, af honom så kallade, vasa propria äfven återfunnos hos vissa Dicotyledoner. Den hufvudsakliga olikheten syntes bero deraf, att kärlnippet hos Dicoty-

ledonerna icke är afslutadt med dess bildning i corona, utan fortväxer.

MOHL anmärker emedlertid själf, att hos den enåriga dicotyledon-stammen — som ligger till grund för den nämnda jämförelsen — äro de till de högre bladen gående kärlnippena med sin nedre del inskjutna emellan de äldres bast och ved, hvarvid de yngres ved sammanväxer med de äldres; veden blir alltså tjockare i nedre ändan af stammen och får en konisk form. Hos Palmerna deremot äro de yngre kärlnippenas nedre delar aldrig inskjutna emellan de äldres bast och ved, utan ligga isolerade i stammens cellväf, närmare periferien än de äldre knippena. Kärlnippena visa heller icke någon aflagring af nya delar vid de äldre, utan stanna för alltid på sin en gång vunna utvecklingsgrad. Att palmstammen blott obetydligt fortväxer i tjocklek förklarar MOHL deraf, att kärlnippenas nedre ändar ofta hafva en utomordentlig finhet. Hos Monocotyledoner deremot, såsom Dracæna, der kärlnippena nedtill få en starkare utveckling, der fortväxer också stammen i tjocklek.

Alla nyare undersökningar af Monocotyledonernas stam synas hvila på den af MOHL lagda grundvalen, och den af honom gifna förklaringen af de olika organsystemerna. SCHLEIDEN anser den hufvudsakliga skillnaden emellan Monocotyledonernas och Dicotyledonernas stam ligga uti de förras afslutade, de sednares fortväxande kärlnippen. Anordningen i det hela synes han härleda derifrån, att kärlnippena hos Dicotyledonerna äro oftast ställda i en enda krets, stundom, såsom hos Nyctagineer och Piperaceer i flera; hos Monocotyledonerna spridda eller ställda i flera kretsar.

Innan jag öfvergår till en granskning af riktigheten af dessa åsichter om organsystemernas betydelse och den deraf beroende förklaringen af den monocotyledona stammen, skall jag först fästa uppmärksamheten vid ett lager, som i de flesta fall torde vara alldeles förbisetadt, eller åtminstone ingestädes blifvit tillerkändt den vikt, det eger för stammens utveckling och deraf äfven för de olika delarnas förklaring.

Undersöker jag nemligen knoppen eller den del af en monocotyledon stam, der nybildning af delar försiggår, så kan det svårligen förbises, att på längre eller kortare afstånd inom periferien finnes ett särskilt smalt lager, som utmärker sig genom sitt saftigare och mera pellucida utseende. På ett tvärsnitt visar det sig som en sammanhängande ring; på ett längssnitt går det parallelt med stammens periferi och synes här således oftast koniskt. Synnerligen märkbart har jag funnit detta lager i löken hos *Amaryllis*, i den knöliga underjordiska stammen hos *Iris*, *Polygonatum*, *Funkia*, *Hypoxis*, *Sabal*, i den bladbärande stjelen hos *Carex*, *Tradescantia*, *Canna*, *Hedychium*, *Bromelia*, *Aloe*. Under mikroskopet visa sig cellulerna i detta lager tydligen stadda i sitt första utvecklingsstadium. Cellulväggarna äro tunnare eller kanske snarare mera gelatinösa och mera genomdränkta af vätska än i de tillgränsande lagren, der väggarna synas fastare och tjockare med intercellular-rum fyllda af luft. En oklar vätska synes fylla cellulerna, och det är väl denna som hufvudsakligast bidrager att göra detta lager synbart för blotta ögat. Ofta kan man se en och samma cellul ha sin ena, det omtalta lagret tillgränsande, vägg gelatinös, under det en annan utåtvänd redan fått fastare konsistens. Svårligen kan man alltså misstaga sig om naturen af detta lager. Alla dess karakterer antyda, att det motsvarar cambiallagret hos Dicotyledonerna. Man ser tydligen huru cellulbildningen *) derifrån fortskrider såväl utåt för att bilda det yttre lagret (barken), som inåt för att bilda det inre (märgen).

*) I afseende på sjelfva cellulbildningen i cambiallagret vågar jag icke uppge något med säkerhet. Att de nya cellulerna bildas genom cytoblastor har jag aldrig sett. Att äldre celluler genom en ny vägg delas i två är hos vissa växter (t. ex. i märgen hos *Piper clusioefolium*) så vanligt, att hvarje tvärsnitt torde lemna exempel derpå. Men att intercellulargångarna äfven utvecklas till sjelfständiga celler i ett *saftförande* cellulager, synes mig knappt kunna betvivlas. Att cellulväggen der icke ursprungligen är dubbel, uppkommande genom två cellulers sammanstötning, utan att den är enkel och först sednare delar sig i två lameller är jag äfven för egen del öfvertygad om. Den har förekommit mig som till en början bestående af en gelatinös hinna, som under infly-

Cambiallagrets celluler äro än kortaré (*Carex*, *Iris*, *Bromelia* etc.), än långa rör (*Hedychium*), men i båda fallen med sneda tvärväggar, som dock i äldre celluler blifva mera horisontala. Om jag icke misstager mig, hafva de yngsta cambialcellerna den minsta diametern, med relativt större längd; de som äro ämnade att öfvergå till parenchym tillväxa småningom och antaga deas form; de som äro ämnade att bibehålla naturen af cambialceller delas åter och bibehålla derigenom sin första linhet.

Fullföljer man cambiallagret nedåt, så visa olika stammar ett olika förhållande. Hos en stor del Monocotyledoner, särdeles i bladbärande stjelkar, öfvergår cambiallagret i ett mer eller mindre starkt utbildadt lager af prosenchymatiska tjockväggiga celler, och detta lager bildar således en tydlig skillnad emellan mårgen och barken. Särdeles utmärkt finnes detta lager hos *Hedychium* och sannolikt hos alla Scitamineer *). Hos andra

telsen af den å båda sidor fortgående cellul-verksamheten småningom blir tjockare, tills i midten af väggen, der de olika cellulernas verksamhet är minst, den skiljer sig i två lameller. Ett sådant lossnande i skilda lameller af ursprungligen solida delar, hvilket väl i allmänhet icke antages, torde äfven för större delar förekomma. Så äro (t. ex. hos *Crocus*) de två loculi i antherahalfvan skilda genom en solid cellmassa; genom en springa delar sig denna i två lameller, hvilkas invikna kanter småningom af den påtryckande inre pollenmassan utbredas, hvarigenom de två loculi öppna sig genom en gemensam rima longitudinalis. Att cellulväggen ifrån att vara gelatinös blir fibrös, och att den ena cellulens fibrer öfvergå i den andras, så som jag beskrifvit det hos flera Alger, har jag trott mig se hos flera Monocotyledoner och särdeles tydligt i bladen hos *Agave americana* *).

- *) Hos adventivrötter och vissa underjordiska krypande stammar (hos *Carex arenaria* etc., *Juncus balticus* etc.) förekommer samma lager såsom en enda tad af mycket tjockväggiga celluler. På samma sätt förekommer det i stammen på *Potamogeton* och sannolikt hos alla de Monocotyledoner, som man tillskrifvit ett enda centralt kärlnippe. Ofta hafva dessa tjockväggiga celler aflagringen olika fördelad, så att t. ex. i roten hos *Funkia* cellulväggarne inåt mot mårgen och på sidorna äro mycket förtjockade, lemnande blott ett

*) Sedan ofvanstående redan var skrifvet har jag fått November-arken af Bot. Zeitung, deri MOHL förkastar den tydning jag gifvit af Conferv-cellulens utseende. Som ämnet icke egentligen hör hit, skall jag nu icke vidare ingå deri.


t. ex. *Bromelia, Canna*, finnes cambiallagret i den nedre delen af stammen som ett concentriskt, här och der afbrutet, lager, eller ock blott som isolerade fläckar ställda i en med periferien concentrisk linea. Hos åter andra, särdeles i köttiga rhizomer hos Liljeväxterna, finnes cambiallagret blott qvar som region, derifrån nybildningen utgår, utgörande gränsen emellan bark och mærg, utan att vara utmärkt genom på eget sätt construerade, och ifrån de tillgränsande särdeles tydligt skilda, celluler. Cambialregionen finnes således öfverallt, ehuru än förekommande som prosenchymatiskt lager *), än blott som nybildande region.

Liksom cellulerna, så anläggas äfven kärlnippena i cambiallagret. Observerar jag den öfre, i stark utveckling stadda delen af knoppen, så är det icke särdeles svårt att få se talrika kärlnippen afsöndras ifrån cambiallagret. Början till en sådan afsöndring sker derigenom, att några parenchymceller anläggas i sjelfva cambiallagret inom de innersta cambialcellerna. Dessa sednare vidhånga då cambiallagret nedtill, men skiljas derifrån i en sned vinkel inåt och uppåt. Cambiallagret fortfar att bilda nya celluler, så att det anlagda kärlnippet afsöndras fortfarande i en sned vinkel ifrån cambiallagret. Denna afsöndring sträcker sig utan tvifvel så långt nedåt i stammen,

halfmånliskt lumen qvar på utsidan. Om jag icke misstar mig, bildas alla dessa adventivstammar och adventivrötter på ett egendomligt sätt, i det de synas vara mera inosculerade på den stam, derifrån de utgå, än utgöra en fortsättning deraf. Öfvergången från deras egendomliga struktur till den köttiga rhizomens kan man finna hos *Hemerocallis*, der den tappformiga rotens nedre, smalare del har den nämnda adventivrotens struktur, deremot den tjockare delen, i stället för en enda rad, har flera rader af tjockväggiga celluler i det nämnda lagret, och dermed början och möjlighet gifven till rotens tilltagande i tjocklek.


- *) Man skall möjligen anmärka, att cellulerna i detta lager ofta hafva horisontela tvärväggar och sålunda icke böra kallas prosenchymceller. Jag tror dock, att de öfverallt uppkomma af prosenchymceller, som sednare genom horisontela tvärväggar blifvit delade i flera. Ofta synes också den qvarstående sneda väggen midt i en series af celler, som hafva horisontela tvärväggar. I alla händelser motsvara alla dessa celluler hvarandra och hafva, som mig synes, mera analogi med prosenchym- än parenchymceller.

som cambialverksamheten finnes kvar i cambialregionen. På



ett tvärsnitt af en monocotyledon stam ser man också tydligt, huru kärlnippena äro mer och mer fullbildade, ju mera de genom från cambialregionen utvecklade celluler äro skilda derifrån. Kärlnippet *z*, som från cambialregionen *c'''* småningom afskilts ända till *c''*, skall således genom en fortgående utveckling af celluler på cambiallagrets inre sida afsöndras derifrån ända till *c'* och *c*, dit de äldre kärlnippena *y* och *x* redan hunnit.

Cambiallagret, som alltid befinner sig på ett gifvet afstånd inom den coniska stammens periferie, upp- och utskjutes småningom, allt efter som nya celluler afsättas på cambiallagrets inre sida. Cambiallagret, som således en gång var *c—c'*,



har, allt efter som nya celluler bildats på dess insida, småningom utskjutits och öfvergått till *c—c''* och *c—c'''*. Kärlnippet *x*, hvars första anläggning var vid *c'*, har fortbildats nedåt genom cambiallagrets verksamhet att utbilda nya celler på sin insida; det har derjemte fortbildats uppåt allt efter som cambiallagret framflyttades till *c''* och *c'''*. Bladet, till hvilket *x* hör, har ifrån att sitta under spetsen af stammen förflyttats till

dess periferi.

Kärlnippets bågformiga utbredning i stammen, liksom att de yngre kärlnippena i nedre delen af stammen måste ligga på utsidan, men i spetsen på insidan om de äldre, är således en naturlig följd af cambiallagrets verksamhet och kärlnippenas utbildning derifrån.

Man skall sannolikt emot den gjorda framställningen anmärka, att en sådan nybildning af delar icke kan utgå ifrån de tjockväggiga prosenchymatiska celler, som hos många Mono-

cotyledoner utgöra cambiallagrets nedre fortsättning. Jag får till stöd för min uppgift anföra, att det utan tvifvel är orätt att anse cellulerna hafva förlorat sin livsverksamhet i den mån de äro tjockväggiga. Hos *Aristolochia siphon* finnes i den ettåriga stammen ett starkt utbildadt oafbrutet concentriskt lager af prosenchymatiska tjockväggiga celluler. I den tvååriga stammen är detta lager afbrutet framför märkestrålarne; det kan således icke här förnekas, att just de prosenchymatiska tjockväggiga cellulerna undergått en förändring. Genom undersökning af de mellanliggande partierna finner man ställen, der några af de prosenchymatiska tjockväggiga cellerna finnas kvar, omgifna af andra, der de inre lagren resorberats och de numera tunnväggiga cellerna öfvergå till cambialceller. Det synes mig som man måste antaga, att cambialsaften utbreder sig småningom i en gifven direktion ifrån cellul till cellul och således, genom någon kemisk process, framkallar dessa förändringar. I den bladbärande stammen hos *Iris* har jag sett kärlnippets under sin fortbildning nedåt ännu på alla sidor omgifvet af prosenchymatiska tjockväggiga celler, och blott bestående af en sträng cambialceller (*vasa propria* Moul.). Dessa kunde knappt inom det prosenchymatiska lagret hafva uppkommit på annat vis, än att flera prosenchymceller resorberat sina inre lager och derefter delats i ett större antal *vasa propria*. Hos *Canna* har jag tydligen sett en af cambialregionens celler inom sin tydliga cellulvägg delad i ett knippe *vasa propria* *).

Det följer af kärlnippets utveckling på insidan af cambiallagret, att kärlnippet under dess utbredning nedåt i stammen icke kan nå den region, som ligger utanför cambiallagret. Det utgår således icke till stammens periferi med sin nedre ända, så som det synes vara Moul. åsigt. Hos *Monocotyledonerna* underjordiska köttiga stammar finnes oftast en bred re-

*) Det kan anmärkas, att delningen af en cellul med större lumen uti många med mindre, måste blifva genom den derigenom ökade capillärkraften ett mäktigt agens för näringsaftens utbredning och förande till de ställen, der *vasa propria* bildas.

gion utanför cambialregionen, som genom bristen på kärlnippen redan för blotta ögat är tydligen skild ifrån den inre, af kärlnippen uppfyllda delen^{*)}. Men hos en del Monocotyledoner t. ex. Gräs, Scitamineer, Bromeliaceer, Palmer o. s. v. utgå särskilda kärlnippen på cambiallagrets yttre sida. Dessa kärlnippen utmärka sig stundom derigenom, att de bestå nästan endast af prosenchymceller. Hos de flesta äro de af svagare diameter än de inre; hos andra t. ex. *Sabal Adansoni* äro de tydligen gröfre än de på insidan af cambiallagret närmast periferien gående. Jag har trott mig finna, att dessa yttre kärlnippen ingå i bladen och bilda der de kärldrängar, som gå på bladets yttre sida, då de från cambiallagrets inre kommande utgå till bladens inre nerver.

Man har hittills allmänt, om jag icke misstager mig, utgått ifrån den åsigt, att kärlnippena hos Monocotyledonerna voro ursprungligen och så att säga typiskt spridda i stammen, och att det endast var tillfälligtvis eller kanske i en sednare period som de stundom genom några tjockväggiga parenchymceller förenades till ett kretsformigt lager. Hos Dicotyledonerna deremot voro kärlnippena ursprungligen ställda i en krets. Då man nu jemfört de förras kärlnippen med de sednares, och då cambialcellerna hos de förra antagits vara de så kallade vasa propria, som äro inneslutna inom kärlnippet, men cambiallagret hos Dicotyledonerna ansetts uppkomma genom


*) Hos vissa monocotyledona köttiga stammar (t. ex. hos *Hypoxis*) finnes uti den äldre delen af barklagret (som icke mera tillhör den bladbärande spetsen) stora, en mjölk eller viscinartad (?) vätska förande kanaler. Det har förekommit mig som om dessa uppstodo genom resorptionen af de kärlnippen, som förut utgått till de blad, som tillhört denna äldre del af stammen. Jag har trott mig se, att sjelfva kärnen först resorberats, hvarefter de yttre cellerna utvecklats en series af mindre celler, som med sina spetsar convergera mot det inre uppkomna tomrummet. Om dessa afsöndra vätskan, eller denna är en blott och bar upplösningsprodukt, har jag icke kunnat afgöra. I de äldsta kanalerna har jag icke sett dessa mindre celler, hvilket synes tala för den sednare åsigten. Skulle mjölksaften, der den finnes inuti ett kärlnippe, hafva uppkommit på samma sätt?

sammansmältningen af de serskilda i krans ställda kärlnippenas vasa propria, så har det varit naturligt, att man hos Monocotyledonerna icke skulle antaga något allmänt cambiallager, men väl hos Dicotyledonerna. Det framgår häremot af den af mig gjorda framställningen, att detta antagande hvilar på en fullkomligt falsk grund. Ett allmänt cambiallager är nemligen det primära, och de i kärlnippena befintliga vasa propria äro derifrån afsöndrade strängar med fortlefvande cambialceller. Ehuru jag därför icke har några direkta observationer, synes det mig följa af den olika struktur, som kärlnippet har på olika ställen af dess utbredning i stammen, att en fortgående livsverksamhet inledes genom kärlnippets vasa propria, i det att kärlnippet ifrån att bestå hufvudsakligen af prosenchym, då det afskiljes ifrån cambiallagrets nedre region, småningom genom resorption af prosenchymcellernas inre lager och deras öfvergång till vasa propria och derifrån till kärl, får under sitt lopp i stammens inre och öfre del allt flera kärl, i samma mån som prosenchymen der minskats.

Undersöker jag cambiallagret i knoppen på en Dicotyledonväxt, så finner jag det, såsom hos Monocotyledonen, ett sammanhängande concentriskt lager, deri nybildning försiggår; det är jemväl på dess insida som de ursprungligen skilda kärlnippena bildas. Men de på insidan och emellan kärlnippena befintliga vanligen långsträckta cellerna få i de flesta fallen snart aflagringer på innerväggarne, hvarefter deras nybildande verksamhet synes upphöra. Jemte kärlnippena komma de sålunda att utgöra ett eget concentriskt lager, känt under namn af corona. Dess celler skiljas ifrån mörgen genom mindre diameter, tjockare väggar och innehålla kanske stundom andra ämnen än mörgecellerna. Den delen af cambiallagret deremot, som fortlefver såsom nybildande lager, finnes på utsidan af corona. Det är genom dess verksamhet, som veden bildas. Allt som nya vedceller bildas på cambiallagrets insida utflyttas äfven detta och stammen fortväxer således i tjocklek. Veden, likaväl som kärlnippena i corona, bildas på cambiallagrets insida, men dock

synes deremellan vara en väsendtlig skillnad. Åtminstone utgöras hos många växter kärnen i coronan af spiralkärl, under det kärnen i veden utgöras af trappkärl eller punkterade kärl. Denna skillnad synes blifva ännu väsendtligare hos några familjer (Piperaceæ), der cambiallagret synes fortlefva såsom nybildande lager både på insidan och utsidan af corona. Kärlknippena på insidan om corona ligga här spridda; och med undantag af de förändringar, som föregå inom kärlknippet, fortväxa de icke vidare. På utsidan om corona deremot äro kärlknippena ordnade till en krans, de fortväxa alltjemt och bilda sålunda veden.

Jemför jag härmed stammen af Aloe, och förmodligen är förhållandet enahanda hos alla de Monocotyledoner, hvilkas stam betydligt tilltager i tjocklek, så visar den samma dubbla växtsätt.



Cambiallagret $c''' - c'$ öfvergår nedtill i ett lager af tjockväggiga celler, som sammanbinda de yngsta kärlknippena till ett concentriskt lager $c'' - c$. Kärlknippet x , utbildadt från c''' till c'' på Monocotyledonernas vanliga sätt, utgår slutligen på utsidan om de äldre kärlknippen, som från c'' till c af redan lignescerade celler äro sammanbundna till corona. Då nemligen cambiallagret vid c'' fortlefver på utsidan såsom nybildande lager och är, som sådant, utflyttadt till c' , så är det här som kärlknippet fortbildas och det kommer således att nedanför fortsättas på utsidan om corona. Det är således visser-

ligen riktigt då MOHL (*Verm. Schr. p. 154*) uppger, att de yttre lagren i stammen af *Dracæna* bildas af de inre kärlknippenas nedre ändar; men då han deraf drager den slutsats, att man icke kan skilja emellan utvecklingssättet i den nedre stammen och vid spetsen, så är, enligt min uppfattning, detta oriktigt, enär deremellan är den väsendtliga skillnad, att kärlknippena utvecklas vid spetsen innaför, och vid basen utanför corona, och att det utan tvifvel är af denna skillnad, som stammen

hos de ifrågavarande Monocotyledonerna ständigt tillväxer i tjocklek på samma sätt som hos Dicotyledonerna.

Jag har nämnt ofvanför, att cambiallagret hos en del Monocotyledoner förekommer såsom sammanhängande concentriskt lager endast i toppen af stammen; att det hos dessa småningom upplöses nedåt i skilda strimmor eller smala strängar, som sålunda på gränsen emellan bark och märg bilda cambialregionen*). Hos andra, der cambialcellerna äro förlängda, inkrusteras dessa vanligen tidigt med de vanliga förtjockningslagren på insidan af cellulväggen och cambiallagret öfvergår således nedåt i ett mer eller mindre starkt prosenchymatiskt lager. Det synes mig icke vara ringaste tvifvel underkastadt att detta lager är fullkomligen analogt med coronan hos Aloe. Men i stället för att cambiallagret såsom nybildande lager finnes på utsidan om corona hos Aloe, är det på insidan om corona, och genom metamorfosen af dess prosenchymatiska celler, som kärlnippena utbildas hos de andra Monocotyledonerna. Emellan dessas kärlnippen och de utanför corona bildade kärlnippena hos Aloe finnes således samma skillnad, som emellan märgens kärlnippen hos Piper och dem som der bilda veden. Det följer alltså häraf, att hela den monocotyledona stammen motsvarar de dicotyledona växternas märg med deri befintliga kärlnippen, omklädd af corona och bark; endast Aloe och dermed analoga växter hafva den utanför corona utvecklade veden.

Lägger man denna åsigt om monocotyledon-stammens byggnad till grund för en jemförelse, så synes mig också allt få en naturligare förklaring. Den cylindriska, föga i tjocklek tillväxande stammen i motsats till den af vedbildningen beroende coniska formen hos Dicotyledoner och Dracæna. Märgen
hos

*) Hos några monocotyledona stammar t. ex. Carex, Hypoxis etc. fann jag cambiallagret särdeles starkt utveckladt i den region, derifrån nya adventivrötter bildas och att dessas första anläggning sker i cambiallagret. Cambiallagrets verksamhet här, sedan det ofvanför i stammen upphört som nybildande region, torde förklara hvarföre hos vissa Palmer stammen nedtill och upptill tillväxer i tjocklek under det att den ofvanför adventivrötterna afsmalnar.

hos Dicotyledonerna bestående af parenchymatiska celluler liksom den i stammen hos Monocotyledonerna kärlnippena omgifvande väfnaden. Spiralkärl förekommande i Dicotyledonernas märkeknippen, likaväl som i kärlnippena hos Monocotyledonerna. Kärlnippenas spridda ställning, deras icke fortväxande hos båda, i motsats till de concentriska, i directionen af radien fortväxande, vedknippena hos Dicotyledoner och Aloer. Hos Dicotyledonerna bildas oftast endast en krets af dessa första coronan tillhörande kärlnippen, och en sannolik följd deraf blir att hos dem märke ofta är ett snart livsverksamheten förlorande parti. Nära nog samma förhållande eger rum hos de flesta gräsen. Nästan alla kärlnippena ligga inbäddade uti, eller några straxt innanför coronans tjockväggiga celler. Men hos en del gräs (Majs m. fl.) finnes det inre af märke äfven genomskuret af kärlnippen, liksom hos de flesta Monocotyledoner. Det kan icke vara något tvifvel underkastadt att Palmstammen och Majsstrået bestå af samma organsystemer som grässtrået i allmänhet, det är alltså af märke, corona och bark. Å andra sidan visa de Piperaceer, som icke bilda kärlnippen utanför corona, den fullkomligaste likhet med Monocotyledonstammens struktur. Jemför jag dessa med de Piperaceer, som hafva den vanliga dicotyledona vedbildningen, så visar sig tydligt, att de partier, som ligga innanför corona äro lika hos båda; och att olikheten ligger deri, att de frutescenta arterna hafva en serie af vedknippen utanför corona, som genom cambiallagrets fortgående verksamhet ständigt tillväxa.

Jag har redan nämnt, att kärlnippenas bildning sker på insidan af cambiallagret; genom dess tillväxt och utbildning af nya celler cernerar derifrån och inskjutes småningom kärlnippet. Der denna verksamhet fortgår, måste kärlnippena synas spridda eller ställda i flera kretsar i märke (Monocotyledoner, Piperaceer). Men der cambiallagrets verksamhet på insidan upphör, så att de bildade kärlnippena icke afskiljas från det till corona förvandlade cambiallagret, der måste kärlnippena

synas ställda i krans och det på inre sidan af corona befintliga icke vidare tillväxa. Der cambiallagret fortlevver som nybildande region på utsidan af corona, der måste jemväl de anlagda kärlnippens ställning bero af den redan bildade, sedermera oföränderliga, coronan. De yttre kärlnippena måste sålunda jemväl synas ställda i krans, och då veden sedan afsättes ifrån cambiallagret uniformt på dettas hela insida, så bliver hela vedbildningen beroende af det först anlagda corona-lagret. Under cambiallagrets småningom skeende utskjutning, genom afsättning af vedceller på dess insida, händer, att vissa cambialsträngar lemnas qvar, som då i det inre af veden fortfara med bildning af nya delar. Sådant synes mig förhållandet vara hos Nyctagineerna.

Ungefär på samma sätt händer att på spetsen af en axel cambiallagret afsätter en del parenchymceller så, att både ofvan och under dessa ett lager cambialceller förekommer. Dessa fortsätta då att bilda nya delar både uppåt och nedåt. Parenchymcellerna blifva mærg, och de med cambialverksamhet fortväxande transversella lamellerna blifva knän i stammen, som på detta sätt blir articulerad. Kärlnippena sammanbindas sedan i dessa genom anastomoser. Så har jag trott mig se utbildningen hos Tradescantia och Momordica.

Är den ofvan gjorda framställningen riktig, så är tydligt, att den af Mohl grundade, och nu väl allmänt antagna åsigten om Monocotyledonernas stambyggnad, hvilat på en fullkomligt falsk grund, i det man jemfört partier med hvarandra, som icke äro jemförliga. Man har således jemfört:

1:o Monocotyledonernas *märgknippen* med Dicotyledonernas *vedknippen*. Att denna jemförelse icke är riktig visa på det tydligaste Aloeer och Piperaceer, der båda slagen förekomma med skilda karakterer.

2:o har man ansett kärnen i det Monocotyledona märgknippet motsvara veden hos Dicotyledonerna. Är den förra jemförelsen oriktig, så måste det sednare antagandet jemväl vara det.

3:o har man ansett basten hos Dicotyledonerna motsvarad af prosenchymcellerna på det Monocotyledona mörghnippets yttre sida. Men det är karaktéristiskt för basten att utvecklas på utsidan af cambiallagret, då deremot Monocotyledonernas hela kärlnippe utvecklas på insidan af cambiallagret. Vi hafva ofvanför sett, att hos en del Monocotyledoner (Bromeliaceer, Scitamineer, Gräs m. fl.) finnas serskilta knippen utvecklade på utsidan af cambiallagret. Dessa utmärka sig stundom derigenom, att de bestå uteslutande af bastceller, och dessa, men icke andra, torde sålunda vara jemförliga med basten hos Dicotyledonerna.

Man har sökt ett bevis för riktigheten af det under punkterna 2 och 3 gjorda antagandet deruti, att organsystemerna, som ingå i mörghnippet, skulle vara anordnade på samma sätt, som organsystemerna i den ettåriga Dicotyledona stammen; att således mörghnippets periferien närmaste del skulle utgöras af tjockväggiga prosenchymceller och således motsvara basten, den inre delen deremot, bestående af kärler omgifna af parenchym hade läget och karaktererna af veden; den emellan båda befintliga strängen af vasa propria motsvarade cambiallagret. Att anordningen af organerna är sådan hos en mängd Monocotyledoner kan icke nekas. Men det gifves andra (Aloe, Polygonatum, Juncus, Carex, Eriocaulon), som hafva cambiallagret liggande i centrum af mörghnippet, omgifvet af en sluten ring af kärler, hvilken åter utikring på alla sidor omgifves af prosenchym. Det finnes slutligen växter (Vellozia), som hafva mörghnippet med prosenchymcellerna vända inåt, och kärler utåt, som följaktligen hafva organsystemerna ställda fullkomligt i motsatt riktning med Palmernas. Här af måste tydligen följa att på denna anordning icke kan läggas någon vikt för förklaringen af organsystemernas betydelse.

För fastställande af den under punkterna 2 och 3 gjorda jemförelse lägger Mohl vikt derpå, att kärlnippet

har en olika organisation på olika ställen af dess förlopp i stammen; att det i sin öfre del består mera af kärl, i sitt nedre lopp har mera baströr, och att dessa sednare utgöra hela kärlknippet i dess nedersta del. Sammanfattningen af dessa nedersta ändar skulle i den nedre stammen bilda ett lager, som motsvarade Dicotyledonernas bast. Jag har ofvanför framställt som sannolikt, att den olika strukturen snarare berodde af det olika utvecklingsstadium, hvarpå kärlknippet befann sig, att det vid sin afsöndring från coronan består mera af prosenchym, och att genom cambialcellernas verksamhet denna småningom öfvergår till vasa propria för att derifrån öfvergå till kärl. Jag har vidare anmärkt, att en del kärlknippen utbildas på utsidan af cambiallagret, och att dessa kanske motsvarade basten, men att de ingalunda borde förväxlas med de på insidan af cambiallagret utvecklade kärlknippenas nedre ändar. Huruvida hos de Palmer, der ett sådant bastlikt lager förekommer, knippena tillhöra det ena eller andra slaget har jag icke material att kunna afgöra: men i intetdera fallet torde detta lagers förekomst inverka på den af mig gifna förklaringen af Monocotyledonstammen.

- Antar man den Mohlska förklaringen, så är det mig omöjligt att inse huru man vill förklara, att stammen t. ex. hos Scitamineerna är delad i en inre och en yttre del, båda försedda med kärlknippen, eller hvad det lager, som åtskiljer dessa delar, egentligen skall betyda.
- 4:o jemför man den mellan märkeknippena befintliga parenchymen med märkestrålarne hos Dicotyledoner och Aloeer. Men den förre utvecklas på insidan af corona och öfvergår utan afbrott i det innersta märkeglagret; den utgöres sålunda af märke, hvars celler blifvit hoptryckta och långsträckta i riktningen af radien, till följe deraf att kärlknippena ligga närmare hvarandra vid corona än i centrum af stammen och lemna under sin utveckling

mindre rum för den mjuka parenchymen. Märgstrålarne deremot bildas på utsidan af corona och sammanhånga med dess parenchymatiska tjockväggiga celler. För såvidt som coronans celler äro skilda ifrån märgen, äro märgstrålarne det äfven. Som märgstrålarne bildas på insidan af cambiallagret, kunna de uppstå så väl omedelbarligen på utsidan af corona, som längre ut i veden (korta märgstrålar). Lika orätt som det sålunda är att anse Monocotyledonernas märgknippen motsvara Dicotyledonernas vedknippen, lika orätt torde det vara att jemföra Monocotyledonernas *strålformiga märg* med Dicotyledonernas *märgstrålar*.

SCHLEIDEN skiljer emellan slutna och fortväxande kärlnippen, tillägger Monocotyledonerna de förra, och Dicotyledonerna de sednare, samt påstår, att häri ligger den egentliga strukturskillnaden emellan dessa båda afdelningar af växtriket. Men det synes mig som hvilade hela denna uppgift på en oredig uppfattning. De slutna kärlnippena skulle utmärka sig derigenom, att hos dem cambialverksamheten blott fortfar en kort tid, hvarefter cambialcellerna förvandlas till en skarpt tecknad cellväf och äro oförmögna till vidare utveckling. Lemnande derhän frågan om några kärlnippen förekomma, som fullt motsvara denna beskrifning, så är dock tydligt att Piperaceernas märgknippen äro likaväl fasciculi vasorum definiti som Monocotyledonernas. De fortväxande kärlnippena deremot skulle vara sådana, der cambium icke förr upphör att fortbilda sig, och kärlnippet icke förr att tillväxa inifrån utåt än delen, som kärlnippet tillhör, upphör att växa. Antingen måste nu märgstrålarne anses tillhöra kärlnippet eller icke. Tillhöra de kärlnippet, så kunde visserligen cambiallagret anses hafva uppstått genom sammansmältningen af de olika kärlnippenas cambialceller, och den gifna definitionen riktig, men då är tydligt att Aloe har likaväl fasciculi vasorum indefiniti som Dicotyledonerna, enär der, om icke hvarje serskilt kärlnippe, dock de dem omslutande märgstrålarne, eller veden såsom ett helt, ständigt

fortväxa. Tillhöra icke märkestrålarne kärknippet, så kan cambiallagret icke heller anses tillhöra kärknippet, enär icke blott detta utan äfven märkestrålarne tillväxa genom dess verksamhet, och följaktligen kan icke heller det oafbrutet fortväxande vedknippets cambiallager jämföras med de *Monocotyledona* kärknippens begränsade cambialsträng. SCHLEIDENS uppgift om denna olikhet emellan *Monocotyledoner* och *Dicotyledoner* är utan tvifvel hemtad ifrån *Aloeerna*, de enda *Monocotyledoner* man tillskrifvit ett cambiallager, och der det sålunda var tydligt att cambiallagret icke kunde göra skillnaden. Hos *Aloe* hafva dessa yttre, på utsidan om corona bildade kärknippena, som öfverallt omgifvas af märkestrålarne, organsystemerna ställda på *Monocotyledonernas* vanliga sätt, d. v. s. att en krets af tjockväggiga celluler omgifver en sträng af vasa propria; men veden i allmänhet tillväxer på *Dicotyledonernas* vanliga sätt, d. v. s. att ett allmänt cambiallager förekommer, som afsätter på sin inre sida såväl kärknippen som märkestrålar, så nemligen att kärknippena på alla sidor omgifvas af märkestrålarne. Förreställer man sig nu veden hos *Dicotyledonerna* bildad af en krets vigglika, af märkestrålarne skilda kärknippen, som på sin utsida ständigt tillväxa genom ett cambiallager, så är detta äfven fallet med *Aloe*. Men uti dessa vedknippen hos *Aloe* förekomma strängar som hafva alla det *Monocotyledona* kärknippets organer. Då man således icke kan säga, att en del motsvarar det hela, så kan man heller icke jämföra det *monocotyledona* och *dicotyledona* vedknippet med hvarandra.

Man kunde visserligen säga, att det ligger en skillnad i vedbildningen hos *Aloe* och *Dicotyledonerna* deruti, att hos *Monocotyledonerna* afsätter cambiallagret vedknippena icke omedelbarligen det ena utanpå det andra, utan att de åtskiljas med parenchymceller, då deremot det ena vedlagret omedelbarligen sluter sig till det andra hos *Dicotyledonerna*; men dels hafva vi hos vissa *Dicotyledoner* (*Nyctagineer*) exempel på att veden afbrytes af parenchymceller, dels hafva vi hos *Xerotes* — om jag vågar dömma efter ett torkadt exemplar, — både

inre slutna mörghnippen och yttre fortväxande vigglika knippen fullkomligen motsvarande Dicotyledonernas.

Det gifves sålunda både hos Dicotyledoner och Monocotyledoner en fortväxande ved, karakteriserad genom sin utveckling på utsidan om corona och genom det allmänna cambiallagrets verksamhet. Denna ved kan bestå af kärlnippen, som icke hafva några serskilda cambialsträngar, som således blott fortväxa genom det allmänna cambiallagrets verksamhet (Xerotes, Dicotyledonerna i allmänhet); eller i denna fortväxande ved kunna finnas kärlnippen med serskilda cambialsträngar; dessa knippen kunna vara omslutna och bilda fasciculi vasorum definiti (Aloe) eller mera öppna och fortväxande genom sitt eget cambialparti (Nyctagineæ).

Jag har ofvanför frambållit såsom karakteristiskt för mörghnippena — i motsats till den vanliga veden — att de äro hvad man kallat fasciculi vasorum definiti. Så är också i allmänhet förhållandet, och namneligen hos Piperaceerna, de växter med hvilka jag önskade visa Monocotyledonernas stora öfverensstämmelse i afseende på stammens organisation. Men hos flera Dicotyledoner fortväxa äfven mörghnippena genom den serskilda cambialsträngs verksamhet, som tillhör hvarje serskild knippe. Hos Cucurbitaceerna förekommer ett allmänt cambiallager, genom hvars verksamhet stammen fortväxer, utbildande en mörgh med en (*Momordica Elaterium*) eller flera kretsar (*Bryonia*) af mörghnippen. Men dessa mörghnippen hafva hvar sitt fortväxande cambialparti, som småningom indrager tillgränsande celler i cambialtillstånd och ombildar dem till celluler af annat slag. Serdeles märkbar och upplysande i detta afseende synes mig roten (eller underjordiska stammen?) af *Bryonia*. Denna tillväxer i tjocklek genom det straxt inom den tunna barken liggande allmänna cambiallagrets verksamhet, i det detta på sin insida afsätter i riktningen af radien ordnade dels parenchymatiska mörghceller, dels mörghnippen, som i början äro runda och bestå af kärll omgifna af cambialceller. Men dessa sednare inverka småningom på tillgränsande parenchymceller,



som derigenom delas och ombildas för nya ändamål — blifva långsträcktare celler och kärl. I stället för att knippena börja med att vara runda, bilda de sålunda snart strålförmiga utskott, och detta icke blott utåt och åt sidorna men jemväl inåt. Om jag icke misstager mig förenas på detta sätt kärlknippena genom anastomoser och hela kärlsystemet utbildar sig till ett nätformigt sammanhängande helt. Parenchymen till en början ordnad i riktningen af radien, ombildas härunder äfven, och synes således i det inre af roten utgå strålförmigt från kärlknippena.

Har man öfvertygat sig här, att organerna inom och i närheten af ett kärlknippe ombildas och öfvergå ifrån en form till en annan, så torde det blifva mindre svårt att antaga, att äfven i de kärlknippen, som man kallat fasciculi vasorum definiti, organerna småningom öfverföras ifrån en form till en annan. Jag har redan antydtt ofvanför, att det monocotyledona kärlknippets olika struktur på olika ställen i stammen torde bero på en längre eller mindre fortskriden utveckling i denna riktning; jag har anmärkt, att kärlknippena, som till bladen utgått genom barken hos *Hypoxis* sannolikt resorberades och ombildades till de der befintliga mjölksafts-(?)gångar. Jag har trott mig se hos flera Monocotyledoner (*Tradescantia*, *Luzula*), att ett i början antydtt större kärl resorberades, och i det derigenom uppkomna tomrummet utbildades flera mindre.

Cucurbitaceernas fortväxande märkeknippen synas mig på visst sätt lemna förklaringen till Menispermeernas och Aristolochiernas egendomligt bildade ved. Kärlknippena hafva nemligen här hvar sitt serskilta cambiallager, och det är genom dess verksamhet som stammen tillväxer. De i en krets ställda kärlknippenas cambiallager bilda en concentrisk, genom märkestrålarne afbruten, linea. Då nybildningen försiggår, synes cambialverksamheten utbredas ifrån det ena kärlknippets cambialsträng till det andras, i det man tydligen här ser en del af märkestrålens celler föra en oklar vätska och vara kortare (delade i flera) än de innanför och utanför liggande fullbildade

märgstrålcellerna. Cambialverksamheten synes ifrån denna linea utbreda sig såväl utåt som inåt; utåt upplösande (resorberande af innerlagren) det framför märgstrålen liggande prosenchymlagret och ombildande det till märgstrålceller, inåt stundom i det inre af mårgen framkallande förändringar, som ge den äldre stammen ett olika utseende med den yngres. Så har jag åtminstone trott mig se hos *Aristolochia*. Det kan dessutom anmärkas, att hos *Menispermum canadense* förekommer ett med Dicotyledonernas corona fullt jemförligt lager, under det att detta synes vara mindre tydligt skildt hos andra (*Cocculus laurifolius* enligt DECAISNES figur och *Aristolochia siphon*), der det utan märkbar öfvergång fortsättes inåt af mårgen och utåt af märgstrålarne. Enligt min uppfattning skiljer sig sålunda stammen hos dessa växter ifrån Dicotyledonernas vanliga stam derigenom, att den tillväxer genom verksamheten af de åtskilda kärlnippenas cambialpartier, under det veden hos andra Dicotyledoner bildas genom ett allmänt cambiallager. Huruvida äfven ett sådant ursprungligen finnes, och huruvida det är genom dess verksamhet som hos vissa Menispermeer flera kretsar af kärlnippen bildas, har jag icke haft tillfälle att undersöka.

Om det således följer af hvad jag anført, att det icke finnes någon skillnad i struktur, som genomgående karakteriserar den monocotyledona stammen såsom skild ifrån den dicotyledona, så kan man dock i allmänhet säga, att den monocotyledona stammens tillväxt sker genom utveckling på insidan af corona — genom bildning af mårgh och mårghknippen —, den dicotyledona stammens deremot — liksom Aloeernas — på utsidan af corona — genom vedbildning. Vi återkomma således på visst sätt att tillskrifva Monocotyledonerna ett *endogent*, Dicotyledonerna ett *exogent* växsätt. Det är tillräckligen bekant, att en äldre fransysk skola (DESFONTAINES — DAUBENTON — DE CANDOLLE) antog en sådan skillnad i växsätt emellan de nämnda växtrikets stora afdelningar; att denna lära bestreds och sönderrefs af MOHL, som sökte visa, att i detta afseende icke fanns någon skillnad emellan Monocotyledoner och Dico-

tyledoner; att GAUDICHAUD, som sökte försona det förre antagandet med MOHLs observationer om kärlnippets utbredning i den monocotyledona stammen, förklarade denna bero af ett dubbelt växsätt, ett från centrum af stammen utåt till bladet, ett från stammens inre nedåt till periferien; att samma utmärkta korporation, som tilldelat GAUDICHAUDS arbete det Monthyonska priset, några år derefter skickade sin utmärktaste växtanatom på en serskild expedition till Afrika för att studera Daddelpalmen och i det uppgifna ändamålet, att genom anatomiska och fysiologiska undersökningar vinna en noggrannare kännedom om de karakterer, som skilja Monocotyledoner och Dicotyledoner; att resultatet af en treårig undersökning uppgafs vara, att GAUDICHAUDS lära var oriktig, att kärlnippena tvertom begynna på insidan af stammens periferi och växa derifrån inåt och uppåt mot bladen; att GAUDICHAUD långt ifrån att finna sig öfvertygad om riktigheten af MIRBELS observationer, protesterade deremot, liksom MOHL i ett bihang till den nya upplagan af sin Palm-anatomi uppträdt emot MIRBELS antaganden. Mina observationer synas ge någon rätt åt alla dessa olika meningar: der synes i allmänhet vara en skillnad i växsätt emellan Monocotyledoner och Dicotyledoner, fastän icke sådan som den äldre fransyska skolan betecknade med endogeneitet och exogeneitet; kärlnippets utbredning i stammen är väl sådan som MOHL beskrefvit den, men hela jämförelsen af det monocotyledona märkeknippet med Dicotyledonernas ved, cambiallager och bast synes mig oriktig. Att det gifves ett dubbelt växsätt för kärlnippet synes mig riktigt, men detta beror af cambiallagrets något olika förhållande nedtill i stammen och upptill i terminalknoppen; något kärlnippenas växande nedåt eller uppåt d. v. s. inträngande emellan andra partier, ungefär som roten nedtränger i jorden, synes mig icke kunna vara tal om, men väl om en fortgående ombildning och dermed nybildning och utveckling, som sker i en gifven direction, nemligen i toppen af stammen utåt mot bladet, genom cambiallagrets der fortgående utflyttning, och nedåt i stammen

genom de särskilda kärlnippenas nedåt fortgående anläggning och skiljande från cambialregionen. MINNELS lära synes således äfven grundad på en riktig observation, då han sett i terminalknoppen, att kärlnippena fortbildades utåt mot bladet; men han drog häraf den felaktiga slutsats, att de begynte vid periferien och derifrån växte inåt och uppåt i stammen. Och i sjelfva den bittra strid, som de sednaste åren fortgått emellan GAUDICHAUD å ena sidan, och RICHARD, BRONGNIART och JUSSEU å den andra, om Dicotyledonernas vedbildning synes mig något riktigt å båda sidor. Det synes mig icke kunna vara tvifvel underkastadt att vedbildningen är en produkt af cambiallagrets verksamhet, och att alla organer utbildas på det ställe, der de anläggas; men därför kan denna utveckling ske i en viss ordning, som är nedåt fortskridande i stammen. Der denna utveckling hämmas, genom cambiallagrets borttagande rundt omkring i stammen, der kan man väl tänka sig ofvänsför ett hopande af cambialsafter, som framkalla de bekanta öfvervällningar af ved, hvarpå GAUDICHAUD hufvudsakligen stöder sin lära om ett system af i stammen nedträngande fibrer.

Jag har trott mig böra ingå i dessa slutliga detaljer för att undvika alla missförstånd om hvad jag ansett följa af mina observationer, helst frågan är af den vikt att man väl med MINNEL derom kan säga: "Aucun Phytologiste n'ignore qu'il s'agit ici de l'une de ces questions fondamentales qui intéressent au plus haut degré la philosophie de la science".

8. *Första Supplementhäftet till Flora Danica.* — Sekreteraren föredrog följande meddelande af Hr FRIES.

»Af alla botaniska planchverk är Flora Danica det allmännast spridda, mest begagnade och oftast citerade. Dertill bidraga, att Flora Danica utgör ett begränsadt helt; att hon är det första figurverk, som började utgifvas efter Linnæanska reformen och allt sedan oafbrutet fortsatts med stigande ve-

tenenskapligt och artistiskt värde. Detta har endast varit möjligt derigenom, att det, utan allt hänseende till merkantil vinst, utgifvits på danska konungarnes, om vi icke misstaga oss enskilda, bekostnad, så att, sedan ett bestämdt antal för utdelning till publika danska och en del främmande biblioteker blifvit aflemnadt, hvad som influtit för försålda exemplar tillfallit utgifvaren såsom arfvode. Grundlagd under den tid Norge utgjorde en del af danska staten, innehåller *Flora danica* redan största delen af norska växterna; men efter 1814 upphörde upptagandet af norska växter, hvarigenom den ursprungliga planen, att gifva en helgjuten bildlig framställning af nordiska vegetationen, stördes. Nu mera inser man allmänt olämpligheten deraf, att bestämma en floras gränser efter politiska förhållanden; att ett verkligen vetenskapligt arbete i detta fall måste fastställas efter naturliga, oföränderliga grunder. Som det vida större antalet af svenska och norska växter redan finnes i *Flora Danica* afbildade, har länge varit en allmän önskan, att detta erkänt klassiska verk äfven måtte upptaga icke blott de i sednare tider gjorda upptäckterna i Norge, utom hvilka *Flora Danica* förblefvo ett fragment, utan ock de för Sverige egendomliga. *Flora Danica* blefve derigenom ett gemensamt nationalverk för de tre skandinaviska folken, vida mer ingripande i vetenskapen än om hvardera för sig ville isolera sig. Behofvet deraf har isynnerhet varit insett i Sverige, sedan Svensk Botanik upphört att utgifvas. Af flera orsaker kunde detta förtjenstfulla verk aldrig vinna den allmänna spridning som *Flora Danica*, och som ett enskildt företag egde det icke heller någon garanti för sitt bestånd. Då därför, vid Naturforskare-mötet i Köpenhamn, botaniska sectionen enhälligt instämde i den önskan, att *Flora Danica* skulle erhålla denna utsträckning och vid ett allmänt sammanträde beslöts, att en underdånig framställning skulle ingå till H. Maj:t Konung CHRISTIAN d. VIII, såsom icke blott varande naturvetenskapernas upplyste beskyddare, utan tillika grundlige kännare, behagade Högstdensamme dertill lemna nådigt bifall.

Detta är anledningen till det Supplement till Flora Danica, hvars första häfte nu anmäles för Kongl. Akademien. Det innehåller endast egendomligt svenska, och sednare åren i Norge upptäckta växter, hufvudsakligen af den outtröttlige Professor BLYTT, som af alla sednare nordiska botanister gjort de viktigaste nya fynd. Arbetet är således egentligen ett svenskt-norskt nationalverk, ehuru utgifvet på dansk bekostnad. Uppdraget har lemnats till Hr Professor LIEBMAN och lyckligare val har icke kunnat träffas, då Hr LIEBMAN är lika utmärkt för grundlig specialinsigt i växtrikets samtliga delar som för en genom autopsi vunnen kännedom så väl af europeiska som nordamerikanska vegetationen.

Första häftet innehåller följande svenska Phanerogamer: *Aira uliginosa* (egentligen endast en afart af *A. flexuosa*, ehuru mera utmärkt än många verkliga arter), *Melica ciliata*, *Eriophorum russeolum*, *Plantago minor*, *Thesium alpinum*, *Juncus stygius*, *Tofieldia calyculata*, *Arenaria gothica*, *Stellaria longifolia*, *Rubus arcticus*, *Helianthemum olandicum*, *Ranunculus illyricus*, *Linosyris vulgaris*, *Inula ensifolia*, *Artemisia rupestris* och *laciniata*, *Carex evoluta*, *aquatilis*, *livida*, *Salix depressa*. Efter norska exemplar äro följande tecknade, dels under utgifvarens resa i Norge för detta ändamål, dels efter originaler meddelade af Professor BLYTT: *Mühlenbergia pendula* TRIN. = *Agrostis suaveolens* BLYTT (enligt ref. åsigt utgör den typ för ett eget, från båda skildt slägte, hvilket benämnts *Blyttia*, ehuru sednare undersökningar visat, att det förgätna Linneanska slägtet *Cinna* dermed fullkomligen sammanfaller), *Coleanthus subtilis*, *Glyceria remota*, *Calamagrostis lapponica* jemte dess forma opima (från hvilken *Calam. chalybæa* är vida skild!), *Luzula glabrata* * *borealis*, *Saxifraga caespitosa* * *palmata*, *Oxytropis lapponica*, *Mulgedium sibiricum*, *Erigeron elongatus* LEDEB. (non *E. politus* FR., den förra förhåller sig till *E. acris*, som *Erigeron politus* = *E. alpinus* β WHLNB. Fl. Lapp. till *E. alpinus* och *E. glabratus* till *E. uniflorus*), *Carex vaginata* TAUSCH. (non THUNB. in HOFFM.

Phyt. Blätt.) eller *C. sparsiflora* WABL., *C. microstachya*, *parallela*, *heleonastes*, *helvola*, *pediformis*, *laevirostris*, *Betula alpestris*, *Salix pyrenaica* * *norvegica*, *Aspidium crenatum*. En stor del af dessa finnes äfven, som bekant, på svenska sidan om Kölen.

Utom ofvannämnde finnas tolf mossarter och aderton larvar afbildade. Alla figurerna föreställa växterna i deras naturliga storlek och uttrycka förträffligt både yttre utseendet och karaktererna, till hvilkas upplysande alltid talrika analyser äro tillagda. Mätte helse och lefnadsmod till det vigtiga arbetets fortsättning förunnas den adle utgifvaren, som under cholera-farsotens härjningar i Köpenhamn led de svåraste slag som kunna träffa en lycklig make, en öm fader.»

9. *Pleurospermum austriacum* (*Ligusticum*) L., *en svensk växt*. — Hr WIKSTRÖM meddelade, att Studerande W. STENHAMMAR och M. M. FLODERUS, hvilka under det förlutna årets sommar botaniskt undersökte en del af Kolmården, ungefärligen vid en åttendedels mil norr om marmorbruket funnit denna för vår flora nya växt, sparsamt växande på stembunden mark. Den tillhör egentligen det medlersta Europas lägre alp- och bergstrakter från Savoyen till Riesengebirge, som ansetts för dess nordliga gräns, och släktets öfriga fyra arter hafva blifvit funna i Sibiriens alpnejder.

Akademiska angelägenheter.

Sammankomsten den 11 Januari.

Till utländska ledamöter kallades genom anställt val, i första klassen: Professoren i Mathematik vid Universitetet i Berlin Hr LEBEUF DIRICHLET, och Professoren vid école polytechnique i Paris Hr LAMÉ, samt i sjette klassen Hr LEON DUFOUR, Läkare i St Séver.

Inlämnade afhandlingar:

Sammankomsten den 11 Januari.

Af Hr HAMP. v. POST: Om Köpings sandås.
Remitterades till Hrr MOSANDER och ERDMANN.

Sammankomsten den 8 Februari.

Af Hr Dr CRUSELL i Petersburg, en uppsats af medicinskt innehåll.
Öfverlemnades till Svenska Läkaresällskapet.
Af Hr Bergmästaren FR. v. SCHEELE: Om Gellivare Malmberg.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Sammankomsten den 11 Januari.

Af K. Nederländska Regeringen.

Flora Batava. Aflev. 173. 4:o.

Af Kais. Akademie der Wissenschaften i Wien.

Denkschriften. Math. naturw. IV: 1. V: 2. 4:o. Mit Taff.

Sitzungsberichte. Philos. hist. X: 5. XI: 1, 2. 8:o.

Math. naturw. XI: 1, 2. 8:o.

Archiv X: 2. XI: 1, 2. 8:o.

Notizenblatt. 1853: 1—20. 8:o.

Almanach der Akademie für 1854. 12:o.

**Af schlesische Gesellschaft f. vaterl. Kultur i
Breslau.**

Jahresbericht. J. 1852. Breslau. 4:o.

Af naturforschende Gesellschaft i Basel.

Bericht üb. die Verhandlungen, 1850—52. X. Band. 8:o.

Af Geological Society i London.

The quarterly Journal. N:o 36 (IX: 4). 1853. 8:o.

Af Société Linnéenne i Bordeaux.

Actes de la Société. T. XI—XVIII. 1839—53. 8:o.

Af Société Imp. des naturalistes i Moskau.

Bulletin. 1852: 3, 4. 1853: 1, 2. 8:o.

Af Société Vaudoise i Lausanne.

Bulletin. N:o 28. T. III. 8:o.

Af författarne.

VAN GEUNS, W. A. J., Proeve einer Geschiedenis van de Æquivalent-getallen . . . Amsterd. 1853. 8:o.

MANNERHEIM, C. G., Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna etc., Moskau 1853. 8:o.

MULDER, L., Hist.-krit. Overzicht van d. Æquivalent-Gewigten van 24 Metallen. Utrecht 1853. 8:o.

OUDEMANS, A. C. Jr., Hist.-krit. Overzicht v. d. Æquivalent-Gew. van 22 Metallen. Leiden 1853. 8:o.

RAUWENHOFF, N. W. P., Onderzoek naar de Betrekking der groene Plantendeelen. Amsterd. 1853. 8:o.

ROSE, H., Gedächtnissrede auf BERZELIUS. Berlin 1852. 4:o.

Af utgifvarne.

Nya Bot. Notiser. 1853. N:o 10—12. 8:o.

Af Hr Buys-Ballet i Utrecht.

Waarnemingen te Utrecht, door Dr. KREECKE. Dec. 1852. Jan. et Febr. 1853. 4:o.

Af Frh. R. C. G. Rudbeck.

CAILLAUD, FRÉD., Voyage à Méroé, au Fleuve Blanc etc. 1819—1822. T. 1—4. Paris 1826, 27. 8:o — jemte tre småskrifter af samme förf.

Sammankomsten den 8 Februari.

Af K. Videnskabernes Selskab i Köpenhamn.

Skrifter. Naturvid. og Mathem. Afdeling. B. 3. 1853. 4:o.

Tables du soleil. Par HANSEN et OLAAPSEN. Copenh. 1853. 4:o.

Quæstiones, 1853. 8:o.

Af Société Géologique i Paris.

Bulletin. T. X. F. 12—16. 8:o.

Af utgifvaren.

Archiv der Mathematik u. Physik. Herausgeg. von J. A. GRUNERT. B. 21. H. 3, 4. B. 22. H. 1. Greifswald 1853. 8:o.

Af författarne.

PACINI, FIL., Sulla struttura dell'organo elettrico del gimnoto. Firenze 1852. 8:o.

PALMSTEDT, C., Om lysgas af stenkol och ved samt andra växtämnen, dess beredningssätt och användande. Stöckh. 1853. 8:o.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Friherre C. J. Cederström.

Nykläckt yngel af Sik, samt en art *Planaria* från Östersjön.

Af Hr Caillaud i Nantes genom Frh. R. C. G. Rudbeck.

En stuff af gneiss med deri boende *Pholader*.

Botaniska Afdelningen.

Af Hr Dr C. F. Nyman.

Sextiofem arter från nejdena af Wien, hvaribland de österrikiska arterna af *Cytisus*, *Loranthus europæus*, *Verbascum orientale*, *Euphorbia stricta*, *E. Gerardiana*, *Euonymus verrucosus*, många *Umbellater*, t. ex. *Peucedanum alsaticum*, *Seseli coloratum*, *Chærophyllum aromaticum*, *Peucedanum cervaria* m. m. fl., *Lythrum dubium*, *Thalictrum angustifolium* o. s. v.

Sexton arter från Grödinge socken i Södermanland, t. ex. *Cerastium glomeratum*, *Nitella stenhammariana* och flera sällsyntare laf-arter.

Af Hr Löjtnant G. F. Boy.

En stenfrukt (drupa) af palmen *Lodoicea Sechellarum*.

Af Hr Pastorsadjunkten Sjöstrand.

Fyrtiosju af Ölands sällsyntare arter, bland hvilka *Juncus glaucus*, *Carex Schreberi*, *C. paludosa*, *C. tomentosa*, *Elymus europæus*, *Koeleria glauca*, *Poa alpina* var. *collina*, *Alyssum calycinum*, *Cochlearia danica*, *Mentha sativa* var. *Agardhiana*, *Lychnis alpina* var. *oelandica*, *Ranunculus illyricus*, *Cerastium glutinosum*, *Plantago minor*, *Viola pratensis*, *V. elatior*, *Galium sylvestre* var. *læve* m. fl.

Af Studeranden R. F. Fristedt.

Sju sällsyntare arter dels från Herjedalen, t. ex. *Salix myrtilloides*, *S. glauca* var. *pullata*, dels från Upsalatrakten, t. ex. *Hieracium oreades*, *H. saxifragum*.

Af Studeranden Fr. Björnström.

Åtta arter *Hepaticæ* från Stockholms-nejden, t. ex. *Jungermannia attenuata*, *J. bicrenata*, *Scapania curta*, *Lophocolea heterophylla* o. s. v.

Af Studeranden Wilh. Stenhammar.

Exemplar af den för Sverige nya *umbellaten*, *Pleurospermum austriacum*. Tjugutre sällsyntare lafvar från Öland, t. ex. *Parmelia fulgens*, *P. impolita*, *Biatora quærnea*, *Cetraria alvarensis*, *Lecidea calcarea* o. s. v.

Af Studeranden Alfred Ahlqvist.

Trettio sällsyntare arter från Öland och Calmar län, t. ex. *Orchis militaris*, *O. mascula*, *O. morio*, *O. ustulata*, *Selinum lineare*, *Coronilla emerus*, *Thesium alpinum*, *Euphorbia palustris*, *Valeriana dioica*, *Euonymus europæus*, *Helianthemum oelandicum* m. fl.

Mineralogiska afdelningen.

Af Hr Friherre Sprengporten.

Tjuguen stuffer koksalt och gips från Dünenberg vid Salzburg, jemte beskrifning.

Af Hr Mag. v. Böbeln.

En stoff af ett kalkberg i närheten af Bayonne.

*Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i December 1853.*

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkning- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,82	25,85	25,84	+2°5	+3°0	+2°0	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Mulet
2	25,68	25,63	25,62	+2,0	+3,0	+2,4	V.S.V.	V.S.V.	V.	Regn
3	25,56	25,44	25,36	+2,0	+1,2	+2,0	S.S.V.	S.V.	S.V.	Mulet
4	25,47	25,53	25,59	+1,0	+0,6	+0,1	V.N.V.	N.	V.S.V.	Dimma
5	25,58	25,55	25,49	+2,2	+3,5	+3,5	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Mulet
6	25,43	25,43	25,48	+3,0	+3,3	—0,1	V.S.V.	V.	V.N.V.	Mulet
7	25,53	25,57	25,60	—3,0	—1,1	—4,6	—	V.N.V.	V.N.V.	Klart
8	25,64	25,66	25,67	—6,1	—3,0	—2,5	—	V.S.V.	V.	—
9	25,64	25,71	25,76	+0,9	—0,5	—2,9	V.S.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
10	25,79	25,79	25,79	—3,9	0,0	+0,9	V.	V.	V.N.V.	—
11	25,81	25,83	25,83	—1,0	—0,4	—3,0	V.	V.	V.	—
12	25,84	25,84	25,84	—3,5	—4,5	—4,5	V.	V.	V.	Dimma
13	25,78	25,74	25,68	—2,0	—0,4	—0,1	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Snö
14	25,63	25,66	25,66	+0,5	+1,0	+0,1	V.&V.	V.N.V.	V.S.V.	Mulet
15	25,61	25,59	25,55	—0,5	+0,5	+0,2	N.O.	O.S.O.	O.S.O.	Snö
16	25,46	25,46	25,44	+1,0	—0,2	0,0	O.S.O.	O.S.O.	S.O.	—
17	25,49	25,40	25,44	—0,1	+0,8	—0,5	O.S.O.	N.O.	N.N.O.	—
18	25,46	25,51	25,53	—2,0	—1,2	—1,0	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	Mulet
19	25,60	25,57	25,72	—1,1	—0,6	—0,1	N.N.O.	N.N.V.	N.	—
20	25,79	25,82	25,80	—1,8	—2,0	—2,1	N.N.O.	N.N.O.	V.	—
21	25,81	25,80	25,81	—4,0	—3,0	—4,7	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	—
22	25,69	25,49	25,49	—3,9	—3,0	—1,4	V.	V.S.V.	V.S.V.	—
23	25,25	25,41	25,55	—0,5	—4,0	—5,7	V.N.V.	N.N.O.	N.	Halfkl.
24	25,64	25,55	25,45	—7,0	—5,5	—2,0	V.	S.V.	S.V.	Mulet
25	25,50	25,48	25,30	—3,0	—2,2	—2,0	V.N.V.	V.	V.	Klart
26	25,06	25,08	25,12	+0,2	—2,0	—4,5	V.	V.	V.N.V.	Halfkl.
27	25,16	25,25	25,36	—8,9	—7,7	—8,7	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klart
28	25,52	25,61	25,69	—7,0	—4,8	—8,1	N.N.V.	N.N.V.	V.N.V.	—
29	25,60	25,49	25,35	—9,0	—9,0	—8,5	V.N.V.	V.N.V.	V.S.V.	Dimma
30	25,12	25,04	24,98	—5,0	—4,0	—3,0	S.S.V.	S.	S.S.V.	Mulet
31	24,94	24,97	24,99	—3,0	—4,8	—5,0	S.S.V.	S.	S	Snö
Sam- man	25,542	25,540	25,540	—1°97	—1°52	—2°06				
	25,541			—1°85						

*Sammandrag af Meteorologiska Observationerna å
Stockholms Observatorium år 1853.*

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.				Thermometern Celsius.				Neder- börd.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Me- dium.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Me- dium.	
Januari . . .	25,370	25,379	25,395	25,381	— 0°36	+ 0°23	— 0°39	— 0°17	0,169
Februari . . .	307	307	312	309	— 7,96	— 5,17	— 7,66	— 6,93	—
Mars	545	560	567	557	—10,71	— 3,47	— 7,75	— 7,31	—
April	425	435	436	432	— 1,99	+ 3,35	— 0,76	+ 0,20	0,341
Maj	554	556	555	555	+ 8,59	+14,04	+ 7,83	+10,15	0,411
Juni	437	427	430	431	+15,83	+20,41	+15,20	+17,15	1,854
Juli	369	367	367	368	+17,99	+21,80	+17,44	+19,08	0,743
Augusti . . .	342	351	349	349	+13,42	+18,52	+13,86	+15,27	3,111
September . .	382	393	390	388	+10,15	+15,72	+11,43	+12,43	0,971
October . . .	381	406	422	403	+ 6,01	+ 8,83	+ 6,51	+ 7,12	1,301
November . .	712	711	721	715	+ 2,28	+ 3,50	+ 2,54	+ 2,77	0,451
December . .	542	540	540	541	— 1,97	— 1,52	— 2,06	— 1,85	—
Medium . . .	25,447	25,453	25,457	25,412	+ 4°27	+ 8°02	+ 4°68	+ 5°06	9,35

ÖFVERSIGT
AF
KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS
FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

N. 2.

Onsdagen den 8 Mars.

Föredrag.

1. Om etherns motstånd och småplaneternas attraktioner. — Hr ÅNGSTRÖM föredrog följande:

»Planeternas sekulära perturbationer hafva isynnerhet derföre ådragit sig astronomernas synnerliga uppmärksamhet, att lösningen af alla frågor rörande vårt solsystems stabilitet ytterst beror på storleken af dessa förändringar, hvilka, så obetydliga de än förefalla, likväl under seklernas lopp kunna hopa sig till den grad, att de helt och hållet förändra ban-elementernas utseende.

Emellertid öfverensstämma så väl teori som erfarenhet deri, att så beskaffade perturbationer icke göra sig gällande inom vårt planetsystem. Det undantag ifrån denna regel, man i början af detta sekel trodde sig finna i månens rörelse, hvars medelhastighet ökat sig ifrån de äldsta tider, så långt astronomiska iakttagelser gå tillbaka, försvann äfven, då det lyckades LA PLACE att förklara denna företeelse utur en långsam förändring i jordbanans excentricitet. Det visade sig dervid, att densamma var, såsom dess orsak, periodisk och icke en gång inverkade på medelhastigheten direkte utan på den så kallade epoken.

Ännorunda är dock förhållandet med kometerna. Banornas lutning och stora excentricitet utesluta ingalunda här perturbationer, äfven af periodisk natur, af det omfång, att ban-

elementerna derigenom helt och hållet förändras. Ett härpå talande exempel är den Lexelska kometen och sannolikt äfven de båda kometer, hvilka blifvit uppkallade efter *Bromsen* och *D'Arrest*. I allmänhet måste samma förhållande inträffa med hvarje komet, som kommer i Jupiters grannskap. Men om äfven kometerna kunna perturberas i sina banor af planeternas attraktioner, så äro tvertom komaternas massor så obetydliga, att de på planeternas rörelser icke kunna utöfva något märkbart inflytande.

Detta oaktadt har en ibland kometerna, nemligen den Enckeska, gifvit anledning till ett antagande, som, om det bekräftar sig, måste äfven göra sig gällande i planeternas rörelser och sålunda hida ett verkligt undantag från den antagna lagen af medelafståndets oföränderlighet såsom blott underkastadt periodiska variationer.

Det har nemligen visat sig, att denna komet, oberäknadt de betydliga förändringar omloppstiden undergår till följe af planeternas perturbationer, tillika ökat sin medelhastighet i banan för hvarje omlopp, så att den för hvarje gång visat sig i perihelium omkring 24 timma tidigare än förut.

Detta förhållande låter lättast förklara sig derigenom, att — enligt hvad kometens berömda kalkulator Professor *Encke* visat — i värdet på medellongituden en term ingår eller antages såsom ingående, och att denna term tillväxer såsom tidens kvadrat; enda svårigheten blir sedan att utur den allmänna tyngdlagen pröfva giltigheten af denna terms tillkomst. Då detta icke hittills lyckats, så har *Encke* tagit sin tillflykt till en annan förklaringsgrund, nemligen etherns motstånd.

Som bekant är, måste den inverkan, som ett resisterande medium af samma beskaffenhet med luften skulle utöfva på en himlakropps rörelse, gå derpå ut att förminaka omloppstiden och banans excentricitet, hvarigenom en med tiden förtgående tillväxt i medelhastigheten också måste uppkomma. Således just hvad man söker. På grund af denna erfarenhet antog nu *Encke* specielt för ethern, att dess täthet aftager med af-

ståndets kvadrat från solen, och vidare, att motståndet är proportionellt mot etherns täthet och mot kvadraten på kometens hastighet.

Emot dessa antaganden kunna likväl grundade anmärkningar göras. Först och främst måste, om etherns täthet tilltager mot solens yta, deraf följa, att ethern äfven deltagar i solsystemets progressiva rörelse, äfvensom i solens rotation; ty man kan ej tillägga ethern luftens egenskaper i ett fall, under det att man förnekar följderna af samma egenskaper i ett annat. Den rotativa rörelsen hos solen meddelar sig omedelbart till den omgifvande kondenserade ethern, och fortplantar sig sedan medelbarligen från lager till lager, antingen med lika eller med förminskad vinkelhastighet. Antager man, att vinkelhastigheten minskas i samma förhållande som planeternas, så följer, att motståndet i det närmaste försvinner för planeter och för kometer med direkt rörelse, men ökas så mycket mera för kometer med retrograd rörelse. Att likväl detta icke är händelsen har den Halleyska kometen tillräckligt visat.

Ett bevis för etherns tilltagande täthet har man äfven ansett sig kunna hemta af den skenbara volumförminskning, hvilken den Enckeska kometens kärna undergår i närheten af solen. Men då ethern besitter egenskapen att genomtränga alla kroppar, så kan dess förökade täthet ingalunda sammanpressa utan måste tvertom utvidga kropparne, om annars en effekt dervid kommer i fråga. Den Newtonska teorien för uppkomsten af kometernas svansar, att de nemligen vända sig från solen af samma orsak som ångor uppstiga i vår egen atmosfär, har BESSEL *) äfven visat vara otillräcklig att förklara dervid förekommande olika formförändringar.

Då således, å ena sidan, med antagandet af etherns kondensation dess motstånd i afseende på den Enckeska kometen försvinner, och å andra sidan detta antagande äfven är otill-

*) Astron. Nachr. Tom. 13, p. 185.



räckligt att förklara de fenomenen man åsyftat, så synes det samma böra förkastas.

Som bekant är hafva åsigtarna om etherns täthet inom diafana kroppar äfven varit olika, i det somliga antagit denna täthet konstant, andra åter, såsom FRESNEL, att densamma är olika för olika media; och om också det sednare antagandet eger för sig mera sannolikhet *), och således de molekulära krafterna förmå att förändra etherns täthet, så kan en sådan förmåga likväl icke tilläggas tyngdkraften.

Något spår till etherns motstånd har man icke kunnat upptäcka i planeternas rörelser, och anser man, att detta härleder sig af planeternas större täthet och mindre utsträckning; men äfven denna förklaring är mycket tvifvel underkastad. Den Fresnelska åsigten af ljusets aberration, äfvensom direkta försök af FIZEAU **) synas ådagalägga, att *ethern till en viss grad deltagar i en diafan kropps rörelse och detta i förhållande till samma kropps brytningsförmåga*. Etherns motstånd uppkommer sålunda inom sjelfva kroppen och måste till följe deraf vara oberoende af kroppens utsträckning, men tillväxa i mån af dess brytningsförmåga. Då likväl detta å andra sidan motväges af den större massa, som hos kroppar med stark brytningsförmåga vanligen förefinnes, så synes man ingalunda berättigad att antaga någon större olikhet emellan planeter och kometer i afseende på etherns motstånd.

Emellertid är vår kännedom af kometerernas beståndsdelar högst ofullkomlig. Att de ej äro fasta eller gasformiga är väl gifvet, af deras egenskap att ej bryta ljuset. Sannolikt äro de af stoftartad beskaffenhet. Man kan sluta detta af deras egenskap att reflektera solljuset i förening med den gjorda iakttagelsen, att stjernor, sedda genom sjelfva kometkärnan, enligt vissa observatörer ***) visat en till och med förökad ljusstyrka.

*) Jfr. Förf:s uppsats om polarisationsplanet. Vet. Ak. Förh. 1853. N:o 6.

**) Comptes Rendus XXXIII, p. 349.

***) PIAZZI, STRUWE, RESLAUBER.

Till en del torde det sistnämnda fenomenet bero af en illusion, emedan andra, såsom *Bessel*, iakttagit motsatsen, men det kan äfven förklaras ur lagarne för ljusets interferens. Om nemligen ett lysande föremål bortskymmes af en kropp med ringa utsträckning, så kan detta föremål visa sig med oförminskad intensitet bakom den skymmande kroppen just i riktningen af deras förbindningslinje. Eger nu den skymmande kroppen ett eget ljus, så adderar sig detta till det lysande föremålets, som derigenom visar sig starkare.

Hvad slutligen det antagandet vidkommer, att motståndet växer med qvadraten på rörelsens hastighet, så kan dervid den invändning göras, att begreppet stor eller liten måste här tillkomma en hastighet blott i förhållande till det medium, hvari rörelsen sker, och att således en hastighet, som för luften är betydlig, derföre icke kan anses sådan för ethern. Den hastighet, hvarmed båda dessa media fortplanta vågrörelser, kan bäst tjena såsom utgångspunkt vid jämförelsen. Dervid visar sig, att den Enckeska kometens hastighet i perihelium icke är fullt $\frac{1}{10}$ af ljusets, och således motsvarar en hastighet i luften af cirka $\frac{1}{4}$ fot i sekunden. Denna omständighet synes mig isynnerhet vigtig, då man vill beräkna etherns motstånd, hvilket än ytterligare modifieras deraf, att det sannolikt uppkommer inom sjelfva kroppen.

Af det föregående synes således böra följa, att etherns täthet är densamma på olika punkter inom himlarymden, och att dess motstånd, om det annars utöfvar ett märkbart inflytande, bör rätta sig efter första digniteten af hastigheten. Prof. *Hansen*, hvilken underkastat de olika hypoteserna öfver etherns motstånd en grundlig undersökning, har visat, att det sednare antagandet föga förändrar det numeriska värdet af motståndet, men så icke det förra. Gifver man nemligen den Enckeska funktionen U ett sådant värde, som motsvarar den observerade förkortningen af omloppstiden, så kommer perihelii-afståndet att aftaga hastigare än som vore fallet, om etherns täthet tilltager mot solen, derföre att excentriciteten aftager i detta fall läng-

sammare. Väl har Encke själf med anledning af apparitionerna 1822 och 1832, då kometen observerades blott *efter* periheliipassagen, yttrat den förmodan, att den fullkomligt riktiga formen för den lag, hvarefter motståndet rättar sig, ännu icke vore funnen, och afvikelserna vid de sista apparitionerna synas äfven bekräfta detta; huruvida likväl antagandet af en konstant densitet hos ethern bättre skulle återgifva observationerna kan på förhand icke afgöras. I någon mån synes dock detta böra blifva händelsen, emedan observationerna 1822 och 1832 just tendera att gifva kometbanan en större excentricitet än som uppkommer, då blott observationer, gjorda *före* kometens periheliipassage, användas. De böra således bättre harmoniera med resultaten af den hypotes öfver etherns beskaffenhet, enligt hvilken excentriciteten aftager långsammare.

Emellertid hafva de betänkligheter öfver etherns motstånd i allmänhet, hvilka i det föregående blifvit framställda, hos mig väckt en liflig önskan att på annat sätt kunna förklara den acceleration i den Enckeska kometens omloppstid, som observationerna ådagalägga; så mycket mera som den berömda upphofsmanen till denna hypotes själf anmärker »dass das widerstehende Mittel nur als eine Form für die nothwendig gewordene Correction anzusehen ist.»

Småplaneterna, hvilkas attraktioner hittills icke varit tagna i beräkning, hafva dervid fästat min synnerliga uppmärksamhet, och tager jag mig friheten att i det följande framställa resultaten af den preliminära undersökning, jag i detta afseende anställt. Äfven om det skulle visa sig, att den observerade anomalien i den Enckeska kometens rörelse icke på denna väg låter förklara sig, så bör dock hvarje bidrag till kännedomen af dessa himlakroppars inbördes förhållanden ega intresse. Den Enckeska kometen kommer säkert i en framtid att sprida nytt ljus öfver dessa småplaneters utbredning och massor, samt att sålunda än ytterligare föröka antalet af de sanningar, hvarmed den redan riktat den astronomiska forskningen.

*) Astr. Nachr. XII; p. 321.

Som bekant är, har det kända antalet af dessa himlakroppar, ifrån att i början af seklet varit 4, på det sista tiotalet ökat sig till 27. Den hastighet, hvarmed dessa upptäckter följt på hvarandra, gör det mycket sannolikt, att deras verkliga antal måste vara högst anseeligt, ehuru väl, i anseende till deras litenhet, de till största antalet troligen komma att blifva oss obekanta. Antingen man nu utgår ifrån den Olberska hypotesen, att alla dessa asteroider äro styckten af en enda större planet, eller också antager, — deras ursprung må nu vara hvilket som helst — att de bilda liksom ett bälte eller en ring emellan Mars och Jupiter, så är det tydligt, att deras sekulära perturbationer, hvilka äro oberoende af läget i banan, måste blifva de samma, antingen man tänker sig dem alla för- enade i en enda eller fördelade på olika punkter af en gemensam bana. De sekulära perturbationer småplaneterna utöfva på den Enckeska kometen böra därför kunna gifva ett approximativt värde på deras gemensamma massa.

För att finna medelriktningen af de 27 asteroidernas banor har jag utur deras elementer beräknat medelvärdet af följande quantiteter:

$$a, e \cos \pi, e \sin \pi, \sin \Omega \operatorname{Tang} I, \cos \Omega \operatorname{Tang} I,$$

och utur dessa sedan erhållit

<i>Asteroiderna.</i>	<i>ENCKES komet.</i>
$\pi = 65^{\circ}1'$	$\pi_1 = 457^{\circ}18',4$
$\Omega = 138^{\circ}23'$	$\Omega_1 = 334^{\circ}29',5$
$I = 4^{\circ}19'$	$I_1 = 43^{\circ}20',7$
$e = 0,0555$	$e_1 = 0,8478$
$a = 2,567$	$a_1 = 2,222$

hvarvid för jemförelsens skull äfven Enckeska komets elementer blifvit tillsatta. Kallar man vidare

Kometbanans lutning mot den gemensamma asteroidbanan	I
Perihelii afstånd ifrån den uppstigande noden	ω
Samma vinkel för asteroidbanan	ω_1

så erhålles

$$I = 47^{\circ}32'$$

$$\omega = 186^{\circ}47',5$$

$$\omega_1 = 94^{\circ}21'$$

Man ser således, att de båda banorna bilda likasom tvenne länkar i en gemensam kedja, och att deras peribelier göra omkring 90° vinkel med hvarandra. Detta i förening med det betydliga värdet af I visar, att båda banorna icke komma i närmare beröring med hvarandra. Granskar man likväl de särskildta asteroidbanorna, så finner man, att för några af dem, hvilkas nodlinier falla i första, och peribelier i andra kvadranten, ett närmande till kometbanan kan ega rum. Jag har beräknat för flera af dem vinklarna ω , ω_1 och deraf sedan kometens och asteroidens radii vectores i sjelfva nodlinien, men blott för de trenne följande funnit skillnaden mindre än 4.

	I	r	r'	diff.
Irene	$48^{\circ}48'$	2,361	2,811	0,450
Proserpina .	$45^{\circ}52'$	3,192	2,665	0,527
Ceres	$48,48'$	2,023	2,959	0,936

hvarvid r betyder kometens, r' asteroidens radius vector i den uppstigande noden för kometbanan. Man ser således, att bland de hittills upptäckta asteroiderna icke finnes någon, som kommer kometbanan nog nära för att på kometens rörelse kunna utöfva ett märkbart inflytande. Deraf följer likväl icke, att ju en sådan kan finnas bland de ännu oupptäckta. Vore densamma medelafstånd nära $= 2,222$, så skulle densamma i kometens rörelse kunna åstadkomma en periodisk förändring af sekulär natur, och som, oaktadt asteroidens litenhet, kunde blifva märkbar vid differential-formlernas integrering.

För att nu återkomma till de sekulära perturbationer, som asteroiderna utöfva på den Enckeska kometen, så hör lösningen af detta problem till de svårare inom astronomin, därför att de båda banornas projektioner på ekliptikan skära hvarandra. *Bessel* *) har visserligen visat, huru man kan finna

*) Astr. Nachr. XIV, p. 1.

de sekulära perturbationer, som en planet utöfvar på en komet eller planet med kometartad bana, då den störande kraften låter utveckla sig i en aftagande serie efter stigande digniteter af $\frac{r'}{r}$, om r' och r betyda planetens och kometens radii vectores, och HANSEN *) har behandlat det motsatta fallet, då kometens radius vector är genomgående mindre än planetens; men dessa methoder gälla icke för det fall, att båda banorna korsa hvarandra.

Följande method torde därför icke sakna intresse, ehuru väl för det fall, att de båda himlakropparnes medeldistanser äro nära lika stora, den icke leder till serdeles konvergerande serier.

Betecknar man med m och m' kometens och den störande planetens massor, med

$$x, y, z, r, x', y', z', r'$$

deras koordinater, samt med ϱ deras afstånd sinsemellan, så erhåller man, som bekant är, den störande kraftens komponenter genom differentiering af den Lagrangeska funktionen

$$R = -\frac{m'(xx' + yy' + zz')}{r^3} + \frac{m'}{\varrho}.$$

Då emellertid de sekulära perturbationerna äro oberoende af planetens koordinater, så kan man i expressionen på R bortkasta den första termen och erhåller sålunda

$$R = \frac{m'}{\varrho};$$

då vidare i denna expression blott de kvantiteter böra bibehållas, som äro oberoende af planetens anomalial media $n't$, så kan man sätta

$$R_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{dn't}{\varrho}.$$

För finnandet af denna integral är det nödvändigt att utveckla $\frac{1}{\varrho}$ i en konvergerande serie.

*) Ermittlung der absoluten Störungen in Ellipsen. 1843.

Kallar man till den ändan U den vinkel kometeus och planetens radii vectores göra med hvarandra, så har man

$$\rho = (r^2 + r'^2 - 2rr' \cos U)^{\frac{1}{2}}$$

och man kan sätta

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{(r^2 + r'^2)^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2rr' \cos U}{(r^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{(2rr' \cos U)^2}{(r^2 + r'^2)^{\frac{5}{2}}} + \text{etc.} \quad (a)$$

eller i allmänhet

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{(r^2 + r'^2)^{\frac{1}{2}}} + \sum \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} \cdot \frac{(2rr' \cos U)^n}{(r^2 + r'^2)^{n+\frac{1}{2}}};$$

hvarvid n antager alla positiva värden från 1 till ∞ .

Konvergensens af föregående serie bestämmes af expressionen

$$\frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2rr' \cos U}{r^2 + r'^2},$$

hvilken alltid är mindre än enheten, så snart $r > < r'$ och äfven för $r = r'$, om icke liktidigt $\cos U = 1$. Serien (a) kan således alltid anses konvergerande, utom för det fall då en sammanstötning af himlakropparne inträffar, för hvilket fall differential-equationerna sjelfva upphöra att vara gällande.

Emedan för perturbationer af första ordningen, då u' betecknar anomalia excentrica,

$$d.n't = \frac{r' du'}{a'}, \text{ så får man}$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d.n't}{\rho} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r' du'}{a' \rho} = R_1$$

För finnandet af R_1 är det icke nödvändigt att undvika utvecklingar, fortgående efter stigande digniteter af planetens excentricitet e' ; om man derföre sätter

$$R_1 = \frac{v^0}{(a'^2 + r'^2)^{\frac{1}{2}}} + \frac{v^1}{(a'^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{v^2}{(a'^2 + r'^2)^{\frac{5}{2}}} + \frac{v^3}{(a'^2 + r'^2)^{\frac{7}{2}}} + \text{etc.} \quad (b)$$

och bortkastar termer, som äro multiplicerade med e'^3 och högre digniteter, så erhålles

$$V^0 = 1$$

$$V' = -\frac{3}{2} a'e'p - \frac{3}{4} a'^2 e'^2$$

$$V'' = \frac{3}{4} a'^2 r'^2 \{(p^2 + q^2) + e'^2 (4p^2 - q^2)\} + \frac{3}{2} a'^2 r'e'p + \frac{3}{4} a'^4 e'^2$$

$$V''' = -\frac{75}{16} a'^2 r'^2 e'p(p^2 + q^2) - \frac{15}{32} a'^2 r'e'^2 (25p^2 + 2q^2)$$

$$V^4 = \frac{105}{64} a'^4 r'^4 (p^2 + q^2)^2 + \frac{1}{4} a'^4 r'e'^2 (18p^4 + 15p^2 q^2 - 3q^4) + \frac{105}{64} a'^2 r'^2 e'p(p^2 + q^2)$$

etc. etc.

eller, om blott första digniteten af e' bibehålles,

$$(c) \left\{ \begin{aligned} R_1 = & \frac{1}{(a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} + \frac{3}{2.4} \cdot \frac{1}{2} \frac{a^2 (p^2 + q^2)^2 r^2}{(a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} + \frac{3.5.7}{2.4.6.8} \cdot \frac{8}{2.4} \frac{a^4 (p^2 + q^2)^2 r^4}{(a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} + \\ & + \frac{3 \dots 11}{2 \dots 12} \cdot \frac{3.5}{2.4.6} \frac{a^6 (p^2 + q^2)^2 r^6}{(a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} + \text{etc.} \\ & - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \frac{a'e'p \cdot 2.r}{(a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{3.5}{2.4.6} \cdot \frac{3.5}{2.4} \frac{a'^2 e'p (p^2 + q^2)^2 r^3}{(a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} - \\ & - \frac{3 \dots 9}{2 \dots 10} \cdot \frac{3 \dots 7}{2 \dots 6} \frac{a'^2 e'p (p^2 + q^2)^2 r^3}{(a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} - \text{etc.} \\ & + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{a'^2 e'p \cdot 2.r}{(a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} + \frac{3.5.7}{2.4.6} \cdot \frac{3}{2.4} \frac{a'^2 e'p (p^2 + q^2)^2 r^3}{(a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} + \\ & + \frac{3 \dots 11}{2 \dots 10} \cdot \frac{3.5}{2.4.6} \frac{a'^2 e'p (p^2 + q^2)^2 r^3}{(a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} + \text{etc.} \end{aligned} \right.$$

hvarvid lagen för utvecklingen är tydlig.

I föregående expressioner hafva p' och q' följande betydelse:

$$rp = ax - \beta y, \quad x = a (\cos u - e),$$

$$rq = -\gamma x + \delta y, \quad y = a \sqrt{1 - e^2} \sin u,$$

$$a = \cos \omega' \cos \omega + \sin \omega' \sin \omega' \cos I,$$

$$\beta = \sin \omega \cos \omega' - \cos \omega \sin \omega' \cos I,$$

$$\gamma = \sin \omega' \cos \omega - \cos \omega' \sin \omega \cos I,$$

$$\delta = \sin \omega \sin \omega' + \cos \omega \cos \omega' \cos I.$$

hvarvid, såsom förut, I betecknar kometbanans lutning till planetbanan och ω, ω' båda banornas perihelii-afstånd ifrån kometbanans uppstigande nod på planetbanan.

För finandet af elementernas sekulära variationer är det nödvändigt att differentiera R_1 med afseende på ω, ω', e och I , samt att sedan integrera det erhållna resultatet med afseende på tiden t . Så har man till exempel

$$\delta e = -\frac{an\sqrt{1-e^2}}{e} \int (A_0 + A_1 \cos u + A_2 \cos 2u + \text{etc.}) dt$$

hvarvid

$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{dR_1}{d\omega} du; \quad A_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{dR_1}{d\omega} \cos u du; \quad \text{etc.}$$

De sistnämnde integralerna erhållas genom användning af elliptiska funktioner. Införes nemligen

$$r = a(1 - e \cos u), \quad \text{Tang}^2 \frac{1}{2} u = \frac{\alpha}{\beta} \text{Tang} \frac{1}{2} \psi;$$

hvarvid

$$\frac{\alpha^2 + a^2(1-e)^2}{\alpha^2 + a^2} = \alpha^2, \quad \frac{\alpha^2 + a^2(1+e)^2}{\alpha^2 + a^2} = \beta^2,$$

så erhålles

$$(d) \quad \int_0^{2\pi} \frac{du}{(\alpha^2 + r^2)^{\frac{2n+1}{2}}} = \frac{R^{2n}}{\sqrt{\alpha\beta}(\alpha^2 + a^2)^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^{2\pi} \frac{(1 + \mu \cos \psi)^{2n}}{(1 - c^2 \sin^2 \psi)^{\frac{2n+1}{2}}} d\psi$$

$$\text{om } k = \frac{\alpha + \beta}{2\alpha\beta}, \quad \mu = \frac{\beta - \alpha}{\alpha + \beta}, \quad c^2 = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 4}{4\alpha\beta}.$$

Dessutom har man

$$\cos u = \frac{\mu + \cos \psi}{1 + \mu \cos \psi}, \quad \sin u = \frac{\sqrt{1 - \mu^2} \sin \psi}{1 + \mu \cos \psi}.$$

och, om $1 - e\mu = f$, $e - \mu = g$,

$$1 - e \cos u = \frac{f + g \cos \psi}{1 + \mu \cos \psi}, \quad \cos u - e = \frac{f \cos \psi - g}{1 + \mu \cos \psi}.$$

Integralen i högra membrum af eqvationen (d) låter, som bekant är, uttrycka sig genom elliptiska funktioner. Då vidare värdet på $\frac{dR_1}{d\omega}$ och öfriga differentier af R_1 utgöras af termer, hvilka alla hafva formen

$$\frac{B}{(\alpha^2 + r^2)^{\frac{n+1}{2}}}$$

hvarvid

$$B = f(\cos u, \sin u, a, e),$$

så inses lätteligen, att de alla kunna uttryckas genom elliptiska funktioner.

Till den numeriska användningen af föregående formler skall jag hafva den äran att återkomma vid ett annat tillfälle och inskränker mig för det närvarande till följande anmärkningar.

I värdet på medellongituden kan en term, fortgående efter andra digniteten af tiden, blott uppkomma genom de perturbationer af andra ordningen, hvilka tillhöra epoken. Om nemligen i perturbationerna af första ordningen för epoken, hvilka fortgå proportionellt med tiden, insättas de variationer af elementerna, hvilka äfven äro proportionela mot tiden, så måste en term fortgående efter andra digniteten af tiden uppkomma.

Vid en ungefärlig beräkning har jag funnit, att den sekulära förändringen i den Enckeska kometens excentricitet, så vidt den härflyter utur asteroidernas attraktioner, måste för det närvarande vara negativ; således

$$\delta e = -f. \text{ konstant.}$$

Genom Jupiters och Saturni hufvudsakliga inverkan uppkommer i värdet på epoken en term, proportionel med tiden, och som adderar sig till kometens anomalia media nt . Om i densamma värdet på δe insättes, så måste en term uppkomma, som aftager med tidens kvadrat. Huruvida denna term tillika eger erforderlig storlek att förklara det anmärkta förhållandet i kometens omloppstid är en annan fråga, och som beror hufvudsakligen af det värde man gifver asteroidernas massor och den gemensamma banans excentricitet. Häremot kan visserligen å ena sidan anföras, att observationerna icke antyda någon betydligare förändring i kometbanans excentricitet, äfvensom att värdet på asteroidmassorna icke kan obetingadt ökas utöfver, hvad som står tillsammans med deras inverkan på de närmaste planeterna, men å andra sidan är det icke nödvändigt att tillskrifva denna orsak ensam hela den observerade förminskningen i omloppstiden, emedan den till en del äfven bör kunna för-

klaras genom de perturbationer af *första ordningen*, som asteroiderna utöfva på omloppetiden eller epoken; dessutom måste äfven ban-elementerna utfalla annorlunda, om ethers motstånd negligeras. Nödvändigheten af en korrektion i den *Encke'ska* komets omloppstid kan af observationerna anses till fullo bevisad, så likväl icke denna korrektions form. Så vidt nemligen detta bevis grundar sig på apparitionerna 1805, 1795 och 1786, blifva dessa observationer bättre satisfierade, om man antager den sökta korrektionen periodisk, omfattande cirka 72 omlopp af kometen; ehuru visserligen förklaringen icke derigenom blir lättare.

Jag har i det föregående antagit, att det resisterande mediet vore samma ether, hvars tillvaro förklaringen af ljusets och värmets fenomen förutsätter såsom nödvändig; man skulle äfven kunna antaga, att det resisterande mediet vore de yttersta lagren af den solens atmosfär, hvilken genom sin ljusreflexion sannolikt bildar den så kallade *coronan* vid totala solförmörkelser. Dervid inträffar likväl, att denna atmosfär måste deltaga i solens rotation och att derigenom dess motstånd måste bli omärkligt.»

2. Sällsamma mineralier från Elfdahls härad i Wermland. — Följande iakttagelser af Hr L. L. IAGLSTRÖM föredrogos af Hr L. SVANBERG.

»Elfdahls härad i Wermland, af mig undersökt de två sistförflutna åren, består till sin hufvuddel af de i Sverige allmänna slagen af rödaktig gneiss och granitartad gneiss. Hyperstenfels finnes mycket allmänt efter Elfdahls härads vestra gräns, bildande höga, svarta bergskammar, hvilka vanligen äro omgifna af röd finkornig och svart hornblendegneiss. Såsom enstaka företeelser visa sig svart hälleflinta, felsit-porfyrr, kvartsfels, diorit, dioritskiffer, syenit, trapp, hvit glimmerskiffer, glimmerrik gneiss, innehållande oligoklas, kalkspatlager o. s. v.

Elfdahls härad erbjuder i allmänhet för mineralogen fåga anmärkningsvärdt. Endast ett berg gör härifrån undantag, nämligen Horrsjöberget, i Ny socken, och torde detta därför förtjena en närmare skildring i hänseende till dess mineralogiska samt geognostiska förhållanden.

Horrsjöberget ligger ungefär $1\frac{1}{2}$ mil i vester från Klar-elfven, samt $\frac{1}{2}$ mil i norr från sjön Brevisten, i den bergsträckning, som bildar högsta ryggen af landet emellan Klara elf och Wägsjöforss bruks vattendrag i Fryksdahls härad. Berget är i sig sjelft icke serdeles högt, ehuru det har högt läge. Dess längd är ungefär $\frac{1}{2}$ mil, samt bredden vid pass hälften af längden. Sträckningen går från S.S.O. till N.N.V., det är parallelt med allmänna bergsträckningen i Elfdahls härad.

Horrsjöberget består af hyperstenfels och himmelsblå quartzfels samt af hvit glimmerskiffer. I hyperstenfelsen uppträda större massor och gångar af en bergart, hvilken består af grönt hornblende, en hvit fältspatsart, svart glimmer och brunröd granat. Hyperstenfelsen intager ungefär hälften af berget; den himmelsblå quartzfelsen andra hälften, öfvergående i södra och norra ändarna till hvit, stundom blå glimmerskiffer.

Quartzfelsen i Horrsjöberget är i större eller mindre grad tjockskiffrig, stundom till utseendet helt och hållit massformig. Den bildar flera små, från hvarandra skilda kullar, hvilka, i skarp begränsning, ligga omgifna af hyperstenfelsmassorna. Denna skarpa begränsning emellan de båda olika bergarterna är tydligt synbar vid östra och vestra sidorna af sådana små himmelsblå quartzfelskullar. I norra och södra ändarne af dem, öfvergår quartzfelsen i glimmerskiffer, och denna torde i sin ordning öfvergå i allmän rödaktig grof gneiss. Quartzfelsens vackra, himmelsblå färg härrörer från inblandning af kyanit, hvilken är bladigt fördelad i quartzmassorna och meddelar åt dem (stundom tillika med hvit glimmer) benägenhet till tjockskiffrighet, eller egenskapen att falla i tjocka bänkar. Kyaniten utskiljer sig ofta ren, isynnerhet på sådane ställen, der rutil finnas i större körtlar. Den rent utskilda kyaniten har vid

analys, utförd af mig på Hr Professor L. F. SVANBERGS laboratorium, befunnits innehålla på 400 delar:

Si	40,02.
Al	58,46.
Fe	2,04.
	<hr/>
	400,52.

Eg. vigten är = 3,48.

Rutil förekommer mycket allmänt i Horrsjöbergets kvartzfels, dels fint insprängd, dels i korn af en ärts storlek; sällsyntare i körtlar af några tums diameter. Sådane stora körtlar finnas vanligen tillsammans med större utskiljningar af ren kyanit. Horrsjöbergets rutil är brunröd samt ger gult pulver. Vid en kvalitativ analys, af mig anställd, befanns titansyran* i honom vara orenad af blott litet jern och mangan.

Ett indigolith-lik mineral *) är i Horrsjöbergets kvartzfels lika allmän som rutil. Båda uppträda ofta ganska intimt blandade, så att rutilen sitter insprängd såsom små korn i körtlar af det kristalliniska indigolithlika mineralet. I några bland Horrsjöbergets himmelsblå kvartzklippor finnes så mycket af detta mineral, dels i korn, dels i körtlar och ådror, att sådane klippor deraf bekomma en skön indigoblå marmorering, och skulle lemna ett vackert byggnadsmaterial för yttre beläggningen af palatser m. m. Nämnede mineral är vanligen mikrokristalliniskt, sällan tätt. I det täta tillståndet är det funnet sittande i små utskiljningar af rent hvit kvartz samt bildar stundom ofullkomliga sexsidiga prismer af en tums tjocklek och två tums längd; och visa sådane prismer, ibland, en påbeggynnande metamorfosering till en hvit massa. Den täta varieteten är den vackraste, och liknar fullkomligt, med undantag af brottets glasighet, en skön indigofärg. Utom på andra ställen i Horrsjöberget är den täta varieteten funnen, ehuru sporadiskt, sitta i den pyrophyllitgång, som längre fram skall beskrivas.

På

*) Enligt preliminära försök innehåller detta mineral fosforeyra, och, såsom det synes mig, i väsentlig mängd.

På ett ställe i Horrsjöberget påträffades ett mineral, kristalliseradt i sexsidiga prismor, hvilket till det yttre visade stor likhet med turmalin, men det oaktadt icke torde vara turmalin.

Titanjern är af nästan lika stor utbredning i Horrsjöbergets kvartzfels som rutil, och sitter vanligen insprängdt i form af små korn, uppgående till högst ett hampfrös storlek. På ett ställe fanns insprängningen ovanligt samlad och titanjernkornen omvexlade likformigt med korn af kvartz och glimmerblad i hela schickter, och var det i en aflossning mellan tvenne sådana schickter som nyss omnämnda turmalinlika mineral förekom. Sällan förefinnes titanjernet utskildt rent i körtlar, och äro dessa af högst en tums diameter. Titanjernet liknar fullkomligt till färgen magnetisk jernmalm, men attraheras knappt märkbart af en stark hästsko-magnet. Enligt af mig på Hr Professor L. F. SVANBERGS laboratorium gjord analys har det befunnits innehålla på 100 delar:

Fe	84,24.
Ti	15,76.
	<hr/>
	100.

Pyrophyllit förekommer i en gång af en fots bredd, genom sättande en i tjocka bänkar fallande hvit, stundom svagt himmelsblå kvartzfels. Schicktningen af denna kvartzfels förorsakas af hvita tunna glimmerlager, som ligga emellan de tjocka kvartzlager. Gången är fylld af kyanit, färglös kvartz, och silfverhvit, för känseln fet, glimmer; och blott sporadiskt har jag funnit närvaron af det täta indigolithlika mineralet samt lameller af jernglans^{*)}. Dessutom förekommer inom denna gång ett mineral i blekröda halfgenomskinliga kristaller, hvilket efter all sannolikhet är ett nytt mineral, att dömma af de kemiska

*) Pyrophylliten sitter i glimmern, sällsyntare genomväfva dess strålar kyaniten. Den är hvit till färgen, i koncentrisk kulor ofta, och ger för blåsörret de för kyaniten egna ormlika krusningar vid blåsörrelägens första påkomst.

undersökningar, som jag hittills hunnit verkställa af detta mineral, men hvilka ännu icke äro fullt afslutade. Dessa undersökningar hafva ådagalagt, att det ifrågavarande mineralet innehåller vatten, svafvelsyra, fosforsyra jemte lerjord och enatomiga baser. Jag torde framdeles få äran närmare redogöra för detta mineral i sin helhet, när de kemiska undersökningarne af detsamma blifvit afslutade.

Svafvelkis finnes sällan i Horrsjöbergets kvartzfels, men dess fordna tillvaro der skönjes dock deraf, att kvartzfelsen på flera ställen är rostbrun genom förvittrad svafvelkis. Almandin är sällsynt, men der den finnes, förekommer den i stora rhomb-dodecaëdriska kristaller.

Vid Ruskåsens gård, en mil norr om Horrsjöberg, finnes en kulle af kvartzfels, som hyser emellan sina aflossningsytor ett blått bladigt, stråligt mineral, hvilket sannolikt icke är annat än kyanit.

Vid Näsberget på östra sidan om Halgån finnes en långsträckt kulle af mörkgrön glimmerrik gneiss, inströdd med smutsigt hvitgröna korn af oligoklas. I denna gneiss förekomma ådror, innehållande kopparkis, svafvelkis, flusspat, kalkspat, kvartz och tungspat. Tungspaten har af mig blifvit kvalitativt undersökt.»

3. Fotografi på koppar. — Hr EDLUND meddelade följande af Hr G. CARLEMAN anställda försök:

»Chlorsilfrets bekanta egenskap att förändra färg då det en tid varit utsatt för ljuset, äfvensom likartade förhållanden hos guld- och platinachlor-föreningar föranledde mig att undersöka andra elektronegativa metallers föreningar med chlor i afseende på deras förhållande i solljuset, och då chlorkoppar dervid lemnat anmärkningsvärda resultater, vill jag nu i korthet redogöra för utgången af några sådana undersökningar.

Om man lägger en väl polerad kopparplåt öfver ett kärl, ur hvilket chlogas långsamt utvecklas, så finner man plåten efter kort tids förlopp börja ändra färg. Den öfvergår i gult, derefter i blått, sedan från rött åter i gult och blått; vid denna andra färgskiftning är plåten känsligast för ljuset, och om en del af den betäckes med ett ogenomskinligt föremål, är en exposition under några sekunder i solljus tillräcklig för att märkbart svärta den obetäckta delen. En gravyr, eller dylikt, lagd på plåten, och utsatt för ljuset, afbildas efter en timmas förlopp negativ på svart botten.

Det bekvämligaste sättet att chlorera plåten är att lägga den öfver ett kärl, innehållande chlorvatten. Man kan äfven begagna sig af den chlogas som frigöres under metallers upplösning i salpetersyra, men plåtens färgskiftning kan i alla dessa fall sällan iakttagas, i anseende till den för häftiga chlorutvecklingen. Tydligast visa sig färgerna då man upplöser guld i denna syreblandning och plåten deröfver långsamt får anlöpa.

Om man vill åstadkomma ett tjockt öfverdrag, som motstår rifning och nötning, är bäst att chlorera plåten sålunda, att den öfverdrages med en lösning af kopparchlorur i saltsyra, som, efter att några sekunder hafva utöfvat sin verkan, afhållas, hvarefter plåten sköljes med vatten och aftorkas; den bör då hafva en ljus brunröd färg utan någon dragning i svart.

Den chlorförening, hvarmed en, på något af nu omnämnda sätt behandlad kopparplåt blifvit öfverdragen, är kopparchlorur och dess svartblifvande i ljuset är sannolikt en blott förändring af moleculernas läge till hvarandra och ej någon kemisk förening eller sönderdelning, såsom förhållandet är vid chloresilvers svartande och reduktion genom ljuset.

Den hvita kopparchloruren, förvarad i en skål under vatten, förblef hvit i mörkret; en annan del, förvarad under vatten, svartnade snart i ljuset och behöll äfven, sedan den under vatten blifvit försatt i mörkt rum, sin svarta färg en längre tid.

Förvarade på ett mörkt ställe, förblifva bilderna oförändrade under flera månader, stundom hela år, men slutligen

bleknar den svarta färgen och hela plåten blir sådan den var före utställningen för ljuset.

Om plåten, sedan bilden derpå erhållits, öfverdrages med en genomskinlig etsgrund, har kopparstickaren besparat både arbete och tid genom den trogna och hastigt tillkomna kalke-ring, han på detta sätt åstadkommit.

På en amalgamerad kopparplåt har jag genom dess ut-sättande för chlogas och sedermera skeende exposition i solljus, erhållit rätt tydliga bilder, men qvicksilfrets svärtande har dock ej blifvit så intensivt som kopparens.

Metaller af mera elektropositiva egenskaper, såsom tenn, jern, zink m. fl. hvilka i form af plåt blifvit på nyssnämnde sätt behandlade, hafva ej afficierats af ljuset.»

4. *HYRTL, om Monotremernas arterie-system.*

— Hr A. RETZIUS redogjorde för det i Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch., mathemat. u. naturwissenschaftl. Classe, V, 1, Wien 1853, införda arbetet af Prof. J. HYRTL, Das arterielle Gefäss-system der Monotremen.

»Det har lyckats förf., som vi förut hafva att tacka för så viktiga arbeten öfver ådersystemerna m. m., att verkställa lyckliga injectioner på Echidna och Ornithorhynchus, oaktadt utan tvifvel de specimina, han haft tillgång till, varit förvarade i spiritus. Beskrifningarna äro serdeles noggranna och fullständiga, utan all vidlyftighet. Pulsåderna hos båda dessa djur förete den märklige egenheten, att de fördela sig, icke såsom hos flertalet af djur och hos menniskan, i vanliga förgreningar, utan i talrika qvastar och undernät, något liknande fördelningen hos Bradypus. Alla de arteriela näten åtföljas af motsvarande vennät, som mycket öfverträffa arternäten i vidd, så att deras lumina hos Ornithorhynchus äro 20 till 30 gånger större än de motsvarige arterernas. Hos Echidna går en stor truncus

anonymus på högra sidan från aortabågen. A. subclavia, som utgår från denna truncus, afgifver en stor a. cervicalis ascendens med lika stort lumen som den delen af hufvudådern, hvilken går till armen. På venstra sidan utgår a. carotis, cervicalis ascendens och subclavia från aorta hvar för sig. A:æ mammariae internæ komma från carotides communes, liksom a:æ thyreoideæ inferiores. Hos Ornithorhynchus förhålla sig de ur aortabågen utgående stammarne såsom hos människan. För öfrigt framställa dessa för klarhet och redighet utmärkte beskrifningar så många egenheter och märkvärdigheter, som endast i detaljer kunna framställas, att Ref. hänvisar dem, hvilka intressera sig för ämnet till sjelfva acterna, hvilka äro illustrerade med trenne vackra taflor.»

5. Cranier af Avarer och Hunner. — Densamme anförde följande i anledning af FITZINGERS afhandling: Ueber die Schädel der Avaren, insbesondere die in Österreich aufgefundenen (Wien. Denkschriften V, I, 1853).

»Som bekant är, förvaras i de flesta större anatomiska museer ett gipsaftryck af ett sannolikt med konst egendomligt formadt cranium, till hvilket originalet blifvit funnet vid Grafenegg i Österrike, och som af dess egare, Grefve August von BAZUNER ansetts hafva tillhört ett individ af de, från medlet af sjetten till slutet af åttonde århundradet i denna trakt boende avariska Hunnerna. Redan för flera år sedan erhöill äfven Carolinska Institutets museum ett sådant specimen i gips af den om anatomiska vetenskapen så högt förtjente Prof. JOSEPH HYrtl i Wien. Öfver detta cranium meddelade Ref. 1844 i Kongl. Vetenskaps-Akademien en beskrifning, som följande år blef införd så väl i HORNSCHUCHS *Archiv Skandinavischer Beiträge zur Naturgeschichte*, som i MÜLLERS *Archiv für Physiologie*. Ref. visade härvid, att detta cranium, som blifvit ansett utmärkt för sin längd, väl var utmärkt högt, men dere-

mot kort, eller af den brachycephaliska formen, till hvilken äfven Avarernas, såsom med Finnarnes beslägtade craniiform måste höra. Denna åsigt fann då föga bifall, emedan kort derefter den för sina resor och forskningar i Syd-Amerika bekante Doctor TSCHUDI med så mycken säkerhet förklarade ifrågavarande hufvudskål vara af peruvianskt ursprung, och ansåg den vara med andra samlingar af naturalier från Peru öfverförd till Österrike. TSCHUDIS åsigt vann flera anhängare, och frågan om det forntida bruket i den gamla världen, att artificiellt forma hufvudet, lemnades för en tid utan afseende. Genom den utmärkt grundliga afhandling, som vi här hafva för oss af Doctor FITZINGER har det blifvit satt utom allt tvifvel, att det vid Grafenegg funna craniet tillhört ett individ af landets fordna invånare. Han har icke allenast fullständigt utredt alla de viktigare omständigheterna rörande denna hufvudskål, utan yttermera erhållit en annan alldeles dylik ifrån Atzgerrsdorf, äfven i Neder-Österrike, $4\frac{1}{2}$ mil från Wien. Denna hade der blifvit uppgräfd i närvaro af ortens läkare, Doctor MÜLLER. Så väl detta cranium som originalet till det förstnämnda befinna sig nu i det kejsarl. anatomiska museet i Wien.

Förf. anför likheten emellan dessa cranier och dem som blifvit funna på Krim, samt beskrifna af Hrr RATHKE och CARL MEYER. Han citerar HIPPOCRATIS uppgift (de ære aquis et locis Lib. 4) om de så kallade macrocephali eller de Skyther, i närheten af mæotiska träsket, som hade artificiellt formade hufvudskålar. Vidare citeras POMONIUS MELA (de situ orbis Lib. I cap. 19), som uppgifver, det bruket att artificiellt förändra hufvudets form funnits bland invånarne kring Bosphoren; PLINIUS den äldre, som uppgifver macrocephali ibland invånarne i närheten af Ceresus, nutidens Keresum vid Svarta hafvet, i Natolien; liksom STEPHANUS BYZANTINUS (Geographica), hvilken uppgifver dessa macrocephaliska Skyther bland inbyggarna i Colchis, nutidens Mingrelien på östra sidan om Svarta hafvet. Han anför äfven ur STRABO (Lib. II, cap. 46) Derbikkerna på Caucasus, emot Caspiska hafvet och Sigynnerna, mediska koloni-


ster, som skola hafva bott i Donau-dalen vid Isterfloden, såsom folkstammar, hvilka hafva haft för bruk att omforma hufvudet sålunda, att pannan blef framskjuten.

Den värde författaren anför äfven en annan märkelig omständighet i sammanhang med beskrifningen af dessa hufvudskålar, nemligen en medalj af okänt ursprung, föreställande staden Aquilejas förstöring af ATTILA. Framsidan af denna medalj visar ATTILAS bild, i profil, företeende samma form som de här omtalta Avar-cranierne. Samma medalj i guld finnes äfven i det Kongl. Myntkabinettet i Stockholm, der Ref. genom Hr Riks-archivarien HILDEBRANDS bevågenhet, fått tillfälle att se densamma, och att instämma i Hr Doctor FITZINGERS yttrande.


Jemte dessa vigtiga upplysningar, rörande de egendomligt formade Avar-cranierne, innehåller denna grundliga afhandling äfven en närmare undersökning om de i Calvarien-berget i Wiener-Wald funna mennisko-cranier, som af Grefve RASUMOWSKY blifvit beskrifna i OKENS Isis 1830, såsom företeende en egen form, och hvilka Ref. i sitt nämnda föredrag oriktigt förmodat vara af samma form som Avar-hufvudskålarna. Dessa cranier har Doctor FITZINGER skaffat sig tillfälle att undersöka, och visar, att de förete den slaviska hufvudskåls-formen. Den serdeles grundliga och lärda afhandlingen är upplyst af fyra skönt utförda taflor, af hvilka tvenne öfver Avar-cranierne och tvenne öfver de sistnämnda slaviska från Calvarie-berget.

En fullkomlig öfverensstämmelse med ofvan omtalade Avar-cranier företer en i Schweitz funnen hufvudskål, hvaraf Hr TROYON hade tillsändt Hr A. RETZIUS ritningar, af hvilka härnedan meddelas copior reducerade till fjerdedels storlek.

Originalen förvaras i Hr TROYONS archeologiska samlingar på hans gård Bel-air, i Canton Vaud, nära Lausanne. Craniet fanns i botten af en grafhög af mycket hög ålder; inga ornament eller redskap funnos i dess närhet. Bland mer än 200 grafhögar, som Hr TROYON undersökt i grannskapet, var detta det enda i sitt slag.



Hr TROYON meddelar vid samma tillfälle underrättelse om fynd af flera sådana cranier vid byn St Romain i Savoyen, i dylika grafhöggar, äfven utan åtföljande ornament och redskap. Dessa cranier voro så skadade, att de föllo sönder kort efter upptagningen. Det har dock lyckats att bevara en öfverdel, som eges af Doctor GossE i Geneve. En ritning af denna, i fjerdedels storlek, är Ref. äfven, genom Hr TROYONS godhet, i tillfälle att här meddela.



- a* sutura coronalis;
- b* sutura sagittalis;
- c c* sutura lambdoidea;
- e* tuber supraorbitale;
- f* tuber parietale;
- g* pars squamosa ossis occipitis;
- h h h* en stor lucka på venstra sidan efter den bortfallna tinningdelen.

Det tyckes på intet sätt kunna betviflas, att ju dessa cranier hafva tillhört samma folk, som de österrikiska Avarerna, hvilka sannolikt åtföljt ATTILAS här.

I sammanhang härmed torde äfven förtjena anföras, det Prof. DUVERNOY i Paris meddelat Ref. en ritning och beskrifning på ett högt brachycephaliskt cranium af mycket hög ålder, som blifvit år 1849 funnet icke långt under jordytan vid gräfning för en väganläggning i Doubs-dalen, icke långt från Mandeuse. Prof. DUVERNOY yttrar sjelf den öfvertygelsen, »att det tillhört en af ATTILAS krigsmän,» emedan i denna trakt ruinerna af en gammal, af ATTILA förstörd, romersk stad äro belägna. Det har fullkomligen formen af ett finskt cranium, icke pressadt.

Hvilken förvåning väckte ej de missformade hufvudskålar af Huanches-Indianer, som PENTLAND hemförde från Titicaca i Peru? Hvilken förvåning väckte ej de många olika konstgjorda craniiformer som blefvo bekanta genom MORTONS verk: »Crania Americana?» Man ansåg denna orimliga, barbariska sed endast tillhöra de vilda hedningarne i Amerika.

Sedan genom Grafenegger-craniet uppmärksamheten blifvit väckt på frågan, huruvida icke samma barbariska bruk äfven i gamla världen egt rum, hafva flera och flera, denna sats bekräftande vittnesbörd framträdt i dagen. Säsom man ser af det föregående, hafva vi egt vittnesbörden härom i våra händer hos gamla författare från forn- och medeltiden, utan att på dem gifva akt.

Till de viktiga data, hvilka Doctor FITZINGER framlaggt, begagnade Ref. tillfället att ytterligare göra ett par tillägg.

I det förträffliga historiska arbetet af AMÉDÉE THIERRY, om ATTILA, hvaraf Ref. endast kände Doctor EDWARD BURCKHARDTS öfversättning: »ATTILA, *Schilderungen aus der Geschichte des fünften Jahrhunderts, Leipzig 1852*, anføres, sedan författaren visat, att väl de egentliga Hunnerna voro Finnar från Ural och Wolgadalen, men att med dem voro under samma öfverherrskap förenade Turkar och efter all sannolikhet Mongoler, utom

sednare Slaver o. fl., att ATTILA själf, jemte en del af sitt folk, blifvit skildrad efter den kalmuckiska typen. I en not pag. 45 yttras här om, samt om bruket att artificiellt ombilda hufvudskålen följande:

»Den bild man lemnat oss af ATTILA är mer den af en Mongol än af en uralisk Finne. Vi veta dessutom af historien, att en del af Hunnerna begagnade konstiga medel för att gifva sina barn en mongolisk fysiognomi, i det de platt-tryckte näsan med starkt åtdragna linneband, jemte det de sammanpressade hufvudet, för att göra kindbenen utstående.»

»Hvilken förnuftig grund kunde väl detta bizarra bruk hafva, om icke bemödandet att närma sig en menniskoform som bland Hunnerna stod i större anseende, med ett ord, att närma sig den aristokratiska racen? Den af romerska skriftställare uppgifna afsigten, att bereda hjelmen bättre fäste på hufvudet, kan knappast antagas såsom alvarligt menad. Det är mera sannolikt, att sedan Mongolerna blifvit herrar öfver Hunnerna, den mongoliska fysiognomien blef det pris, hvarmed aristokratiska utmärkelser voro förenade; man sökte därför att närma sig denna form; man ansåg det för en heder att så missbilda sig, för att erhålla utseende af att leda sitt ursprung från den herrskande racen. Detta är den sannolikaste grunden för dessa onaturliga tillformningar, hvilka historiska författare så utförligt omtala.»

Denna åsigt af saken öfverensstämmer fullkomligen med den som Ref. framställt i »*Frenologien bedömd från en anatomisk ståndpunkt*», äfvensom Prof. ESCHRICHT »*Angående Betydningen af Hjernes skallens og hele Hovedets Formforskjellighed* (Skand. Naturf. Sällsk. Förhandl.), i anledning af ifrågavarande bruk bland de amerikanska vildarne.

Vi se sålunda flere och flere spår dertill, att detta förvända bruk fordom varit temligen allmänt utbreddt i den gamla världen, och man torde efter THIERRYS auktoritet kunna förmoda, att det förnämligast, och kanske ursprungligen, tillhört

Mongolerna, bland hvilka detsamma dock numera, så vidt Ref. hade sig bekant, icke finnes kvar.

Det torde därför så mycket mer förvåna mången, som intresserar sig för studium af craniets former hos olika folkslag, att erfara det ifrågavarande barbariska bruk ännu finnes kvar i ett af Europas mest civiliserade länder nemligen i Frankrike. Vi erhålla nemligen härom ganska intressanta upplysningar i Doctor FOVILLES *Traité complet de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie du système nerveux cérébrospinal*. 1:re partie, Anatomie, Paris 1844, pag. 632, art.: »*Déformation artificielle du crâne*» etc. samt Atlas, Pl. 23, fig. 1, 2.

Doctor FOVILLE yttrar neml. »Dans plusieurs parties de la France, on coiffe les nouveaunés de bonnets fixés sur la circonférence du crâne lui-même. Tantôt on commence par l'entourer d'un étroit et long triangle de toile, qui décrit plusieurs tours avant d'être arrêté, et par dessus ce serre-tête ou bandeau on place un bonnet rond à coulisses, dont les cordons sont serrés suivant la même circonférence que ce serre-tête lui-même. Cette pratique est très-commune en Normandie. Dans d'autres provinces, on ne commence pas par entourer la tête d'un bandeau; on la couvre d'un bonnet rond, et ce bonnet se trouve ensuite assujetti par un nombre variable de tours de bande méthodiquement jetés depuis les bosses frontales jusqu'aux bosses parietales. C'est ainsi qu'on agit à Toulouse et dans une grande étendue des pays voisins. — — — — —

Une constriction circulaire, suffisante pour fixer la coiffure ne peut manquer de faire céder la tête si tendre à cet âge. Ce qu'elle perd alors en largeur, elle le gagne en excès de longueur; et c'est ainsi que se trouvent produits ces crânes allongés et cylindroïdes (voy. pl. 22 et 23, fig. 1), quelquefois même étranglés dans le milieu de leur longueur qu'on rencontre en proportions variables dans presque toutes les maisons d'aliénés de France, mais surtout dans celles des départemens où la méthode adoptée pour la coiffure des enfans implique une constriction circulaire. — On trouve des personnes du Limousin,

de Bretagne, du Nord et du Nord-Est de la France avec une déformation évidente du crâne dont la cause ne peut être douteuse. — — À Paris, où se trouvent rassemblés des habitans de toutes les parties de la France, toutes les habitudes de nos provinces se trouvent importées, et les déformations du crâne produites par les coiffures vicieuses ne sont nullement rares.»

Planchen 23 visar trenne profil-porträtter af qvinnor från Normandiet, hvilkas cranier äro sålunda formade, till mycken likhet med de hunniska.

Doctor FOVILLE har såsom Öfverläkare vid de stora kuranstalterna för sinnessjuka i Departementet Seine-inférieure och Charenton varit i tillfälle att undersöka cranie-formen hos ett stort antal af landtfolk. Han har härvid träffat icke få individer med sålunda artificiellt formade cranier. Ehuruväl han yttrar den åsigt, att missformningen icke stör hjernans funktioner, tror han dock att den icke sällan befrämjar oordningar i desamma, som öfvergå i sinnesrubbing. Detta öfverensstämmer ej, så vidt man kan sluta af MORTONS skrifter, med erfarenheten om förhållandet bland de amerikanska Indianerna. Mera troligt är att den värde författaren här tagit post hoc för propter hoc.

Han uppgifver, som vi se, tvenne olika sätt att verkställa omvirningen på hufvudet. Man kan ej af hans uppgifter finna, att det anförda förfaringssättet har för afsigt att missbilda hufvudet. Man skulle snarare tro, att detta bruk i Frankrike omedvetet kvarstår såsom ett arf från den råa hedendomen, samt, liksom många andra inrotade vanor och fördomar, först genom serskildta tillfälligheter kommer att försvinna.

Man anser vanligen Normandiets invånare vara Norrmänner, men det är sannolikt att den befolkning, som före Norrmännens ankomst bebodde landet, icke är utdöd. Det är tvertom troligt, att här liksom i många andra länder, den äldre befolkningen kvarstår jemte den mera aristokratiska herrskare-stammen. Denna sednare har, såsom Ref. sjelf varit i tillfälle öfvertyga sig, troget bibehållit sina förfäders, Norrmännens typ.

Den berömde författaren, som här sist citerats, utgör själf derpå ett vackert bevis. Ref. tror icke, att hufvudpressningen härleder sig från Norrmännen. De i fig. 1, 2, pl. 23 afbildade hufvuden visa icke heller ringaste likhet med den norska dolichocephaliska typen, utan antyder snarare en brachycephalisk. — Den hufvudskål, som afbildas på pl. 22 är, enligt Ref. åsigt, af en äkta gaulisk typ, låg, lång, dolichocephalisk, icke artificiellt formad. Den är tagen på en kyrkogård vid Paris och man känner ingenting om den person den i lifstiden tillhört.

Att missbruket uppgifves vara allmänt i Bretagne, det gamla grefskapet Toulouse och flera länder der den celtiska stammen är rådande, är ganska anmärkningsvärdt; men äfven dessa länder hafva före Celterna varit befolkade af Iberier. I Bearn, der den gamla iberiska befolkningen ännu är rådande, skall, enligt Doctor FOVILLE, virningen af de späda barnens hufvud icke brukas.

Efter anförandet af alla dessa facta framställer sig lätt den frågan: är detta bruk af sig själf uppkommet i de stora kontinenterna, i den gamla och nya världen, eller kunna dessa facta lemna något vittnesbörd om forntida förbindelse emellan dessa kontinenter? Ref. hoppades vid ett annat tillfälle få återkomma till denna fråga.»

6. *Analys af ett jodhaltigt svenskt mineralvatten.* — Hr ERDMANN meddelade ur en skrifvelse från Hr E. W. OLBERS, dat. Lilla Edet och Tösslanda d. 29 December 1853, följande underrättelser om ett såväl i medicinskt, som geologiskt hänseende serdeles intressant källvatten, hvars analytiska undersökning Hr OLBERS gemensamt med Apotekaren SVANGREN verkställt:

»Sedan jag under sistlidne sommar i förening med Apotekaren L. SVANGREN på Lilla Edet företagit analys af den s. k. *Torpa saltkällas* vatten, som i flera afseenden synt mig anmärkningsvärdt och förtjenande att blifva mera bekant, tager

jag mig nu friheten härmed delgifva resultatet af våra undersökningar.

Till en början får jag nämna, att källan, som i orten är bekant under namn af Torpa saltkälla eller den salta källan vid Torpa, är belägen på säteriet Torpas ägor uti Fors socken af Flundre härad i Elfsborgs län, $\frac{1}{4}$ mil norr om Lilla Edet och så nära stranden af Götha elf, att dennes vatten ofta inflyter i källan och, endast vid lågt vattenstånd i elfven, källans vatten kan fås oblandadt. Till följd deraf varierar proportionen af de i källans vatten lösta salterna ganska betydligt, hvilket både af smaken kan förnimmas och ännu tydligare genom vattnets egentliga vikt, som jag under Juli månad detta år fann vara = 1,0084, under sisl. October = 1,0122 samt ett par andra gånger = 1,006 och 1,0089, allt detta vid en temperatur af $+16^{\circ}$ Cels. Vattnet är klart och har stark salt smak. Dess temperatur har endast en gång blifvit bestämd och fanns då vara $+11^{\circ}$, vid $+15^{\circ}$ luftvärma i skuggan.

Källan, som icke gifver synnerligt mycket vatten, har mig veterligen aldrig varit begagnad till brunnsskickning, men förre egaren af Torpa, Kapten F. VIRGIN, begagnade vattnet till badning, såsom substitut för hafsbad, och lät fördenskull för några år sedan öfverbygga källan med ett enkelt badhus, till hvilket vattnet uppfordrades med en pump. Han sade sig af dessa bad röna en välgörande verkan. För öfrigt har jag icke hört omtalas, att källan till något blifvit nyttjad utöfver hvad Kapten VIRGIN berättat, nemligen att vattnet blifvit af framlidne Assessor HOLLBERG på lazarettet i Wenersborg begagnadt under den åren 1810—11 gängse s. k. landtvärns-sjukan.

Efter förutgången kvalitativ analys, vid hvilken jag endast vill nämna, att lakmustinktur knappt märkbart förändrade färg, afvensom att den genom kalkvatten erhållna fällningen genom tillsats af mera källvatten obetydligt löstes, företogs bestämning af de kvantiteter uti hvilka de funna beståndsdelarne ingredi-

erade i vattnet, och voro dessa, beräknade på Ett tusen (1000) delar vatten af 1,0084 egentlig vikt, följande:

Jodnatrium	1,8058.
Chlornatrium	8,3605.
Chlormagnesium	0,3090.
Bikarbonat af Talkjord	1,2772.
d:o af Kalkjord	0,1391.
d:o af Jernoxidul	0,0186.
Fosforsyrad Jernoxidul	0,0049.
Kiselsyra	0,0290.
	<hr/>
	11,9441 samt
Fri Kolsyra	0,1962.

Således på 16 uns vatten 91,740 gran fasta beståndsdelar. Vid ett försök, som sedan gjordes med vatten, hemtadt vid ett annat tillfälle, då vattnet afdunstades i en platinaskål och återstoden en längre tid torkades vid $+160^{\circ}$, fann jag summan af de fasta beståndsdelarne något öfverstiga 13 tusendelar af vattnets vikt (bestämda siffran kan nu icke uppgifvas): en annan gång åter fann jag vid ett dylikt förfarande summan af de fasta beståndsdelarne utgöra 9,62 delar på 1000 delar vatten.

Med afseende på denna analys får jag nämna, att kvantiteten af vattnets serskildta beståndsdelar blifvit utrönt genom minst tvenne gånger förnyad bestämning, och att, om några små differencer uppstått, profvet till och med fyra gånger blifvit omgjordt, hvilket varit fallet med den uppgifna talkjords- och natron-quantiteten. — Jodhalten har blifvit bestämd genom utfällning med salpetersyrad palladium-oxidul och ur den återstående lösningen utfälldes chlören med salpetersyrad silfveroxid såsom chloresilfver, öfver hvilken sedan leddes torr chlogas under upphettning utan den ringaste viktförändring, hvarföre ej något spår af brom kan upptagas. — Kolsyrehalten i vattnet bestämdes direkt vid källan genom upptagande af vattnet i en dertill inrättad flaska, hvari befanns en lösning af chlorbarium och ammoniak i öfverskott. Måhända är dock, med ihåg-

kommande af vattnets förhållande till lackmustinktur och kalkvatten, den uppgifna kolsyreqvantiteten något för stor.»

Med anledning häraf yttrade Refer. följande:

Denna uti Torpa saltkälla ådagalagda stora mängd af fasta beståndsdelar är ett förhållande, som är alldeles främmande för alla andra hittills undersökta svenska mineral- eller källvatten, bland hvilka intet enda i detta afseende uthärdar en jemförelse med det ifrågavarande. Ty det på salter mest rika svenska vatten, nemligen Ronneby, innehåller på 1000 delar blott 2,5236 delar fasta ämnen, under det att hos flertalet af de andra summan af de fasta beståndsdelarna blott utgör bråkdelar af enheten, räknadt på 1000 delar vatten. Men äfven för utländska mineralvatten är denna stora quantitet af lösliga salter något ovanligt, och icke många bland dem kunna i det fallet täfla med, ganska få öfverträffa Torpa saltkälla. Lika anmärkningsvärd är äfven den betydliga halten af jod, ett ämne, som hittills icke finnes uppgifvet såsom beståndsdel i något svenskt källvatten, och i de utländska, der det förefinnes, merendels ingår till en mycket ringare quantitet, ofta endast till ett spår. Denna vattnets stora halt af chlor- och jodnatrium är äfven i det afseendet af stort intresse, att derigenom ett nytt ytterligare stöd lemnas åt det förut kända, från zoolog-geologiska skäl *) härledda faktum, att denna del af landet uti en jemförelsevis icke så långt aflägsen tidsperiod varit betäckt af hafvet.

Det är en redan länge känd sak, att på åtskilliga ställen af Västergötlands slättbygd, serdeles den som utbreder sig söder om Lidköping på ömse sidor om Lida-ån, vanligt koksalt utvittrar från åkrarne under den varmare sommartiden på sådane lågländta ställen, der regnvatten kommit att samla sig och intorka, och att äfven saltvatten derstädes på flera punkter framtränger i dagen. Denna omständighet har redan i äldre tider, men isynnerhet i början af detta århundrade, gifvit anledning

*) Hvaribland här blott må nämnas fyndet af ett hvalfiskskelett uti Wånga socken, ungefär två mil sydväst från Skara, och hvarpå redan Em. SWEDENBORG år 1719 fästade uppmärksamheten.

ledning till anställande af åtskilliga gräfningar och misslyckade borrhänsök, i ändamål att påträffa de fasta saltlager, som man förmodade kunde förefinnas på något visst djup under den salthaltiga jordytan, afvensom till infordrande af uppgifter från samtliga Landsböfvingarne i riket rörande tillvaron af saltkällor i deras respektive län. Af dessa uppgifter inhemtades, att dylika källor skulle finnas, inom *Skaraborgs län* vid hemmanen Skår och Smedtofta uti Lefvene socken, vid Backgården Sörby uti Wåla socken och på Dumme och Sköttorps herrgårdars egor uti Hjerpås socken, allt inom Kållands härad, samt mellan Wånga och Qvämenes hyar uti Wånga socken af Skånings härad: inom *Elfsborgs län* och *Dahlsland*: på hemmanet Hedens egor i Grimsta socken af Sundals härad och å hemmanet Böns egor i Rölunda socken af Wedbo härad; afvensom inom *Götheborgs* och *Bohus län* på åtskilliga ställen. De få och ofullständiga försök, som sedermera blefvo anställda med afseende på dessa källors salthet, ådagalade emellertid, att denna halt var alldeles för obetydlig för att löna tillgodogörande, såsom knappt uppgående till $\frac{1}{4}$ procent eller till ett lod rent koksalt på en kanna vatten.

Om också ändamålet med de nyss anförda borrhänsöken, påträffandet af underliggande saltlager, icke uppnåddes (en omständighet, hvarom nutidens ökade erfarenhet om vårt lands geologiska skaplynne skulle på förhand hafva upplyst), qvarstår emellertid såsom ett faktum förekommandet af saltdränkt jord och saltkällor på flera trakter af Vestergöthland, Dahlsland och Bohus län, såsom tydliga minnesmärken efter ett hafvets fordom högre stånd. Vår uppmärksamhet har nu genom Hrr **OLBERS** och **SVANGRENS** nyss anförda undersökning blifvit rigtad på en ny dylik saltkälla uti en trakt, der sådane förut icke blifvit angifna, och derjemte på närvaron af ett ämne deri, som i medicinskt hänseende spelar en vigtig och betydande rol. Denna sista omständighet allena skall säkerligen i den närmaste framtiden bidra till ett ytterligare ökande af dessa källors

antal och tillvinna dem all den utvidgade kännedom i kemiskt-medicinskt afseende, som de sannolikt alla väl förtjena.

7. Bidrag till svenska fotens, kannans och skålpundets historia. — Hr WALLMARK anförde:

»Då historien om vårt lands mått och vigter är i flera hänseenden af intresse, och äfven berör några af de vetenskaper, som utgöra föremål för K. Akademiens verksamhet, vågar jag anhålla om Akademiens uppmärksamhet å följande lilla bidrag till denna historia.

Den omständighet, att jag nyligen påträffat några omkring 200 år gamla målkärl, försedda med GEORG STJERNBJELMS äfven i nämnda historia mycket bekanta namn, hvilka målkärl Hr Apothekaren G. LUNDBERG haft godheten att nu till Akademien förära, har föranledt mig att, jemte redogörelse för mina undersökningar å nämnde målkärl, meddela några resultater af mina forskningar i den del af svenska metrologiens historia, hvilken rör uppkomsten af *grundenheter*na för våra nu gällande allmänna mått och vigter, nemligen foten, kannan och skålpundet, såsom varande af intresse äfven i vetenskapligt afseende.

Såsom *längdmått* omtalas alnen och foten jemte några andra redan i våra province-lagar. Alnmåttet synes allt sedan den tiden varit det allmännast begagnade. I 1540 års regementsform stadgas ock: »*natt allestädz här uthi landet med allehanda kremmeregodz och köpmanswarur en meniglige wicht, alln och mått, lijkeligen skall hållen blifwa*», och uti Kon. GUSTAFS artiklar af år 1555 påbjudes: »*natt een lijka alin, mått och wicht öfver alt brukes och hafves skall*», men det är mig icke bekant, att något normalmått (likare) är i någon svensk författning åberopad förr än år 1604, då uti riksdagsbeslutet stadgades: »*at alnen här uthi Rijket skal rättes efter Ryholms aln*», hvilket upprepas i 1605 års begge Kongl. mandater om aln, wigt och måhl, samt uti 1665 års K. placat

och 1733 års K. förordning om mått och vikt, i hvilka båda sistnämnda författningar det likväl tilläggas, att af denna Ryholms aln »*Modellet i jern, oppå Stockholms Rådhus dörr, finnes anslagen, hvilkens allens halfdeel eller tw quarter een Svänsk Foot riktigt hålla skall*».

Rydaholms kyrka i Östbo härad i Småland hyser ännu den likare här afses. Sjelfva kyrkan är ombyggd år 1793, men dubbeltornet äfvensom kyrkodörren med den derå fästade alnen äro bibehållna från gamla kyrkan, hvars ålder synes vara alldeles obekant. Om denna alns ursprung äro flera gissningar. NICOLAUS CELSIUS, i sin *Geodesia, brevibus Thesibus & Problemibus explicata* (Anno 1696, Upsaliæ) säger, att Ryholmsalnen då redan begagnats i Sverige 400 år. ALLVIN deremot, i sin beskrifning öfver Östbo härad (tryckt 1852), säger (s. 90) att Kon. Gustaf I år 1555 utgaf en sträng befallning, att lika mått, mål och vikt skulle vara öfver hela riket, och att Konungen låtit förfärdiga i Stockholm alnar af jern, deraf en sändes till hvarje kyrka i hela riket att förvaras, samt att Rydaholmsboerna voro de enda, som fastgjorde alnen på kyrkodörren. Att dylika alnar skulle hafva blifvit utsända nämnde år till alla kyrkor i riket, synes mig icke antagligt, enär i sådan händelse man säkerligen icke skulle redan år 1604 hafva återopat just den i Rydaholms kyrka förvarade alnen såsom rikslikare, utan heldre tagit någon, som på närmare ort bordt finnas qvar, t. ex. i hufvudstaden, och dylika alnar ju borde ännu i dag anträffas här och der. Den Ryholmska alnen har således sannolikt vida högre ålder än den Hr ALLVIN vill gifva henne; den af förrbemålde CELSIUS uppgifna synes mig vida antagligare. Hvad längden af den Ryholmska alnen beträffar, så synes af det underdåniga betänkande, som 1737 års kommitterade afgåfvo rörande rikets mått och vikt (ms. i Kongl. Riksarkivet), äfvensom af en i Kongl. General-landtmäteri-kontoret förvarad kopia af meranämnde aln, att densamma är 2,9 dec. lin. eller 1,45 procent större än den nu gällande.



Oaktadt ofvannämnda stadganden af åren 1604, 1605, 1665 och 1733, synes mig dock ej sannolikt att Ryholms-alnen verkligen tjenat till esterrättelse i mellersta Sverige, utan att man der, åtminstone de sista 300 åren, begagnat den nu gällande s. k. Stockholms alnen. Detta antydes bland annat deraf, att 1626 års rosstjenstordning anbefallte det hästarne skulle mätas med Stockholms aln, samt att sedan långliga tider uti Stockholms rådhus, först å dörren och sedan i förstugan, hängt en jernaln, som tjenat till likare, förmodligen i öfvertygelse att den var lika med den Ryholmska, och ännu i dag begagnas till esterrättelse, då ej mycket stor noggrannhet erfordras. Sedan 1737 års kommitterade utrönt att Ryholms-alnen icke var lika med Stockholms rådstugu-aln, öfvergaf man äntligen att åberopa den förre, och höll sig sedan uteslutande vid den sednare.

Beträffande längden af denna Stockholms rådstugu-aln, har jag funnit densamma lika med den nu gällande alnen, eller åtminstone så nära lika densamma, som måttets beskaffenhet och upphängningssätt m. m. tillät mig att bestämma. Nämnde kommitterade hade ock ej funnit någon skilnad emellan den Stockholmska rådstugu-alnen och 1665 års likare-aln, som då (1737) förvarades i Handelskollegium, och säkert tjenat till typ för vår nuvarande aln.

Det äldsta tillförlitliga svenska längdmått jag näst efter ofvannämnde Stockholms rådstugu-aln påträffat, är en i K. General-landtmäteri-kontoret förvarad messingsskifva eller lineal med derå särdeles väl utförda messingsskalor, som hafva följande öfverskrift: »*Linea Carolina Hydro-metro-statica omnium Corporum Ponderum & Mensura communis inventa et dedicata Ser:mo Regi Sueticæ CAROLO GUSTAVO à GEORGIO STERNHELM Anno d: b: d: viii*». Vid ena ändan finnes följande påskrift: »*Nobilissimo Domino JONÆ BURÆO Hereditario in Burewijk & c. GEORGIUS STERNHELM 1659*». — Bland de många skalor som å denna lineal förekomma är: »*Pes Romanus, XII Pollices Ped. Rom. & Semi-Ulnæ Stokh.*» Hvarje $\frac{1}{12}$ fot eller tum är delad

i 10 och medelst transversaler ytterligare i 100 delar. Detta fotmått från midt till midt af ändstrecken, som visserligen vore något grofva, men deremot försedda med skarpa och parallela kanter, har jag jemfört med en fot å Akademiens normal-etalong, och funnit båda lika inom 0,0001 fot. STJERNHJELM, som hade haft mycket bestyr med mått- och vigtregleringen, och uppställt samt genomfört ett eget system härutinnan, för hvilket jag skall hafva äran redogöra i det följande, har säkert ombesörjt utförandet af ofvannämnde 1665 års riks-åln, hvaraf nämnde öfverensstämmelse förklaras, och som vittnar om en stor noggrannhet redan den tiden. Denna riks-åln förvaras nu i Kongl. skattkammaren och skall vara indelad i decimaltum och decimallinier.

STJERNHJELM utgaf från koppartrycket en af honom sjelf graverad tessla under titel: »*Mensuræ Regni Svethiæ Autoritate Regiâ, Ordinatæ per GEORG STJERNHJELM S. R. M:tis Consil Milit Anno 1664*», der, bland annat, finnes: »Semi Pes Sveth. Rom. Antiq», indelad så väl i 5 som 6 tum, sista tummen i 10 delar, och öfverensstämmer äfven detta mått med vårt nuvarande så noga man af en i kopparstickspress tryckt planch plägar fordra. (Halffotsmättet å planchen var neml. 0,2 dec. lin. för kort).

Hvad nu beträffar den omständigheten, att STJERNHJELM satte Stockholms-foten lika med den forn-romerska, torde jag få nämna, att, enligt NICANDERS inträdestal i denna Akademi år 1776, om de gamla romerska, grekiska och hebreiska mål och vigter (s. 12), STJERNHJELM påstått, det Konung GUSTAF II ADOLF antagit romerska foten för ett allmänt mått här i Sverige, skölande STJERNHJELMS ord, uti det ms., som skall finnas i Upsala Akademis Bibliothek, vara följande: »*Hunc eundem pedem (Romanum) nostrum facere perpetuaque lege Svethiæ proprium & legitimum sancire placuit olim serenissimo p. m. Regi GUSTAVO ADOLPHO*». Det är ganska möjligt, att STJERNHJELM, som redan under den store Konungens sednare regeringstid var en aktad vetenskapsman och god mathematicus, förmått Konungen till

detta steg, men någon författning härom har mig veterligen icke utkommit. Huruvida man emellertid hade någon historisk grund för detta antagande, eller om det uppkom endast af en genom slump tillkommen likhet i afseende å de båda måttens storlek, eller om högbemälda Konung redan före utfärdandet af 1626 års rusttjenstordning hade jemkat alnen till närmaste öfverensstämmelse med romerska foten enligt det begrepp man då hade om dess fordna längd, synes numera vara ytterst svårt att kunna afgöra. Utan att tillåta mig någon gissning härutinnan, torde jag få äran nämna, att NICANDER, i ofvannämnde tal, visserligen hade kommit till det resultat, att den romerska foten, så väl den fordna som den moderna, var = 0,993 svensk fot, men att JONARDS uppgift (GEHLERS Phys. Wörterbuch VI: 4248), att den forn-romerska foten var = 0,9959 meter, som gör 0,9966 svensk fot, synes vara riktigare, samt att det således i alla händelser är anmärkningsvärdt, det man utan särdeles stort fel kan antaga, att *den svenska foten, sådan denna åtminstone ett par sekler varit gällande, är lika med den forn-romerska foten.*

I afseende på uppkomsten m. m. af vår nuvarande rikslikare, hvilken endast högst obetydligt kan vara skiljaktig från 1665 års riks-aln — som jag ännu icke varit i tillfälle att få uppmäta — äfvensom af Akademiens med rikslikaren identiska normal-etalong, torde jag, för att undvika vidlyftighet, få hänvisa till Akademiens Handlingar för år 1825 sid. 96 och 1844 sid. 17.

Hvad *ytmått*en beträffar, hafva dessa sedan långliga tider blifvit uppmätta med längdmåttens kvadrater. Ehuru således egentligen icke hörande till detta ämne, torde jag få äran nämna att, enligt 1598 års husesyns-ordning, ett *öresland* utgjorde kvadraten på 27 stänger — hvarje stång om 9 alnar — således kvadraten på 243 alnar = 59049 kvadratalnar. När *tunnlandet* först infördes är mig icke bekant. Intill år 1643

utgjorde det 13122 qvadratalnar, uppenbarligen laget så stort att 44 tunnland utgjorde jemt 1 öresland. Enligt 1643 års landtmäteri-instruktion blef tunnlandet ökad till 14000 qvadratalnar eller 56000 qvadratfot, sannolikt både för att få bibehålla kapplandet i det närmaste oförändradt, äfven sedan tunnan kom att innehålla 32 kappar, och för att få införa kannlandet om jemnt 1000 qvadratfot, ehuru detta sednare föga lär kommit i bruk.

I den händelse, som icke är osannolik, att tunnan fordom deltes i 30 kappar, likasom det ännu sker i Finland, blef då 1 kappland = $\frac{13122}{30} = 437,4$ qvadratalnar. Det nya kapplandet blef deremot $\frac{14000}{32} = 437,5$ qvadratalnar, föga skiljaktigt från det förra.

I afseende å *rymdmättet* synes ock vara ytterst svårt att numera kunna utreda forntida förhållanden. I province-lagarne omtalas redan spann och skeppor; sedermera räknades spanmål äfven efter *tunnor*, deraf 12 gingo på en läst. Först i 1594 års handelsordning har jag funnit *kannan* omnämnd såsom lagligt mått. Der stadgas nemligen, att Stockholms stads tunna skulle hålla 50 kannor, men Upsala, Westerås och Enköpings stads tunna 54 kannor, utan att man likväl får veta något närmare härom. Enligt Kongl. mandatet af den 7 Maj 1605 skulle tunna och spann öfver allt i riket rättas efter Örebro tunna och spann, men enligt 1638 års riksdagsbeslut skulle alle måltunnor rättas efter Stockholms-målet, och hålla »32 Uplandz Faat eller Finsche kappar eller och 54 Stockholms kannorn».

Rörande storleken af dessa mått, torde följande kunna tjena till någon ledning.

Rådskammar-protokollet den 9 December 1635 (Palm-sköldska samlingen i Upsala bibliothek) upplyser att: »*Differencen emellan Örebro och Stockholms tunna var 7 kannorn*», utan att likväl här uttryckes hvilkendera tunnan som var den

större, eller hvad slags kannor här menas. Enligt rådeskammarprotokollet för den 4 i samma månad proponerade BURJUS »vara godt att een Måltunna hafver 54 kannor, een Ööltunna all-nast 48 kannor», samt »befalles BURJUS och WEILER att justera kannorna efter tonnerne. taga Örebrotunna och derefter lämpa kannan». Vidare skulle BURJUS och WEILER »först beställa 2 kannor af bleck, een efter Örebroos, den andra efter Stockholms måhl».

Uti STJERNHJELMS »Berättelse om Svenska Öhl- och korn-måhl och dess æquation till nestomliggiande främmande måhl» (Palmsköldska samlingen i Upsala bibl.) afgifven den 20 Juni 1651, och således under den tid 1638 års författning om mått och vikt ännu gälde, upptages bland annat:

»En Svensk Måhl-tunna, håller $\left. \begin{array}{l} \text{kappar } 32. \\ \text{kannor } 54, \end{array} \right\}$ och finnes si-

dan till en kub lika med Stockholms kannan, samt sidan till en kub lika med Stockholms kappen grafiskt utsatta.

Enligt uppmätning, som Akademiens ledamot Hr ÅNGSTRÖM haft godheten att på min anmodan verkställa å nämnde original-manuskript medelst en efter Akademiens etalong af mig kopierad skala, är den förra 4,685 dec.t. och den sednare 5,547 dec.t. Under förutsättning, att 32 kappar motsvara 54 kannor, hade det förra måttet bordt vara

$$= \frac{1}{2} (4,685 + 5,547 \sqrt[3]{\frac{32}{54}}) \text{ dec.t.}$$

$$= \frac{1}{2} (4,685 + 4,659) = 4,672 \text{ dec.t.,}$$

eller 0,013 dec.t. mindre än det uppritade måttet, och det sednare bordt vara

$$= \frac{1}{2} (5,547 + 4,685 \sqrt[3]{\frac{54}{32}}) \text{ dec.t.}$$

$$= \frac{1}{2} (5,547 + 5,578) = 5,562 \text{ dec.t.}$$

eller 0,015 dec.t. större än det uppritade måttet. Dessa fel måste anses ganska obetydliga, då man vet, att måtten voro uppdragna på papper och ändades med temligen grofva punkter. Enligt detta antagande var år 1651 — och sannolikt hela tiden från

år 1638 till år 1664, då STJERNHJELMS ofvannämnde »*Mensuræ*» utkom, deruti kannan göres beroende af och sättes jemnt = $\frac{1}{16}$ kubikfot — den öfver hela riket gällande *Stockholms-kannan* = $(4,672)^3 = 102,0$ nuvarande kubikdec.t., samt den då enligt lag gällande (*Stockholms-*) *tunnan* = 54 sådana kannor eller 55,07 nu gällande kannor, d. v. s. allenast 0,93 kanna mindre än vår n. v. *måltunna*, som onekligen derifrån härleder sitt ursprung. Om man nu får antaga, att *Stockholms-tunnan* ofvannämnde år 1635 var densamma som år 1651, samt att omförmälde skilnad var uppmätt i *Stockholms-kannor*, så skulle en *Örebro-tunna*, som efter alla anledningar var större än *Stockholms-tunnan*, år 1635 hafva utgjort $54 + 7 = 61$ *Stockholms-kannor* = 61. 1,02 = 62,2 nuvarande kannor, och således varit allenast 0,8 n. v. kanna mindre än vår n. v. *spanmålstunna fast mål* eller den n. v. *finska tunnan*, och varit den i lag gällande från år 1604 och sannolikt långt derförut, allt intill år 1638. Rörande *Örebro-kannans* storlek vågar jag icke yttra mig, enär jag icke ännu funnit någon upplysning i huru många kannor *Örebro-tunnan* indeltes. Som dock *Örebro-kannan* synes varit större än *Stockholms-kannan* och är förut afslagd, bör vår n. v. kanna icke härledas från den förra.

Nyssnämnda *Stockholms-kanna* gällde dock i afseende å storleken icke längre än till år 1665, då Kongl. plakatet om mått och vikt utkom, hvilket bland annat stadgar följande: Ehuru på 1638 års riksdag är för godt funnet, att en *spanmålstunna* skall hålla 54 *Stockholms-kannor* »*Lijkväl, emedan sedermera, efter nogha undersökning och ögonskeenlige erfarenheten, bepröfvat är, att samma fördeelning icke hafver sin behöriga likheet emott Tunnans rätta måhl och storheet, uthan att een Spanmåls Tunna då sin rätta proportionerade stycken hafver, när hon uthi 56 kannor deelt blifver; Efter som ock, uthaf det rätta gamla kannemåttet, som sedermera här i Wår Stadh Stockholm är blesven funnen, klarligen är att see, att uthaf ålder een richtig Måhltunna 56 kannor hållit hafver, och att een sednare fördelnidg uthi 54 kannor allenast, uthaff*

oen missräkning, som genom tidsens förlopp, icke så nogha sedan är achtat, sin ursprung hafver; Ty skall det här efter granneligen i acht tagas, att uppå bemelte Spanmåls Tunna just 56 kannor måhles efter det gamla och rätta måhlet, dock väl förståendes att sjelfva tunnan icke derigenom större göres, utan oförändradt förblifver widh den stoorlek som hon för detta haft hafver». Derjemte stadgades, att tunnan skulle hålla »32 Faat eller Kappar, så att en kappå håller 1½ kannan».

Under förutsättning, att Stockholms-tunnan verkligen förblef oförändrad, borde den nya Stockholms-kannan således hafva blifvit $\frac{5510}{56} = 98,4$ n. v. kubikdec.t.; kannan fastställdes likväl, uti STJERNHJELMS oftanämnde »Mensuræ» af år 1664 samt i 1733, 1737 och 1739 års Kongl. förordningar angående mått och vikt, till jemnt 400 n. v. kubikdec.t., hvarigenom således tunnan i sjelfva verket ökades till 5600 kubikdec.t. Att detta verkligen inträffat torde kunna slutas deraf, att, i händelse Stockholms-tunnan år 1654 verkligen innehållit 5600 kubiktum, Stockholms-kannan då bordt vara $= \frac{5600}{54} = 103,7$ kubiktum. Men som $\sqrt[3]{103,7} = 4,698$ öfverstiger med 0,026 tum förutnämnde af STJERNHJELM år 1654 uppritade, vederbörligen korrigerade mått för sidan till en kub lika med kannan, och $\sqrt[3]{175} = 5,593$ öfverstiger med 0,031 tum hans sida till en kub lika med kappen, synes ett sådant antagande oföfogadt, och Stockholms-tunnan verkligen vara ökad. Att någon ändring skett är ock i hög grad sannolikt, af det skäl, att det ju är knappt tänkbart, att, då man delade den gamla Stockholms-tunnan i 56 delar i stället för 54, man skulle erhålla precis 400 kubikdec.t. Deremot synes mig ganska troligt att STJERNHJELM, som, enligt hvad jag haft äran nämna, hade sin hand med vid denna reglering, ja slutligen (år 1667) blef Generalkdirektör öfver mått och vikt, utverkat nämnde jemkning, som var så

väsentlig för redighet i framtiden och för möjligheten, att en gång erhålla decimal-indelning i all slags mått och vikt.

Å nämnde »*Linea Carolina*» af år 1657 finnes Stockholms-foten utsatt = sidan af en kub, som rymmer 10 kannor. Likaledes finnes utsatt sidan till en kub, som rymmer 1 spann eller 16 kappar, hvilken sida jag vid uppmätning funnit vara = 14,103 dec.t. och således allenast 0,008 dec.t. större än dess rätta mått $\sqrt[3]{2800} = 14,095$ dec.t.

Uti förutnämnde »*Mensuræ*» af år 1664 finnes, jemte tunnans för våta varor fördelning i 48 kannor o s. v., samt mål-tunnans fördelning i 32 kappar om $1\frac{1}{4}$ kanna, äfven följande decimal-indelning af svenska kubikfoten (amphora), neml.:

- 1 ämbar (amphora) à 10 kannor,
- 1 kanna (cantharus) à 10 römer,
- 1 römer (quintarius) à 10 toll-måt,
- 1 toll-måt (modiolus) à 10 minuter.

Amphoran benämndes efter den romerska amphoran, som var jemnt 1 romersk kubikfot.

Oaktadt sålunda ett oskiljaktigt samband blifvit knutet emellan rymd- och längdmåtten, och änskönt meranämnde »*Mensuræ*» hade vunnit Kongl. sanktion, stadgas likväl intet om detta samband uti Kongl. plakatet af år 1665, utan, hvad kannan beträffar, »*bjudes och befallles att hafva uthi alle Städer eller och å Landet een och enehanda kanna eller kannemåhl, efter dess forms innehåll, som der om i provincierna publicerat varder, men uthi det öffrige, och elljest deelt, på sådant sätt som det förr hafver varit brukeligt*», utan att kannans verkliga storlek bestämmes, och hvad tunnan beträffar är ofvan nämndt, att den enligt samma plakat visserligen skulle hålla 56 kannor, men utan att tunnan heller bestämmes till sin storlek. Också minskades ingalunda genom denna förordning den villervalla i mått och vikt, som i långliga tider varit öfverklagad.

I sammanhang med hvad jag nu haft äran anföra om STJERNHJELMS prisvärda bemödande att göra rymdmättet på ett enkelt

sätt beroende af längdmåttet, torde jag nu få äran redogöra för inrättningen af först omförmälde af Hr Apothekaren LUNDSTRÖM förärade målkärl.

Dessa äro till antalet 5, alla af tenn, af kubisk form, försedda med lock och följande väl graverade inskriptioner:

- a) *Cantharus Stockholm*. VIII { Quart. Stockholm } håller i vatn
Lib. Roman }

400 Unc. 55300 aes. Anno 1664. G. Stjernhjelms. N:o 1.
(Å fränsidan:) Ill.mo Dno. Gustavo Ottoni Stenbock Comiti
de Bogesund etc. Regni Suehiæ Ammiralis. Humillime
offert G. S.

- b) II { Quart. Stok. } 50. Lod Stok. A:o 1664. G. S. N:o III.
Lib. Rom ▽ }

- c) *Quartarius Stockholm*. 1 lib. Rom ▽ 25 Lod Stok. A:o 1664.
G S. N:o IV.

- d) *Quintal*. seu. Romer. $\frac{1}{16}$ Canth. 40 Unc. Stok. 5530 as.
A:o 1664. G S. N:o V.

- e) *Sextarius Rom*. { Xeste Græc } $\frac{1}{4}$ Congy. Rom 20. Unc.
Log. Hebræum }

Rom. ▽. 48 Unc. Paris. Trosir. 41520 as. A:o 1664. G.
Stjernhjelms N:o.

Dessa mått voro dessutom å en sida försedda med inskriptioner, sådana som »Theriaca coelestis», »Tali Leporis» o. s. v., hvilka vittnade derom, att de långt tillbaka varit begagnade såsom farmaceutiska vasa.

Redogörelsen för hvad inskriptionerna antyda om vattnets vikt anhallar jag få uppskjuta till dess jag kommer att tala om vigten. Här torde vara tillräckligt omnämna resultaten af mina uppmätningar af dessa målkärl. De utgjordes egentligen af rättvinkliga paralleppipeder. Å de tvänne största var djupet eller höjden icke så obetydligt större än de öfriga dimensionerna, utan att något s. k. peel fanns anbragt. Enär djupet var den enda dimension, som med någon noggrannhet kunde bestämmas, måste de öfriga utrönas genom volumen i förening med djupet. Resultaten innefattas i nedanstående tabell, der

v = den sigterade
 V = den uppmätta
 D = det uppmätta djupet i dec.tum.
 $s = \sqrt[3]{v}$
 $s_1 = \sqrt[3]{\frac{v}{D}}$
 $s_2 = \frac{v}{V} D$

} beräknad i decimaltum.

	a) $v=100$	b) $v=25$	c) $v=12,5$	d) $v=10$	e) $v=\frac{1000}{48}$
$D-s_1$	4,63—4,63 = + 0,18	3,06—2,94 = + 0,12	2,28—2,30 = — 0,02	2,21—2,19 = + 0,02	2,78—2,81 = — 0,03
$D-s_2$	4,63—4,64 = + 0,19	3,06—2,92 = + 0,14	2,28—2,32 = — 0,04	2,21—2,15 = + 0,06	2,78—2,75 = + 0,03
$s-s_1$	4,64—4,62 = + 0,02	2,92—2,92 = ± 0,00	2,32—2,33 = — 0,01	2,15—2,13 = + 0,02	2,75—2,73 = + 0,02
$s-s_2$	4,64—4,68 = — 0,04	2,92—2,94 = — 0,02	2,32—2,30 = + 0,02	2,15—2,19 = — 0,04	2,75—2,81 = + 0,06
s_2-s_1	= + 0,04	= + 0,02	= — 0,03	= + 0,06	= + 0,08
V	103,1	26,0	12,4	10,1	20,6
1 kenna skulle bittra af v	103,1	104,2	99,1	100,9	99,0
$D:o$ af s_2	98,6	99,6	101,2	96,6	97,7

Mätningarna gäfvö alltså i medeltal kannan = 404,1 kubikdec.t., och, om meningen varit att göra höjden = 8, hade kannan blifvit = 98,7 kubikdec.t. Att afgöra om målkärnen äro så vårdslöst justerade, att de anmärkta olikheterna derigenom uppkommit, eller om STJERNHJELM ernat göra kannmättet antingen kubiskt och = 1 Stockholms-kanna enligt ofvannämnde antagande = 98,4 n. v. kubikdec. eller icke fullt kubiskt, men = 1 n. v. kannan, synes mig numera icke möjligt. Största sannolikheten synes dock vara för den förmodan, att meningen med dessa målkärn varit att göra kannan = $\frac{1}{16}$ kubikfot, och de öfriga måtten i förhållande dertill, helst uti ofvannämnde kommitterades underdåniga utlåtande af år 1727 säges: »Jemväl har man hos vice Presidenten Baron Tegner funnit en cubisk kannan, gjord 1663, hvarpå, jemte årtalet står Kr. Rådet STJERNHJELMS namn med inscription, *Cantharus Stockholmoensis*, håller i vatten 100 Uns 55300 aes, hvilken kannan finnes, enligt det af berörde STJERNHJELM uträknade *Latus Cubi* vara inrättad efter förnämnde Stockholms aln», och på ett annat ställe i samma utlåtande säges, att herrar kommitterade funnit nämnde målkärn temligen lika med den i räntekammaren befintliga messingskannan.

Enligt ofvannämnda råds-kammar-protokoll d. 27 April 1667 skulle kannan blifva hufvudmålet i våto och torro, men mig verterligen har icke någon författning i detta ämne blifvit efter 1665 publicerad förr än år 1733, då den nya Kongl. förordningen om mått och vikt utkom, enligt hvilken kannmättet blef fastställt såsom hufvudmått, och skulle utgöra $\frac{1}{16}$ kubikfot; vigten af 1 kannan vatten utsattes derjemte, dock i hög grad felaktig, hvarom jag skall hafva äran nämna utförligare, då jag kommer till vigten. Spanmålstunnan, neml. »mätaretunnan», skulle hålla 56 sådana kapnor o. s. v. Uti 1737 års K. förordning angående mått, mål och vikt borttogs äntligen det felaktiga stadgandet om vigten af 1 kannan vatten, och utsattes denna vikt i en bifogad tabell temligen riktigt; kannans och måltunnans storlek förblef der oförändrad likasom i den nu gällande K. förordningen om mål, mått och vikt af år 1739.

Beträffande slutligen *vigten*, så torde jag, med förbigående af de speciela *vigterna*, såsom tackjerna-, bergs-, uppstads- och råkoppar- samt medicinalvigten med flera, såsom icke egentligen hörande till förevarande ämne, få inskränka mig att nämna det hufvudsakligaste om *viktualievigten*, äfvensom angående stapelstads- eller, som den förut kallades, jern- eller Stockholms metallvigt, i hvad denna står i samband med viktualievigten.

Benämningerne skålpund och marker synas i många hundra år hafva begagnats omvexlande för samma tyngd. Redan på 4300-talet gjordes dock samma skilnad som allmänheten ännu i dag plägar göra; man sade nemligen redan då *skålpund* peppar, mandlar, risgryn o. d., men *marker* fläsk, smör o. d. I det föregående är omnämndt, hurusom Konung GUSTAF 1:s stadgande äfven gällde en allmän vikt, hvarmed då onekligen mentes den vikt, som sedermera fått namn af viktualievigt. 1605 års K. plakat föreskrifver, att »*bismännen skola vara efter Örebro Bisman, lijka öfver alt Rijkets*». Uti den K. fullmakten för Rijks Guardien HANS WEILER af den 12 Mars 1634 omtalas, utom Bissman, äfven Wåghar, äfvensom Lijkare. Hvad viktualie-skålpundets storlek beträffar, är mig likväl icke något bekant förr än från år 1644, då STJERNHJELM, uti sin från trycket utgifna bok: »*Archimedes Reformatus*», uppgaf, att 1 skålpund »*kramer- eller köpmanswicht*» var = $\frac{1}{4}$ köln. mark = 8647 $\frac{1}{2}$ holl. troiska ass. (1 köln. mark var nemligen = $\frac{1}{16}$ mark holl. troiska vikt om 5,420 ass). Som 1 n. v. skålpund viktualievigt är = 8848 svenska ass = 8844 holl. troiska ass, så var vikt. skålpundet sistnämnde år för litet om 197 holl. ass eller omkring $\frac{1}{16}$ mindre än nu.

År 1666 d. 25 Juni skedde inför K. Bergskollegii protokoll jemförelse-vägningar mellan de likarevigter i dåvarande fraktkammaren, som sedan 1738 hade varit såsom sådana begagnade, och befanns viktualie- och myntvigten dels alldeles lika, dels högst obetydligt skiljaktiga; 1 skålpund vikt. vigt höll 8782 ass; 5 marker jernvigt voro = 4 skålpund 1 lod vikt. vigt. Tillika finnes antecknadt att STJERNHJELM betygade sig intet hafva

förändrat jernvigten, det ock så befans; men tillstod och bekjende der bredvid att han hade förändrat viktualievikten och gjort henne svårare, till ett quintin på hvart skålpund. Detta yttrande gäller så mycket sannolikare det uti *STJERNHJELMS* oftänämnde »*Mensuræ*» af år 1664 afsedda skålpundet om 8848 ass, men icke nämnde likare, som 8848—8782 är =66, som är endast $3\frac{1}{2}$ ass mindre än 4 n. v. qvintin.

Enligt ofvannämnde Kongl. Maj:ts rådslag och resolution (ms. i Kongl. Riksarkivet) af den 27 April 1667, eller 2 år sedan det nya K. plakatet om mått och vikt utkommit, blef — till följe deraf att Örebro bismans eller viktualievigtens likare uti vågarne icke öfverensstämde sins emellan eller efter det gamla förhållandet med myntvigten, samt derföre, att metall- och viktualievigten ej heller korresponderade i proportion som 4 till 5 — viktualievigtens skeppund ökadt med $2\frac{1}{2}$ \mathbb{X} myntvigt, hvilken förökning öfverensstämde med metallvigt-likaren på fraktkammaren. Till yttermera visso statuerades då, att 1 skålpund vikt. vigt skulle vara =8848 ass Trois och 1 mark metallvigt =7078 ass Trois. — Denna resolution har dock sannolikt icke kommit till allmänhetens kannedom.

Enligt ofvannämnde jemförelse i fraktkammaren vägde, som nämnt är, 5 marker jernvigt =4 \mathbb{X} 1 lod vikt. vigt, hvadan 1 skeppund eller 400 marker jernvigt väga =322 $\frac{1}{2}$ skålpund vikt. vigt. Tydligen menas således i 1667 års resolution, att samma skeppund jernvigt, som förut uppvägs af 322 $\frac{1}{2}$ skålpund vikt. vigt, skulle, genom vikt. vigtens ökning, komma att uppvägas med 320 skålpund. Hvad nämnde proportion beträffar, så finnes den antydd redan i K. mandatet angående aln, vigt och mål d. 7 Maj 1605, der det föreskrifves att »*Bismannen skall vara efter Örebro Bissman, lijka öfver allt Rijket, nemblig 5 mark drygare än Stockholms Bismans*». Att här menas 1 lispund vikt. vigt, tord man kunna taga för afgjort, hvarföre detta stadgande på nutidens sätt att uttrycka sig skulle lyda sålunda: 20 skålpund viktualievigt motsvara 25 marker stapel-

stapelstadsvigt. Uti K. fullmakten för Riks-Guardien HANS WEILER att justera vigterna af d. 12 Mars 1634 synes likaledes vara föreskrifvet, att 16 lispund vikt. vigt (Skålpundewicht, Bismarwicht) skola hålla 1 skeppund stapelstadsvigt (Stockholms Wägewicht).

Man skulle således vara benägen till den slutsats, att jernvigten eller, som den numera heter, stapelstadsvigten varit oförändrad; åtminstone från början af 17:de århundradet, och att vikt. vigtens likare under förra $\frac{3}{4}$ af samma århundrade undergått ändringar, men att man år 1667 återställde vikt. skålpundets forna vigt, så att det åter kom att utgöra $\frac{3}{4}$ mark stapelstadsvigt — om icke en annan omständighet gafve all anledning att misstänka, att i sjelfva verket tillgått helt annorlunda.

Jag har i det föregående haft tillfälle omnämna STJERNHJELMS stora förtjenster att till framtida rättelse hafva förfärdigat noggranna likare för längdmåttet, hvilket ock hufvudsakligen derigenom bibehållits oförändradt ända hitintills, äfvensom att hafva bragt kannan till jemt $\frac{1}{16}$ kubikfot eller 100 kubikdec.tum. STJERNHJELM stannade dock ej vid dessa åtgöranden. Han insåg ganska riktigt fördelen af ett samband äfven mellan mått och vigt, och uppgjorde ett eget system härutinnan, som dock tyvärr hvilade på felaktig grund. Han synes nemligen icke hafva fotat sitt system på egna experimenter, utan på andras uppgifter, dem han råkat erhålla till en del mycket felaktiga, hvarföre ock hans system ledde icke allenast icke till det dermed åsyftade ändamålet, utan tvärtom till mycken oreda, som varade icke mindre än omkring 70 år.

Han antog såsom facta:

- 1:o) Att 1 svensk fot eller $\frac{1}{4}$ svensk aln var lika med 1 forn-romersk fot, och således att 1 svensk kubikfot var lika med en forn-romersk kubikfot eller amphora;
- 2:o) Att 1 amphora färskt (»frisch») vatten vägde 80 forn-romerska skålpund, hvilka, som bekant är, deltes i 12 uns à 8 drachmer;

- 3:o) Att 4 forn-romersk drachma var = 1 attisk drachma = 1 fullviktig Brabant-dukats om 72 holländska ass, och
4:o) Att 1 svenskt skålpund höll 8848 holl. tr. ass.

En svensk kubikfot vatten komme således att väga 80.12.8.72 = 552960 holl. ass, och 1 kubikdec.tum (i hela tal) 553 holl. ass, hvilken sednare vikt, som han kallade *unc*, utgjorde jemnt $\frac{1}{4}$ svenskt skålpund eller 2 lod.

Enär nu 16.553 = 8848, så är väl ganska sannolikt att STJERNEJELM utverkat vikt. skålpundets ökning till 8848 tr. ass (nemligen sådana som då voro att tillgå) samt att stapelstadsvigten m. fl. derefter jemkades, ehuru man ej vågade låta allmänheten komma i kännedom deraf.

Uti 1662 års meromförmälda K. plakat omnämnes icke något samband mellan mått och vikt, men som oftanämnde »Mensuræ» af år 1664, som vunnit Kongl. sanktion, äfvensom 1733 års K. förordning angående mått och vikt, upptaga 4 kanna »friskt» vatten 6,250 \mathcal{Z} , så får man icke förundra sig öfver den flera gånger öfverklagade villervalla, som rådde i afseende å rymdmåttet och vigten ända till år 1737, då den fornyade K. förordningen utkom, som åtföljdes, såsom nämnt är, af tabeller, bland annat öfver vigten af 4 kanna vatten med dess öfver- och underafdelningar, varande 4 kanna »klart och friskt regnvatten» här upptagen till 6 \mathcal{Z} 5,1 lod (= 6,159 \mathcal{Z}) Enligt sednaste försök väger 4 kanna rent vatten af +15° i luft = 6,147 \mathcal{Z} , och kan genom temperatur-ändring uppgå till 6,152 \mathcal{Z} , men ej deröfver. Regnvatten synes deremot kunna uppnå 6,159 \mathcal{Z}

Orsaken till förr nämnda felaktiga uppgift å vattnets tyngd, hvilken uppgift vållade, att skålpundet blef osäkert på $\frac{1}{4}$ lod eller kannan på $\frac{1}{4}$ jumfru, böra hufvudsakligen sökas i de möjligen felaktiga antaganden, dels att 1 romersk libra höll 12.8.72 = 6912 holl. tr. ass, dels att 1 amphora vatten vägde 80 rom. libræ, för hvilka uppgifternas granskning jag likväl ännu icke hunnit samla erforderliga materialier, och jag

för öfrigt ej nu skulle våga pröfva Akademiens tålmod. Som romerska foten, som nämnt är, var efter all sannolikhet något mindre än den svenska, så kan ej felet härröra från denna källa. Deremot kan vattnets mindre fullkomliga renhet hafva i sin mån bidragit till en för hög vikt å en viss volum vatten.

Visserligen föreskrefs uti det år 1667 utfärdade Kongl. memorialet för (Justeraren under STJERNHJEM) JÖRGEN LOW att »efter såsom Skålpunden och Markpunden äro satte på vissa aas, så att härefter ingen irring mera af hvarjehanda Lijkares förändring är till att befähra; Altså skall JÖRGEN LOW låta beställa och gjuta åtskilliga Lijkare, så väl af Markpund som af Skålpund, af hvilka han skall lefverera uthi Wårt Archivo, Cammar- Commerce och Bergz Collegio, jemväl och på Fracht Cammaren, hvardera sin medh Cronomerkie och deras aas-tal annoteraden. Denna befallning är dock sannolikt aldrig åttlydd, alldenstund jag, oaktadt allt efterforskande, icke kunnat påträffa någon enda af dessa vigter. 1737 års kommitterade förkastade på goda skäl räkningen efter holländska ass, emedan detta ass var, dels en för liten utgångsvigt, dels icke noggrannt bestämd, alldenstund de funnit utifrån inhemtade sins emellan temligen olika, utan föreslogs endast vissa likare, hvilka ock, så väl i 1737 som i 1739 års K. förordning om mått och vikt äro föreskrifna. Det är ock efter 1739 års i K. Kammarkollegium förut förvarade, numera i K. General-landtmäteri-kontoret befintliga likare (af förgylld messing) som vår nuvarande riks-likare (af platina) är på behörigt sätt justerad.

Hufvudsumman af hvad jag nu haft äran anföra är ingalunda stor. Den inskränker sig nära nog blott dertill, att vår närvarande svenska fot eller halfaln varit oförändrad åtminstone i 200 år, och att den derförut under ett eller annat sekel begagnade alnen varit lik eller åtminstone icke betydligt



olik den nuvarande; att den n. v. *kannan* i nära 200 år varit oförändrad och utgjort $\frac{1}{16}$ kubikfot, men att sannolikt STJERNHELM bragte den derhän ifrån ett något större mått, samt slutligen att *skålpundet* äfven varit oförändradt från medlet af 1600-talet, då STJERNHELM något ökade dess vigt för att inpassa detsamma i sitt system, från den storlek hvarvid det sannolikt i långa tider tillbaka hållit sig.

Af det anförda torde dock derjemte — oaktadt jag här sorgfälligt undvikit den labyrinth, hvari man råkar, då man vill efterspana de olika måtten och mätningssätten vid mottagande och afleverering af spanmål m. m. å olika tider och orter, de olika vigterna för jern, koppar m. m. å olika platser o. s. v. — synas, huru nödigt det är att hafva ett ouppslösligt samband mellan längd-, yt- och rymdmåttet, deraf det naturligaste onekligen är det, då ytmåttets enhet är kvadraten på längdmåttets enhet, och rymdmåttets enhet är kuben på samma längdenhet, i hvilket fall ock allenast en likare för måtten erfordras och bära finnas, nemligen den för längdmåttet, samt att det äfven är nödvändigt att hafva en likare för vigten. Det är ock ur dessa skäl som Akademiens kommitterade — dit jag hade äran räkna mig — för afgifvande af utlåtande rörande rikets mått och vigt, tillstyrkte Akademien att i sitt till Kongl. Maj:t nyligen afgifna underdåniga förslag till stadga angående rikets mått och vigt foreslogo så väl nämnde principer antagande i afseende å sambandet mellan längd-, yt- och rymdmåttet, som de mest rigurösa föreskrifter i afseende å likarne för foten och skålpundet.

Slutligen torde ock detta lilla föredrag kunna föranleda en eller annan, som möjligen kunde påträffa äldre svenska mått och vigter, att rädda dem från förstörelse eller glömska.

Akademiska angelägenheter.

Till inländsk ledamot i nionde klassen kallades Conter-Amiralen, R. S. O. Hr C. A. VINEN.

Præses tillkännagaf, att Akademien bland sina inländska ledamöter genom döden förlorat: i åttonde klassen Hr J. A. LEYONMARCK och i den tredje Hr SAM. OWEN.

Akademien tillerkände Hr ÅNGSTRÖM det Lindbomska priset för hans afhandling: Optiska undersökningar, och Hr Prosector Dir FR. WAHLGREN i Lund det Flormanska för hans: Anteckningar öfver byggnaden af ryggmergen och ryggmerganglierna hos rockan.

Sitt årliga reseanslag af fyrahundrade Riksdaler Banco tilldelade Akademien Hr ÅNGSTRÖM för fortsatta undersökningar öfver jordmagnetismen, och Studeranden A. E. HOLMGREN för entomologiska undersökningar i Halland, hälften hvardera.

Inlemnade skrifter.

Af Hr. G. STENHAMMAR: Revision och systematisk uppställning af skandinaviska Copromyzinæ.

Remitterades till Hrr WAHLBERG och BOHEMAN.

Af Hr Amiralen J. H. KREUGER, sammandrag öfver vindarnas förhållande år 1853.

Remitterades till Hr ERDMANN.

Hr Löjtnant H. v. POSTS afhandling om Köpings sandås, hvilken varit remitterad till Hrr MOSANDER och ERDMANN, återlemnades med tillstyrkande af dess införande i Akademiens Handlingar.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af Kongl. Förvaltningen af Sjöårendena.

KLINT, GUST. AF, Sveriges Sjö-Atlas. (67 stora kartor in folio samt mindre).

Af Kongl. Norska Universitetet i Christiania.

Nyt Magaz. f. Naturvidenskab. VIII: 2, 1853. 8:o.

Saga Didriks Konungs af Bern. Christ. 1853. 8:o.

HOLMBØ, C. A., Norsk og Keltisk. Christ. 1854. 4:o.

BØECH, W., Klinik over Hudsygdommene i 1852. 8:o.

Af Författarne.

HEUFLER, LUD. DE, Specimen Floræ Cryptogamæ Vallis Arpsch. Viennæ 1853. Fol. (m. t.)

WALKER, FR., Insecta Britannica. Diptera. Vol. II. Lond. 1853.
8:o. (m. t.)

ZANTEDESCHI, FR., La Termocrosi di Melloni dimostrata insussistente. 4:o.

Af Utgifvarne.

Nya Botaniska Notiser 1854. N:ri 1 och 2. 8:o.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Mineralogiska afdelningen.

Af Hr Gentele.

Två stuffer bergsalt från saltgrufvan Wilhelms Glück i Würtemberg.

Till Akademiens Instrumentsamling.

Af Hr Apothekaren G. Lundberg.

Fem Tennmått (om 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ kanna samt en Sextarius Rom.) alla
med GEORG STJERNHJELMS namn och årtalet 1664.

ÖFVERSIGT

AF

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

N. 4.

Onsdagen den 19 April.

Föredrag.

1. *Nya algformer.* — Hr J. G. AGARDH hade insändt följande beskrifningar på nya alger.

1. *BRYOPSIS DUCHASSAINGII* J. Ag. *mscr.* fronde elongata parce dichotoma ramulis tenuissimis dichotomo-ramosis ubique vestita.

Hab. ad Guadeloupe: Dr Duchassaing.

Frondes 4—6-pollicares, ambitu cylindraceæ, plumulam elongatam gracillimam referentes, filo primario ramulisque investientibus constitutæ. Fila primaria simpliciuscula aut parce dichotoma, millimetrum dimidium æquantia, totam frondis longitudinem percurrentia. Fila secundaria ex primariis undique egredientia, ordine nullo mihi conspicuo, ita subtilissima ut oculo inarmato singula nequaquam discernantur, in aqua fluctuantia et nubeculam referentia. Sunt hæc pluries dichotoma, ramulis elongatis ut tota planta continuis.

Habitus a cæteris generis speciebus abludit, ita ut genus sui juris forsan suspicari liceret. — Alga pulcherrima.

1. *BATOPHORA* J. Ag. *mscr.* Gen. nov. ex Siphonearum familia inter Oliviam et Dasycladum intermedium.

Frons nuda, clavato-cylindracea, ab axi simplici tubuloso emittens ramos distantes verticillatos; rami abbreviati, ramulis inferne verticillatis, dein trichotomis, superne dichotomis, articulos mentientibus, constituti; juniores tenuiores subpenicillati, adultiores breviores obtusi. Fructus ex ramulis transformatis orti, oppositi aut verticillati, ellipsoideo-sphærici, botryoideo-areolati intra perisporium hyalinum firmum conceptacula plurima clavato-prismatica circa spatium centrale circumcirca disposita, foventia.

Genus habitu fere Dasycladi, ramis vero remotioribus ramulisque tenuioribus longe acuminatis, terminalibus subpenicillatis jam distinguendum. Accuratius inspecta planta offert fructum peculiaris omnino indolis, cujus nihil analogum in Dasyclado saltim adhuc cognitum novi, cum fructu Olivie forsan potius

comparandum. Ramuli nempe omnes superiores ramorum sensim in fructus sphaericos aut aliquantulum ellipsoideos transformantur, ita ut planta fertilis, fructibus dense onusta, ramum Rubi fructibus ornatum haud male refert. Fructus singuli nec male fructum Rubi idæi referunt; a superficie visi monstrant intra membranam firmam hyalinam areolas virides 5—6-gonas arcte conjunctas superficie convexas; transversaliter secti offerunt spatium internum vacuum, circa quod cellulae virides stratum unicum infraperiphericum circumcirca efficiunt; cellulae hae sunt clavato-obovatae, angustiori apice rotundato spatium internum fructus limitante, latiore apice areolam convexam superficiei efficiante. Cellulas conceptacula nominavi, utpote sporidia aut sporas intra illas evolutas, analogia ex Oliva petita, suspicor. Si in Dasyclado fructus ejusdem generis detegerentur, genus utrumque conjugere non dubitarem.

2. B. OERSTEDI *J. Ag. mscr.*

Hab. ad radices Rhizophoræ Mangle in sinu substagnanti, »Krauses lagoon» dicto, ad Insulam St. Crucis: Oersted.

Frondes circiter bipollicares, crassitie digiti minoris, in caespites conjunctae. Filum primum inferne crassitie fere pennae passerinae nudiusculum, superne tenuius ramulisque obsitum, spatio inter verticillos proximos diametro fili primarii bis-ter longiore. Ramuli in parte vetustiore caulis rigidiores, breviores et obtusi, in parte juvenili et superiore subpenicillati, ob ramificationem umbellatam trichotomam aut dichotomam quot ramulis tot articulis quasi constituti. Articuli cylindracei, inferiores diametro 2—3plo, superiores multiplo longiores. Color fere Dasycladi. Exsiccata effuso succo chartam tingit.

In habitu et ramificatione frondis similitudo cum Nitella adest, velut in dispositione conceptaculorum intra fructum quandam cum antheridiis ejusdem analogiam forsitan quis videat.

3. CONFERVA CENTRIFUGA *J. Ag. mscr.* globosa peripherice increscens medio demum dilacerata, filis infra ambitum pannoso-intricatis distanter patentissime ramosis, ambitu radiantibus liberis, articulis diametro duplo-triplo longioribus, membrana filis grossis rugosa.

Hab. ad ripas amnis Nicaraguae: Oersted.

An genus diversum? Membrana articularum mirum in modum rugosa, rugis, ni fallor, a fibris grossis membranam constituentibus ortis.

4. ECTOCARPUS CLAVIFER *J. Ag. mscr.* caespite unciali olivaceo-virente, fronde inferne sub-dichotoma, ramis distantibus abbreviatis, superne sparse ramosa, articulis inferioribus ad genicula subcontractis diametro 2—3plo longioribus, supremis parum conspicuis abbreviatis; propagulis eximie clavæformibus sessilibus truncato-obtusis, articulis brevissimis areolatis.

Hab. ad Guadeloupe: Duchassaing.

Recens gelatinosa videtur; exsiccata fere Schizonema referens, cujus inter fila tenuia propagula crassa etiam oculo nudo con-

spicua. Microscopio subjectum *Confervam* crederes. Propagula infra geniculum lateraliter adnata, omnino sessilia, erectiuscula, filis duplo crassiora, diametro ipsorum 4plo longiora, clavato-cylindracea, truncato-obtusa, articulus diametro 4—5plo brevioribus, articulo quoque in areolas 4—6 oculo conspicuas divisio.

Species distinctissima, ad *Ect. fenestratum* Berk. proxime accedens, propagulis sessilibus eorumque forma, articulisque florum, ut videtur, distinctioribus diversa.

5. *CRYPTONEMIA PHYLLANTOIDES* J. Ag. *macr.* caule ramoso in laminas stipitatas lanceolato-oblongas simpliciusculas aut furcatas evanescenti-costatas margine vix undulatas abeunte, foliolis novellis a margine pullulantibus obovato-lanceolatis, faveillas numerosas gerentibus.

Hab. ad ostia fluvii Gabon: Hb. Le Normand!

Caulis 3—4 pollicaris, residuis folii membranacei plus minus anceps, in ramos plures, totidem folia gerentes, divisus. Folia 2—2½ pollicaris, latiora pollicem lata, basi lato-cuneata, apice plerumque obtusissima, infra medium sæpius latiora, nunc fere æquali latitudine a basi ad apicem, juvenilia obovata, plerumque simplicia, nunc in folia 2, alias conformia, divisa, margine vix undulata, singula stipite brevi, in nervum infra medium folii evanescentem continuato, suffulta; sterilia margine auda; fertilia in fimbrias secus marginem numerosissimas producta. Foliola fructifera sæpe vix lineam distantia, 1—2 lineas plerumque longa, lanceolato-obovata, nunc *Opuntia* in modum contracta, nunc ipsa in foliola minora, a margine provenientia, divisa. Cystocarpia numerosa foliolis singulis immersa. Structura frondis et fructus cum aliis speciebus generis convenit.

Cr. seminervi proxima species.

6. *GELIDIUM SERPENS* J. Ag. *macr.* fronde ancipiti-subplana, tota decumbente et radicante, 3—4-pinnata, pinnulis a basi parum attenuata linearibus obtusis integerrimis, fertilibus a fronde adscendentibus erectis simplicibus clavatis infra apicem sphærosporas in zonam transversalem collectas gerentibus.

Hab. ad lapides conchasque prope Realejo Nicaraguz, Oersted!

Crescendi modo eximie distincta species. Supra lapides conchasque expansa, centrifuge et quoquoversum serpens, arcte adnata, demum in parte centrali, ubi ramuli fructiferi densissimi eriguntur, quasi strato peculiari, lineas 1—2 alto, obducta. Ramificatio cæterum *Gelidii* cornei. Ramuli fertiles densissimi subclavati, nempe infra apicem obtusum zonam sphærosporarum leniter elevatam gerentes. Sphærosporas inter fila strati corticalis plurimas obovatas vidi, divisas vero nullas.

Cum *Gelidio* corneo var. *lepadicola* Post. et Rupr., quod erectum crescit, nullo modo confundenda.

7. *DELESSERIA OPUNTIOIDES* J. Ag. *macr.* repens, fronde costata dichotoma articulata constricta, articulis ellipsoideis isthmo filiformi radicante sejunctis, soris...

Hab. ad oras Guineæ: Hb. Le Normand!

Frons pusilla pollicaris repens et radicans, in spec. viso parce dichotoma, Opuntiae in modum articulatum constricta. Articuli lineas 3—4 longi, linesque lati, basi longius cuneati, apice rotundati et in isthmum filiformem contracti, cujus ex inferiori pagina radiculae demittuntur.

Ad Deless. Leprieurii proxime accedit, at isthmis omnino filiformibus et forma articulorum diversa videtur.

II. *MESOTREMA J. Ag. mscr.* Genus novum, Martensiae proximum.

Frons membranacea plana flabellato-laciniosa, areolato-cellulosa et in media fronde flabellatim fenestrata. Fructus . . .

Genus Martensiae proximum, at diverso evolutionis modo, donec detegantur fructus, distinguendum. In Martensia pars contigua frondis primum formatur, dein insequente evolutione partis fenestratae. Haec autem, auctore Harvey, ita formatur ut infra lineam periphericam angustissimam oriantur foramina, quae sensim dilatantur, novis foraminum seriebus infra marginem continuo formati. In Mesotrema vero reticulum ex dilatatione flabelliformi frondis pendere videtur. Infra extimam nempe seriem cellularum, quae ipsam constituit peripheriam, cellulae radiatim in lineas disponuntur. Ut flabellatim expanditur frons, cellulae radiatae separantur, ita ut lineae quaeque columna fiat separata, quae inferiorem frondem cum lineis non interrupta cellularum peripheriam constituentium conjungat. Foramina itaque quasi distensione frondis oriuntur, et quo magis flabellatim expanditur frons, eo majora evadunt foramina. Hinc sequitur ut foramina inferiora superioribus minora sint, utpote in parte laciniae formata, quae minus quam superior extenditur.

8. *M. PAVONIA J. Ag. mscr.*

Hab. in mari Indiae Occidentalis, ut ad Guadeloupe: Duchassaing!

A stipite compresso, duplici strato contexto, nempe cellulis interioribus majoribus magisque angulatis, exterioribus minoribus, frons in laminam 1—2-pollicarem, membranaceam, roseam, cuneato-flabellatam, margine laciniatam, sensim expanditur. Laciniae sensim frondi conformes evadunt, atque ut frons primaria in disco sensim fenestratae; in parte contigua areolatae, areolis minus regularibus, et hic illic nervis longitudinalibus flabellatis percursum; nervi cellulis magis elongatis, alias conformibus constituuntur. Pars fenestrata constat columnis flabellatim radiantibus, in utraque pagina a seriebus cellularum radiatis provenientibus. Supra reticulum continuatur frons laciniosa; ut in lacinia quadam expansio flabellata inchoatur, oritur quoque reticulum huic laciniae proprium.

III. *HALOPELTIS J. Ag. mscr.*

In speciebus Alger. Vol. II. p. 607. Rhodomeniam australem Sonderi et Acropeltid. chilensem Montagnei ad idem genus (Acropeltis) retuli. Occasione vero dein mihi oblata plantam Montagnei videndi, diversum omnino genus in hac agnovi. Hinc novum

nomen nostro generi fingere cogor. Ad Halopeltidem itaque pertinet Rh. australis Sond. cum descriptione speciei et generis a me loc. cit. data. In Acropeltide vero, cujus Acr. chilensis unica mihi cognita species, frons tota interior filis elongatis contexta videtur; in medio frondis fila magis longitudinalia, fere costam immersam formantia, in reliqua parte magis transversalia et ab una ad alteram paginam transeuntia. Hæc fila interiora in fila verticalia brevissima strati exterioris, mucro solidescendo involuta, abeunt. Pelta, in utraque pagina infra apicem elevata, constat filis verticalibus magis evolutis et laxiori mucro cohibitis, inter quæ sphærosporas magnas cruciatim divisas vidi. Quoad locum in Systemate Acropeltis adhuc dubium manet; forsitan prope Grataloupian disponendum? Næ itaque confundantur Acropeltis, Halopeltis Acrodisci et Acrotyli species — omnes exteriore forma fructificationis mire convenientes, habituque similes, structura autem diversissimæ — probe observandum.

2. *Fossilt Os petrosum af en stor Hval-art.* —

Hr Magister MATHESIUS i Skara hade till Hr A. RETZIUS öfversänt ett mycket eget bildadt os petrosum vägande $7\frac{1}{2}$ uns, samt 12 centimeter långt, $4\frac{1}{2}$ centim. bredt på midten, af halfmånförmig skapnad, med flere gropar och hål, af hvilka ett i den smalare ändan var genomgående, troligen för 7:de nersparet. Inuti kunde man se runda böjda kanaler äfvensom en öppning till snäcken. Benet var, ehuru sönderslaget, vid upptagningen dock väl bibehållet. Det hade blifvit kemiskt undersökt af Artis veterinariæ Adjunkten FÖRSELL, och befunnet innehålla qvar såväl benbrosk, som kalksalter. Magister MATHESII berättelse om fyndet lyder som följer:

»År 1853 i April månad träffades nära Kinnekulle detta ben jemte några flera, äfven fossila — ett af de senare lärare haft mycken likhet med det i Prof. NILSSONS Skandinaviska Fauna öfver Daggdjuren p. 640 och fig. 3 upptagna ben, men var ej fullständigt; då jag visade bonden, som uppgrävt dessa ben, anförda pagina, pekade han genast på nämnda figur och dess högra sida samt uppgaf, att detta benstycke var ungefär 3 à 4 tum långt och $\frac{1}{2}$ tum tjockt. Endast labyrinthen tillvaratogs, de öfrige hade bonden och hans folk sönderpackat samt använt jemte närliggande grus till fyllning vid en kallarebyggnad. Stället,

hwarest fyndet gjordes, har, så långt mannaminne räcker, benämnts *Simberg*, beläget straxt nedanför Kinnekulle i Österplana församling, Kjestad socken, utgörande en mindre hög sandkulle af några tunnlands areal; denna sandkulle är skiljd från nedersta delen af Kinnekulles sandstens-lager genom en, några famnär bred dråg. För öfrigt iakttages ingen ytterligare sandkulle deromkring, utan är den *Simberg* angränsande marken öfverallt sluttande, äfven åt Kinnekulle-sidan, och utan märkbara upphöjningar. *Simberg* synes under en icke så särdeles aflägsen tid hafva varit kringflutet. Det består, åtminstone der ifrågavarande gräfning skett, af väggrussand, blandad med större stenar. Benen träffades på planen nära intill en f. d., på stället befintlig, vargrop ungefär en aln under jorden, och hafva icke osannolikt, vid denna grops anläggning, medföljt bottenjorden, då den uppkastades och spriddes, hvarföre det icke är osannolikt, att den egentliga fundorten för sådana ben är att söka i den i senare tider igenfyllda varggropens botten — att genomgräfvad denna och undanföra jorden torde medtaga omkring 30 dagsverk.

Den 11 dennes begaf jag mig till stället och inhemtade ofvannämnde notiser, lät äfven vid tillfället några man gräfvad en stund; men i stället för hval-ben träffades en mängd hästben. Utan tvifvel hade å denna lokal, då rofdjur der fångades, hästar dödats, för att ditlocka rofdjur, och dessa ben, sedan rofdjursfångsten upphört, begagnats till fyllning af gropen.

Egaren af *Simberg*, som just å detsamma nyligen uppfört sin bostad, har lofvat att, i händelse vidare några ben af ovanlig beskaffenhet skulle påträffas, dem tillvarataga och derom lemna mig underrättelse. Nästa sommar är min afsigt att, så vidt tiden medgifver, ytterligare på detta ställe undersöka.

Det omskrifna benet skänktes vid innevarande termins början af en Studerande *Frimanson* från Österplana till härvarande Elem. Läroverks Naturaliesamling.»

3. Om den stora fettdroppen i fiskarnes ägg. —

Hr A. RETZIUS meddelade en kort berättelse om de befruktnings- samt kläckningsförsök med fiskrom, som nyligen blifvit anställda på Kongl. Carolinska Institutet af Friherre GUSTAF CEDERSTRÖM. Hr RETZIUS hade genom bemälte Friherres benägna nit för denna sak kommit i tillfälle, att i någon mån följa de intressanta förändringar, som försiggå i fiskarnes ägg före och efter befruktningen. Af det Hr RETZIUS iakttagit, ansåg han sig här böra anföra något rörande de förändringar, hvilka visa sig i den del af ägget, som utgör gulan, eller de olika former, under hvilka fettcellen och ägghvitan i denna del framställa sig.

Vid de tillfällen, då han förut undersökt fiskrom, hade han alltid sett ägguleblåsan fylld med ett emulsionslikt innehåll af talrika små, men gröfre och finare fettdroppar, liksom uppslammade i ett klarare ägghvitelikt fluidum. I den rom af Lake som Hr RETZIUS nyligen undersökt, tagen af individer från Östersjön och under lektiden, fann han innehållet helt olika, nemligen en enda stor oljedroppe simmande på den klara ägghvitelika vätskan och alldeles åtskiljda.




Fig. 1. Fyra romkorn af Lake, tagna under lektiden af obefruk-
tad rom, sedda under svag förstoring ofvanifrån; a fettdroppen, b ägghvitevätskan i äggulan, c groddmassa för embryots början.

Denna fettdroppe eller, om man så vill kalla densamma, fettcell, har ett för den ovande betraktaren förvånande utseende.



Den är ganska stor, har särdeles mörk skuggning i omkretsen och simmar alltid öfverst. Den kan ses äfven med blotta ögat, ehuru väl Lakrommen är ganska fin. Noga betraktad, från sidan, befinnes den vara linsformigt utplattad emellan ägguleblåsans vägg och det vattenhaltiga, albuminösa fluidum på hvilket den är intryckt.

RATHEK har i äggen hos *Blennius viviparus* (Abhandl. zur Bildungs- und Entwicklungs-Geschichte, 2:r Th. p. 6) beskrifvit 16 till 20 sådana fettdroppar. v. BAER citerar detta i sitt klassiska arbete: *Untersuch. ueber die Entwicklung der Fische*. v. BAER yttrar: »Nach RATHEK sind im *Blennius viviparus* ursprünglich mehrere Oeltropfen, die während der Entwicklung zu einem Oelbläschen sich sammeln. Im keinem der von mir untersuchten Cyprinus-Laiche fand ich einen gemeinschaftlichen Oeltropfen.» Af samma ställe synes det, att CARUS framställt samma oljedroppe i äggen af *Cyprinus dobula*, som BAER derföre anser tillhöra antingen Gers eller Aborre. BAER såg äfven samma oljeblåsa hos Gösen, Gersen och Aborren. Hos Gäddan, så väl som hos *Cyprinus*-arterne, fann han fettets fördeladt i talrika oljedroppar i äggulans peripheri.

Deremot hade RETZIUS i befruktad rom af Gädda sett den stora oljeblåsan, liksom han flere gånger sett den saknas hos Aborre, och i stället funnit äggulan hos denna sednare innehålla små oljeblåsor i oräknelig mängd. C. VOGT har i sitt förträffliga arbete, *Embryologie des salmons (Histoire Naturelle des Poissons d'eau douce de l'Europe centrale* par AGASSIZ, Neuchatel 1842) på dessa förhållanden äfven lagt stor vikt. Han yttrar: »Äggulan (hos fiskarne) liknar till yttre egenskaper mindre gulan än hvitan hos fåglarne. Den består af en klar, homogen klibbig vätska utan spår till celluler eller andra småkroppar, såsom hos andra djur.» »Jag lägger en synnerlig vikt på denna omständighet, emedan den utöfvar så viktigt inflytande på embryot's bildning.» — — »En annan viktig del af gulan utgöres af de oljedroppar, som simma på dennas yta» — — »till följe af deras mindre specifika vikt, drifvas de från den öfriga gulan

och utplattas emot dennas hinna. Denna mindre specifika vigten af oljedropparne förorsakar äfven, att de samla sig på ett ställe, der de bilda en discus, som alltid är uppåt vänd, så länge som ägget ligger i vatten» etc. Det synes häraf, som vi längre fram skola finna, att ehuruväl den utmärkte författaren så riktigt uppfattat förhållandet med fiskgulans beståndsdelar af fett och klar ägghvita, utan egentliga celler, så har han dock, efter all sannolikhet, endast uppfattat ett öfvergående stadium, under hvilket fettet samlat sig i några färre droppar på gulans yta. Detta måtte till en del äfven hafva varit fallet med v. BAER, som tyckes af fettdropparnes olika förhållande vilja igenkänna romkorn af olika fiskar. Sålunda säger BAER: »I de flesta ägg förekomma små oljedroppar, dessa äro särdeles små hos *Cyprinus blicca*, och *erythrophthalmus*, större och färre hos *gäddan*, der de ligga i perefieren af fröstället. De äro samlade i en droppe hos *aborren*, *gersen* och *gösen*,» tilläggande i följe häraf: »Jag kan till följe af detta olika förhållande icke anse dem ega den stora fysiologiska betydelse, som man velat tillägga dem.» Hvad nu *aborren* beträffar, har RETZIUS, hos de individer han undersökt, längre tid före lektiden icke träffat den stora oljedroppan, utan i stället otaliga små, öfver allt i gulan kringsspridda droppar, som närmare lektiden tyckas blifva färre och större. Detta var äfven förhållandet med *laken*. Det är redan här anfördt, att *lakens* rom under lektiden endast har en oljedroppa. Den lakrom som Hr RETZIUS erhållit från Friherre CEDERSTRÖM var af lake, som blifvit fångad i Östersjön. Kort efter undersökte Hr RETZIUS insjölake, som leker en månad senare än Östersjö-laken. Hos denna visade sig rommen såsom i fig. 2.

Fettet var här fördeladt i en mängd dels större, dels mindre oljedroppar, spridda igenom hela äggulemassan. De större oljedropparna voro här icke enkla eller klara, visade icke den mörka ringen i omkretsen, utan voro granulerade af otaliga ännu mindre korn, nästan såsom de stora cellerne i fåglarnes äggula.




Fig. 2. Rom af *Gadus Lota*, tagen ungefärligen en månad före lektidens början.

I de små, utbildade ägg, som sitta inneslutna i äggstocks-väggen af de flere fiskslag, som förekomma på torget i Stockholm, och i hvilka den purkinyeiska förblåsan ännu är stor i förhållande till sjelfva den ringa utbildade gulan, har RETZIUS i allmänhet endast funnit spår till oljedroppar i sjelfva denna blåsa. Det är sannolikt dessa droppar, hvilka VOGT beskriver såsom delar af *fröfläcken* (l. c. p. 4), då han säger: »Fröfläckarne som fröblåsan innehåller till ett antal af 6 eller 12, äro omgifna af en ganska klar vätska: de äro i allmänhet små klara blåsor, liksom sjelfva fröblåsan, men af mindre cirkulär form.» »Jag har ofta funnit dem liksom vidhäftade fröblåsans vägg, men vid andra tillfällen har jag trott mig se dem fritt flytande.» COSTE afbildar äfven dessa droppar i den purkinyeiska blåsan af spiggens ägg, utan att man likväl finner dem omtalade i texten till arbetet.

Hr RETZIUS framställer derföre den åsigt, att den WAGNERSKA fröfläcken hos fiskarne består af fettpartiklar, hvilka småningom genereras, tillväxa i antal, förena sig med hvarandra och uppträda såsom små droppar eller blåsor. Allt efter som dessa taga öfverhanden tyckas de utvidga fröblåsan och fortsätta sin bildning genom hela gulan. Hr RETZIUS tror äfven att fröblåsan genom denna process hos fiskarne tidigt förstöres. Han tror att detta förhållande kan sprida mycket ljus öfver såväl fröfläckens (såsom kärnkropp) och fröblåsans (såsom kärncell) rätta betydelse.

Korteligen, ett närmare studium af dessa skiftande förhållanden af fett och ägghvitevätskan i fiskrommen tyckes i hög grad bekräfta den af STANNIUS nyligen så snällrikt anvisade naturlagen, som anföres i hans sistlidna år utgifna märkvärdiga skrift: *Beobachtungen ueber Verjüngerungsvorgänge im thierischen Organismus*, p. 64, då han yttrar: *Das wichtigste was diese Abhandlung giebt, ist aber, meiner Ueberzeugung nach, die Hinweissung auf unabsehbare Reihen von chemischen Processen im lebenden Thiere, bei welchen Fett- und Eiweiss-modificationen die wesentlichste Rolle zu spielen scheinen etc.*

Ingenstädes tyckes detta förhållande ligga närmare till hands, i enklare eller klarare form under våra ögon än i ägget, och, såsom vi se, förnämligast i fiskarnes ägg. Vi torde härvid kunna antaga, att flertalet af de olika materialier, som ingå i embryot's bildning, till sina elementardelar förbindas med endera af nämnda två hufvudformer, nemligen fett och ägghvitan, och under dessas inbördes inverkan på hvarandra framkalla de mångfaldiga delar, af hvilka organismen bygges och underhålles.

Äfven flera dagar sedan gulan blifvit innesluten inom buk-kaviteten hos de små fiskembryonerne, kan man se oljedroppen qvarstående på gulan genom de klara bukväggarne. Detta har äfven CARUS VOGT m. fl. längesedan iakttagit och afbildat. Hos de lakungar som kläcktes af rom hitsänd af Friherre G. CEDERSTRÖM syntes denna droppa ganska stor ännu 10 dagar sedan ungen lemnat ägget.




Fig. 3. Lakunge, 10 dagar gammal, sedd under mikroskopet, vid svag förstoring; a den ännu stora äggulesäcken; b oljedroppen.

4. Land- och Sötvattens-Mollusker i nord-östra Skåne. — Hr S. M. Adjunkten WALLENGREN meddelade genom Hr LOVÉN följande:

»Den trakt af nordöstra Skåne, som utgöres af Ljungby, Ifö och Ifvetofta pastorater, gränsar i öster till Östersjön, i norr och nordost till Blekinge, från hvilket den skiljes genom en hög ås, kallad Ryssberget, som äfven utgör gränsen i nordvest. I vester utgör Kiaby sjö samt en större torfmosse och ett för några få år tillbaka nästan otillgängligt morass den naturliga gränsen, och i söder finnas vidsträckta flygsandsfält, hvilka väl numera i allmänhet äro bundna, dels genom furuplanteringar, dels genom sandhafra, men likväl på åtskilliga ställen ännu icke hafva helt och hållet aflagt sin ursprungliga beskaffenhet.

Största delen af denna trakt hvilat på kritlager, som i vester och öster sträcker sig från Kiaby, der den för sina petrifikater väl bekanta Kjugekulle är belägen, till Sissebeck, der det åter träder i dagen i närheten af den så kallade »Oreliden», hvarest Blekinge börjar. Åt norr går det ända in under Ryssberget och åt söder likaledes under sandfalten. På åtskilliga mellanliggande ställen finnes det i öppen dager, men på andra deremot träffas det först på 44—45 alnars djup. Detta sednare är isynnerhet förhållandet, der åsar af hopad, numera stadnad flygsand hafva lagt sig. Åt vester sammanhänger således detta kritlager med det stora Skånska, som stryker fram vid Oppmanna, Ignaberga m. fl. st., och åt öster, utan tvifvel, likaledes med det kritlager, som träder i dagen i närheten af Carlshamn.

Norra delen af ifrågavarande område, närmast intill Ryssberget, är utaf backig natur, emedan nämnde ås förgrenar sig deruti. Den är också bevuxen af stora och vackra bok- och ekskogar, men har äfven torfmossar, kärr och morass. Medlersta delen deremot, som är af jemnare beskaffenhet, utgöres af furuskogar och odlade fält, samt är genomdragen med ett nät af insjöar och träsk. Den södra delen, som i allmänhet är flack, intages af ofvannämnda sandfält.

Att en trakt af så varierande beskaffenhet skall erbjuda naturforskaren ett rikt fält till skörd, kan man redan hoppas. Också visar sig vid närmare undersökning en stor rikedom på sällsynta naturalster inom nästan alla klasser. Mineralogen erbjudes bland annat afven den sällsynta och inom Sverige endast här förekommande *Pyrophylliten*; botanisten kan bland många andra sällsyntheter här hemta: *Malaxis Löselii*, *Sonchus palustris*, *Potentilla opaca*, *Pilularia globulifera*, *Chara nidifica*, *Dicranum flexuosum* o. s. v.; Palæontologen skall icke eller missnöjd återvända från Kjugekulle och Iföns »Ungsmunnar». Hvad Zoologen här har att söka, finnes väl egentligen icke så mycket bland de högre djuren, som fast mera bland de lägre; ehuru afven här kan bland de förre träffas: *Sorex pygmaeus*, *Alauda alpestris*, *Hyla arborea*, *Acipenser sturio* o. s. v. Hvad insekterne beträffar, har Prof. BOHEMAN i sin »Resa i Södra Sverige 1854» uppräknat en mängd sällsyntare arter, såsom funna här, och sedan dess hafva åtskilliga andra blifvit anträffade, hvarom till en del uppgift blifvit lemnad uti de gång efter annan till Kongl. Akademien insända bidragen till kännedomen af vår fauna; och hvad Crustaceerna angår, har Prof. LILJEBORG uti sitt arbete om »Skånes Cladocera, Ostracoda och Copepoda» uppgifvet flera sällsynta, till dessa ordningar hörande arter såsom förekommande här, hvartill numera afven kan fogas den för vår fauna nya: *Bosmina longirostris* BAIRD, som jag sistliden höst fann uti Blekesjö vid Ljungby.

Att trakten afven skall vara rik på land- och sötvattensmollusker är tydligt, isynnerhet hvad de sednare beträffar. Vattendragen äro många, ehuru icke mer än en större å genomlöper området, nemligen den vid Årup, genom hvilken Ifösjön har sitt utlopp i hafvet, sedan den upptagit vattenmassor afven från Kiaby och Lebrasjöar. Dessa nämnda trenne äro de största insjöar trakten eger, och de hafva till största delen sandbotten, som der och hvar är bevuxen med *Chara*, *Potamogeton* och andra vattenväxter; men trenne mindre finnas afven: Blekesjö, Wagne och Sisse sjöar, hvilka likväl hafva dybotten, samt äro till

en del genomvuxna af *Scirpus*, *Schoenus*, *Arundo*, *Iris* och *Acorus*. Dessutom är rik tillgång på kärr, morass och torfmossar, bland hvilka sednare isynnerhet den vid Ljungby utmärker sig derigenom, att han hvilar på en slags hvitaktig gyttja, som innehåller en otalig mängd Cyclader, Lymnæer och Paludiner af samma arter, som ännu lefva uti den närbelägna Blekesjön. Denna torfmosse är fyra alnar djup, hvarefter bottenlagret vidtager.

Sedan jag förutskickat dessa anmärkningar rörande sjelfva trakten, öfvergår jag till egentliga föremålet med denna uppsatts, att lemna en öfversigt öfver de land- och sötvattens-mollusker, som inom uppgifna område hittills blifvit af mig funna under den följd af år, jag egnat min uppmärksamhet åt dessa djur. Vid uppgörandet af förteckningen har jag hufvudsakligen följt den af Prof. Nilsson år 1822 utgifna *Historia Molluscorum Sueciæ terrestrium et fluviatilium*, såsom ännu varande hufvudarbetet för denna del af vår fauna.

LIMAX ater. Skogarne. Allm. *L. albus*. Skog. Sälls. *L. rufus*. Skog. Teml. sälls. En märkelig varietet af denna art har jag funnit, som eger följande karakterer: *supra fuscescente rufus, capite nigricante, clypeo nigro-punctato, limbo rufo*. Den påminner mycket om *L. ater*. var. δ . — *L. fasciatus*. Allm. öfver allt. *L. flavus*, teml. sälls. *L. cinereus*, teml. allm. *L. cinereo-niger*. Skog. sälls. Dessa båda träffas icke sällan tillsammans. *L. agrestis*. Allm. öfverallt.

VITRINA pellucida. Öfverallt, isynnerhet uti skogarne. Från Westmanland och Dalarne meddelad af Målarmästaren FREDRICSSON.

HELIX bidentata. Leingeryd; teml. sälls. *H. fulva*. Allm. *H. pomatia*. Årup och Ljungby. *H. arbustorum*. Allm. *H. nemoralis*. Allm. *H. hortensis*. Allm. *H. fruticum*. Allm. *H. strigella*. Bland buskarne vid Lebrasjö ganska allmän. *H. incarnata*. Vid Leingeryd, sällsynt. *H. hispida*. Allm. *H. lapicida*. På Ryssberget allmän. Från Westmanland och Dalarne meddelad af Hr FREDRICSSON. *H. pulchella*. Allm. *H. rotundata*. Allm. *H. rudrata* STUD. teml. sälls. *H. pygmaea*. Årup, sälls. *H. cellaria*, teml. allm. *H. nitida*, allm. *H. crystallina*, allmän.

BULINUS obscurus. Leingeryd, sälls. *B. lubricus*. Allmän.

SUCCINEA amphibia var. α et β . Allmän. (*S. Pfeifferi* är ännu icke funnen i orten.)

CLAUSILIA bidens, teml. sälls. *C. plicatula*, teml. sälls. *C. rugosa*, allm.

PUPA muscorum, allmän. *P. edentula*. (Denna art, som, sedan den blifvit funnen först på Gottland, upptäcktes vid Esperöd i Skåne 1845 af Mag. HULTMARK, enligt underrättelse i bref och medde-

lade exemplar, har jag äfven funnit i närheten af Leingeryd. Vid Snäckgårdet nära Wisby på Gottland, fann jag den 1849 bland *P. muscorum* och *P. umbilicata*, men likväl på fuktigare botten än dessa båda allmänast förekommo. Så är den också i Skåne funnen på fuktig gräsbotten, då deremot *P. muscorum* synes mera föredraga sandiga ställen. Från alla tre lokalerna öfverensstämma exemplaren med hvarandra). *P. fragilis*. Skog. allm. *P. anti-vortigo*, teml. allm. *P. pygmaea*. Årup, sälls. *P. vortigo*, sälls.

AURICULA minima, allmän.

PEPSA fontinalis och *Ph. hypnorum*, teml. allmänna.

LYNAEA stagnalis. Allm. Ut i Blekesjö, som utmärker sig för att bysa gigantiska exemplar ur nästan alla former bland sötvattens-mollusker, förekomma de största af denna art, jag någorstades sett. De äro ofta ända till 70 millim. i längd; för öfrigt likväl lika de vanliga, endast ej så groft strierade på sista vridningen. *L. auricularia*. Lebra- och Kiaby-sjöar; teml. allm. *L. ovata*, allm. *L. balthica*; vid Östersjön allm. *L. succinea*, vid Edenryd, teml. allm. *L. peregra*, allm. *L. palustris*. I närheten af Leingeryd; sälls. *L. fusca*, allm. Träffas äfven vid Östersjökusten. *L. minuta*; Bleke- och Wagne-sjöar, samt Kiaby torfmosse; temligen allmän.

PLANORBIS contortus, allm. *P. corneus*, allm. *P. hispidus*. Kiaby torfmosse, allm. *P. spirorbis*, allm. *P. vortex*. Blekesjö; teml. sällsynt. *P. marginatus*, allm. *P. carinatus*, allm. *P. nitidus*, teml. sällsynt.

ANCYLUS fluviatilis, sällsynt.

VALVATA piscinalis, Lebra- och Blekesjöar, teml. allmän. *V. cristata*, allmän.

PALUDINA Listeri (FORB.), allm. *P. impura*, allm. *P. balthica*, Östersjön; allmän.

NERITINA fluviatilis, allmän.

CYCLAS cornea, allm. *C. lacustris*, allm. *C. calyculata*, teml. sällsynt.

PISIDIUM obliquum, teml. sälls. *P. pulchellum*, allm. *P. henslowianum*, Lebrasjö; sällsynt.

UNIO tumidus, limosus et pictorum, Kiabysjö; allm. *U. batavus*, Kiaby-sjö; sälls.

ANODONTA piscinalis NILSS. Kiaby torfmosse, sälls. *A. cellensis* SCHNÖT. Blekesjö, sälls. *A. anatina*, Lebra- och Ifö-sjöar. Allm. *A. rostrata* KOCK. Ifö och Blekesjöar, sälls. *A. ponderosa* PFEIFF. Kiaby-sjö, allm. *A. complanata* ZIEGL. Kiaby-, Ifö- och Wagne-sjöar; sälls. *A. intermedia* PFEIFF., teml. allm. *A. cygnea* LIN., Blekesjö; sällsynt. (Från Westmanland och Dalarne har jag genom Hr FREDRICHSSON erhållit *A. anatina*, *rostrata* och *intermedia*).

5. Hafsfaunans regioner vid Norges kust. —

Hr LOVÉN meddelade följande utdrag ur ett bref från Hr CANDIDAT P. CEM. ASBJÖRNSSEN i Christiania:

»Først i Slutningen af Oktober f. Aar vendte jeg tilbage til Christiania fra min Reise til Hardangerfjorden og Bergens Stift. Udmod Havet, ved Moster og Bømmeløen opholdt jeg mig en Maaned; den største Dybde, som her forekom var 240 Favne. I Quindherrred længer ind mod Fjorden var jeg tre Uger; her angav man de største Dyb at være 300—400 Favne. Inde i den egentlige Hardangerfjord, i Kintservig og Ullensvang tilbragte jeg en Maaned. Her forekom efter Fiskernes Angivelse Dyb af 500—600 Favne, noget som jeg ingenlunde finder usandsynligt, da Skrabben ofte inde ved Land gik lige ned til et Dyb af 200 Favne. Den største Dybde jeg naaede var 250 Favne eller knapt det. Det hændte mig derfor meget ofte, at jeg aldeles ikke fik Skrabben i Bunden.

Den almindelige Erfaring, som jeg gjorde under Reisen med Hensyn til de bathymetriske Forhold var den, at de af Sars angivne Regioner ikke rigtig synes at holde Stik. Ude mod Havet der gaaer det vel nogenlunde efter den opstillede Norm, skjøndt ogsaa der synes mig at være betydelige Afvigelser; men inde i Fjordene stiger Alt dybere ned, og lader sig med Hensyn til sin Forekomst aldeles ikke bringe under saa sikre og bestemte Regler, som de man har antaget som almeengjældende, idetmindste for Havkystens Vedkommende. KOREN har gjort den samme Bemærkning for de nærmest Bergen værende Fjorde. Lokaliteten og Bundens Beskaffenhed spille vist en langt større og vigtigere Rolle herved end man skulde troe. Ved Neapel og Sicilien har Sars gjort den Iagttagelse, at FORBES's Regioner fra Ægæer-havet der ikke holde Stik, og mig er det i Sandhed forekommet af de »Dredging Papers» der findes i FORBES's »Report» om Skrabninger ved Englands Kyster, at der i det Hele er en stor Usikkerhed i de øvre og mellemste Regioner, medens Dybet og Litoralbæltet altid vise konstante Former. Dog, dette er Forhold, som nok ville opklares ved mere udbredte og nøiaktige Undersøgelser.

Hvad her kan meddeles om mine Fund er kun foreløbigt, da jeg først nu har kunnet begynde at gennemgaae Samlingerne.

Af nye Former for Faunaen maa jeg nævne *Monodonta limbata* PHIL., men kun i døde Expl. Denne, der jo forekommer levende i Middelhavet, har Sars ogsaa fundet i eet Expl. ved Manger. KOREN har fundet Skallen af en *Pectunculus* ved Bergen. Disse Fund ere jo i visse Maader ligesaa mærkelige, som at der blandt de af mig i Christiania-fjorden fundne Former er den nordamerikanske *Nucula* (*Yoldia*) *sapotilla* GOULD. KOREN har fundet en stor og smuk *Yoldia* paa betydeligt Dyb, som han har kaldt *Y. abyssicola*. Foruden de anførte har jeg ogsaa fundet en *Cerithium*, som jeg formoder er ny, og som passende maa kaldes *niveum*. Af sjeldne Echinodermer har jeg fundet *Ophioscolex purpurea*, *Pteraster militaris* og *Echinus elegans*. Men min største Skat er en ny Søstjerne, der er den største og pragtfuldeste jeg har seet. Den maa vistnok ansees som Typus for en ny Familie, thi den forener Asteridernes med Fodder (to Fodrader i hver Fure) forsynede Armfurer med Ophiurernes Skive, og inden i denne Skive findes en leddet Kalkring, hvorfra Armene, 44 i Tallet, have sit Udspring. Hvorvidt Blindarme og Generationsorganer strække sig ind i Armene kan jeg ikke med Vished afgjøre, da jeg ikke fik undersøge Dyret i frisk Tilstand, og de Explr. jeg har ere, formedelst den daarlige Sprit, jeg maatte tage til Takke med, saa slet konserverede, at Armenes Indhold er opløst. Munden er aldeles nøgen, uden Tænder eller Skjæl; saavel Skiven som Armene er bedækket med en Hud, der indeholder mangehaande Kalkpartikler, men ikke Skjæl. Analaabning mangler; Madreporpladen sidder på Rygsidens Rand. Skelettet har den nærmeste Lighed med Beenbygningen hos *Comatula*. Armene ere besatte med sex Rader af kortere og længre (de længste over en Tomme) Pigge eller Naale, der ere bedækkede med en Membran, som ender i en Blære ved Naalens øvre Ende, og denne Membran, især Blæren, indeholder utallige mikroskopiske tandede Kalkhager, af hvilke to og to gribe mod hverandre som Hagerne paa *Pedicellariernes* Hoved. Skiven er kun 4 till 4½ Tomme i Giennemsnit, men hver af Armene, en tredjedeel af



deres Længde fra Skiven, $\frac{1}{2}$ till $\frac{3}{4}$ Tomme tykke samt 41—42 Tomme lange. Den hele Søssterne er stærkt rød med Skygninger af guulrødt og saa overordentlig fragil, at det ikke har lykkedes mig at erholde et eneste heelt Explr. Frisk og heel seer den ud som en pragtfuld Straaleglorie. Denne Gloria Maris fandtes kun paa en eneste Lokalitet, paa en næsten lodret Klippevæg mellem 100 og 200 Favne, og uagtet jeg tilbragte over en Uge med at skrabe efter den her, fik jeg dog kun nogle faa Explr. I Bergen fik jeg den smukt tegnet for det til Sommeren udkommende Hefte af Fauna litoralis. — Af sjeldnere Polyper gjenfandt jeg Lobularia gracilis, som Sars har fundet i Nordlandene.»

Med anledning af detta meddelande fastade Hr Lovén Akademiens uppmärksamhet på de viktiga upptäckter inom hafszoologiens område vetenskapen redan fått emottaga och framdeles kan förvänta från Norge, der Sars redan för 25 år sedan började sina grundliga undersökningar, och alltsedan, jemte andra nitiska män, med utmärkt framgång begagnat sitt lands för sådana forskningar så serdeles lyckliga belägenhet. I afseende på de högst betydliga hafsdjup i det inre af fjordarna, som Hr Asbjørnsen angifvit, återkallade Hr Lovén i Akademiens minne hvad han för längre tid sedan engång yttrat, i berättelsen om en år 1840 utförd resa i Bohus län, nemligen huru det förhållandet, att de största djupen träffas ej utanför, utan innanför skärbandet och i fjordarna, är ett drag i bildningen af vår halfös vestra kuster, som återfinnes öfverallt, från Bohuslän till det nordligaste Norge. På yttre sidan af Finmarkens stora öar sänker sig hafsbotten oftast småningom och uppnår först på en eller annan mils afstånd från land det stora djup, från hvilket »havbroen» åter höjer sig. På deras inre sida deremot och i smala sund och fjordar, är det vanligt, att helt nära klippväggen finna djup af 400 till 300 famnar. På samma sätt träffas i Bohuslän, i Uddevallafjorden, i Gullmarsfjorden, innanför Väderöarna, på östra sidan om Kosteröarna, djup af ända till 430 famnar, som mellan svenska kusten och Jutland ej återfås förr

än långt ute i Skagerrack. Denna företeelse synes få en ökad betydelse genom Hr ASBJÖRNSSENS uppgifter om djup af ända till 500—600 famnar i det inre af fjordarna, i synnerhet om det skulle visa sig, att de största af dessa tvärdjup finnas i närheten af Norges högsta fjellbildningar, och således landets vertikala dimensioner under hafsytan tilltaga i förhållande till dem, som äro öfver densamma.

Inlemnade afhandlingar.

Af Kongl. Förvaltningen af Sjöärenderna: Tjugo journaler öfver observationer anställda vid Fyrbåksstationerna.

Remitterades till Hr ERDMANN.

Af Hr Bergmästaren FRANZ v. SCHERLE: Meteorologiska observationer anställda i Philipstad.

Öfverlemnades till det astronomiska observatorium.

Af Hr RIEN: om geologiska beskäffenheten af gulddistrikterna i Californien.

Remitterades till Hr ERDMANN.

Akademiska angelägenheter.

Hr Magister Docens BLOMSTRAND, som innehaft det Berzelianska stipendiet, hade anmält, det han erhållit anställning å annan ort, och då han sålunda vore förhindrad att i enlighet med donators föreskrift hädanefter vistas vid Universitetet, afgick han från stipendiet.

Sedan Hr PASCH, som genom anställdt val kallades till Präses under det nu ingångna akademiska året, på grund af vacklande hälsa afböjdt detta bevis på Akademiens förtroende, blef genom förnyad omröstning Hr ÅKERMAN vald till ordförande.

Hr REUTERDAHL nedlade derefter präsidium med ett tal: Om det sätt hvarpå de exacta vetenskaperna blifvit af en svensk lärde, OLAUS MAGNUS, behandlade vid början af den nyare tiden.

Vid Akademiens offentliga sammanträde på dess årliga högtidsdag, den 31 Mars, afgaf Sekreteraren följande berättelse om de under året timade förändringar:

Beräkningarna af den på Kongl. Maj:ts nådiga befallning företagna och redan år 1852 afslutade gradmätningen, samt höjdmätningarna i Lappmarken, hafva under det sistförflutna året så fortgått, att den hufvudsakligaste, och tillika bevärligaste delen deraf, eller den geodetiska, blifvit fulländad, hvarigenom en connectering mellan de svenska

mätningarne och de norrska å ena sidan, samt de ryska å den andra, lätt blir möjlig. För att träffa aftal om arbetets utgifvande har under sistlidne sommar ett sammanträde härstädes egt rum mellan Statsrådet STRAUWE samt Professorerne HANSTÉN och SELANDER.

Sedan Kongl. Maj:t redan tillföre i nåder anbefallt, att meteorologiska observationer, i enlighet med den af Löjtnant MAURY i Washington utförda planen, om bord å svenska örlogsfartyg, som passera Atlantiska Oceanen, skola förrättas samt till Vetenskaps-Akademien öfverlemnas till delgifvande åt Herr MAURY, har Kongl. Maj:t, efter Akademiens underdåniga förslag, lemnat nådig föreskrift om erforderliga instrumenters anskaffande, afvensom åtgärder i nåder blifvit vidtagna för dylika observationers anställande å inhemska handelsfartyg, hvarigenom allt Sverige numera kan deltaga i dessa för vetenskaperna och sjöfarten lika gagneliga iakttagelser.

Men äfven på ett annat ännu verksammare sätt har Sverige deltagit i de sjöfarande nationernas bemödanden i vetenskapens tjänst. Den för fäderneslandet hedrande jordomseglings-expedition, som nyligen med Fregatten *Eugenie* under befäl af Hr Contre-Amiralen VIGEM blifvit utförd, har, jemte den aktning den tillvunnit svenska flaggan, tillika hembragt värdefulla observationer och rika förråder af natur-alster, hvilka, närmare granskade, i sin mån skola bidra till vetenskapernas tillväxt. För att lemna en öfverblick af de physikaliska arbetena, verkställda af Premier-Löjtnanten SKOGMAN och Studeranden JOHANSSON, och af omfånget af de hemförda samlingarne, frukten af Doktor KINBERGS och Magister ANDERSSONS verksamhet, må här endast i korthet nämnas, att meteorologiska journaler blifvit förda öfver luftens tryck och temperatur, vindens riktning och styrka, atmosfärens utseende och öfriga fenomen, afvensom öfver hafvets temperatur, allt för hvar tredje timma hela dygnet om under sjelfva resan, och att observationer likaledes antecknats öfver jordmagnetismens intensitet i horisontel riktning, bestämd på alla af fregatten besökta fasta platser, såväl genom vibrations- som deviations-experimenter, samt öfver jordmagnetismens intensitet i vertikal riktning, tagen både ombord och i land, hvarförutan hygrometriska iakttagelser blifvit gjorda och hafsvattnets salthalt anmärkt.

De naturhistoriska samlingarna innehålla en betydlig mängd dyrbara alster af nästan alla klasser. Den zoologiska utgöres af 3,714 numror, hvarje öfverhufvud motsvarande flera, stundom många arter, förvarade dels i sprit i 14 trädkärl, 9 zinkcylindrar, 30 större bleck-lådor, 246 bleckdosor af omkring $\frac{3}{4}$ kannas rymd, oberäknadt talrika glasburkar och rör, dels i torrt skick i 60 lådor, 19 fat och 69 bleckdosor. Växterna torde efter sannolikt öfverslag uppgå till närmare 50,000 exemplar. Sådana resultat hafva endast kunnat vinnas genom den nitfulla och kraftiga medverkan fregattens chef stödse häråt lemnat, samt genom de utsedde naturforskarnes insigter och osfbrutna bemödanden att väl begagna hvarje ögonblick för uppfyllandet af sina åligganden. Samlingarna äro gjorda på alla af fregatten besökta ställen i närmare 30 särskilda länder och till en del i trakter hvarifrån intet förefanns i härvarande museer. Af dessa förråder kommer, enligt

Kongl. Maj:ts nådiga föreskrift, att aflemnas dupletter till rikets universiteter.

För att bereda allmänheten tillförlitlig kännedom om sträds bearbetning med maskiner, hvilket ämne Fabrikören JEAN BOLINDER, med ett af Akademiens framlidne ledamot JOHN SWARTZ lemnadt anslag, vid industri-expositionen i London närmare granskat och i sin till Akademien afgifna reseberättelse fullständigt framställt, har, i enlighet med Hr SWARTZ's önskan, nyssnämnda meddelanden jemte tillhörande plancher blifvit införda i Tidskrift för praktisk byggnadskonst.

Docenten i Kemi vid Upsala universitet, Läraren i Agricultura Kemi vid Ultuna landbruks-institut, Magister JOHAN KEIJSER, som, för utvidgandet af sina insigter i det honom anförtrordade läroämnet, af Akademien erhållit Byzantinska resestipendiet på ett år, har nyligen till fäderneslandet återkommit från ett besök vid Tysklands förnämsta landbruksskolor och är nu sysselsatt med berättelsen om sin resa.

Med Akademiens reseanslag för år 1853 har Professor MOSANDER i mineralogiskt hänseende besökt åtskilliga bland mellersta Sveriges grufvor, äfvensom några ställen i Norrige, och har från denna resa, om hvilken han ingifvit berättelse, hemfört mineralier af icke ringa värde.

Under fortfarande ledning af Professor FAJES har, med anslagna statsmedel, ett betydligt antal svenska Svamparter ytterligare blifvit afmåladt, hvarigenom den redan förut värdefulla samlingen vunnit ökad fullständighet.

I de af ett talrikt auditorium besökta Thamiska föreläsningarna har Akademiens Physiker afhandlat läran om ljuset.

Såväl till följe af Kongl. Maj:ts i nåder infordrade yttranden, som af Embetsverkens remisser, har Akademien under det sistlidna året afgifvit utlåtanden öfver ärender, hvilka påkallat vetenskaplig utredning, nemligen: om allmänt stadgande mot försäljning af rått och odestilleradt brännvin, om anslagen till vetenskapliga resor och utgifvande af lärda arbeten, om åtgärder med anledning af den i Brüssel hållna Navigations-kongressen, om decimal-systemets tillämpning på rikets mått, mål och vikt, om ett af franske undersåten BAZILE DE FRAMERY meddeladt sätt att till ångdrift begagna det vid beredningen af s. k. cokes onyttigt bortgående värmes m. m. Dessutom har Akademien haft tillfredsställelsen att vitsorda det ändamålsenliga fullbordandet af den maskin för uträkning och tryckning af matematiska tabeller, hvilken Hr SCHAEUTZ uppfunnit och med dertill anvisadt statsanslag så utfört, att den ej blott kan tjena till ledning vid frambringandet af dylika apparater till hvad omfång som helst, utan är så fulländad både till sin idé och i utförandet, att den, behörigen inställd och endast med en vanlig vef hållen i verksamhet, själf beräknar serier med 4 differenser och ända till 15 siffror, hvarjemte den samtidigt trycker resultaten i tabellform med ända till 8 siffror, sedan den själf vederbörigen korrigerat den sista.

Sin verksamhet har Akademien i öfrigt på vanligt sätt fullföljt genom utgifvande af handlingar för år 1852, öfversigten af förhandlingarna vid sammankomsterna och årsberättelser öfver vetenskapernas

främsteg. För 1853 äro afhandlingar inlemnade af Magister Docens C. W. BLOMSTRAND, Hr H. VON POST och Doktor CHR. STENHAMMAR.

Som Prognosticon till 1855 års Almanacha inflyter en för allmänheten lämpad uppsats om Kolerasarsoten.

Från Kongl. Förvaltningen af Sjöärendena har Akademien emottagit de meteorologiska och vattenhöjds-observationer, som vid fyrbåksstationerna under åren 1852 och 1853 blifvit förda, hvarförutan Hr Amiralen KREUGER för dessa år meddelat af honom gjorda tabellariska sammandrag öfver vindarnes riktning och styrka m. m. å nämnda ställen. Resultaterna häraf komma främdeles att genom Akademiens skrifter allmängöras. Meteorologiska iakttagelser hafva i öfrigt ingått från Kronofogden BURMAN i Neder-Calix, Inspektor BRÖCKMAN på Tolfors bruk vid Gefle samt från Doktor PFUND i Alexandria.

Bland vetenskapliga meddelanden, som Akademien dessutom under året fått emottaga, torde böra nämnas: berättelse om en resa till det inre af sydvästra Afrika af Hr C. J. ANDERSSON, beskrifning öfver Gellivare malmberg af Bergmästaren VON SCHEELLE, anmärkningar om Koleran af Geheime Hofrath BAUMGÄRTNER i Freiburg, medicinska försök med Galvanism af Doktor CRUSELL i St Petersburg, samt uppsatser i astronomiska och fysiska ämnen af Ryttmästaren VON SCHUMACHER vid Appenrade.

Nya litterära förbindelser äro ingångna med Accademia de' nuovi Lincei i Rom, the American geographical and statistical Society i New-York, die naturforschende Gesellschaft och der naturwissenschaftliche Verein i Halle, Ungerska Vetenskaps-Akademien i Pesth m. fl.

Biblioteket, hvilket liksom den fysikaliska samlingen på vanligt sätt genom inköp blifvit förökadt, har äfven blifvit riktadt genom utbyten och skänker, bland de senare med flera dyrbara arbeten, såsom af Hans Maj:t Konungen: Chenu's illustrations conchyologiques 1—83 livr. kolorerade plancher in folio; af Hans Maj:t Konungen af Preussen: fortsättning af Lepsius Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, Lief. 33—41 atlas folio; af Kongl. Storbritanniska regeringen: fortsättning af the geological Survey of great Britain, 20 Chartor in folio; af Kejsarl. Franska regeringen genom H. Ex. Herr Grefve G. LÖWENHJELM: Voyage au Pol Sud et dans l'Océanie par DUMONT D'URVILLE, med plancher in folio; af the Smithsonian Institution i Washington: ett större antal verk rörande Nordamerikas geologi, naturalhistoria och ethnografi; af Herr ANATOLE DEMIDOFF: fortsättning och slut af hans Voyage dans la Russie méridionale; af Kongl. Förvaltningen af Sjöärendena: fullständig samling af Svenska Sjökort, 67 stycken etc.

Knappast har Rikets Naturhistoriska Museum under något föregående år vunnit betydligare tillväxt än under det sistförflutna, förnämligast genom de stora och värderika samlingar, hvilka med fregatten Eugenie från alla verldsdelar blifvit hemförda, men äfven genom de icke ringa skänker, som i öfrigt ingått. Det är med synnerlig fögnad Akademien erfarit det ökade intresse, som ej mindre de förnämde Rikens Konsuler å sällgerna orter och utrikes vistande landsmän, än främmande vetenskapsidkare i detta hänseende visa.

Så har den mineralogiska samlingen ökat med ända till 4,220 stycken, väl till största delen bestående i de Skandinaviska stoffer som Intendenten under sin nyssnämnda resa anskaffat till ett antal af 3,851, men äfven med de bidrag fregatten *Eugenie* hemfört, samt genom gåfvor, bland hvilka i främsta rummet en utmärkt samling grönländska mineralier (185 st.) skänkta af Herr RINK i Köpenhamn.

Det botaniska museum har genom Magister ANDERSSONS insamlingar under resan kring jorden, från 41 ställen i 28 vidtåtkända länder, erhållit talrika växtarter, bland hvilka de från Gallapagos-öarne troligen till stor del äro för vetenskapen nya samt i antal öfverstiga hvad som tillförene derifrån till Europa anländt. Dessutom äro större sviter af sällsynta växter från Japan, Java, Borneo, Celebes och Amboina förärade af Professor BLUME i Leyden, från Central-Amerika af Apothekaren HJALMARSSON i Porto Rico, från Madeira af Professor OSWALD HEER i Zürich, från Rhodus af Professor HEDENBERG, från Sicilien af Doctor TUDARO, oberäknadt de svenska arter som erhållits från rikets flesta delar.

Genom de ansehlige förråder af djurarter ur alla klasser, hvilka Doctor KIRBERG från expeditionen hemfört, har den zoologiska afdelningen vunnit sin betydligaste förökning, men äfven andra utmärkta remisser hafva ankommit, bland hvilka en större fogelsamling från Nubien, Sennaar och Fazogla, skänkt af vice Konsul BARTOLUCCI i Cairo; insektarter från Rhodus af Professor HEDENBERG; insekter af membracidernas grupp från Doctor SIGNORET i Paris; djur af flere klasser från Honduras af Apothekaren HJALMARSSON, som ytterligare derifrån afskickat tvenne sändningar, hvilka denna vår äro att förvänta, likasom sällsynta däggdjur och foglar från Chileniska Anderna, förärade af Konsul BAHLSEN i Valparaiso. Senast har Presidenten Grefve MANNERHEIM öfverlämnat i härvarande museum solande typexemplar till Herr BOHEMANS *Monographia Cassidarum*.

Den minnesstod Akademien bar för afsigt att uppressa öfver JACOB BERZELIUS är nu under arbete af Professor QVARNSTRÖM och kommer att uppställas på den vackra plats, som vid Nybron å Ladugårdslandet är ordnad.

Årets anslag för naturvetenskapliga resor inom fäderneslandet, 400 Rikr Banko, delas lika mellan Observator ÅNGSTRÖM för fortsättandet af hans magnetiska observationer i mellersta Sverige, och Studeranden A. E. HOLMGRÉN i Upsala för entomologiska forskningar i Halland och norra Skåne.

Lindbomska belöningen är tillerkänd Observator ÅNGSTRÖM i Upsala för »Optiska undersökningar» och den Flormanska åt Prosector WAHLGRÉN i Lund för »anteckningar öfver byggnaden af ryggmärgen och ryggmärgsganglierna hos Rockan», båda införda i Akademiens handlingar för år 1852.

Instrumentmakarne SÖRENSEN och FRANS BERG hafva erhållit uppmuntran för skicklighet i förfärdigande af matematiska instrumenter.

Dagens minnespenning är egnad åt en bland denna Akademies stiftare, MÅRTEN TRIEVALD.

Vetenskaps-Akademien saknar inom sin krets bland inländske ledamöter: Fabrikören JOHN SWARTZ; Stats-Rådet och Ridd. af K. N. O. SAMUEL GRUBBE; Fabriksidkaren, Ridd. af K. W. O. SAMUEL OWEN samt Hofmarskalken och Kommendören af K. W. O. m. m. JOHN ADOLF LEYONMARK, hvilken i nära ett halft sekel såsom Akademiens Kamerrare nitiskt vårdat hennes ekonomiska angelägenheter; och bland utländska ledamöter: Professoren vid École polytechnique i Paris THEODOR OLIVIER; Kejsarl. Franska Institutets Sekreterare m. m. FRANÇOIS ARAGO samt Minerslogiæ Professoren i Halle ERNST FRIEDRICH GERNER.

Deremot har Akademien under sistlidet år med sig förenat såsom inländska ledamöter: Bergs-Rådet och Kommendören af K. W. O. JOHAN LORENZ ASCHAN och Kongl. Svenske och Norrsk Ministern i London, Contre-Amiralen m. m. CHRISTIAN ADOLF VIRGIN, samt bland utländske ledamöter upptagit: Intendenten öfver Bergverken i Finland, Statsrådet m. m. NILS NORDENSKJÖLD i Helsingfors; Mathematum Professoren vid Universitetet i Berlin G. LEJUNGE-DIRICHLET; Math. Professore vid École polytechnique i Paris, Ledamoten af Franska Institutet G. LAMÉ, samt korresponderande ledamoten af samma Institut, Medicinæ Doctorn LÉON DUBOIS i Sit Sévèr.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af K. Nederländska Regeringen.

Flora Batava. Aflev. 174. Deel XI: Reg. 4:o.

Af K. Videnskabernes Selskab i Köpenhamn.

Oversigt over Forhandlinger 1853. 8:o.

Af Kejsarl. Finska Universitetet i Helsingfors.

Programmer och Disputationer H. T. 1852 och V. T. 1853.

Af Royal Society i London.

Philosophical Transactions 1853: P. 3. 4:o.

List of Members 1853. 4:o.

Proceedings. Vol. VI: nr. 91. 101. 8:o.

Address of the Earl Rosse, Nov. 1853. 8:o.

Greenwich magnetical and meteorological Observations 1851.

Astronomical Observations made by Th. Cotton. Lond. 1853. 4:o.

Af Royal Geographical Society i London.

Journal of the Society. Vol. XXIII. 1853. 8:o.

General Index of the second ten voll. 1853. 8:o.

Af Société Géologique i Paris.

Bulletin. T. IX: f. 28—35. T. XI: f. 1—3. 8:o.

Af

Af K. K. Geologische Reichs-Anstalt i Wien.

Jahrbuch 1853: nr. 2. 4:o.

Af Zoologisch-Botanischer Verein i Wien.

Verhandlungen des Vereins. B. III. 1853. 8:o.

**Af Physikalisch-Medicinische Gesellschaft i
Würzburg.**

Verhandlungen. B. IV: H. 1, 2. Wbg. 1853, 54. 8:o.

Verzeichniss der Bibliothek der Gesellschaft. 1853. 8:o.

Af Société des Sciences Naturelles i Cherbourg.

Mémoires de la Société. Vol. I: Livr. 1—4. Cherb. 1852, 53. 8:o.

Af Författarne.

AGARDE, J. M., Observationes Eclipsis solis, quæ erat die 28 Julii 1851.
Lundæ 1853. 4:o.

BLONDLOT, N., Essai sur les fonctions du foie. Paris 1846. 8:o, jemte
3:ne medicinska brochurer. 8:o.

BONSDORFF, E. J., Redogörelse för resultaterna af vattenkurens använ-
dande . . . i Åbo 1853. Helsingf. 1854. 8:o.

Af Utgifvarne.

Flora. 1853: Nr 32—48. 1854: Nr 1—3. Regensb. 8:o.

Af Hr Buys-Ballet i Utrecht.

Uitkomsten van Wetenschap en Ervaring aeng. Winden en Zeestroom-
ingen. Utrecht 1853. 8:o.

Het universeel Extract-journal met Verklaring. Utr. 1853. 8:o, jemte
tabeller.

Af Hr Scheele i Filipstad.

Wermländska Bergsmannsföreningens Annaler. 1852, 1853. Sthm
1853, Örebro 1854. 8:o.

Tal och berättelse vid K. Wermländska Hushållnings-Sällskapets 50:de
Års-sammankomst, 1853. Carlstad, 1854. 8:o.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Hennes Maj:t Enke-Drottningen.

En Numida meleagris.

Af Handlanden Rampe.

En Ranatra linearis.

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 11. N:o 4.

Af Professor Huss.

En *Vidua paradisica*.

Af Konsul Bahlson i Valparaiso.

En samling af 138 st. Foglar och 9 Däggdjur från Chili, mest från högre regionen af Andiska bergen.

Af Hr Grefve Mannerheim.

En samling af Cassidider, typer till Hr BOHEMANS monografi öfver denna insektsfamilj.

Botaniska afdelningen.

Af Hr Apothekaren Hjalmarsson.

Trehundradetrettioåtta phanerogamiska växtarter från Honduras, mest af Compositæ, Leguminosæ, Melastomaceæ, Labiatæ, Scrophulariaceæ, Euphorbiaceæ och Gramineæ, samt märkvärdigare officinella arter af *Jonidium*, *Convolvulus*, *Ipomæa* m. m.

Nittiosex cryptogamiska arter från Honduras, St Thomas och St Christoffer.

Fjorton märkvärdigare fruktslag från Honduras, t. ex. *Erythrina Corallodendron*, *Myroxylon peruiferum*, *Crescentia Cujete*, *Hymenæa Courbaril*, *Ipomæa Mechoacan*, m. fl.; rötter af den sistnämnda och af en *Jonidium*, m. m.

Af Adjunkten vid Kongl. Veterinär-Skolan i Skara, Hr N. E. Försell.

Tio arter från Brasilien.

Af Studeranden Hr S. O. Lindberg.

Åttio arter från Orangerierna vid Stockholm, samt tio Mossarter från Stockholmstrakten, hvaribland det af gifvaren först såsom Svenskt upptäckta *Octodieras julianum*.

Af Botanicus Intendenten.

Fyrtiosju sällsyntare skånska arter, meddelade af Hr Magister Areschoug, hvaribland *Allium montanum*, *Phalangium ramosum*, *Juncus balticus* och *obtusiflorus*, *Psamma baltica*, *Holcus mollis*, *Elymus europæus*, *Peucedanum Oreoselinum*, *Rumex Nemolapathum*, *Astragalus arenarius* m. fl.

Trettio odlade fruktsorter från Stockholms omgifningar.

*Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i Januari 1854.*

	Barometern reducerad till 0°. Decimalum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkn- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	24,95	24,88	24,80	— 7°6	— 7°4	— 7°6	N.	N.N.O.	N.N.O.	Snö
2	24,72	24,80	24,94	— 5,9	— 8,9	— 7,7	V.S.V.	S.S.O.	O.N.O.	—
3	25,09	25,15	25,27	— 6,1	— 3,9	— 5,4	—	N.N.O.	N.N.O.	—
4	25,38	25,37	25,32	— 7,0	— 6,0	— 7,0	N.N.O.	—	—	Halfkl.
5	25,28	25,28	25,27	— 6,0	— 5,0	— 6,4	O.	O.S.O.	O.	Snö
6	25,25	25,24	25,25	— 7,0	— 5,1	— 5,0	O.	O.	O.	—
7	25,25	25,34	25,40	— 6,6	— 9,1	— 14,0	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	—
8	25,41	25,42	25,44	— 19,0	— 16,0	— 22,0	—	—	N.	Klart
9	25,40	25,45	25,49	— 12,0	— 10,0	— 13,0	N.N.O.	N.O.	N.O.	Mulet
10	25,51	25,60	25,64	— 10,0	— 6,9	— 8,0	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	Suö
11	25,66	25,68	25,71	— 8,0	— 10,0	— 10,5	N.N.O.	N.N.O.	N.	—
12	25,71	25,70	25,71	— 10,5	— 7,2	— 7,8	N.	N.	N.	—
13	25,69	25,71	25,75	— 6,0	— 4,9	— 6,0	N.	N.N.O.	N.N.O.	—
14	25,78	25,78	25,78	— 10,0	— 6,4	— 6,4	—	—	O.N.O.	Mulet
15	25,77	25,75	25,75	— 4,5	— 5,1	— 7,1	S.O.	S.O.	O.	Suö
16	25,75	25,75	25,72	— 8,7	— 7,0	— 7,5	O.	S.O.	S.O.	—
17	25,71	25,70	25,67	— 6,5	— 4,8	— 3,0	S.O.	O.N.O.	O.S.O.	—
18	25,52	25,50	25,48	— 1,8	+ 1,2	+ 1,7	S.	—	V.S.V.	Dimma
19	25,57	25,64	25,66	+ 2,0	+ 1,0	+ 0,1	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
20	25,65	25,69	25,70	+ 3,0	+ 1,1	— 0,4	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
21	25,63	25,59	25,63	— 1,5	— 0,3	+ 0,1	S.V.	S.S.V.	V.	—
22	25,71	25,73	25,72	— 0,2	— 0,3	+ 1,1	V.	V.	V.S.V.	Mulet
23	25,71	25,66	25,62	+ 1,1	+ 1,9	— 2,0	S.S.V.	S.S.V.	S.	Klart
24	25,62	25,55	25,47	0,0	— 0,7	— 0,9	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Mulet
25	25,45	25,48	25,52	— 2,0	— 0,7	+ 0,7	S.S.V.	S.V.	S.V.	—
26	25,41	25,28	25,34	0,0	+ 3,1	+ 1,8	S.V.	S.V.	S.V.	Klart
27	25,71	25,75	25,75	— 1,0	+ 0,2	— 1,8	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
28	25,52	25,43	25,36	+ 2,0	+ 2,6	+ 1,0	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Mulet
29	25,27	25,16	24,91	+ 0,3	+ 0,1	+ 0,5	V.S.V.	V.S.V.	S.	—
30	24,69	24,76	24,90	+ 0,5	+ 0,7	— 0,2	V.S.V.	V.S.V.	V.	Snö
31	24,68	24,57	24,93	— 1,5	+ 2,0	0,0	O.S.O.	V.N.V.	V.N.V.	—
Me- dium	25,434	25,432	25,448	— 4°53	— 3°61	— 4°60				
	25,438			— 4°25						

i Februari 1854.

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkning- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,00	24,99	24,91	— 5°0	— 1°9	— 2°3	V.N.V.	V.N.V.	V.	Klart
2	24,89	24,90	25,01	— 3,5	+ 0,1	+ 0,3	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
3	25,12	25,10	25,33	— 3,0	— 0,1	— 0,3	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
4	25,46	25,47	25,48	— 5,0	+ 4,9	— 1,3	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
5	25,37	25,25	25,11	— 1,5	+ 1,0	+ 0,2	S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Malet
6	25,00	24,69	24,60	+ 0,1	+ 0,2	+ 1,9	S.S.V.	S.	V.N.V.	Sol
7	24,69	24,61	24,73	— 3,7	+ 0,2	— 4,0	V.S.V.	N.V.	V.N.V.	—
8	24,79	24,83	24,85	— 8,9	— 3,8	— 5,0	—	—	N.N.O.	Klart
9	24,99	25,04	25,18	— 7,5	— 4,2	— 10,7	N.N.O.	V.N.V.	N.N.O.	Malet
10	25,31	25,41	25,49	— 11,0	— 8,5	— 10,5	N.N.V.	N.N.O.	N.N.V.	Sol
11	25,49	25,49	25,57	— 8,0	— 7,7	— 11,4	N.N.V.	N.N.O.	N.N.O.	—
12	25,65	25,76	25,85	— 11,2	— 10,2	— 12,5	N.N.O.	N.N.O.	N.N.V.	Halfkl
13	25,87	25,83	25,75	— 13,0	— 7,2	— 7,2	V.S.V.	V.S.V.	V.	—
14	25,68	25,31	24,72	— 5,5	+ 2,1	+ 3,5	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Malet
15	24,49	24,46	24,64	+ 1,0	— 1,0	— 3,0	V.S.V.	N.V.	N.N.V.	Sol
16	24,85	24,98	25,06	— 8,0	— 7,1	— 10,0	N.N.V.	N.N.V.	V.	Halfkl
17	24,92	24,71	24,54	— 8,1	— 0,2	+ 1,0	S.	S.V.	S.	Sol
18	24,36	24,35	24,52	+ 0,9	+ 0,2	— 1,0	S.	S.	S.	—
19	24,83	25,06	25,22	— 6,5	— 5,0	— 7,5	V.	V.N.V.	V.N.V.	Malet
20	25,35	25,36	25,28	— 6,8	— 3,0	— 4,0	V.S.V.	S.V.	S.S.V.	—
21	25,34	25,54	25,65	— 1,1	+ 1,7	— 4,3	N.N.V.	V.N.V.	V.	Klart
22	25,67	25,60	25,47	— 7,3	+ 2,0	+ 0,5	S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
23	25,27	25,12	25,16	— 2,0	+ 0,5	— 1,1	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
24	25,38	25,42	25,19	— 5,1	+ 0,1	— 0,3	V.N.V.	V.S.V.	S.S.V.	—
25	24,82	24,72	24,71	+ 2,2	+ 1,8	— 3,5	S.V.	V.	V.	Sol
26	24,74	25,22	25,44	— 1,0	— 0,1	— 2,0	N.N.V.	N.	N.	—
27	25,62	25,69	25,63	— 8,5	— 1,8	— 3,0	—	S.V.	V.	Klart
28	25,49	25,35	25,30	— 1,0	+ 1,5	+ 1,1	S.S.V.	S.	V.	Sol
Me- dium	25,159	25,152	25,157	+ 4°93	— 1°62	— 3°44				
	25,156			— 3°33						

ÖFVERSIGT

AF

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

N:o 5 & 6.

Onsdagarne den 10 Maj och 14 Juni.

Föredrag.

1. *Om Svalans hibernation.* — Härom meddelade Hr SUNDEVALL följande: »Vid ett par föregående tillfällen hafva uppsatser om Svalornas förmodade vinterläge i vattnet blifvit intagne i denna tidskrift, nemligen i årgången 1849, sid. 484 och 1850, sid. 6, i afsigt att förskaffa ytterligare upplysningar öfver detta ofta omtvistade ämne. Det är, såsom derstädes reden anfördes, af vigt för naturkunskapen, att få denna fråga utredd; ty i fall svalor verkligen kunna, under vissa villkor, lefvande tillbringa vintern under vattnet, så är detta ett förhållande, som icke kan förklaras efter vår nuvarande kännedom om foglarnas natur, och som således nödvändigt bör leda till en utvidgning af denna kännedom. Ifall deremot berättelserna om Svalornas vinterläge under vatten kunde bevisas vara origtiga, och ifall de omständigheter, som föranledt sagan, kunde nöjaktigt framvisas, så vore det en stor vinst för vetenskapen, att hafva blifvit fullkomligt befriad från en af dessa fördomar, som äro djupt rotade i folktron och anses vara grundade på säkra iakttagelser, samt ständigt återkomma, utan att kunna tillbakavisas med blotta påståendet, att de innefatta en orimlighet.

För att, om möjligt, bidraga till denna gåtas lösning, har jag, jemte mina embetsbröder vid Zoologiska Riksmuseum, Hr

BOHEMAN och LOVÉN, under trenne vintrar, genom kungörelse i allmänna tidningarna, utlofvat ett præmium för erhållandet af Svalor, funne i vattnet, på sätt som anföres i en af de nyssnämnda uppsatserna (årg. 1850, sid. 10). Dessa kungörelser, af hvilka den första blöf införd i Aftonbladet d. 20 Februari 1850, hafva blifvit allmänt kända öfver hela Sverige och förskaffat oss flera bref och underrättelser, för hvilka vi hafva verklig orsak att vara tacksamme, men inga Svalor. Sedan nu nära halftannat år förflutit efter den sista kungörelsen, utan att något meddelande efter densamma ingått, och Svalorna sjelfva nyss åter visat sig flygande här i trakten (nemligen d. 8 Maj), torde det vara tid att meddela de upplysningar, som vunnits, åtminstone såsom en uppmaning till dem, som möjligtvis kunna lemna ännu bättre, att ej förtiga dessa.

Ett par af de erhållna brefven innehöllo ett skarpt tadel öfver de s. k. «Vetenskapsmännens» otro och benägenhet att hemma i kammaren uppgöra teorier, utan att bry sig om den verkliga erfarenheten. Vi hafva med största tacksamhet emottagit dessa öppet uttalade påminnelser om nödvändigheten i all vetenskap, att i första rummet studera naturen samt efterse verkliga förhållandet, och omnämna dem särskildt här, då de i detta fall tyckas hafva varit af nytta. Uti ett af dessa bref anför nemligen brefskrifvaren, att han sjelf, för flera år sedan, i vårt eget grannskap, nemligen vid Norrbro i Stockholm, sett en Svala sitta frisk och hoppande på ett isstycke samt derifrån störta sig i vattnet, utan att åter synas till. Han ber oss sjelfve derstädes efterse, då vi möjligtvis kunna lyckas att någonsång få se samma fenomen. En annan, muntligen meddelad underrättelse, beledsagad af lika allvarliga påminnelser, framställde en alldeles dylik berättelse, och en tredje af samma slag erhöles uti ett bref, blott såsom en enkelt och välvilligt meddelad upplysning.

Uti alla dessa trenne fall är det tydligt, att de, som lemnat underrättelserna, sett den allmänna Strömstaren (*Cinclus aquaticus*), som hvarje vinter finnes vid de flesta öppna vatten-

drag i södra och mellersta Sverige. Årligen pläga, från December till Mars månader, ett eller två par uppehålla sig på det anförda stället i Stockholm, under Norrbro och uppåt strömmen till Rosenbad, hvarest man dagligen under denna tid har tillfälle att beundra deras, hos en verklig sångfågel med klufna tår, högst märkvärdiga förmåga att simma och att hemta sin föda under dykning, ofta 10 till 12 alnars sträckor under vattnet, eller än längre ifall de dyka med strömmen. Det bör ej förefalla underligt, att detta årligen förnyade skådespel är alldeles obekant för de flesta af hufvudstadens invånare, som dock dagligen gå förbi stället, emedan en dylik liten fogel endast ådrager sig deras uppmärksamhet, som äro vande vid, eller mycket roade af att betrakta naturföremålen. Ej heller bör det vara oväntadt, att en och annan, som tillfälligtvis råkat få se den neddykande fogeln, utan att känna den, trott den vara en Svala, som gick att intaga sin hviloplats för vintern, i enlighet med den allmänna folktron. De meddelade underrättelserna visa, att verkligen trenne personer sålunda misskännt Strömstaren. Detsamma bör sålunda hafva skett flera gånger, och jag tviflar numera alldeles icke, att det är denna lilla fogel, som gifvit anledning till hela historien om Svalans vinterläge under vattnet. Detta antagande förklarar alla de uppgifter vi känna häröfver. Det bör nemligen stundom hända, att en Strömstare, eller tvenne, emedan de vanligen lefva parvis, uppehålla sig i granskapet der isnot drages, och begagna tillfället, att neddyka under isen uti de för notdragningen upphuggna vakarna, för att på botten söka sin föda, som utgöres af vatteninsekter. Detta bör så mycket hellre kunna inträffa, som dessa foglar, vid en tillfrusen insjö, ej hafva många tillfällen att stilla sin hunger. Att de dervid någon gång kunna råka in uti noten och bli dermed uppfångade är lätt begripligt. Men deras andedrägt tillåter dem ej att utan skada vistas länge under vattnet, möjligen högst en half och troligtvis ej en hel minut, men då de under notdragningen qvarhållas der längre tid, måste de nödvändigt mer eller mindre fullständigt

qväfvad, så att somliga verkligen dö, men andra, som ej alltför länge blifvit hållna under vattnet, blott råka i ett tillstånd af skendöd, hvarifrån de åter kunna hemta sig, serdeles genom inverkan af värme, och häruti torde man finna förklaringen på den i flera berättelser återkommande uppgiften, då tvenne s. k. Svalor erhållits, att »den ena efter en stund qvicknade till, men den andra förblef död». De flesta berättelser, som omnämna att en »Svala» åter kom till lif, tillägga dock, att hon efter en stunds förlopp verkligen dog. Till och med vid notdragning i öppet vatten bör det någongång kunna inträffa, att en Strömstare kommer in uti notvarpet, dyker ned och fångas uti noten. Men att detta allenast inträffat vintertiden förklaras deraf, att Strömstaren nästan blott då finnes i södra och mellersta Sverige. Med få undantag vistas de om sommarn i fjelltrakterna och de norra, mindre bebodda delarna af Skandinavien.

Det är märkvärdigt nog, att hvarken jag själf, eller, så vidt jag känner, någon annan tviflare, antagit denna ganska naturenlige förklaring af det otroliga fenomenet, isynnerhet som flera äldre berättelser kunnat gifva anledning dertill, då det t. ex. nämnes, att den uppfångade »Svalan» varit svart med hvitt bröst och temligen stor, såsom uttryckligen anföres i en af de berättelser, som af KLEIN hopsamlades år 1747 och finnas bevarade i hans *Historie Avium Prodromus*, 4:o, Lubeck 1750; nemligen sid. 209, litt. E. — De, som betviflat uppgifterna, hafva naturligtvis endast varit sådane, som intresserat sig för deras förklarande, och som blifvit bragte till tvifvel just genom sin kännedom af fogelarterna; men dessa hafva icke kommit att tänka på ett misstag mellan två, för en kännare så olika foglar, som Svala och Strömstare, och dessutom torde man hafva varit bunden af den föreställningen, att den uppfångade fogeln nödvändigt skulle hafva legat stilla på botten, före notdragningen. Flera andra, vida mindre antagliga förklaringsgrunder hafva således blifvit uppgifna, t. ex. de som jag själf framställt i denna tidskrift (årg. 1849, sid. 483); eller den,

att sjuka eller svaga Svalor, vid hastigt kommande köld, om hösten och våren, nedfallit uti eller vid vattnet, och likväl kunnat åter lefva opp, ifall de kort tid derefter blifvit uppfångade, o. s. v.

Genom de tre ofvan anförda uppgifterna är det nu bevisadt, att Strömstaren flera gånger blifvit ansedd för Svala, ehuru den varit lefvande och stadd i fri rörelse, eller just under de omständigheter, då de flesta personer bäst äro i stånd att igenkänna en Svala. Det blir så mycket lättare begripligt, att samma förväxling kunnat ske med döda eller stillaliggande foglar, hvilka för dem, som ej närmare gjort sig bekanta med dessa djur, äro vida mindre igenkänneliga. Ännu har det aldrig lyckats för någon fogelkännare att få se en under vattnet upptagen svala, och för de flesta öfrige är likheten i färg och storlek mellan en Svala och en Strömstare tillräcklig att föranleda misstaget. För egen del är jag serdeles nöjd öfver att icke hafva från början sjelf insett denna anledning till den allmänna folktron, utan att hafva lärt att inse den genom de ofta återopade uppgifterna, för hvilkas benägna meddelande jag stadnar i den största förbindelse. Likaledes vågar jag hoppas, att de aktningvärde män, som genom sina, här förut (1849 och 1850) meddelade uppgifter om Svalans hibernation, föranledt dessa uppsatser, skola finna en verklig tillfredsställelse öfver att hafva gifvit anledning till en, såsom mig synes, fullt antaglig lösning af den länge omtvistade gåtan. De torde äfven kunna anse denna lösning innefatta en fullkomlig upprättelse för de tvifvel, som af mig blifvit framställda emot dem, enär en förväxling af två till färg och storlek nära lika småfoglar ganska lätt kan ske och endast kan anses för ett fel hos den, som angifver sig såsom fogelkännare, hvilket ingen af dem gjort.

Slutligen anser jag mig böra tillägga, att, ehuru jag sjelf ej tviflar på riktigheten af den här framställda åsigten, innefattar den dock ännu icke något bevis emot Svalans hibernation under vatten, och ingenting som visar, att icke, åtmin-

stone en del af de uppfångade foglarne kuonat vara verkliga Svalor. Saken är således ännu icke utagerad och mången skall kanhända förkasta den gifna förklaringen, såsom »en i kammaren uppgjord hypotes», då det ej en gång är bekant, att någonsin en Strömstare blifvit fångad i not. Vidare förekomma, uti åtskilliga berättelser, en omständighet, som icke kan förklaras på det här uppgifna sättet, nemligen att »många svalor på en gång upptogos». Uti en och annan af de mig bekanta uppgifterna tillägges det, att Svalorna voro med klorna sammanfästade. Då icke någon enda berättelse om detta ämne är känd, som blifvit genast upptecknad, och dessa sednast anförda omständigheter hufvudsakligen synts mig förekomma uti sådana, som tillika angifva, att berättaren sjelf var ett barn, eller annars tyckas utvisa, att han gått mindre noggrant tillväga, skulle jag förmoda att de böra tillskrifvas en sednare, eller kanske genast uppkommen föreställning om förhållandet, som icke hade uppkommit ifall någon särskild anledning hade förmått honom att närmare undersöka. Emellertid bör man ej förbise den märkvärdiga likhet, som finnes mellan de i Sverige gängse berättelserna och de ofvan anförda, som hopsamlades af KLEIN, för mer än hundra år sedan. Dessa äro tillhopa tio, angående fynd af Svalor i isnot, hvilka synas vara gjorda mellan 1742 och 1745, till större delen i Ost-Preussen. Häraf synes det nästan som om fenomenet derstädes förekomme vida oftare än hos oss, hvarföre det vore väl, om någon ville anställa nya undersökningar deröfver i samma land. Likaledes vore det önskvärdt, att nya iakttagelser häröfver i vårt land blefve antecknade och meddelade till sakens utredande. Det är nemligen ej fråga om att bekräfta min eller någon annans mening deröfver, utan allenast att få verkliga förhållandet utredt.»

2. Skandinaviens Corisæ. — Hr BOHEMAN föredrog följande af S. M. Adjunkten H. D. J. WALLENGREN insända uppsats:

»Ett utaf de intressantaste släkten bland Hemiptera, men derjemte ett utaf de svåraste att utreda, i anseende till den stora likhet, som råder arterna emellan, är utan tvifvel släktet *Corisa*. Till följe af denna stora likhet hafva också dess arter blifvit med hvarandra förblandade, men sedan FIEBER genom sin utmärkta monographie af släktet, hvilken uti *Acta Regiæ Bohemicæ Societatis Scientiarum* utkom i Prag 1851, skingrat det mörker, som hittills hvilat deröfver, och gifvit den rätta claven för arternes åtskiljande, kan man hoppas, att äfven de Skandinaviska arterne skola blifva närmare utredda. Att i någon mån bidra till detta ändamål är afsigten med följande uppsats.

Då FIEBER i nämnde monographie yttrar, att alla författare, som före honom behandlade ämnet, icke egde begrepp om könskilnaden hos ifrågavarande arter, utom SAHLBERG, som hade blott »ett obestämdt begrepp» (p. 7) derom, torde likväl få anmärkas, att Prof. ZETTERSTEDT uti sitt arbete: *Insecta Lapponica*, hvilket äfven af FIEBER kändes och begagnades, tydligt angifver differentiam sexus (p. 284) med följande ord: »Mas: segmento ultimo ventrali inciso, laciniis foliaceis, membranaceis, penultimo et antepenultimo duplicatis, in medio imbricatis s. incumbentibus. Fem: segmento ultimo ut in mare; penultimo simplici, transverso, integro»; och då både SAHLBERG och ZETTERSTEDT äfven kände den skilnad, som i hufvudets form hos en del arter förefinnes könen emellan, hvilket visar sig vid de särskilda af desse författare gifna artheskrifningarne, så tillkommer honom endast förtjensten af att hafva ådagalagt det äfven framtarsernes sista led, som af honom kallas *pala*, är olika hos hanne och hona. Men detta är likväl ingalunda en ringa förtjenst, då just denna olikhet i form är ett utaf de mest karakteristiska kännetecken äfven för arterne, så att man kan derefter med säkerhet bestämma icke blott könet, utan oftast äfven arten.

Enligt samma monographie (p. 11) skulle Lappland ega 44 och Sverige 41 arter af detta släkte, men dessa äro likväl gemensamma för båda de uppgifna områdena, så att, när



man närmare granskar de speciella uppgifterne, man finner att FIEBER egentligen icke kände mer än 11 arter såsom Skandinaviska, nemligen: *C. Geoffroyi*, *Hellensi*, *præusta*, *striata*, *Falleni*, *fossarum*, *semistriata*, *carinata*, *Bonsdorffi*, *coleoptrata* och *limitata*, i händelse denna skulle vara identisk med FALLENS *C. fossarum* var. β och ZETTERSTEDTS *C. striata*, såsom FIEBER förmodar, ehuru han likväl icke särskildt uppgifver Skandinavien bland lokalerne. Det har hittills icke lyckats mig att finna nämnde art, ehuru jag samlat en stor mängd *Corisæ* från skilda orter och derunder noga efterforskat den, men jag har deremot lyckats finna en del andra, som FIEBER ej kände såsom Skandinaviska, så att hela antalet af våra nu bekanta, till detta slägte hörande arter, uppgår till 24, hvaribland då icke räknas *C. limitata* FIEB., såsom af mig okänd. Bland dessa arter äro, så vidt jag kunnat utröna, 4 nya för vetenskapen och en, hvarom FIEBER misstagit sig. Gruppindelningen i följande uppsats är efter FIEBER, såsom den lämpligaste; likväl något ändrad efter Skandinaviska Faunans fordringar.

Conspectus Specierum Scandinaviæ Generis Corisæ.

Gen. CORISA FIEB.

(*Corisæ* GEOFF. FALL. ZETT. *Notonecta* LIN. *Nepa* DE GEER. *Sigara* FABR.)

A. Pronoto lineis transversalibus subparallelis, aut fissis, aut in medio abbreviatis.

1. *Pronoto simplici vel elongato, carina antica brevi.*

a. *Superficies punctata.*

1. *C. Geoffroyi* (LEACH): nigro-fusca, nitida; pronoto lineis transversalibus 16, fissis et abbreviatis flavo-hyalinis; lineolis hemelytrorum ejusdem coloris, brevibus, anguloso-undulatis, sparsis, numerosissimis; linea suturæ membranæ inconspicua; area marginali hemelytrorum flavida; corpore subtus flavido; meso-et meta sterno, xyphe acutissimo, scapulis pleurisq. ad suturam internam, nigris. Long. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ poll. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{3}{8}$ poll.

Mas: palis parallelogrammo-cultratis, obtusis; fovea frontali angusta, medium oculorum attingente; segmentis ventralibus 3—4 ad basin nigris.

Fem: palis late falcatis, acutis, curvatis; segmentis ventralibus 2—3 ad basin nigris.

SYN. *Sigara striata* FABR. S. R. 104. 2. *CORIXA* FALL.
Hem. Sv. 181. 1. *CORIXA Geoffroyi* LEACH Lin. Trans.
Vol. XII. l. 17. 7. ZEYT. Ins. Lapp. 284. 1. FIEBER Mo-
nogr. 14. 1.

Hab. in Lapponia — Scania haud infrequens.

b. *Pronoto et clavo rastrato, corio punctato basi rastrato.*

* *Hemelytris obscuris, flavide au pallide lineatis.*

2. *C. Fieberi* (n. sp.); nigro-fusca, capite antice subangulato; pronoto vix elongato, postice angulato, lineis 7 arcuatis, flavidis; lineolis clavi approximatis, hieroglyphicis, interruptis, confluentibus, ad basin subparallelis, latioribus; lineolis corii approximatis, hinc inde flexuosis, lineis 3 nigris longitudinaliter dissectis; linea membranæ lata, flavida; margine membranæ pallido, macula fusca; area marginali hemelytrorum sordida; pectore cum xypho lobisque flavido; articulo ultimo tarsorum posticorum nigro. Long. $\frac{3}{16}$ poll. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{1}{16}$ poll.

Mas. palis late cultratis, superne æqualiter arcuatis; abdomine subtus nigro, marginibus incisurisque flavidis; area frontali medium oculorum superante.

Hab. in aquis stagnantibus Scaniæ rarissime. In Blekesjö ad Trolle Ljungby semel lecta.

Descr. C. signatæ FIEB. quoad colore admodum affinis videtur, sed re vera diversa quod e palarum forma satis apparet. Caput pallidum, antice subangulatum, quoniam foves frontalis obovata oculorum medium superat. Pronotum vix elongatum, postice angulatum, marginibus lateralibus flavidis, lineis arcuatis 7 flavidis, parallelis, in medio dorsi una alterave confluenta l. fissa. Hemelytra parce pilosa, lineolis clavi: ad basin tantum subintegris, contiguis, furcatis, dentatis, subparallelis, reliquis latioribus, sed in medio et apicem versus abbreviatis, dentatis, subhieroglyphicis, ut superficies flavoreticulata l. irrorata potius quam lineata videatur; lineolis corii approximatis, hinc inde flexuosis et dentatis, lineis 3 nigris longitudinaliter dissectis, in seriebus itaque 4 dispositis. Linea membranæ lata, pallida, postice lineola nigra adnexa. Membrana lineolis sparsis, irregularibus, in medio evanescentibus, in margine interno subparallelis, flexuosis, confluentibus, in marginem apicalem excurrentibus, ut tantum ad marginem exteriorem adsit macula fusca. Area marginalis hemelytrorum sordida, unicolor. Pectus cum xypho, lobis prosterni et pleuris, flavidum. Abdomen subtus fuscum, segmentis 4 basalibus nigris, marginibus et incisuris flavido-pallidis. Pedes flavidi, articulo ultimo tarsorum posticorum nigro.

Obs. *C. simistriatæ* quoad colore etiam valde affinis, sed corio punctato, nec rastrato, capite subangulato, tibiis anticis non turgidis &c. ab illa differt.

3. *C. vaga* (n. sp.): supra nigro-fusca; capite antice subangulato; pronoto vix elongato, postice subrotundato, lineis 9 flavidis, arcuatis; lineolis clavi et corii approximatis, confertis, confluentibus, flexuosis, inordinate abbreviatis, omnino hieroglyphicis, tantum

ad basin clavi subparallelis et subcontinuis; linea membranæ subtili, pallida; area marginali hemelytrorum sordida, postice infuscata; margine apicali membranæ toto nigro. Long. $\frac{1}{2}$ poll. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{1}{8}$ poll.

Mas: palis late cultratis, acutis; fovea frontali magna, oculorum medium superante; abdomine subtus nigro, marginibus incisurisque pallidis.

Hab. in aquis tuffosis Scanizæ rarissime. Ad Trolle Ljungby semel lecta.

Descr. Præcedenti admodum similis sed major et aliter colorata. Caput antice subangulatum, summo vertice fuscescente. Pronotum haud elongatum, postice rotundatum, lineis 9 transversis arcuatis, in medio dorsi hinc inde fissis, flavidis, subinconspicuis. Hemelytra parce pilosa, lineolis subtilibus, crebris, sine ordine abbreviatis, dentatis, flexuosis, omnino hieroglyphicis irrorata; lineolæ tantum ad basin clavi subintegræ, furcatæ, confluentes, subparallelæ. Linea membranæ subtilis, pallida. Lineolæ membranæ hieroglyphicæ, in margine interno subparallelæ, confluentes, furcatæ, in margine apicali, late nigro-fusco, radiatim dispositæ, in medio membranæ sparsæ et distinctæ. Pectus cum acetabulis nigrum. Xyphus pallidus, in medio infuscatus. Lobi prosterni, pleuræ et parapleuræ pallidis. Pedes pallidi, articulo secundo tarsorum intermediorum apice, et articulo ultimo posticorum toto nigro.

**** *Hemelytris ochroleucis, lineolis transversalibus nigris.***

4. *C. hieroglyphica* (LEON DUF.): cinerea, capite maris antice subangulato; pronoto elongato, obtuso, lineis 7—9 nigris, arcuatis subtilibus, hinc inde interruptis; lineolis hemelytrorum nigris subtilibus, inæqualibus, contiguis, interruptis, sæpe seriatim confluentibus; clavorum basi et linea membranæ late cineres; pectoris medio nigro; xypho pallido; area marginali hemelytrorum pallida, apice macula fuscescente, strigaque marginali nigricante; articulo ultimo tarsorum posticorum nigricante. Long. $\frac{1}{4}$ poll. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{3}{4}$ poll.

Mas: palis late cultratis, basi subtus paullo productis; abdomine subtus nigro, apice ochroleuco, segmentis ultimis basi nigris; fovea frontali oculos superante.

Fem: palis anguste cultratis; abdomine subtus basi nigro, maculis lateralibus fuscescentibus.

Syn. *C. hieroglyphica* LEON DUF. Hem. 86. 2. f. 85—87. FIGG. Monogr. 22: 19.

Hab. in aquis Scanizæ et Blekingizæ sæt infrequens. Ad Sölvesborg mense Aprili ipse et ad Lund Dom. ROTR.

c. *Pronoto, clavo et corio rastrato.*

*** *Lineolis hemelytri parallelis, undulatis plerumque integris.***

5. *C. Sahlbergi* (FIGG.): supra nigro-fusca, vertice macula magna fusca; pronoto elongato lineis transversis 9, in disco plus minus abbreviatis; lineolis hemelytrorum remotis, subtilibus, undatis, parallelis, subintegræ, flavidis; corii angulo postico flavido, lineæque

membranæ suturæ lata pallida, linea nigra adnexa; lineolis membranæ brevibus, in disco horizontalibus, abbreviatis; dorso pectoreque late nigro; xypho producto, acuto, pallido; lobis ani basi nigris; femoribus anticis basi macula nigra; femoribus mediis apice, tibiis tarsisque fuscis. Long. $\frac{1}{8}$ — $\frac{3}{8}$ poll. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{2}$ poll.

Mas. palis cultratis, sensim latioribus, obtusis, fovea frontali obovata, oculorum basin vix superante; segmentis ventralibus 4 nigris.

Fem. palis late cultratis; segmentis ventralibus 3 nigris.

Syn. *C. striata* SAHLB. Not. Fenn. 9. 1. (exclus. syn. et var. β) *C. Sahlbergi* FIEB. Monogr. 25. 24.

Hab. in aquis stagnantibus, fossis tuffosis et lacubus Scaniz hæud infrequens, e. gr. Trolle Ljungby ($\frac{25}{5}$), W. Wram ($\frac{10}{7}$ — $\frac{4}{8}$) et Ifvetofta (ipse); Lund Dom Rora.

6. *C. Linnæi* (FIEB.): supra nigro-fusca, subnitida; capite pallido; pronoto brevi, obtuso, lineis transversis 6 integris; lineolis hemelytrorum subtilibus, undulatis, parallelis, subintegris; corii angulo postico nigro-fusco lineaque suturæ membranæ oblitterata; lineolis membranæ sparsis, subhieroglyphicis, in medio subevanescentibus; dorso pectoreque in medio nigro; xypho producto, acuto flavido; lobis ani fuscis, margine pallido; femoribus anticis flavis, unicoloratis. Long. $\frac{9}{32}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{3}{32}$ poll.

Mas. palis cultratis, sensim latioribus, obtusis; segmentis ventralibus 4—5 nigris.

Fem. palis cultratis acutis, ventre sordido.

Syn. *C. Linnæi* FIEB. Monogr. 25. 25.

Hab. in Scaniz ut videtur rarissime. In Blekesjö ad Trolle Ljungby specimina duo ($\frac{3}{2}$ — $\frac{25}{5}$) inveni.

7. *C. vernicosa* (n. sp.): supra nigro-fusca, nitida, vertice infuscato; pronoto elongato, postice angulato lineis 8 transversis pallidis; lineolis hemelytrorum subtilibus, confertis, subintegris, hinc inde angulatis et undatis; corii angulo postico concolore; linea suturæ membranæ subtili, flavida, utrinque nigro-marginata; lineolis membranæ subparallelis, in medio integris, undulato-flexuosis, in apice brevibus, radiatis; pectore in medio cum xypho brevi, obtuso, nigro; femoribus anticis unicoloratis. Long. $\frac{1}{8}$ poll. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{3}{32}$ poll.

Fem. palis cultratis acutis; ventre flavo, segmento primo ad basin nigro.

Hab. in aquis Scaniz rarissime. Tantum semel ad Trolle Ljungby lecta.

Descr. Supra nitida. Caput vertice rotundatum infuscatum. Pronotum elongatum, postice angulatum lineis transversis 8 arcuatis, subincois, in medio hinc inde fissis. Hemelytra parce pilosa, lineolis flavidis subintegris, parallelis, subtilibus, hinc inde angulatis et undatis, ad basin clavi fere rectis ibique nonnihil latioribus, ad apicem corii brevibus, dentatis; ad aream marginalem series punctorum ejusdem coloris. Apex corii hemelytris concolor, sed linea flavida cum linea suturæ membranæ subtili,

utrinque nigro-marginata, in angulo connexa, cingitur. Membranz lineolæ subparallelæ, flexuoso-undulatæ, ad marginem anteriorem densiores et hinc inde abruptis, sed in medio integræ, remotiores, ad marginem apicalem fuscum abbreviatæ, dentatæ et radiatæ. Area marginalis hemelytrorum sordida. Pectus cum xypho brevi et obtuso, flavo-limbato, nigrum. Lobi prosterni, pleuræ et parapleuræ acetabulique flavi. Abdomen infra flavum, segmento primo ad basin nigro. Pedes flavidi; tarsi tantum postici subinfuscati.

8. *C. Hellensi* (SAHLB.): supra nigro-fusca; pronoto abbreviato lineis transversis 4—5, lineaque media longitudinali, flavidis; lineolis hemelytrorum remotis, subtilibus, undulatis, flavidis, ut etiam suturis et marginibus; lineolis membranz angulatis, sparsis, contiguis; pectoris medio et dorso nigro; xypho acuto flavido. Long. $\frac{3}{4}$ Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{1}{2}$ poll.

Mas: palis late cultratis, subtus basin versus sublatis; fovea frontali parallelogramma, oculos attingente; segmentis ventralibus 4 nigris.

Fem: palis anguste cultratis, basi ventris plaga triangulari nigra.

Syn. C. Hellensi SAHLB. Not. Fenn. 11. 3. FALL. Hem. Sv. 183. 4. FIEB. Monogr. 26. 27.

Hab. in Lapponia (FIEB.). In Scania rarissime occurrit. Ad Trolle Ljungby semel capta.

** *Lineolis hemelytri plus vel minus abbreviatis, subparallelis, clavorum basi lineis subparallelis, plerumque latioribus.*

9. *C. præusta* (FIEB.): supra umbrina; pronoto elongato lineis 7—8 nigris fissis aut abbreviatis, subcontiguis; lineolis hemelytrorum subparallelis, confertis, flexuosis, interdum abbreviatis, flavidis; femoribus tibiisque anticis macula, tarsi postici utrinque fascia transversa nigra; dorso pectoreque cum lobis prosterni et xypho nigro; scapulis interne late nigris; pleuris nigris margine externo et postico flavidis; area marginali hemelytrorum pallida. Long. $\frac{3}{4}$ Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{3}{4}$ poll.

Mas: palis cultratis, cochlearis instar dilatatis, supra inflexis; fovea frontali oblonga, medium oculorum superante; segmentis ventralibus 4 basi nigris.

Fem: palis cultratis, acutis, basi subtus subproductis, latioribus; segmentis ventralibus 2—3 basi nigris.

Syn. C. borealis DALM. in litt. *C. præusta* FIEB. Monogr. 29. 30.

Hab. in Lapponia-Scania. In Scania rarius occurrit. In Blekesjö ad Trolle Ljungby mense Februario infra glaciem reperta.

10. *C. concinna* (FIEB.): supra umbrina; pronoto elongato lineis 9—10 nigris fissis aut abbreviatis; lineolis hemelytrorum confertis, abbreviatis, sparsis, sinuato-undulatis, clavi sigmoideis, corii obliquis, angulatis; femoribus anticis macula nigra; tarsorum posteriorum articulo primo versus apicem subtus et in margine apicali utrinque, secundo in margine basali utrinque nigro; dorso pectorisque medio nigro; xypho flavido; area marginali hemelytrorum sordida. Long. $\frac{3}{4}$ Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{1}{2}$ poll.

Mas: palis. cultratis, fovea frontali oblonga, oculorum medium superante; segmentis ventralibus 4—5 nigris.

Fem: palis cultratis, subarcuatis, basin aequalibus, non productis; segmentis ventralibus 2—3 nigris.

Syn. *C. concinna* FIEB. Monogr. 29. 31.

Hab. in aquis Lapponiæ-Scaniæ sat infrequens.

11. *C. striata* (LIN. FIEB.): supra nigro-fusca; pronoto parum elongato lineis 6—7 hinc inde fissis, margine laterali flavido; lineolis hemelytrorum subtilibus, subparallelis, abbreviatis, undulatis l. angulatis, ad basin clavi valde latioribus, flavidis; dorso nigro; lobis ani pallidis margine arcu fusco; pectoris medio nigro; xypho pallido; lobis prosterni apice angustatis, obliquis; area marginali hemelytrorum pallida, apicem versus macula e lineolis minutis nigricante. Long. $\frac{1}{2}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{3}{4}$ poll.

Mas: palis cultratis latis; fovea frontali parallela, brevi; segmentis ventralibus 2—3 ad basin nigricantibus.

Fem: palis cultratis latis, acutis; ventre flavido.

Syn. *NOTONECTA striata* LIN. F. Sv. 904. CORREA FIEB. Monogr. 30. 33.

Hab. in aquis Scaniæ ubique frequens.

Obs. Quamquam pro certo non dicere possum, hanc speciem tamen eandem ac *C. fossarum* var β . FALL. Hem. Sv. p. 138 esse puto.

12. *C. Falleni* (FIEB.): supra nigro-fusca, vertice macula infuscata; pronoto elongato lineis 8—9 transversis, in disco fissis, flavidis, margine laterali flavido; lineolis hemelytrorum subparallelis, subtilibus, inæqualibus, approximatis, hinc inde abbreviatis, eroso-aut angulato-undulatis, ad basin clavi reliquis haud latioribus, flavidis; dorso nigro-fusco; medio pectoris nigro; xypho pallido; lobis prosterni angustis, medio coarctatis, apice rotundato-truncatis, antrorum obliquis; area marginali hemelytrorum sordida. Long. $\frac{3}{4}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{1}{2}$ poll.

Mas: palis oblongo-triangularibus, acutis, basi superne et subtus in angulo obtuso dilatatis; segmentis 4 ventralibus nigris; fovea frontali obovata, oculorum basin superante.

Fem: palis late semilunatis; segmentis 2—3 ventralibus basi nigris.

Syn. *C. Falleni* FIEB. Monogr. 31. 34 (exclus. Syn. Fall.)

Hab. in aquis Lapponiæ-Scaniæ rarius.

13. *C. undulata* (FALL.): supra nigro-fusca, vertice pallido; pronoto postice producto lineis 8—9 transversis, in disco interdum fissis, flavidis, margine laterali flavido; lineolis hemelytrorum subparallelis rudioribus, inæqualibus, remotioribus, hinc inde abbreviatis, undulatis et dentatis, ad basin clavi reliquis nonnihil latioribus; dorso nigro, marginibus flavidis; medio pectoris nigro; xypho nigro, flavido-marginato; lobis prosterni angustatis, obliquis, medio coarctatis, apice rotundatis; area marginali hemelytrorum pallida. Long. $\frac{1}{2}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{1}{4}$ poll.

Mas.: palis late cultratis, ad medium latioribus, ad basin non productis; fovea frontali obovata oculorum basin superante; segmentis 3 ventralibus nigris.

Fem.: palis cultratis, acutis; segmentis 2 ventralibus nigris.

Syn. *C. undulata* FALL. Hem. Sv. 182. 2. (sec. Mus. Zett.). Sub hac specie attemen etiam *C. Falleni* et *concinna* latent.

Hab. in aquis Scanizæ sat frequens, mensibus Majio et Junio.

Descr. Præcedenti valde affinis, sed major et latior, præsertim forma palarum maris distincta. Caput flavum, clypeo infusato, vertice immaculato. Pronotum elongatum, postice angulatum, lineis 8—9 transversis, arcuatis, parallelis, in disco interdum fissis; margine laterali flavido. Hemelytra lineolis rudioribus, subparallelis, undulatis, dentatis, hinc inde abbreviatis; lineolis basi clavi parallelis, continuis, reliquis nonnihil latioribus, una alterave ad marginem internum furcata; lineolis corii dentatis, angulatis, undulatis, hinc inde confluentibus abbreviatisque et furcatis. Linea suturæ membranæ angusta, postice linea nigra adnexa. Lineolæ membranæ sparsæ, angulosæ et flexuosæ, in disco subcontinuas, ad marginem internum subparallelæ, furcatæ, abbreviatæ et confluentes, ad marginem nigrum apicalem hieroglyphicæ. Area marginalis pallida. Dorsum nigrum marginibus flavidis. Corpus subtus pallidum, meso- et metasterno nigro, scapulis, pleuris et lobis prosterni flavidis; xypho acuto nigro, flavo-marginato. Pedes flavidi; tibiæ posticorum marginibus fuscæ; tarsi posticorum nigri, articulo primo fascia longitudinali pallida.

14. *C. variegata* (n. sp.): fusca, vertice pallido; pronoto elongato lineis 9—10 transversis nigris, in disco contiguis, margine laterali pallido; lineolis hemelytrorum abbreviatis, sigmoideis, angulatis, eroso-dentatis, ad basin clavi tantum subparallelis, subcontinuis furcatisque; linea suturæ membranæ subobliterata; dorso nigro, marginibus flavidis; pectore xyphoque flavido; lobis prosterni apice oblique truncatis; area marginali hemelytrorum pallida. Long. $\frac{1}{8}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{1}{8}$ poll.

Mas.: palis late cultratis, arcuatis; fovea frontali magna, oculorum medium fere attingente; segmentis 4 ventralibus nigris.

Fem.: palis cultratis, subfalcatis; segmentis 2—3 ventralibus nigris.

Hab. in aquis Scanizæ rarissime. In Wagnesjö ad Trolle Ljungby Manse Majio capta.

Descr. Præcedenti similis et ejus fere magnitudine, sed revera distincta. Etiam *C. assimili* FIEB. affinis videtur, sed palarum forma longe diversa. Caput flavum. Pronotum elongatum lineolis 9—10 nigris, in disco contiguis, fissis et ad marginem hinc inde furcatis; marginibus lateralibus pallidis. Hemelytra leviter rastrata, lineis sparsis, eroso-dentatis et angulatis, omnibus abbreviatis, sigmoideis, ut superficies tota crebre et ir-

regulariter flavido-irrorata, nec lineata videatur; lineolis tantum basalibus clavi subparallelis, furcatis, subcontinuis. Linea suturæ membranæ obliterata et lineolæ membranæ sparsæ, confluentes, abbreviatæ, apicem versus hieroglyphicæ, ad marginem apicalem radiatæ, ad marginem internum breves et subparallelæ. Area marginali hemelytrorum pallida. Dorsum nigrum, marginibus flavidis. Corpus subtus flavidum, segmentis 4 maris et 1—2 feminae ventralibus nigris. Pedes flavidi.

15. *C. fossarum* (LEACH): nigro-fusca; pronoto brevi, vix producto, lineis 6 transversis, parallelis, flavidis, margine laterali fusco; lineolis hemelytrorum eroso-undulatis, clavi integris, ad basin latioribus, corii subparallelis, hinc inde abbreviatis; dorso, medio pectoris xypoque nigro; lobis ani basi late nigris; area marginali hemelytrorum pallida. Long. $\frac{1}{2}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{3}{4}$ poll.

Mas: palis e basi utrinque latioribus sensim angustioribus cultratis; fovea frontali oblonga basin oculorum paulo superante; segmentis ventralibus 4—5 nigris.

Fem: palis late similunatis; segmentis ventralibus 2—3 nigris.

Syn. *C. fossarum* LEACH. Trans. Lin. XII. 1. 17. 4.

SABL. Not. Fenn. 10. 2. FALL. Hem. Sv. 182. 3. ZETT.

Ins. Lapp. 285. 3. FIEB. Monogr. 32. 37.

Hab. in aquis Lapponiæ-Scaniæ ubique frequens.

16. *C. Fabrici* (FIEB.): nigro-fusca; pronoto vix elongato lineis 7 transversalibus, parallelis flavidis, una alterave in medio abbreviata, margine laterali fusco; lineolis hemelytrorum flavidis, undulatis, clavi a basi supra medium integris, sed postice subtilibus et hinc inde abbreviatis, corii angustis, abbreviatis; abdomine, xypoque pectoreque nigro; scapulis et pleuris nigris, externe pallidis; lobis prosterni pallidis; area marginali sordida, apice fuscescente, embolio nigro. Long. $\frac{3}{4}$ — $\frac{1}{2}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{3}{4}$ poll.

Mas: palis cultratis, latis, dorso arcuatis; fovea frontali oblonga, basin oculorum vix superante.

Fem: palis late cultratis, acutis, basi subtus subproductis, latioribus.

Syn. *C. abdominalis* FIEB. Bull. de Mosc. 1848. *C. Fabricii* FIEB. Monogr. 33. 38.

Hab. in aquis fundo tuffoso Scaniæ sat frequens. In Blekesjö et Wagnesjö ad Trolle Ljungby cum priore mensibus Majio et Junio.

17. *C. nigrolineata* (FIEB.): alutaceo-grisea; pronoto postice angulato lineis 7 nigris, hinc inde abbreviatis; margine laterali sordido; lineolis hemelytrorum nigris, angustis, subparallelis, contiguis, clavi vix undulatis, integris, subfurcatis, corii abbreviatis, eroso-undulatis, aut furcato-ramosis; dorso, pectore late et xypoque nigro; lobis prosterni anoque nigro; humeri clavi apiceque corii flavidis; area marginali hemelytrorum pallida, embolio longitudinaliter lateque nigricante. Long. $\frac{1}{2}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{3}{4}$ poll.

Mas: palis semiovatis, in basi subtus haud productis; fovea frontali oblonga, oculorum basin vix superante; segmentis ventralibus nigris, ultimis margine sordidis.

Fem.: palis late cultratis, acutis, segmentis 4 ventralibus late nigris.

Syn. *C. nigrolineata* FIEB. Monogr. 34. 40.

Hab. in aquis Scaniz rarius, mensibus Aprili et Majio. Ad Trolle Ljungby et W. Wram ipse. Ad Lund Dom. Rora.

18. *C. semistriata* (FIEB.): nigro-fusca, capite antice rotundato; pronoto vix elongato, postice angulato, lineis 7 arcuatis flavidis; lineolis clavi transversalibus, parallelis, integris, basi non latioribus, corii approximatis, hinc inde flexuosis aut anguloso-contiguis, flavidis, lineis longitudinalibus 2—3 dissectis; linea suturæ membranæ tenui flavida, linea nigra adjuncta; pectore xyphoque nigro; lobis prosterni et pleuris nigris margine pallido; abdomine nigro-fusco incisiuris pallidis; segmentis ventralibus 3—4 nigris; area marginali hemelytrorum sordida, macula fusca ad basin et apicem. Long. $\frac{1}{2}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{3}{4}$ poll.

Mas.: palis simiorbiculatis, tibiis anticis turgidis; fovea frontali obovata medium oculorum vix superante.

Fem.: palis late cultratis, acutis.

Syn. *C. simistriata* (FIEB. Monogr. 36. 43.

Hab. in aquis Lapponiz-Scaniz haud infrequens. Ad Trolle Ljungby et Wram ipse. Ad Lund Dom. Rora.

2. *Pronoto carina media percurrente.*

19. *C. carinata* (SAHLB.): nigro-fusca, violaceo-subnitente; vertice rotundato, antice fusco, fronte plana; pronoto elongato lineis 9—10 transversis, pallidis; lineolis hemelytrorum subtilibus, evanescentibus, clavi remotis subintegris, corii approximatis, abbreviatis, undulato-crosis; dorso pectorisque medio nigro; scapulis pleuris que interne nigris; segmentis ventralibus 4 nigris, femoribus posticis antice et tibiis in margine externo fuscis; area marginali hemelytrorum infusata. Long. $\frac{1}{2}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{1}{2}$ poll.

Mas.: palis e basi latiori, supra et subtus productis, cultratis, acutis, extus obtuse carinatis.

Fem.: palis subsemilunatis.

Syn. *C. carinata* SAHLB. Not. Fenn. 12. 4. FALL. Hem.

Sv. 184. 4. ZETT. Ins. Lapp. 285. 4. FIEB. Monogr. 38. 37.

Hab. in aquis Lapponiz-Scaniz rarius. Ad Trolle Ljungby a me et ad Herrevadskloster a Dom. Rora capta est hæc inter Corisas Scandinaviz forte pulcherrima species.

B. *Pronoto non lineato; superficies punctata.*

20. *C. Bonsdorff* (SAHLB.): lurida, vertice paullo prominente, fronte plana; pronoto brevi, postice obtuso; hemelytrorum lineolis flavidis contiguis, clavi transversalibus, corii abbreviatis; linea suturali corii et linea suturæ membranæ flavidis; pectore ochroleuco, mesosterno macula nigra, metasterni medio nigro; xypho flavido; area marginali hemelytrorum pallida. Long. $\frac{1}{2}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{3}{4}$ poll.

Mas.:

Mas. palis subuliformibus, apice truncatis, ungue valida; abdomine nigro, connexivo flavido.

Fem. palis subuliformibus, ventre ochroleuco, dorso infuscato, segmentis tantum basi nigris.

Syn. *C. Bonsdorffii* SAHLB. Not. Fenn. 13. 6. FALL. Hem. Sv. 184. 6. FIEB. Monogr. 39: 50.

Hab. in Lapponia (FIEB.) et in Scania sat infrequens. Ad Trolle Ljungby a me et ad Lund a Dom. ROTH lecta.

21. *C. coleoptrata* (FABR.): lurida, vertice subangulato; pronoto brevissimo, transverse semi-ovato, fuscescente; clavo fusco, corio a membrana non discernendo, lurido, vittis duabus percurrentibus fuscis; pectore medio nigro; xypho pallido; palis subcurvatis, subtus canaliculatis; area marginali hemelytrorum pallida. Long. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$. Lat. ad bas. hemelytr. $\frac{1}{10}$ poll.

Mas. palis subuliformibus, dorso arcuatis; dorso abdomineque nigro; segmentis ventralibus margine postico pallidis.

Fem. palis subuliformibus; dorso flavido plaga longitudinali nigra; segmentis ventralibus 2 basi nigris.

Syn. *SIGARA coleoptrata* FABR. R. S. IV. 60. 3. S. R. 104. 4. *CORISA coleoptrata* SAHLB. Not. Fenn. 14. 7. FALL. Hem. Sv. 185. 7. FIEB. Monogr. 40. 51.

Hab. in aquis Uplandiæ—Scaniæ sat infrequens. Ad Lund a Dom. ZETT. et ROTH, ad Ljungby a me et ad Upsala a Dom. THIMM capta.

3. *SPHECOMYIA funnen i Norden.* — Hr WAHLBERG anförde:

»Bland de märkligaste fynd, som i senare tider inom Dipterologiens område i Norden blifvit gjorda, kan Syrphidsläktet *Sphecomyia* ovedersägligen räknas. Det uppställdes år 1829 af LATREILLE (Dictionnaire classique d'Histoire naturelle, T. XV, p. 545, samt CUVIER Règne animal Ed. 2, T. V, p. 495) efter en från Carolina i Norra Amerika af Bosc hemförd art. År 1830 beskrefs densamma af WIEDEMANN efter ett i Wienermuseum förvaradt hon-exemplar och benämndes *Chrysotoxum vittatum* (Aussereuropäische zweiflügelige Insecten, T. II, s. 87). Honan framställdes likaledes af honom genom beskrifning och teckning (l. c. s. 91, Tab. IX, fig. 7), under namn af *Psarus ornatus*, efter två från Nordamerikanska fristaten Georgien i Berliner-museum befintliga specimina, der kallade *Epopter orna-*

tus. År 1842 återförde MACQUART (Diptères exotiques nouveaux ou peu connus, T. II, Part. II, p. 18, Tab. III, fig. 3) den ifrågasvarande arten till det af LATREILLE bildade släktet och kallade den *Specomyia vittata*, samt afbildade hanen, och angaf dess könskillnad, efter ett Georgiskt exemplar i Pariser-museum. En figur derpå är dessutom lemnad i Ed. 3 af CUVIERS Règne animal, les Insectes, pl. 475, f. 2. Allt detta rör den amerikanska arten, och ända dittills ansågs släktet endast tillhöra nyssnämnda verldsdel.

Sedermåra har en art deraf blifvit anträffad på tre ställen inom Europa, nemligen nära Wilna af S. B. GORSKI, vid Christiania af L. ESMARCK och enligt dennes uppgift äfven af SIEBKE, samt senast i Finland af E. BONSDORFF. GORSKI beskref och afbildade år 1852 (Analecta ad entomographiam provinciarum occidentali-meridionalium imperii Rossici, Fasc. 4, p. 170—174, Tab. 4, fig. 4) den af honom funna hanen med det nya namnet *Tyzenhauzia vespiformis*, ehuru han sjelf synes hafva förmodat släktets identitet med *Sphecomyia*, enär ingen annan skillnad förefanns, än att dennas antenn-seta, enligt LATREILLE, tvärt emot förhållandet hos alla flugor, skulle utgå från andra leden, en uppgift, som måste hvila på något misstag, så mycket heldre som hvarken WIEDEMANN eller MACQUART deruti instämmer. Den senare beskriver tydligt setans vidfästning på tredje leden.

Sedan jag kommit i tillfälle att undersöka så väl en af Hr ESMARCK fångad hona, som båda könen af Hr BONSDORFF tagna i parning, hanen till mig benäget öfverlemnad, har jag ej blott vunnit full visshet om desammas öfverensstämmelse sinsemellan och med GORSKIS väl beskrifna och afbildade exemplar från Lithauen, utan äfven om deras plats såsom art af släktet *Sphecomyia*. Då detta lika utmärkta som sällsynta insektgenus sålunda blifvit funnet både på östra och vestra sidan i de till Sverige närmast belägna länder, torde det vara mer än sannolikt, att det äfven tillhör vår fauna, hvarföre det så mycket snarare här synes förtjena en närmare granskning. Huru

oviss GORSKI varit om giltigheten af sitt nybildade slägte, visar sig äfven deraf, att han ej med säkerhet tilltror sig kunna afgöra om *Tyzenhauzia vespiformis* är en från *Sphecomyia vittata* skild art, eller olikheterna endast bero af könsskillnaden. Han har nemligen blott egt tillgång på en hane af den förre, hvilken han jemfört med beskrifningen på den senares hona, ej med dess af MACQUART omnämnda hane. De af GORSKI uppgifna olikheterna äro följande: *Sphecomyia vittata* har längre åtskiljda ögon och således bredare vertex med tydligare oceller än *Tyzenhauzia vespiformis*; rygglinierna på thorax äro bredare, framtill spetsiga, mera närmade till hvarandra eller kortare afbrutna, ej smalt linieformiga och långt afbrutna; fläckarne på pleuræ 3, ej blott 2; de bakre fötternas coxæ med en gul fläck, ej svarta endast med gulaktigt skimmer; lår, ben och fötter helt ljusgula och lika färgade, ej låren och fotspetsarne mörkare; abdominal-fascierna 9, hvaraf 7 af lika bredd, endast den andra tydligt afbruten samt den 8:de och 9:de på analsegmentet helt smalt åtskilda, ej blott 7, olikbreda, den andra bredt, den 4:de och 6:te smalt afbrutna; buken med första segmentet helt svart, det andra svart med två triangulära gula fläckar, 3:dje, 4:de och 5:te gula med en stor tvärställd, elliptisk, svart fläck i disken, ej buken svart med en gul fascia framtill på 2:dra, 3:dje och 4:de segmentet; scutellen smalt svartkantad, ej bredare svart, samt slutligen vingarne gulare. Då jag härmed jemför den europeiska artens hona, finner jag alla de af GORSKI för hanen uppgifna skillnaderna från *Sphecomyia vittata* ♀ qvarstå, med undantag af ögonafståndet och abdominal-fasciernas antal, hvilket endast utgör könsskillnader, såsom MACQUART redan anmärker för den amerikanska. Det torde således kunna antagas, att de från olika verldsdelar härstammande individerna, ehuru närstående, dock tillhöra särskilda arter, båda ingående i samma slägte, *Sphecomyia*, hvilket namn äfven bör tilläggas *vespiformis*, i stället för det yngre *Tyzenhauzia*, som måste försvinna.



Släktet *Sphecomyia*, ehuru fattigt på arter, hittills endast *vittata* och *vespiformis*, är så mycket utmärktare genom sina karakterer, och företer kännetecken af flera bland Syrphidernas hufvudgenera. Genom epistomets form påminner det om *Ceria*, *Psarus*, *Sericomyza*, *Volucella*, *Syrphus*, *Criorrhina*, *Mallota*, *Helophilus* och *Brachyopa*; genom en sned hårrad från antennroten till hvarterda ögat om *Sericomyza*; genom pann-utskottet, hvarpå antennerna sitta, om *Ceria*, *Psarus* och *Criorrhina*; samt genom antennernas bildning om *Chrysotoxum*, *Microdon* och *Psarus*, med hvilket sistnämnda släkte det närmast öfverensstämmer i form-karakterer, liksom det till storlek, statur, färgteckning och vingarnes nervgång mest liknar *Milesia*, framför allt *M. vespiformis*. Från alla skiljes det likväl lätt genom sista antenn-ledens form och proportion etc. En generisk och specifik beskrifning torde bäst upplysa dess egenheter.

SPHECOMYIA LATR. MACQU.

Chrysotoxum WIED., *Psarus* WIED., *Tyzenhauzia* GORSKI.

(Figg. WIED., MACQU., CUV., GORSKI l. l. c. c.)

Corpus magnum, oblongo-subcylindricum, immarginatum, tenuiter pubescens, nigro-flavoque pictum. *Caput* thorace paullo angustius, transversum, postice planum vel quasi truncatum, *marginē occipitali* pone verticem et ad oculos inferne pilis longioribus (flavis) vestitum. *Vertex* ocellis in triangulum dispositis, maris setulis obumbratis, feminae evidentioribus. *Frons* in tuberculum conicum, truncatum, antennarum articulo primo paullo brevius, producta. *Epistoma* dimidia fere longitudine infra oculos rostratim subverticaliter descendens, conicum, lateribus compressiusculum, superne prominens, subcarinatum, in mortuis saltem, ad carinam, plicis oblique positis, deorsum convergentibus notatum, et serie pilorum obliqua a radice antennarum utrinque ad oculum ducta, infra medium leviter tuberculatum, apice profunde retusum; *apertura oris* oblonga. *Oculi* triangulari-ovales, convexi, nudi, breviter distantes, in femina tamen paullo latius quam in mare; *interstitio* postice angustiore. *Proboscis* in mortuis exserta, *labius* pubescentibus. *Palpi* minuti, subfiliformes. *Antennae* apici tuberculi frontalis insertae, approximatae, subarcuatim porrectae, elongatae, longitudine fere epistomatis, a primo articulo furcatim divaricatae, *articulis 2 basalibus* longis, subcylindricis, apicem versus nonnihil incrassatis, breviter setulosis, setulis antrorsum versis, *primo secundo* paullo brevior et angustior, cum opposito parallelo, pone medium subcurvato, *secundo* apice sat oblique truncato, *tertio* minuto, transverse-ovali vel subreniformi, oblique posito, *marginē* carinato; *seta* e medio dorsi, ipso

articulo longiore, non articulata, inflexa, nuda. *Thorax* subcylindricus, sutura mesothoracis transverse impressus, antice truncatus, *callis humeralibus* sat prominentibus, rotundatis, postice rotundatus. *Scutellum* subsemicirculare, convexiusculum, immarginatum. *Abdomen* thorace fere angustius, subcylindricum, paullo curvatum, immarginatum, supra convexum, infra concavum, maris quadri-, feminae quinque-annulatum præter segmenta analia retracta; ano in mare rotundato, subincluso, in femina acutiori, *vagina* brevi. *Alæ* insecti quiescentis omnino incumbentes, apicem abdominis paullo excedentes, vigilantis vero divergentes vel patulæ ut in *Ceria* et *Conope* (Gorski); *nervis* omnino *Milesia vespiformis*, h. e. *nervis* areas 2 discoidales terminantibus lineam subrectam, ad exitum nervi quinti tantum paullo curvatam, margini alæ posteriori proximam illique parallelam formantibus, superiore cum longitudinali quarto, mox ante apicem alæ, acutum angulum, cum apice costæ conniventem, fingente; longitudinalibus subrectis, tertio apice in costam curvatim flexo, quarto ante exitum leviter curvato, quinto apice curvato, septimo brevi, ab apice areæ axillaris ad marginem anteriorem decurrente, spurio (Macquart) obsoleto vel *Milesiarum* illo minus conspicuo; transverso ordinario paullo infra medium quarti oblique et subcurvatim ducto, medio recto. *Squamæ subalares* parvæ, ciliatæ. *Halteres* nudi. *Pedes* simplices, inermes; femoribus rectis, haud incrassatis, pilosis; tibiis puberulis, posticis præsertim curvatis et apicem versus paullo latoribus; tarsis puberulis, apice pilosis, tibiarum longitudine, metatarsis anterioribus ceteris articulis simul sumtis brevioribus, posticis ceterorum articulorum conjuncta longitudine.

Differentia sexus supra indicata.

Volatus celer, sine ullo susurro (Gorski).

Metamorphosis ignota.

Habitatio in saltibus graminosis, editioribus (Gorski).

Sphecomomyia vespiformis: nigra, margine occipitali, macula frontali gemina, vittis duabus epistomatis, thoracis lineis binis angustis, linearibus, late interruptis, callis duobus humeralibus totidemque maculis pleurarum utrinque, scutelli basi, vittis ventralibus, abdominisque fasciis septem (♂) vel novem (♀) flavo-aureis, secunda latius, quarta, sexta et (in ♀) octava angustius in medio interruptis, alternis integris angustioribus, nervis alarum, halteribus pedibusque rufescenti-testaceis, femoribus basi subtus tarsisque apice infuscat. ♂♀. Long. 6 lin.

Tyzenhauzia vespiformis GORSKI l. c. Tab. 1, fig. 1 (bona) ♂.

Habitat in Norvegia prope Christianiam (♀), ESMARCK et SIEBEK; in Finlandia ad prædium Eriksberg, Paroeciæ Uskela in præfectura Aboensi (♂♀ copulati trunco populi quiescentes, mense Julii, BOKSDORFF; in Lithuania prope Vilnæ ad prædium Werki die 6 Junii 1846 folio fruticis insidens (♂) GORSKI, semper rarissima.

Habitu, magnitudine et pictura sericeo-flavo-aurea *Milesia vespiformis* simillima, epistomatis vero et præsertim antennarum forma longe diversa. Caput nigrum, margine occipitali flavo-aureo, macula frontali triangulari ejusdem coloris utrinque ad basin protuberantiæ, antice

attenuata, postice oppositæ valde approximata, in femina majore, latiore et lineis duabus epistomatis longitudinalibus, latis, flavo-aureis, a radice antennarum usque ad aperturam oris fusco-marginatam continuatis, linea media nigra, nitida, parum angustiori distinctis. *Oculi* fuscii. *Proboscis* nigro-fusca, *labiis* fusco-testaceis. *Palpi* nigro-fuscii. *Antennæ* nigre, *seta* fusco-ferruginea. *Thorax* niger, subopacus, pleuris nitidioribus, pilis flavescentibus erectis pubescens, callis humeralibus flavo-aureis, maculis pleurarum concoloribus utrinque binis mōx ante basin alarum supra pedes intermedios locatis, superiore oblonga transverse posita, inferiore subrotunda, et striis denique in dorso 4 angustis, flavo-aureis, lineas 2 remotas et longe interruptas formantibus, anterioribus parallelis, posterioribus parum divergentibus, basin vel apicem thoracis haud attingentibus. *Scutellum* æneo-nigrum, nitidum, lunula flavo-aurea dimidiam latitudinem occupante. *Abdomen* æneo-nigrum, nitidum, fasciis in mare 7, in femina 9 flavo-aureis, segmento primo fascia solitaria apicali, integra, angusta, latera versus paullo dilatata, reliquis segmentis (in mare 2—4, in femina 2—5) fasciis duplicibus, sub margine connexis, anteriore ante medium segmenti sita latiore, medio anguste interrupta, posteriore apicali, angustiore, integra, latera versus attenuata. Fascia secunda oblique posita, subarcuata, paullo latius interrupta, ceteræ subtransversæ, rectæ, 1, 3 et 5 reliquis angustiores. Spatia nigra inter fascias 1 et 2, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7 latiora. Anus maris flavo-aureus, feminae vagina nigro-fusca. *Venter* niger, segmentis omnibus apice anguste ferrugineis et fasciis subbasalibus, simplicibus, angustis, flavo-aureis, in mare fascia segmenti secundi maculis 2 parvis, longe remotis formata, tertii anguste interrupta, quarti integra. *Alæ* subhyalinæ, versus apicem juxta nervos longitudinales, ad nervos transversos et ad junctionem nervi tertii et quarti haud longe a medio marginis externi indeterminate leviter infuscatæ, nervis rufescenti-testaceis. *Squamæ subalares* pallide testaceæ, in vivis ferrugineæ (Gonski). *Halteres* toti rufescentes. *Pedes coxis* nigro-fuscis, *trochanteribus* fusco-ferrugineis, *femoribus* rufo-testaceis, subtus ad medium infuscatis, *tibiis* flavo-testaceis, *tarsis* testaceis, apicem versus infuscatis, *pulvillis* pallidis, *unguibus* divericatis, apice nigris.»

4. *Nya svenska mineralier.* — Hr Igelström hade inlemnad följande beskrifning öfver tvenne mineralier, hvilka på Prof. L. SVANBERGS laboratorium blifvit kemiskt analyserade:

»Svanbergit, ett nytt mineral från Horrsjöberget, Ny socken, Elfdahls härad, Wermland.

Svanbergit har jag, till ära för Hr Professorn L. F. SVANBERG, kallat ett nytt, af mig i Horrsjöberget, Ny socken, Elf-

dahls härad, Wermland, upptäckt och analyseradt mineral, hvilket förekommer på en gång i quartzfels i sällskap med kyanit, pyrophyllit, lazulit, glimmer, quartz och jernglans.

Svanbergiten är kristalliserad i monoklinoëdriska octoëdrar och deraf härledda långsträckt kristallformer. Kristallerna äro blekröda, halfgenomskinliga, med en tydlig genomgång, parallell med basiska planet, efter hvilken de med lätthet låta klyfva sig. Pulfret är blekrödt. Eg. v. = 3,30. Hårdheten = 5.

Svanbergitens blåsrörs-förhållanden äro följande. I kolf ger den ett ymnigt surt vatten. På kol, enbart, affärgar sig, men smälter ej ens i tunnaste kant. Blandad med soda och påblåst med reduktions-låga, gifver den röd hepar, som med vatten blir grön och vid tillsats af utspädd salpeter- eller saltsyra utvecklar ymnigt vätesvasla. I borax på platinatråd löser sig lätt till en klar-perla, som i värme är svagt jernfärgad. I fosforsalt löser sig lätt till ett färglöst klart glas, under stark gasutveckling. Med kobolt-solution ger vacker blå färg.

Det mest finsslammade pulfver af detta mineral är olösligt i syror, äfven i koncentrerade och vid kokning. Endast partielt sönderdelas det, och väl så, att en hvit återstod bildas, på hvilken syror icke vidare synas hafva någon verkan. Om man glödgar mineralet i små stycken i platinadegel, så inträffar det fenomenet, att den vid degelns begynnande rödglödning liksom fattar eld och sönderspringer. Glödgningsförlusten efter fyra repeterade glödningar uppgick till 14,09 procent. Härvid blef vigtsförlusten allt mindre och mindre för hvarje repeterad glödning. Smält med soda i platinadegel sönderdelas mineralet lätt, och den glödgade massan är utan återstod löslig i syror. Denna lösning, försatt med salpetersyra, gifver vid några dropars tillsats af molybdensyrad ammoniak den bekanta fosforsyre-reaktion.

Enligt af mig gjord analys innehåller Svanbergiten på 100 delar:

Svafvelsyra	17,32
Fosforsyra	17,80
Chlor	spår
Lerjord	37,84
Kalkjord	6,00
Jernoxidul	1,40
Natron	12,84
Vatten	6,80.
	<hr/> 100.

Det måste dock medgifvas, att dessa ziffertal ännu icke göra anspråk på någon större säkerhet hvad elementernas blandningsförhållanden uti mineralet beträffar, utan att de snarare må betraktas såsom endast uttryckande dess ungefärliga procentiska sammansättning, hvarföre äfven korrektioner för dessa tal utan fråga komma att göras vid en framtida noggrann undersökning.

Lazulith från Horrsjöberget, Ny socken, Elfdahls härad, Wermland.

Enligt tvenne öfvererensstämmande analyser, verkställda efter olika metoder, har jag erhållit lazulithens procentiska sammansättning som följer:

Fosforsyra	42,52
Lerjord	32,86
Talkjord	8,58
Kalkjord	spår
Jernoxidul	10,55
Manganoxidul	spår
Vatten	5,30.
	<hr/> 99,81.

Sp. v. = 2,78.

Horrsjöbergets lazulith ger blått streck och pulfver samt är genomskinande i mindre splittrar med vacker blå färg. Di-gererad med saltsyra i värme, verkar syran så, att jern upp-löses och ett grönt pulfver bildas på mineralets yta. I stark

värme löser koncentrerad svafvelsyra, efter längre tids digestion, allt jern, under det att en hvit återstod qvarstannar, som icke mera förändras af syror. Fluorvätesyra verkar på samma sätt. Glödgadt, förändras mineralets färg och blir rostbrun samt porös, under det att vatten bortgår. I smältning med en blandning af kolsyradt kali och kolsyradt natron sönderdelas det fullständigt, och man erhåller en klar lösning vid tillsats af saltsyra. För blåsrör ger det tillkänna närvaron af mangan. Till yttre utseendet liknar Horrsjöbergets lazulith den från Salzburg.»

5. *Bref från naturforskaren Hr J. WAHLBERG.* — Sekreteraren meddelade följande utdrag ur bref från sin bror, som nu anträdt sin andra naturhistoriska resa i det södra Afrika:

»Den 14 November kl. 7 på morgonen lemnade jag London, ankom kl. 10 f. m. till Southampton, gick ombord på det ståtliga skrufskeppet Indiana, och afseglade kl. 1/4 e. m. till Plymouth, på hvars redd vi följande morgon ankommo. Här var jag sysselsatt att kopiera min karta öfver Limpopo och afsände den i bref till Dr HODGKIN, för att af honom vidare befordras till ARROWSMITH, hvilken jag i London besökte och af hvilken jag till skänks erhöll åtskilliga nyare afrikanska kartor. Vi lemnade Plymouth den 15 på e. m. När vinden är god segla vi, ty fartyget är tackladt alldeles som ett skepp, och när vinden är för svag eller vidrig är skrufven i gång. Den 26 Nov. på e. m. kom jag i land på St Vincent, som åtminstone denna årstid var en bland de torraste och på naturalster fattigaste platser jag någonsin besökt, och dess ringa befolkning, en blandad race af Negrer och Portugiser, mycket mörk. Der odlades visserligen något majs, vattenmeloner etc., men i ringa mängd, och de ståtliga apelsiner vi erhöilo till köps kommo från St Antonio, en betydligt större ö, hvilken vi passerade helt nära. Boskapsskötsel tycktes vara hufvudnäring, och åsnor förekommo i stor myckenhet, hvilkas skriande hördes från alla

håll; äfven getter, nästan halfvilda. Jag hyrde genast ett par svarta följeslagare och begaf mig uppåt ön samt erhöll der en *Prinia*, sannolikt ny art,

Prinia orbitalis nova spec. Orbitis tenue albo-plumosis (ut *Zosterops*), gula alba (limite laterali definito); alis complicatis extus rufis.

♂ R. e fr. 9,7. Ala 55. Cauda 52. Tars. 18,2. D.m.c.u. 15.

♀ " 9,6. " 56. " 51. " 18. " 15.

Dorsum rufescente fuscum, immaculatum. Caput superne et in lateribus tectricesque caudæ superiores obscure cinerea; genæ et regio ocularis nigricantes; gula pure alba (limite laterali definito). Alæ complicatæ rufæ. Pectus, tibia hypochondriaque vinaceo-rufescentia. Venter medius albicans. Cauda rotundato-emarginata, rectrice extima, basi dimidio oblique nigro-fusca, dein alba; secunda nigricante, limbo tenui apiceque alba; reliquis fuscis. Rostrum fuscum, basi subtus flavescens. Pedes carneo-flavescentes. ♂.

♀ pallidior; caput superne rufescens, fusco tinctum; capitis latera cinerascens, absque nigredine.

Rectrices med. 2 mm. < 5. Rectr. 1 5 mm. < 5.

Hab. in insula Scti Vincentii, frequens.

Dessutom fick jag: *Pyrgita jagoensis*, en *Ascalabotes*, en *Lacerta*, *Ocypoda hippeus*, några insekter (hvaribland ett par *Dolichoper*), samt växter. Ormar sades alldeles saknas. Den enda träd-artade buske som förekom och utgjorde bränslet på ön, tillhörde naturliga familjen *Tamariscinæ*; äfven fanns på de betydligare höjderna en buskartad *Euphorbia*. *Vultur percnopterus* allmän. *Falco haliaëtus*, och naturligtvis många vadare och vattenfoglar. Om aftonen återvände jag ombord på *Indiana*, och fick på begäran tillstånd att »for particular purpose» få hafva ljus tändt om natten, ty annars skulle dessa alltid släckas precis kl. $\frac{1}{2}$ 14. Jag satt uppe tills öfver kl. 2, kunde sedan ej sofva, och begaf mig följande morgon ånyo i land, samt in till öns högsta punkt. Jag erhöll dock nästan endast detsamma jag fått eftermiddagen förut; det enda nya af foglar var en *Corvus umbrinus* SUNDEV. = *C. leptonyx* PEALE, hvilken träffades temligen allmän. Kl. 6 e. m. afseglade vi. Den 8 December ankommo vi till *Ascension*, hvarest endast posten sändes i land och fartyget ej en gång ankrade. Jag erhöll endast på metkrok två ex. af en *Monacanthus*, och såg med saknad de ståtliga fregattfoglarne, hvilka dock under dåvarande förhållanden voro oät-

komliga. Sjöfolket togo med blotta händerna ej mindre än tre Boobys (unga ex. af *Dysporus fuscus*), som jag ej brydde mig om att taga till vara. De högsta punkterna på ön syntes vackert gröna, men de lägre, koniska lavahöjderna alldeles rödbruna och nybildade. I dällderna visade sig en tunn dimma, hvilken uppgafs komma från dervarande guano? (eller möjligen af vulkanisk natur?) Ofantliga sköldpaddor sådes fångas på denna ö. Den 17 Dec. på sydl. lat. $34^{\circ}49'$ och vestl. long. $2^{\circ}33'$ började de första individerna af *Diomedea chlororhynchos* och exulans att visa sig. Den 22 Dec. kl. 5 e. m. ankrade vi i Taffelviken, efter en öfverfärd från Southampton af 38 dygn. Under hela resan har vädret varit det aldrig vackraste.

Consul LETTERSTEDT träffade jag genast efter ankomsten i land. Han synes rask och talar om att medfölja ett stycke inåt landet. . . . Just dagen före vår ankomst hade man i Capstaden bildat ett bolag för bearbetning af koppargrufvorna omkring Orangeflodens mynning, der kopparkis lärers förekomma.

Min operationsplan har jag ej ännu hunnit uppgöra, men hoppas att kunna börja med vestkusten, och efter återkomsten derifrån gå längs efter kolonien åt östra sidan. En stor olägenhet är, att en smittsam lungsjuka lærer gå bland boskapen. . . . VICTORIN, som anländt hit för något mer än en månad sedan, hade just lemnat Capstaden och begifvit sig till Wynberg. Från ANDERSON hade ej sedan Augusti varit några underrättelser; han hade då befunnit sig 150 eng. mil öster om Welfish bay, på väg till den stora insjön. . . . Jag kan ej säga huru mycket lyckligare jag känner mig sedan jag åter kommit i en verksamhet som intresserar; måtte endast Försynen tillställa mig helse och krafter att gå mödorna till mötes.»

Följande bref från Capstaden, af den 20:de Mars, är det senaste:

»Några rader innan jag begynner min långa inlandsresa. Vid min ankomst till Cap fann jag förhållandena mycket förändrade sedan förra gången, allt var nemligen dubbelt dyrare än då; detta stegrades ännu mera sedan ett rykte spridt sig om

guldupptäckter på åtskilliga håll. Jag var villrådig huru jag borde börja, men beslöt mig för en färd till »Walfish bay» sjöledes och derifrån inåt landet, ungefärligen i samma direktion som ANDERSON, hvilken enligt just ankomna underrättelser lyckligen anländt till den stora insjön. Anledningen hvarföre jag föredrog denna framför resor inom kolonien, hvilka SUNDEVALL hade tillrådt mig, var att den smittsamma lungrotan utbrutit bland boskapen derstädes, hvilken gjorde färdandet med egna åkdon och dragare mycket besvärligt, samt derjemte, att jag borde med fulla krafter och kassa begynna det svåraste; sedan, vid en lycklig återkomst, kunde koloniresan alltid lättare företagas. Derjemte var VICTORIN ganska flitigt sysselsatt inom kolonien.

Under de 2½ månader jag uppehållit mig här, har jag föga samlat, endast förberedt mig för långfärden, hvilken jag bestämt till två år; under denna tid kan jag sannolikt ej låta höra af mig.

Jag har utrustat mig temligen, men tyvärr ej öfverkommit några instrumenter för geografiska bestämningar. Omkostnaderna äro nästan stora för mig; omkring 800 £ sterling stryka nemligen på första året. En ung 19-årig svensk, LINDBOLM, som genomgått smedsläran vid Motala, och som utkommit hit för Hr LETTERSTEDTS räkning, medföljer mig, derjemte två kuskar och två oxledare, alla bastarder, svartbruna, ullockiga sällar, vid namn JACOB MÜLLER, DIMAAS ONVERWAGT, DAVID ADONIS och DIMAAS MÜLLER; vidare tre, fyra hundar. Snällseglande skonerten »The Witch of the wave», kapten BRUCE, amerikanare, skall föra mig till bestämmelseorten.

Min afresa har nu sednast blifvit fördröjd genom »strikes» ibland båtfolk och arbetare för att tilltvinga sig högre löner. Sir ANDREW STOCKENSTRÖM, hvilken äntligen återkommit från östra delen af kolonien, har haft godheten att gifva mig öppet rekommendationsbref och goda råd. Ammunition har jag erhållit tillräckligt, egentligen genom brefvet från the Duke of Newcastle, som Dr HODGKIN (till hvilken jag nu äfven skrifver) förskaffade mig; annars göras här många svårigheter vid er-

hållandet af dylik. Penningar förskjuter Hr LETTERSTEDT så mycket jag behöfver. Tvenne oxvagnar och en mängd kistor och varor har jag redan bragt ombord och afseglar möjligen i morgon. Jag känner mig friskare än på många år, och har försedt mig med en engelsk läkarebok samt åtskilliga medicinalier. Ankommen till Walfish bay ämnar jag besöka missionären BÄM i Scheppmansdorff och af honom söka erhålla oxar att föra mina vagnar upp till hans plats, samt sedan vänta der tills jag kan erhålla egna i utbyte mot handelsvaror etc.

Af D:r PAPPE har jag fått ett par små fiskar: *Leptocephalus morrisii* eller annan närstående art, samt en helt liten sötvattensfisk.»

Akademiska angelägenheter.

Den 10 Maj.

Till inländsk ledamot i tredje klassen kallades genom anställt val, Föreståndaren för Motala mekaniska verkstad, Hr Kapten O. E. CARLSUND.

Inlemnade afhandlingar.

Den 10 Maj.

Af Hr Professor W. LILJEBORG: Öfversigt af de i Skandinavien förekommande arter af släktet *Gammarus*.

Remitterades till Hrr SUNDEVALL och LOVÉN.

Den 14 Juni.

Af Hr Rådman BRURLING: *Primitiæ floræ portobellensis*.

Remitterades till Hrr WIKSTRÖM och WAHLBERG.

Af Hr C. O. LÖWENHELM: Meteorologiska observationer vid Malma i Carlstads län.

Öfverlemnades till det astronomiska observatorium.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademins Bibliothek.

Anmälda den 10 Maj.

Af Geological Society i London.

The quarterly Journal. N:o 33—35, 37. 8:o.

Af K. Akademie der Wissenschaften i München.

Abhandlungen. Historische Classe: B. VII. Abth. 1. 1853. 4:o.

Gelehrte Anzeigen. B. 36, 37. 1753. 4:o.

Bulletin. 1753. N:o 26—52.

Reden von FR. V. THIERSCH, v. HERMANN und KRAIBINGER.

Af K. Gesellschaft der Wissensch. i Leipzig.

Abhandlungen. B. III. Bogen 1—26. 8:o.

Berichte üb. die Verhandlungen. Phil.-Hist. Cl. 1850: 4. 1851:

1—5. 1852: 1—4. 1853: 1—3. 8:o.

Af Fürstl. Jablonowskische Gesellschaft i Leipzig.

Preisschriften. IV. 1853. 8:o.

Af Naturforschende Gesellschaft i Halle.

Abhandlungen. B. I: 2—4. 1853—54. 4:o.

Af Naturforschende Gesellschaft i Zürich.

Mittheilungen. H. 6, 7. (Nr 66—91). 8:o.

Af Société Linnéenne i Bordeaux.

Actes de la Société. T. XIX. Livr. 1, 2. 1853. 8:o.

Af Observatorio de Marina i San Fernando.

Almansque Náutico para el año 1855. San Fernando 1853. 8:o.

Af Författarne.

BOHEMAN, C. H., Monographia Cassididarum. T. II. Holm. 1854. 8:o.

DARLBOM, A. G., Hymenoptera Europæa præcipue Borealis. T. II. Berolini 1854. 8:o.

HOMOLLE & QUEVENNE, Mémoire sur la Digitaline et la Digitale. (Archives de Physiologie. 1854: 1). Paris 1854. 8:o.

LEBOY-D'ÉTIOLLES, Recueil de lettres et de mémoires adressés a l'Académie des Sciences. Paris 1844. 8:o.

— — Thérapeutique des rétrécissements de l'urètre. Paris. 8:o.

LARSSON, L. M., Plantarum vascularium in Vermlandia ferrimontana sponte crescentium synopsis. Carlstadii 1852. 8:o.

— — Symbola: ad floram Dalicæ, dissertatio etc. Carlstadii 1851. 8:o.

Anmälda den 14 Juni.

Af Kejsarl. Franska Regeringen.

Annales des Mines. 1853. Livr. 1—5.

Af Société de Géologie i Paris.

Bulletin. T. X. f. 23—33. 8:o.

Af Roy. Astronomical Society i London.

Memoirs. Voll. XVI, XVII, XIX. Lond. 1847—51. 4:o.

Notices. Vol. VIII, X. 1847—50. 8:o.

Proceedings. Vol. VII. No 1—17. 1845. 8:o.

Af Microscopical Society i London.

Transactions. Vol. III. P. 1, 2. 1850, 51. 8:o.

Af Chemical Society i London.

Quarterly Journal. Vol. VI: 4. VI: 1. 1854. 8:o.

Af K. K. Geologische Reichsanstalt i Wien.

Jahrbuch. Jg. IV. Nr 3. 1853. 8:o.

Af K. Gesellschaft d. Wissensch. i Leipzig.

Abhandlungen. Math. Phys. B. IV. Bog. 21—30.

Berichte. Math. Phys. 1853: II, III. 8:o.

Af Société de Physique etc. i Genève.

Mémoires. T. XIII. P. 2. 1854. 4:o.

Af Allg. Schweiz. Gesellsch. d. ges. Naturwissenschaften.

Neue Denkschriften. B. XIII. Zürich 1853. 4:o.

Actes de la société helvétique. 1852, 1853. 8:o.

Af Naturforschende Gesellschaft i Bern.

Mittheilungen. Nr 224—309. 1852, 53. 8:o.

Af H:s Exc. Grefve G. Löwenhjelm i Paris.

Letter on the metrical decimal system, by W. W. MARR. Paris 1853. 3:o.

Af Hr G. Marklin i Upsala.

DONATI, Vit., Essai sur l'hist. natur. de la mer adriatique. À la Haye 1758. 4:o.

Af Prof. Braun i Berlin.

BRAUN, AL., Ueber Krankheiten der Pflanzen, welche durch Pilze erzeugt werden. Berlin 1854. 8:o.

— — Das Individuum der Pflanze in seinem Verhältniss zur Species. Berlin 1853. 4:o.

Af Författaren.

WYDLER, H., Trenne småskrifter. (Aftryck ur Regensburger Flora).

Af Utgifvarne.

Archiv für wissensch. Kunde von Russland. B. XII: 4. 1853. 8:o.

The Astronom. Journal. Cambrige. No 55—57, 62—67. 4:o.

Af K. ö. Tabell-Commissionen.

Underd. Femårsberättelse om folkmängden i Sverige vid slutet af år 1850. Sthm 1854. 4:o.

Af De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen i Haarlem.

Natuurkundige Verhandelingen. 2:de Verzameling, 9:de Ded. Haarlem 1854. 4:o.

Af Hr Z. Hæggström.

Svensk Skolbotanik utg. af N. J. ANDERSSON och K. FR. THEDENIUS.
H. 4—10. Stockh. 1852, 1853. 8:o. (m. t.)

Till Akademiens Fysikaliska Kabinett.

Af Hr Dr N. P. Hamberg.

Ledningstråd och cell till HUMPHRY DAVYS galvaniska stapel.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Anmälta den 10 Maj.

Af Professor MUSS.

En Estrilda bengalus från Guinea.

Af H. Exc. Grefve C. Löwenhjelm.

En Amadina cantans från Afrika.

**Af Presidenten i Entomologiska Föreningen i
Stettin Hr C. A. Dohrn.**

Dynastes Neptunus mas et fem.

Af Medicinalrådet Berg.

Åtskilliga insekter tagna ur fikön.

Af Hr Guldsmeden Zackrisson.

En korall från Söderhafvet.

Anmälta den 14 Juni.

Af Hr Registrator F. Hamström.

En Cuculus canorus.

Af

Af Hr Professor Hult.

En *Spermestes caucillatus*.

En *Estrilda bengalus*.

Af Hr Dr Segerstedt.

En *Graculus carbo*.

Af Handlanden Kluth.

En *Testudo caretta*.

Af Hr Baron C. F. Cederström.

Fyra ex. *Cottus gobio*.

Fiskyngel af flera arter.

Botaniska afdelningen.

Anmälda den 10 Maj.

Af Hr J. Vahl i Köpenhamn.

Femtioåtta arter från Grönland, hvaribland: *Alnus repens*, *Salix arctica*, *Gentiana serrata* och *involucrata*, *Pleurogyne rotata*, *Koenigia islandica*, *Polypodium alpestre*, *Aspidium fragans*, *Woodsia hyperborea* m. fl.

Af Hr Magister Lindeberg i Göteborg.

Fyrtiosju arter från Bohuslän och Holland, t. ex. *Salix Smithiana*, tio arter af *Rubus*, *Glaucium luteum*, *Thalictrum minus* var. *glau-dulosum*, *Lathyrus maritimus*, *Teesdalia nudicaulis*, *Geranium palustre*, *Statice rariflora*, *Halimus pedunculatus*, *Crambe maritima*, *Carex maritima*, *Buxbaumi*, *incurva*, *Calamagrostis acutiflora* m. fl.

Af Hr Magister L. M. Larsson.

Tjugusju arter från nordvestra Wermland, t. ex. *Salix amygdalina*, *daphnoides*, *depressa* och *Lapponum*, *Hieracium crocatum*, *Mulgedium alpinum*, *Aconitum septentrionale*, *Rubus arcticus*, *Calamagrostis phragmitoides*, *Poa remota*, *Carex tenella*, *livida*, *aqvatilis*, *Orchis cruenta* m. fl.

Trettiosju arter från östra Norge utanför Wermlands-gränsen, mest från Trysil-d-fjeld, t. ex. *Hieracium atratum*, *Stellaria borealis*, *Tofieldia borealis*, *Carex loliacea* och *atrata*, *Polypodium alpestre*, *Allosurus crispus*, *Eqvisetum variegatum* var. *scirpoides* m. fl.

Af Studeranden Góthe.

Aderton arter från nejderna af Stockholm och Rosersberg, t. ex. *Populus nigra* (hon-trädet), *Petasites officinalis*, *Crepis biennis*, *Odon-tites rubra*, *Carex pulicaris*, *Hornschuchiana*, *paradoxa* m. fl.

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 11. N:o 5 & 6.



Af Hr Dr N. P. Hamberg.

Etthundradesjutton arter af frukter och frön från olika delar af jorden: af Amomum, Elettaria, af Phytelphas macrocarpa, af Oryza, Sorghum, Panicum, Setaria, af fyra arter af Gossypium, arter af Phaseolus, Ervum, Cicer, samt af ett stort antal medicinalväxter.

Anmälda den 14 Juni.

Af Studerande S. O. Lindberg.

Etthundradefyrtio Bladmossor och trettio Lefvermossor, serdeles från Upland och Södermanland, hvaribland trettiotvå arter af Hypnum, tio af Dicranum, åtta af Grimmia, sex af Leskea, sju af Mnium, sex af Orthotrichum, m. m.

Af Studerande Göthe.

Aderton arter från Upland och Södermanland.

Af Studerande Norman.

Tio arter från Stockholms-trakten, t. ex. Thlaspi perfoliatum, Viola arenaria m. fl.

Ethnografiska afdelningen.

Af Hr Boheman.

En pung gjord af en Albatross-fot och en dylik af Otaria-hud, från Söderhafs-öarna.

*Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i Mars 1854.*

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Viudarna.			Anmär- ningar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,61	25,77	25,80	— 1°0	+ 4°2	+ 2°7	V.	V.	V.	Klart
2	25,83	25,82	25,81	+ 3,2	+ 5,3	+ 3,1	V.	V.S.V.	V.S.V.	—
3	25,71	25,73	25,68	+ 2,0	+ 5,0	+ 1,0	V.S.V.	V.S.V.	V.	—
4	25,73	25,71	25,49	— 1,3	+ 6,5	+ 5,1	V.	V.	V.	—
5	25,38	25,39	25,51	+ 2,0	+ 3,3	— 1,0	V.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	—
6	25,68	25,84	26,01	— 6,1	— 2,9	— 7,1	N.V.	N.N.V.	N.V.	—
7	26,01	25,91	25,78	— 9,0	0,0	— 2,5	V.N.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
8	25,60	25,47	25,25	— 1,0	+ 3,0	+ 1,8	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Mulet
9	25,14	25,17	25,13	+ 1,0	+ 6,1	+ 2,0	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Klart
10	25,16	25,12	24,91	+ 2,0	+ 7,0	+ 5,0	V.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	Mulet
11	24,80	24,85	25,03	+ 2,5	+ 8,5	+ 4,0	V.S.V.	V.	N.N.V.	Klart
12	25,31	25,50	25,63	+ 1,1	+ 6,0	0,0	N.N.V.	N.V.	S.	—
13	25,74	25,78	25,84	— 0,4	+ 9,2	+ 3,5	S.S.V.	S.V.	S.V.	—
14	25,91	25,95	25,98	— 1,0	+ 4,3	— 1,2	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	Halfkl.
15	26,03	26,04	26,06	— 1,2	+ 4,9	— 1,0	S.S.O.	S.O.	S.O.	Klart
16	26,08	26,06	26,01	— 2,7	+ 4,0	— 1,8	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	—
17	25,96	25,90	25,90	— 5,2	+ 4,0	— 1,9	N.N.O.	O.N.O.	S.S.O.	—
18	25,86	25,77	25,71	— 3,0	+ 1,2	— 1,9	V.S.V.	V.S.V.	V.N.V.	—
19	25,68	25,77	25,85	— 3,0	— 1,4	— 2,2	N.N.O.	N.N.O.	N.	Mulet
20	25,86	25,79	25,57	— 2,0	+ 1,0	— 0,7	N.	V.N.V.	V.	Suö
21	25,52	25,59	25,65	— 0,5	+ 2,0	— 2,3	N.	N.	N.	Mulet
22	25,30	25,13	25,25	+ 0,3	+ 10,0	+ 5,3	V.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	—
23	25,20	25,08	25,04	— 0,7	+ 2,0	+ 0,1	—	N.V.	—	Suö
24	25,14	25,25	25,20	— 2,8	+ 0,2	— 3,0	N.N.V.	N.N.V.	V.N.V.	—
25	25,02	24,76	24,75	— 3,0	+ 3,2	0,0	V.N.V.	S.	O.S.O.	Mulet
26	25,04	25,22	25,38	— 0,2	+ 0,7	— 4,5	N.O.	N.N.O.	N.N.O.	Suö
27	25,42	25,35	25,32	— 5,0	+ 4,9	+ 1,2	S.S.V.	S.V.	V.S.V.	Klart
28	25,28	25,39	25,49	+ 1,3	+ 6,3	+ 2,6	V.	N.N.O.	—	—
29	25,39	25,47	25,56	+ 1,2	+ 5,0	+ 0,1	O.S.O.	O.S.O.	—	Mulet
30	25,50	25,45	25,48	+ 0,2	+ 6,7	+ 3,2	S.	S.S.V.	—	—
31	25,44	25,52	25,57	+ 1,4	+ 5,6	+ 3,4	—	—	—	—
Me- dium	25,527	25,534	25,537	— 1°00	+ 4°06	+ 0°42				
	25,533			+ 1°12						

i April 1854.

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkning- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,59	25,52	25,50	+ 3°0	+12°0	+ 9°0	S.S.V.	S.V.	S.V.	Mulet
2	25,32	25,43	25,53	+ 8,0	+11,7	+ 6,2	V.S.V.	V.	V.	Klart
3	25,36	25,43	25,23	+ 4,0	+ 1,6	+ 0,2	V.	V.N.V.	V.N.V.	Soö
4	25,41	25,47	25,35	— 1,5	+ 6,0	+ 4,7	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klart
5	25,16	25,05	25,21	+ 6,0	+11,2	+ 2,9	V.	V.S.V.	V.N.V.	—
6	25,40	25,39	25,12	+ 3,2	+ 9,5	+ 4,9	V.	V.S.V.	V.S.V.	—
7	25,03	25,10	25,07	0 0	+ 3,7	+ 2,3	V.S.V.	N.N.V.	V.N.V.	—
8	25,31	25,41	25,34	+ 0,3	+ 7,5	+ 4,0	V.N.V.	V.N.V.	V.	—
9	25,11	24,92	25,05	+ 4,4	+12,0	+ 4,2	V.S.V.	V.S.V.	N.	Regu
10	25,33	25,44	25,39	— 0,8	+ 4,9	+ 1,0	N.	N.N.V.	N.N.O.	Halfkl
11	25,32	25,49	25,63	+ 1,0	+ 3,1	— 0,1	N.	N.	N.N.V.	Klart
12	25,78	25,90	25,99	— 2,1	+ 5,0	— 0,2	N.N.V.	N.	—	—
13	26,01	25,94	25,81	— 0,1	+10,0	+ 6,0	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
14	25,78	25,71	25,67	+ 2,0	+13,0	+ 8,2	V.N.V.	V.	V.	—
15	25,56	25,42	25,36	+ 3,2	+14,0	+ 9,0	V.	V.	V.	—
16	25,48	25,63	25,72	+ 0,8	+ 5,0	+ 0,9	N.N.V.	N.	N.N.V.	—
17	25,81	25,77	25,73	— 1,1	+ 9,0	+ 5,2	—	V.	V.	—
18	25,70	25,67	25,65	+ 4,0	+14,8	+10,0	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
19	25,64	25,57	25,53	+ 7,0	+18,0	+ 9,0	V.N.V.	V.N.V.	—	—
20	25,54	25,48	25,43	+ 6,2	+17,2	+ 6,5	—	—	S.O.	—
21	25,26	25,16	25,07	+ 6,0	+17,3	+ 7,7	—	V.S.V.	V.S.V.	—
22	24,94	25,03	25,10	+ 6,5	+ 5,0	+ 1,9	—	N.N.O.	N.N.O.	Halfkl
23	25,19	25,34	25,51	— 1,0	+ 2,0	— 3,0	N.N.V.	N.N.O.	N.N.O.	Soö
24	25,63	25,67	25,63	— 3,0	+ 3,7	— 2,4	N.N.O.	N.	S.	Klart
25	25,46	25,39	25,49	+ 1,3	+ 7,7	+ 3,8	V.S.V.	V.S.V.	N.N.V.	Regu
26	25,56	25,57	25,49	+ 1,4	+ 5,2	— 1,5	N.N.V.	N.N.V.	S.S.O.	Klart
27	25,29	25,21	25,16	+ 1,9	+ 7,1	+ 2,4	S.S.O.	S.O.	O.S.O.	Mulet
28	25,43	25,11	25,07	+ 2,0	+ 5,0	+ 2,0	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	Soö
29	25,03	25,04	25,05	+ 1,2	+ 1,5	+ 1,0	N.O.	N.O.	O.N.O.	—
30	25,01	24,99	24,93	+ 1,9	+ 4,2	+ 3,1	N.	N.	N.N.V.	Regu
Me- dium	25,405	25,398	25,394	+ 2°19	+ 8°26	+ 3°63	Nederbörden = 0,371 dec. tum.			
	25,399			+ 4°69						

i Maj 1854.

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkn- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	24,93	24,93	24,92	+ 2,4	+ 6,9	+ 2,7	V.S.V.	S.S.V.	S.	Mulet
2	24,92	24,92	24,97	+ 4,2	+14,0	+ 8,4	S.	S.V.	S.V.	—
3	24,97	25,15	25,28	+ 8,3	+12,0	+ 8,2	V.S.V.	V.	—	Regn
4	25,32	25,26	25,20	+ 7,9	+ 9,0	+ 6,1	—	O.S.O.	O.	—
5	25,12	25,18	25,19	+ 7,3	+14,0	+ 6,4	V.S.V.	V.N.V.	N.N.O.	—
6	25,05	25,04	25,33	+ 6,2	+ 7,0	+ 8,0	S.S.O.	S.	V.S.V.	—
7	25,43	25,39	25,39	+ 7,0	+10,8	+ 5,7	V.S.V.	S.	S.S.V.	—
8	25,40	25,44	25,43	+ 6,5	+11,2	+ 6,1	S.	S.S.O.	S.	Klart
9	25,41	25,44	25,44	+ 9,9	+16,0	+ 9,0	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	—
10	25,43	25,46	25,47	+10,0	+18,0	+ 9,5	—	—	O.N.O.	—
11	25,47	25,48	25,54	+11,2	+20,0	+11,2	—	—	—	—
12	25,58	25,61	25,61	+12,7	+19,0	+11,8	—	O.N.O.	—	—
13	25,57	25,53	25,46	+12,2	+18,3	+10,0	V.S.V.	S.V.	S.S.V.	—
14	25,45	25,45	25,45	+13,2	+18,2	+13,0	S.S.V.	S.V.	V.S.V.	—
15	25,50	25,51	25,51	+10,0	+17,3	+ 9,5	V.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	—
16	25,60	25,64	25,66	+ 8,0	+13,5	+ 7,0	N.	N.	O.	—
17	25,67	25,59	25,49	+ 8,2	+14,3	+ 6,4	—	S.	S.	—
18	25,38	25,33	25,36	+12,0	+12,1	+ 8,0	V.S.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
19	25,38	25,43	25,47	+ 9,0	+14,2	+10,1	N.N.O.	V.N.V.	—	—
20	25,53	25,52	25,49	+ 8,9	+15,1	+ 9,8	N.N.O.	S.	S.S.V.	—
21	25,51	25,48	25,51	+11,1	+16,2	+ 9,7	V.S.V.	S.S.V.	S.	—
22	25,54	25,54	25,57	+11,4	+17,1	+11,1	S.	S.	S.S.O.	—
23	25,55	25,56	25,55	+12,3	+17,1	+12,7	O.N.O.	O.N.O.	N.N.O.	—
24	25,51	25,59	25,62	+12,0	+14,0	+ 9,0	N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
25	25,62	25,62	25,58	+12,2	+15,0	+ 9,6	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
26	25,52	25,47	25,44	+11,7	+15,9	+10,0	N.O.	O.N.O.	—	—
27	25,38	25,37	25,36	+11,4	+19,0	+13,0	V.S.V.	O.N.O.	O.N.O.	—
28	25,37	25,40	25,46	+10,1	+13,1	+10,6	O.S.O.	V.S.V.	V.S.V.	Regn
29	25,46	25,47	25,52	+10,2	+18,2	+10,7	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	Klart
30	25,53	25,52	25,43	+12,6	+14,2	+10,9	N.O.	N.O.	N.O.	Regn
31	25,43	25,50	25,55	+11,3	+17,0	+13,3	—	V.	—	—
Me- dium	25,404	25,414	25,427	+9,72	+14,76	+9,34	Nederbörden = 0,806 dec. tum.			
	25,415			+11,27						



ÖFVERSIGT
AF
KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS
FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

N. 7.

Onsdagen den 13 September.

Föredrag.

1. *De flundre-artade fiskarnas kroppsbyggnad är mera skenbart än verkligt osymmetrisk *).*

— Hr A. RETZIUS föredrog följande af Intendenten vid Göteborgs zoologiska museum Hr A. MALM insända meddelande.

»Den fisk, som gifvit anledning till nedanstående uppsats, och hvilken jag här i förstoring afbildat, är en liten unge af *Rhombus vulgaris*, hvilken af mig påträffades och fångades på omkring fyra alnars vatten vid bryggan vid Klubba (Fiskebäckskihl, öster sida), den 41 Juli 1854. Han sam i och nära sjelfva vattenytan och rörde sig med mycken liflighet, samt höll derunder kroppen i omkring en half rät vinkels lutning åt sidan!

Dess totallängd utgör $19\frac{1}{2}$; största höjden (utom fenor) 10; hufvudets längd 6 millim. Ryggfenan har 75; analfenan 59 och stjärtfenan $\frac{1}{2}$ strålar, men den öfre och den nedre af dessa strålar äro så korta, att KRÖYER föranlåtits att kalla dem »rudimentära». Jag måste anse dem för verkliga strålar, all den stund deras rötter äro nästan lika mycket utvecklade som de närmast intill dem liggande. Så är åtminstone förhållandet med den öfres rot; den nedres är spensligare än någon af de öfriga. Dessa tvenne yttersta strålar äro $\frac{1}{2}$ -del kortare än de

*) Härtill Tab. I.

närmast liggande, och dessa äro endast hälften så långa som de längsta.

Grundfärg ingen, således hvitaktig, och ej skönjbart ljusare på högra än på den venstra sidan. Den venstra sidan har åtta mörka tvärband, hvilka uppkomma genom de på dessa band spridda pigmentfläckarna, hvilka redan sjelfva spridt sig i kroklinigt utlöpande, mörka strålar. Härigenom har det rum, som inneslöt det ursprungliga pigmentet, slutligen blifvit tomt, så att man kan likna en sådan utbredd fläck vid en Fissurella. Dessa fläckar äro de primära. Framom ögat finnes det första bandet, som utgöres af några få, oregelbundet strödda fläckar. Det andra går öfver ryggfenans främre del, något bakom fenans början, öfver parietal-trakten, fortsätter öfver temporal-, tympanal-, jugal-, præopercular-, opercular-, subopercular- och interopercular-trakterna, samt upphör vid angular-trakten. Tredje bandet går öfver occipital-trakten samt fortsätter öfver främre extremiteterna, ner på bukfenorna. Fjerde är beläget något framom kroppens midt. Femte, sjette, sjunde och åttonde äro belägna på bakre hälften af kroppen, det sista på stjertroten. De sju bakre utgå således på ryggfenan, de fem bakre på analfenan. På båda dessa fenor, emellan banden, står, midt på fenan, en rund, mörk fläck. Längs interspinalbenens bas, särdeles tydligt på ryggsidan, finnes en mörk linia, hvilken uppkommer genom efter hvarandra stående, mörka punkter. Såväl på hufvudet, bakom ögonen, som på kroppen — ej på interspinal-trakten — finnas oregelbundet strödda, cirkelrunda, becksvarta, sekundära pigmentfläckar. Endast få af dessa hafva börjat förgrena sig och till följe deraf blifvit blekare. På högra sidan äro banden fullkomligt lika dem på den venstra, så ock de sekundära fläckarna; men allt är der blekare, särdeles längs sidans midt, så att det är isynnerhet på rygg- och analfenorna, samt på dessas interspinalben, som banden riktigt tydligt uppträda.

En utförligare beskrifning af denna lilla fisk anser jag mig kunna förbigå, helst jag lemnat figurer, hvilka tydligare

än en beskrifning åskådliggöra Rhombus i detta utvecklingsstadium. Såsom af dessa synes, ligger ännu det högra ögat mycket snarare på högra än på den venstra sidan, och därför sam den ej såsom utbildade flundror, ej heller fanns den på botten.

Denna lilla fisk bör nu otvifvelaktigt lära oss, att alla Pleuronectoider, i ett ännu tidigare utvecklingsstadium, måste vara symmetriska och då, till kroppsformen äfvensom sättet att röra sig, hafva största likhet med en torsk, eller ännu mera med en Raniceps. Men allt som åldern framskrider och fisken allt mer och mer närmar sig målet för sin bestämmeelse, det nemligen att blifva en varelse, som på bästa sätt skall kunna vaka öfver, att de djur, som hålla sig på och i hafsbottnen, ej skola blifva allt för talrika, omgestalta sig hufvudets ben, så att båda ögonen slutligen komma att finnas på fiskens ena, uppåtvända sida.

KRÖYER — i »Danmarks Fiske», inledningen, 1853, sid. LXXXI — säger: »Flyndrefiskene blive højst mærkelige ved Manglen af den Symmetri, som ellers karakteriserer Bendyrene: begge Øjnene sidde næmlig på samme Side, og denne vender stedse op, naar Fisken svømmer, og er stærkt farvet, medens den anden Side, som intet Øje har, viser en hvidagtig Farve. Dessuden ere Mundens to Sider hinanden ulige, hvilket ogsaa alleroftest er Tilfældet med Brystfinnerne. Kroppen er meget sammentrykket, og som Følge deraf høj. Rygfinnen strækker sig langs hele Ryggen; Gadborfinnen indtager den underste Rand af Kroppen, og synes næsten at fortsættes af Bugfinnerne fortil De opholde sig på Havets Bund.»

Allt detta kan tillämpas på dessa fiskar, sedan de blifvit mera utvecklade, men föga eller intet af ofvanstående håller streck då flundran ännu befinner sig i ett tidigare stadium.

Vi vilja nu öfvergå till benbyggnaden i allmänhet, hos de flundre-artade fiskarna, men skola särskildt hålla oss vid det parti af kranium, som undergått så betydliga förändringar, att en sådan fisks båda ögon kommit att ligga på den uppåtvända sidan. Någon dissektion af denna lilla unge har jag ej velat

företaga; en sådan skulle ej heller lemnat särdeles många upplysningar, då jag ej haft tillgång på flera sådana små ungar. Jag har därför sökt att framleta mig på annat sätt, i det att jag försett mig med preparater af något äldre individer, framför allt af samma art. Ett sådant exemplar, hvaraf jag nu har skelettet framför mig, håller 188 millim. i längd och har 79 strålar i ryggfenan samt 56 i analfenan.

Granskar man byggnaden af en flundra, så finner man visserligen, att såväl det egentliga skelettet som hudskelettet är olika på fiskens båda sidor, men denna i sig själf dock obetydliga olikhet torde hafva uppkommit endast genom följande orsaker: 1:o att musklerna på den uppåtvända sidan måste vara mera utbildade än på den nedåtvända, i och för fiskens operationer på och i hafsbottnen; 2:o af ljusets inflytelse: måhända har detta förorsakat det förra. Det är dock egentligen hufvudet, som företer den största olikheten på båda sidorna, dock är det isynnerhet dess mellersta del, då såväl dess bakre som främre partier ej hafva undergått större förändringar, än den öfriga kroppen i allmänhet. Detta synes äfven om man endast tager i betraktande hufvudets basis, jemte de ben, som stå i sammanhang med denna. Man finner då, att *os occipitis basilare* och *vomer* hafva ett ganska normalt läge, men *os sphænoideum* är icke allenast böjdt åt höger, utan äfven vridet så, att *os sph. anterius* har ett åt sidan i stället för uppåt riktadt läge. Likväl är detta mera skenbart, ty det måste hafva detta läge, som rättar sig efter ögonens ställning till hvarandra. Såväl de öfre som de yttre nackbenen, som *ossa parietalia* och *mastoidea* äro ej särdeles olika på hufvudets båda sidor. *Os interparietale* är ock ungefär lika utbreddt på ömse sidor om den från detsamma uppstigande nack-kammen, men framtill böjer denna sig dock något åt venster. Vi komma nu till de bakre pannbenen och finna, att det är dessa, som i hög grad fått förändra sig, för att ögonen måtte blifva förflyttade åt den venstra sidan af kroppen. Sedt uppiifrån är det venstra knappt hälften så

stort som det högra: det förra når ej längre, än till bakre kanten af *orbita*; det högra deremot framspringer nära öfver orbitas midt, och förenar sig der med de ben, som komma från främre delen af kranium, för att, tillsammans med nyssnämnda bakre pannbens framåtlöpande lob, bilda det benparti, som skenbart tycks vara kraniets öfra del. men som i själfva verket har sina motsvarigheter, äfven under det venstra eller undra ögat, fastän de der hafva en annan form och till en del ett annat läge. Nyssnämnda benparti var i alla hänseenden af behovet påkalladt, t. ex. dels för att skydda det högra ögat, och dels för att gifva denna kant af hufvudet tillbörlig fasthet, då fisken likasom plöjer i hafsbottnen. Det venstra af dessa pannben böjer sig och framskjuter nästan till framkanten af *orbita*, det högra deremot, för att äfven få detta läge, måste först böja sig ett godt stycke bakåt, för att sedan, ifrån bakre kanten af *orbita* kunna fortsätta, jemte det förra. Är det högra ofvantill så mycket större och starkare än det venstra, så är detta särdeles robust jemnfördt med det förra, hvad den del beträffar, som ligger emellan ögonen. Ja, det tycks likasom om det venstra här skulle hafva velat vinna hvad det upptill i massa förlorat; ty det högra pannbenets fortsättning mellan ögonen utgöres endast af en tunn spån.

Låtom oss nu i korthet betrakta hufvudets främre ben: Mellankäksbenen jemte deras apofyser äro hvarandra nästan fullkomligt lika, men det högra ligger något högre, än det venstra. De i närheten af nämnde apofyser börjande *supranasal*-benen, hvilka äro nästan broskartade och snarare torde böra anses som hudbildningar, böja sig båda åt den mörka sidan, och rigta der sina spetsar mot de nyssanfödda, mellan ögonen liggande, långa delarna af de bakre pannbenen. Os *ethmoideum* är betydligt rigtadt på sned, åt venster, och har läget mellan *vomer* och nämnde *supranasal*-ben. Det venstra, främre pannbenet är mycket litet, då det högra deremot utsänder en betydligare lob, som (jemte högra *infraorbital*-benet?), tillsammans med den ofvannämnda framskjutande de-

len af högra bakre pannbenet, formerar den starka benkam, hvilken ligger ofvanom, eller rättare nedom det högra ögat. Att *infraorbital*-benet i betydlig mån fått bidra till att åstadkomma nämnda benmassa, har jag antagit därför, att jag funnit ett sådant framom (rättare under) det venstra ögat, men deremot ej kunnat upptäcka något motsvarande under det högra, om jag ej vill se det i nämnda benmassa, hvilket torde vara riktigt, fastän jag ej ännu lyckats fränskilja det från de öfriga benen. Att utgångshålen för luktnerverna äfven kommit att ligga dragna åt venster, torde man kunna sluta af det föregående: det högra ligger nemligen föga till höger om en linnea, som drages mellan *crista occipitalis* och mellankäksbenens apofyser; det venstra midt för benkammen mellan ögonen. Det egentliga och udda pannbenet torde vara det triangelformiga ben, som, jemte de bakifrån kommande, långa grenarna af bakre pannbenen, formerar benkammen mellan ögonen. *Maxilla superior et inferior, os palatinum, pterygoideum, transversum, jugale, tympanale, temporale, præoperculum, interoperculum, suboperculum* och *operculum*, likasom *supratemporale, suprascapulare* och *scapula* förete inga betydligare olikheter på de båda sidorna, hvarken hvad läge eller form beträffar.

Kasta vi nu en blick på våra figurer och jemföra dem med föregående beskrifning af ett kranium af en utbildad, dock på långt när icke fullvuxen fisk, så finna vi snart, att såväl denna art som andra pleuronectoider måste vara symmetriska under deras tidigare utvecklingsstadier. Vi finna, att naturen här likasom annorstädes endast betjenar sig af några lätta modificationer af flera eller endast några vissa kroppsdelar, för att uppnå det eftersträfvade resultatet. Men fastän, såsom vi sett, dessa modificationer hos en ung flundra äro i hög grad obetydliga, så hafva de dock varit tillräckliga nog, att man ända hittills ansett flundran som ett verkligt monstrum bland de vertebrerade djuren. Då Skaparen såg sig behöfva sådana egendomligt danade djur, för att upprätthålla jemnvigten mellan hafvets innevånare, likasom för att genom ett sådant medel

åstadkomma en ännu större mångfald och omvexling bland Sina produkter, behöfde Han ej framalstra någon ny, eller någon från de öfriga fiskarna väsendtligt afvikande djurform. Det var nog att Hans »varde», med hänseende på den flundre-artade fisken, häntydde på, att denna fisk skulle tillbringa sitt lif på den ena kroppssidan, och på höjden utveckla sig, för att derigenom slutligen plogjerns-lik kunna uppfylla sin bestämmelse. För att flundran måtte få denna lika egendomliga som underbara kroppskonstitution, behöfde detta »varde» endast vara nedlagdt i fröet till denna fisk; sedan blef det väl ljuset, som i väsendtligaste mån bidrog till fulländandet af den byggnad fisken slutligen erhöi. Då fisken i sitt sätt att röra sig, för att få ena sidan nedåtvänd, gaf sig en sned rigtning, drog sig det öga, som låg på den redan nu något nedåtvända sida, mot ljuset. Och i samma mån som fiskens lutning åt sidan blef allt större, i lika mån fortgick en sådan dragning, för att omsider blifva så fullständig, att ögonen helt och hållet komma att ligga på den mot ljuset vända sidan. Men för att en sådan förändring skulle kunna försiggå med de kroppsdelar, som blefvo utsatta för densamma, var det nödvändigt att den kom att inträffa under djurets späda ålder, innan någon mera utsträckt och betydligare förbening egt rum i de delar af kranium, som isynnerhet voro föremål för en sådan omgestaltning.

Hvad tydningen af ett och annat af de i hufvudet förekommande benen beträffar, torde måhända, isynnerhet som mina materialier ej varit så särdeles talrika, en och annan felaktighet förefinnas; men dessa förändra dock ingenting i sak och böra med lätthet kunna rättas af den, som vill fortsätta mina undersökningar.

Innan jag slutar denna lilla uppsats, anser jag mig böra nämna några ord om ett par andra flundre-arter, hvilka jag erhållit här i Bohusläns skärgård, och hvilka jag nu har framför mig, isynnerhet som äfven de i ej ringa mån bekräfta hvad som ofvan blifvit yttradt.



Den ena är ett 280 millim. långt exemplar af Skrubbskäddan (*Platessa flesus* auct. nov.), men venstervändt, således de äldre författarnes *Pleur. passer vel flesoides* PONT. För att visa hur obetydligt omfång forskarens blick kan öfverskåda, vill jag endast nämna, att den högervända (den normala) Skrubban af de äldre författarne icke allenast ansågs såsom egen art vara skild från den venstervända, utan just derföre, att de hade ögonen på olika sidor, fördelade man Skrubban på tvenne olika fisksläkten.

Den andra är ett 445 millim. långt exemplar af *Rhombus maximus*, hvars hufvud är fullkomligt lika gestaltadt som den figur utvisar, hvilken finnes i Yarrells History of British fishes, second edition, pag. 333, och hvilken figur föreställer hufvudet af en *Rhombus vulgaris*, med »a malformed head», som fångats i närheten af Devonport, 1835.

Båda dessa fiskar tyckas utvisa, att en flundre-artad fisk, då den genom någon tillfällighet eller missbildning får sina ögon ställda på ett från det typiska (sedan fisken är utbildad) afvikande sätt, kan blifva i stånd att simma på hvilkendera sidan som helst.

Den förstnämnda afviker ej i något annat från en vanlig Skrubba, hvad kroppsbyggnaden beträffar, än derutinnan, att ögonen m. m. kommit att ligga på den venstra sidan. Men hvad färgen vidkommer, är den i hög grad olika; ty då man undantager den på högra sidan hvita nosen, är färgen å hela denna sida nästan fullkomligt så mörk som på den venstra. Man skulle väl kunna invända, då jag nu vågar säga, att denna fisk äfven någon gång följt sin inre, ursprungliga bestämmelse att röra sig med högra sidan uppåt, att färgen på den högra sidan ej talar så mycket härför, alldenstund den högra sidan egentligen skulle varit mörk, och att det derför ej är så underligt, att den bibehållit denna färg; men det är min öfvertygelse, att just denna färg, jemte de i huden öfverallt kring-spridda benknölarna, hvilka ofvan äro nästan lika talrika på den högra som på den venstra sidan, är tillräckligt talande

bevis för, att fisken stundom äfven gått med högra sidan uppåtvänd. Vi sågo ju på den lilla afbildade *Rhombus*, att färgen var högst obetydligt olika på de båda kroppssidorna. I ett ännu tidigare stadium, eller då fisken åtminstone till det yttre företer en fullkomlig symmetri och således simmar med ryggen uppåt, måste alls ingen olikhet finnas i färgen, utan pigmentfläckarnas både antal, storlek och läge böra i ett sådant stadium vara i det närmaste lika på båda kroppssidorna. Orsaken hvarför de ej komma till någon utbildning på den nedåtvända sidan, är endast brist der på ljus. Eller, en flundreartad fisk blir så att säga färglös på den ena sidan, endast därför att denna vänder från ljuset. Är detta riktigt, hvilket jag ej finner anledning att betvifla, så kan man ock antaga, att, då den ifrågavarande fisken är mörk på båda sidor, den ock stundom simmat med den sidan nedåtvänd, på hvilken ögonen sitta; ja, kanske ock stundtals med ryggen uppåt, liksom då han var ung.

För att ytterligare bekräfta detta antagande, vilja vi nu kasta en blick på den andra fisken, eller den ofvan anförda *Rh. maximus*.

Genom någon tillfällighet har ryggfenan framtill, jemte dess interspinalben, under fiskens späda ålder, blifvit fränskiljd hufvudet, tills ett litet stycke bakom ögonen. Denna fränskilda del bildar nu derigenom en något fram öfver det högra ögat utskjutande vinkel. Sedan så skett, har fisken ganska väl kunnat se åt höger, och därför, jemte det att benbildningen till en del blifvit hämmad i den höger om högra ögat liggende benkammaren, har ögat kommit att sitta midt i pannan, med endast en obetydligt sned lutning åt venster. Näsborrarna sitta nästan fullkomligt lika högt på ömse sidor om den ännu mer, eller nästan fullkomligt symmetriska nosen. Fisken har väl i allmänhet simmat på den högra sidan, men också på den venstra och troligen ofta med ryggen uppåt vänd. Härför talar icke allenast fiskens färg, som på båda sidor och till alla delar är i det närmaste lika mörk, utan äfven de ben-

aktiga hudknölarna, hvilka både till antal och storlek äro mycket utbildade på den högra sidan, samt knappt märkbart afvikande från samma å den venstra. Hvad den högra sidans färgfördelning vidkommer, torde ett förhållande förtjena anföras, som der är särdeles tydligt markeradt, å den venstra deremot högst otydligt, nemligen att fyra svartbruna band sträcka sig tvärs öfver fiskens hela sida. Såväl bakom som framom dessa band är den mörka färgen ej så reguliert samlad, men det hela synes antyda, att äfven denna art af släktet *Rhombus* är försedd med ett antal (kanbända samma) tvärband under sin första period.

Att ryggfenan, såsom vår figur utvisar, ifrån att endast nå fram till ögats bakkant, slutligen med fiskens tillväxt går långt framom ögat, ja, ända till öfverkäksbenens baser, sker ej derigenom, att nya, ej förutvarande fenstrålar (jmför strålantalet i rygg- och anal-fenorna hos de båda omhandlade exemplaren af *Rh. vulgaris*!) och dithörande interspinalben uppkomma framom det redan tillstädesvarande. Det sker genom det enkla medlet, att interspinalbenen tillväxa på längden, samt falla sig nedåt och framåt, så att främsta strålen formerar mot sitt interspinalben vid pass en rät vinkel, i stället för att de till en början föllo i en rät linia. Det samma kan äfven sägas om analfenan.

Att kroppen från att vara helt låg, slutligen får en så betydlig höjd, är icke blott en följd af nyssnämnda bens och strålars snart nog tilltagande i längd; det härleder sig tvifvelsutan ock från ryggkotornas såväl bakre som främre benutskotts allt mer och mer tilltagande i längd, särdeles under fiskens första utvecklingsstadier.

Vi hafva nu i korthet genomgått de viktigaste momenterna af flundrans utveckling, och stanna, af ofvan anförda skäl, vid det lika intressanta som otvifvelaktiga resultatet, att flundran i allt väsentligt liknar en torskartad fisk, innan hon, för att vara mest passande för sin bestämmelse, af naturen nedlägges på sin ena kroppssida. Att munnens läge ej förän-

drades, utan blef det ursprungliga, härrörde nog deraf, att karna i denna ställning voro mera lämpliga att fatta uti sådana djur, som vistas på eller i hafvets bottensats, t. ex. musslor (*Tellinæ*, *Syndesmiæ* m. fl. dyl., dem jag funnit i de exemplär jag öppnat), maskar (magen hos *Platessa vulgaris* har jag ofta funnit alldeles fullproppad af *Arenicola piscatorum*) jemte många andra smärre hafsdjur.»

2. Anteckningar rörande de trigonometriska tabellerna. — Hr Lector LINDMAN meddelade genom Hr EDLUND följande.

»Det är allmänt bekant, att såväl de trigonometriska som andra tabellers uppgifter blott äro approximativt riktiga, hvilket äfven i allmänhet är händelsen med reglorna för deras användning. De ziffror, som genom tabellers bruk erhållas, äro i följe af båda dessa skäl behäftade med större eller mindre fel, på hvilkas möjliga belopp man måste hafva reda för att kunna veta, hvilken grad af noggrannhet som kan tillerkännas en verkställd räknings resultat. I sin *Theoria motus corporum coelestium* (§ 30) har GAUSS fästat uppmärksamheten på denna viktiga omständighet, och visat de grunder, på hvilka felens gränsvärden kunna beräknas *). Om afseende endast göres på det oundvikliga tabellfelet, hvilket må betecknas med ω , och med nu brukliga sätt att korrigera **) till det högsta kan vara en half enhet af sista decimalens ordning, samt

*) Professor N. G. af SCHULTÉN uppgifver några hithörande och för hans tabeller lämpade formler på sid. 164 i sina logaritmiska och trigonometriska tabeller, tryckta i Helsingfors 1838. Anmärkningsvärdt är, att ingen annan tabell, så vidt jag vet, innehåller det minsta om den grad af precision, som tabellens bruk medgifver.

**) Att, såsom nu brukas, i tabeller med t. ex. 7 decimaler utesluta den 8:de, då den understiger 5, men öka den 7:de med en enhet, då den 8:de är 5 eller deröfver, gör ofvannämnda fel oundvikligt. Om man deremot på något sätt, t. ex. genom en punkt bakom logaritmen, utmärkte, att de uteslutna decimalerna ligga emellan 0,25 och 0,75, samt, om de vore mindre än 0,25, helt

1:o en båge ϕ är gifven

α) exact,

så blir största möjliga felet hos $\log \sin \phi$, $\log \cos \phi$, $\log \operatorname{tg} \phi$,
 $\log \operatorname{Cot} \phi = \omega$;

β) proxime (bågens eget fel i delar af radien $= d\phi$),

så blir största möjliga felet hos $\log \sin \phi = m \operatorname{Cot} \phi d\phi + \omega$,

» » » » » $\log \cos \phi = -m \operatorname{tg} \phi d\phi - \omega$,

» » » » » $\log \operatorname{tg} \phi = \frac{2m}{\sin 2\phi} d\phi + \omega$,

» » » » » $\log \operatorname{Cot} \phi = -\frac{2m}{\sin 2\phi} d\phi - \omega$,

($m =$ de vanliga logarithmernas modul);

2:o logarithmen för en goniometrisk function är gifven

α) exact,

så blir största möjliga felet hos ϕ i sekunder $= \frac{\omega \operatorname{tg} \phi}{m \sin 1''}$ af $\log \sin \phi$,

» » » » » $= -\frac{\omega \operatorname{Cot} \phi}{m \sin 1''}$ af $\log \cos \phi$,

» » » » » $= \frac{\omega \sin 2\phi}{2m \sin 1''}$ af $\log \operatorname{tg} \phi$,

» » » » » $= -\frac{\omega \sin 2\phi}{2m \sin 1''}$ af $\log \operatorname{Cot} \phi$,

β) proxime,

så blir största möjliga felet respective såsom i α), om man blott i täljarne sätter $\omega + \omega'$ i stället för ω , då ω' är = logarithmens eget fel.

Af 2:do ses, att felet hos en båge, bestämd genom $\log \sin$, kan, då bågen är nära 90° , uppgå till ett ganska stort belopp. Äfvensom då en båge nära 0° bestämmes genom $\log \cos$, hvilket dessutom genom en blott flyktig blick i tabellerna ådagalägges

och hållet utelemnade dem, men ökade den 7:de med en enhet, om de vore större än 0,75 (den 7:de betraktad såsom enhet), så skulle tydligen felet minskas till hälften. Om särskilda tecken användes, vore det möjligt att ändå mera minska tabellfelet, i fall annars något praktikabelt beteckningssätt kunde utfinnas. En punkt tyckes likaväl kunna sättas bakom som emellan siffrorna, hvilket sednare är händelsen, der karakteristikan är utsatt, äfvensom mellan 5:te och 6:te decimalen i CALLETS trigonometriska tabeller.

I följe häråf blir man stundom tvungen att rentaf öfvergifva methoder och formler, som annars äro både noggranna och beqväma, och vara betänkt på andra utvägar att finna den sökta bågen. T. ex. om man i en rätvinklig sferisk triangel söker hypotenusan, då man känner vinklärne, så har man

$$\cos a = \cot B \cot C,$$

hvarest $\log \cos a$ kan vara nära = 10. Om man i det fallet subtraherar denna eqvation från 1 och adderar den till 1 samt dividerar resultaterna, så fås

$$\frac{1 - \cos a}{1 + \cos a} = \frac{1 - \cot B \cot C}{1 + \cot B \cot C}$$

eller, i följe af kända formler,

$$\operatorname{tg}^2 \frac{1}{2} a = - \frac{\cos(B+C)}{\cos(B-C)},$$

hvarigenom a kan med noggrannhet finnas. Flera dylika utvägar framställas på åtskilliga ställen *) och bestå i allmänhet uti att genom någon transformation anskaffa en annan goniometrisk function vanligen för halfva bågen, hvarjemte den erhållna formeln bör medgifva logarithmers omedelbara användning. Detta kan likväl icke alltid ske, utan man blir vid utförandet af den transformation, som fordras, på det logarithmer må kunna användas, nödsakad att införa en hjälpvinkel. Detta fall bör noga skiljas ifrån det förra, i hvilket noggrannheten blir så stor, som tabellens beskaffenhet i allmänhet medgifver. Detta är långtifrån att vara händelsen, då hjälpvinkel begagnas. Om man nemligen, då en gifven $\log \sin$ eller $\log \cos$ är nära 10, såsom FRANCOEUR **) och GRUNERT ***) föreslå, sätter den gifna functionen, låt vara $\cos \varphi = \operatorname{tg} x$, så kan x af denna eqvation bestämmas.

Derefter finner man lätt *

$$\frac{1 - \cos \varphi}{1 + \cos \varphi} = \frac{1 - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x},$$

*) T. ex. CAENOLI, Traité de Trigon. Paris 1786, pagg. 109, 250. Francoeur, Cours de Math. pures. Bruxelles 1838. Tom. II, pag. 252.

**) L. c. pag. 253.

***) Archiv der Math. und Physik. Tom. I, pag. 73.

som slutligen ger

$$\lg \frac{1}{2} \phi = \pm \sqrt{\lg(45^\circ - x)} \dots \dots \dots (1).$$

Låtom oss nu undersöka, hvilken grad af precision denna method medgifver och antagom till en början $\log \lg x (= \log \cos \phi)$ felfri. Största möjliga felet hos x i sekunder blir då $= \frac{\omega \sin 2x}{2m \sin 1''}$, hvilket äfven, fast med motsatt tecken, kommer in uti $45^\circ - x$ och hos $\log \lg(45^\circ - x)$ medför ett möjligt fel $= -\omega \lg 2x - \omega$. Som nu x , då ϕ är nära $= 0^\circ$, blott är obetydligt mindre än 45° , så är $\lg 2x$ ganska stor och felet kan således också bli högst betydligt. Det minskas visserligen till hälften genom logaritmens, af rotutdragningen föranledda, division med 2, men man måste åter multiplicera med 2, för att få ϕ , hvars största möjliga fel i sekunder blir $= -\frac{\omega \lg 2x + 3\omega}{2m \sin 1''} \sin \phi$. Då resultatet i allmänhet och oaktadt $\log \cos \phi$ antogs felfri, blir så ogynnsamt, så synes denna method icke vara tillfredsställande, ehuru den någon gång ger plausibla resultater. För det undantagsfall, att den gifna logaritmen är felfri, kan man lätt finna en formel, som ger bågen med full noggrannhet. Om man nemligen har

$$\log \cos \phi = 10 - a \quad (a = \text{ett helt litet bråk}),$$

så är

$$\cos \phi = r 10^{-a} \quad (r = \text{tabular-radien}).$$

Häraf fås sedan

$$\sin \phi = r \sqrt{1 - 10^{-2a}}, \quad \log \sin \phi = 10 + \frac{1}{2} \log(1 - 10^{-2a}).$$

I följe af en bekant formel är nu

$$10^{-2x} = 1 - \frac{k(2\alpha)}{1} + \frac{k^2(2\alpha)^2}{1.2} - \frac{k^3(2\alpha)^3}{1.2.3} + \text{etc.},$$

hvarrest $k = 140 = 2,3025851$ ($\log k = 0,3622157$). Således blir

$$\log \sin \phi = 10 + \frac{1}{2} \log(2k\alpha - 2k^2\alpha^2 + \frac{4}{3}k^3\alpha^3 - \frac{2}{3}k^4\alpha^4 + \text{etc.})$$

$$= 10 + \frac{1}{2} \log 2k\alpha + \frac{1}{2} \log(1 - k\alpha + \frac{2}{3}k^2\alpha^2 - \frac{1}{3}k^3\alpha^3 + \text{etc.}).$$

Emedan α är ett mycket litet bråk, så kan den sista logaritmen utvecklas i serie enligt formeln

$$\log(1-x) = -\frac{1}{k} \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \text{etc.} \right),$$

hvarest man gör $x = k\alpha - \frac{2}{3}k^2\alpha^2 + \frac{1}{3}k^3\alpha^3 - \text{etc.}$, och medtager så höga digniteter af α , som inverka på sista decimalen i tabellen. Medtages tredje digniteten, så fås

$$\log \sin \varphi = 10 + \frac{1}{2} \log 2k\alpha - \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{12}k\alpha^2 \dots (2),$$

hvilken formel, under förutsättning, att $\log \cos \varphi$ är felfri, ger φ fullkomligt exact och till och med noggrannare än den vanliga interpolationen, ännu då φ är $= 22^\circ$ och tabeller med 7 decimaler nyttjas.

Är deremot $\log \cos \varphi$ behäftad med något fel — och detta är i allmänhet fallet —, så ger äfven denna formel ett ganska felaktigt resultat. Om nemligen $d\alpha$ är felet hos α , så blir

$$\text{felet hos } \varphi \text{ i sekunder} = \frac{1-k\alpha}{2\alpha \sin 1''} \operatorname{tg} \varphi d\alpha,$$

hvarest likväl termen $k\alpha$ i täljaren utan märkbart fel kan utelemnas. I detta fall blir, då räkningen sker enligt förra methoden,

$$\text{största möjliga felet hos } \varphi \text{ i sekunder} = -\frac{(\omega+d\alpha)\operatorname{tg} 2\alpha+3\omega}{2m \sin 1''} \sin \varphi,$$

hvarest termen 3ω i täljaren utan fara kan försummas. Sålunda blir största felet hos φ

$$\text{genom (1)} = \frac{(\omega+d\alpha)\operatorname{tg} 2\alpha \sin \varphi}{2m \sin 1''}, \quad (\omega \text{ tages med samma tecken som } d\alpha)$$

$$\text{genom (2)} = \frac{\operatorname{tg} \varphi d\alpha}{2\alpha \sin 1''}.$$

För att kunna något så när bedöma dessa fels relativa storlek, bör man ihågkomma, att $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{\cos \varphi}{\sin^2 \varphi}$, samt med tillräcklig approximation $\alpha = \frac{m\varphi}{2}$. Då man insätter detta samt tillåter sig att göra $\sin \varphi = \varphi$, $\cos \varphi = 1$, så blir $\left(\frac{1}{k} = m\right)$

$$\text{det förra felets absoluta värde} = \frac{\omega+d\alpha}{m \sin \varphi \sin 1''}$$

$$\text{» sednare » » »} = \frac{d\alpha}{m \sin \varphi \sin 1''}.$$

Häraf följer, att formeln (2) alltid har företräde framför formeln (1), såsom alltid gifvande ett, åtminstone i någon mån, nog-

grannare resultat *). Ungefärligen samma noggrannhet vinnes genom att medelst *Zacch*s *Tafeln der Additions- und Subtractions-Logarithmen* skaffa sig $\log \sin \frac{1}{2}\phi$, hvilket utan tvifvel är den beqvämaste utvägen.

Emellertid inträffar oftast, att de resultat, som på något af nu uppgifna sätt erhållas, äro behäftade med så stora fel, att de blifva alldeles odugliga. Då man begagnar tabeller med 7 decimaler, uppgå felen visserligen stundom till blott några få sekunder, men äfven sådana äro, betraktade såsom *räknesfel*, alltför stora, hvarjemte de nu omnämnda methoderna icke lemna någon utväg att bedöma deras *verkliga* storlek, ehuru man genom förut anförda formler kan finna deras största möjliga värde. Då nu så är, och emedan någon ny metod för det fall, som nu är i fråga, svårligen tyckes kunna erhållas återstår ingenting annat än att anlita tabeller med flera decimaler, än man förut begagnat. Att felen annars kunna blifva ganska betydliga (naturligtvis i förhållande till den noggrannhet, som med den begagnade tabellen i allmänhet kan ernås), skall följande exempel ådagalägga. Antag att man i en plan triangel har två sidor och en motstående vinkel gifna, neml.

$$b = 567,63, \quad a = 200, \quad A = 20^\circ 37' 50''$$

samt söker vinkeln B , så är $\sin B = \frac{b \sin A}{a}$.

Man har, då tabeller med 10 decimaler begagnas,

$$\log b = 2,7540653404 \quad B = 89^\circ 50' 18'',45 \text{ eller dess supplement.}$$

$$\log \sin A = 9,5469829291$$

$$\begin{array}{r} 2,3010282695 \\ \hline \log a = 2,3010299957 \end{array} \quad \text{Största möjliga felet} = 0'',03.$$

$$\log \sin B = 9,999982738$$

Göres räkningen med 7 decimaler, så fås

$$\log \sin B = 9,999982.$$

Genom

*) Det kan visserligen anmärkas, att tabellfelet äfven nu inverkar, men tydligt är genom hitbörande formel i 2:do, att denna inverkar blir omärklig.

Genom formeln (1) fås $B = 89^{\circ} 50' 4,37''$ eller dess supplement,

» » (2) » = $89^{\circ} 50' 6,14''$ » » »

» ZECHS Tabeller » = $89^{\circ} 50' 6,13''$ » » »

De verkliga felen äro således resp. = $14,08''$; $12,31''$; $12,32''$, hvilket alltför mycket afviker från den precision, som bruket af tabeller med 7 decimaler bör medföra.»

3. Kort öfversigt af Sveriges *Delphax*-arter.

— Hr BOHEMAN anmälde en af Studenten Hr C. STÅL författad uppsats, af följande innehåll:

»Bland de släkten, som räknas till Fulgoridernas familj, torde knappt något vara mindre noga känt af de flesta författare än släktet *Delphax*. Jag önskade derföre, att detta lilla försök till de svenska, hvilket är nästan detsamma som alla kända, arternas utredning och beskrifning på ett ställe måtte vara till någon nytta. Förut vill jag i korthet genomgå, hvad i ämnet blifvit skrifvet, serdeles med afseende på de svenska arterna. LINNÉ kände ingen hithörande art; först FABRICIUS beskref några sådana och förde dem till *Fulgora*, innan han uppställde sitt genus *Delphax*. I Systema Rhyngothorum upptages häraf tio arter, hvaraf likväl fyra bortgå, såsom ej, efter nyare åsigt, hörande dit; af de återstående sex äro tre, hvilka FALLÉN med rätta förenar såsom en art under namnet *dispar*, men de öfriga tre äro goda arter, ehuru den ena, nemligen *minuta*, är något omtvistad. GERMAR för den till sin *lineola*, men jag biträder heldre ZETTERSTEDTS åsigt, enligt hvilken den hör till *guttula*, hvilket namn den får bära, till dess det blifvit utredt, hvilken art FABRICIUS menat. FALLÉN beskriver under *Delphax* fem arter såsom svenska, deribland en ny och en som numera räknas till ett annat släkte; ZETTERSTEDT tillägger en i Sverige förut ej funnen, likväl beskrifven, art. Men det är isynnerhet BOHEMAN, som riktat vår Fauna med hithörande arter. Uti olika afhandlingar be-

skrifver han ej mindre än tjuguåtta, af hvilka blott en antogs såsom förut känd. Af GERMAN hade likväl två deraf förut blifvit beskrifna, deribland BOHEMANs största och vackraste art. DAHLBOM tillade sedan en, och jag har i förra årgången af denna Öfversigt beskrifvit tre nya arter. Således borde vår Fauna med de fyra för Sverige nya, som i denna afhandling upptagas, räkna fyrtioen arter; men redan GERMAN hade för längesedan gjort den upptäckten, att en art, *D. limbata*, hade en kortvingad form, som han kallat *D. anceps* (= *pal-liata* BOHEM.), och vid de öfrigas närmare studerande finner man, att flera andra äfven hafva en sådan jemte den långvingade. Vid utarbetandet af denna afhandling har jag lyckats att hos sex arter upptäcka båda formerna, af hvilka hvar och en förut blifvit beskrifven såsom serskildt species, så att vid deras afräkning vår Fauna räknar det ändock ej obetydligt antalet af trettiofem arter.

DELPHAX (FABR.).

1. *Frons unicarinata*.

A. *Caput supra intra oculos visum latitudine longius.*

1. *D. lineola* (GERM.): fusca; thoracis carinis dilutioribus; hemelytris abdomine vix dupplo longioribus, nervis obscurioribus, linea suturali parva nigra ornatis; pedibus sordide flavotestaceis ♂♀. Long. corp. 3—3½, lat. 1½ millim.

D. lineola GERM. Magaz. 3, p. 209, 1. — Ejusd. Faun. Ins. Eur. 7. Tab. 19.

Circa Holmiam passim (Dom. BOHEMAN et ipse). Ostrogothia ad Gusum (Dom. P. F. WAHLBERG).

2. *D. truncatipennis* (BOHEM.): testacea; thoracis lateribus fuscis; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, dilute flavotestaceis, maculis 2 longitudinalibus fuscis ornatis (♂), vel immaculatis (♀); abdomine supra lateribus fuscescentes ♂♀. Long. 3, lat. 1½ millim.

D. truncatipennis BOHEM. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 266, 12. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 46, 15.

In Gottlandia et circa Holmiam passim frequens (Dom. BOHEMAN et ipse).

3. *D. smaragdula* (STÅL): dilute flavovirescens; thorace medio longitudinaliter pallide flavotestaceo; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, testaceo-hyalinis; antennis pedibusque dilute flavotestaceis, tarsis apice fuscis ♀. Long. 4½, lat. 1½ millim.

D. smaragdula STÅL. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1853, p. 174, 1.

Prope Holmiam raro (Dom. BOHEMAN).

4. *D. longifrons* (BOHEM.): pallide testacea; hemelytris abdomine dimidio longioribus, pallide flavotestaceis, hyalinis, vitta subsuturali fusca; pedibus dilute flavotestaceis, femoribus nigrofusco-bilineatis; tarsis apice fuscis ♂. Long. 4, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.
D. longifrons BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 42, 12.
 Exemplum unicum prope Holmiam legit Dom. P. F. WAHLBERG.
5. *D. guttula* (GERM.): præcedenti valde affinis, capite nonnihil minus producto, frontis carinis magis obsolete distincta; pallide testacea, macula genarum, thoracis lateribus vittaque hemelytrorum subsuturali nigrofusca; hemelytris abdomine fere dimidio longioribus ♂♀. Long. $2\frac{3}{4}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.
D. guttula GERM. Magaz. 3, p. 216, 7. — *D. minuta* FALL. K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 129 (anne eadem FABRICII, quæ vix ad *lincolam* pertinet, ut voluit GERMAR.). — ZETT. Faun. Lapp. p. 549, 3. — Ins. Lapp. p. 305, 3.
 Per totam Sueciam frequens.
6. *D. pallidula* (BOHEM.): dilute flavotestacea; hemelytris abdomine nonnihil longioribus, testaceohyalinis, nervo longitudinali medio præsertim apice reliquis obscuriore ♂♀. Long. 2, lat. $\frac{3}{4}$ millim.
D. pallidula BOHEM. Öfers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 265, 9. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 48, 16.
 In Gottlandia passim frequens (BOHEMAN et ipse).
7. *D. perspicillata* (BOHEM.): pallide flavescens; macula genarum aliaque parva thoracis laterali nigris; hemelytris abdominis longitudine, albidohyalinis ♂♀. Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.
D. perspicillata BOHEM. Öfers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1845, p. 164, 31. — K. Vet. Ak. Handl. 1845, p. 62, 32.
 In Gottlandia rarius (BOHEMAN et ipse). Kinnekulle (BELFÄRGE).
 Hæc species caput intra oculos subquadratum habet, quare ad divisionem sequentem rectius pertineret; sed propter magnam suam affinitatem cum præcedentibus hic locanda.
- B. *Caput supra intra oculos visum latitudine brevius vel longitudine æquale.*
 a. *Carina frontis a medio fore furcata.*
8. *D. basilinea* (GERM.): fuscescens; thorace medio longitudinaliter, antennis pedibusque pallidis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidis, macula subcuneata basali, fascia semicirculari pone medium maculaque parva suturali nigrofusca ♂. Long. $3\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.
D. basilinea GERM. Magaz. 4, p. 105, 9. — *D. speciosa* BOHEM. K. V. Ak. Handl. 1845, p. 59, 30.
 Prope Holmiam ad Tollarö exemplum unicum invenit Dom. BOHEMAN.
9. *D. striatella* (FALL.): pallide testacea; capitis carinis albidis, fusco-marginatis; hemelytris abdomine vix dupplo longioribus, vel tertia iere parte brevioribus, albidohyalinis, stria suturali parva fusca

ornatis: abdomine nigrovario (♂), vel subimmaculato (♀). ♂ Long. 3, lat. 1½ millim.

Form. macroptera hemelytris abdomine longioribus.

D. striata FALL. K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 129 (vix GERM.

— *D. striatella* FALL. Hem. Suec. 2, p. 75, 3.

Forma brachyptera hemelytris abdomine multo brevioribus.

D. hamata BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 45, 14.

In Gottlandia, Scania, Westrogothia, Uplandia et circa Holmiam passim frequens.

Exemplum unicum medium inter formas ambas, hemelytris abdominis longitudine prope Upsaliam ante plures annos legi.

b. *Carina frontis basi tantum. plus minusque distincte furcata.*

10. *D. notula* (GERM.): fronte labroque nigricantibus, albidocarinatis; vertice flavotestaceo; thorace fusco, flavotestaceo-tricarinato; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, albedo-hyalinis, nervis subtiliter fuscopunctatis, striola suturali fusca ornatis; abdomine fusco, pedibus dilute flavotestaceis, tarsis apice fuscis ♀. Long. 2½, lat. 1 millim.

D. notula GERM. (sec. exemplum a Dom. SIGNORET communicatum).

In Gottlandia rarissime (Dom. BOHEMAN).

11. *D. pallens* (n. sp.): flavo-testacea; fronte labroque albedo-tricarinatis; thorace longitudinaliter albedo-tricarinato; hemelytris abdominis vix dupplo longioribus, albidis, hyalinis; subtus nigricans (♂), vel flavotestacea (♀); pedibus flavo-albidis, unguiculis fuscis ♂♀. Long. 2½, lat. 1 millim.

In Gottlandia et Sudermannia (BOHEMAN). circa Holmiam (ipse) raro occurrit.

. Præcedenti subsimilis, sed dilutior, absque stria suturali hemelytrorum. Caput ante oculos nonnihil productum, apice subtruncatum; fronte et labro flavotestaceis, albedo-carinatis, carinis fuscis marginatis, carina illius media basi furcata; vertice flavotestaceo, utrimque impresso, medio albedo. Prothorax antice productus, truncatus, basi late emarginatus, flavotestaceus, albedo-tricarinatus, carinis lateralibus obliquis; mesothorax longitudinaliter tricarinatus, carina media albida, lateralibus obsoletis. Hemelytra abdominis vix dupplo longiora, albida, hyalina, nervis apicem versus obscurioribus, interdum parce fuscopunctatis. Corpus subtus nigricans (♂), vel dilute flavotestaceum (♀). Pedes pallide flavi, unguiculi nigri.

12. *D. lepida* (BOHEM.): nigrofusca; fronte verticeque dilutioribus, parce albidosparsis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, vel dimidio brevioribus, albidis, fuscopunctatis et maculatis; tibiis tarsisque albedoannulatis ♂♀. Long. 2—2½, lat. 1 millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidohyalinis, nervis remote fuscopunctatis, fasciis duabus, una obliqua ante, altera transversa pone medium, fuscis ♀.

D. lepida BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 39, 10.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine dimidio brevioribus, albidis, nervis fuscopunctatis, macula transversa intra apicem nigrofusca ♂♀.

D. tristis BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 60, 25.

Forma macroptera in Gottlandia et circa Holmiam rarius legit BOHEMAN; *forma brachyptera* in Gottlandia, Scania et prope Holmiam passim frequens (BOHEMAN et ipse).

13. *D. limbata* (FABR.): pallide flavotestacea; labro dilute fusco; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus vel vix dimidio brevioribus, albidis, fuscopunctatis et maculatis; abdomine nigrofusco (♂), vel dilute ferrugineo (♀); pedibus ferrugineis ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$ —3, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidis, punctis nervorum, fascia incurva semicirculari pone medium maculaque parva suturali fuscis ♀.

D. limbata FABR. Ent. Syst. IV, p. 6, 21. — Syst. Rhyng. p. 84, 5. — GERM. Magaz. III, p. 211, 2. — Faun. Ins. Eur. 15, pl. 14, fig. a et b. — *D. signifera* BOHEM. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1845, p. 164, 30.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, albidis, fuscopunctatis, basi ferrugineis, apice fuscis ♂♀.

D. anceps GERM. Magaz. 4, p. 105, 10. — Faun. Ins. Eur. 15, pl. 14, fig. c et d. — *D. palliata* BOHEM. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 266, 13. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 56, 22.

Forma macroptera in Sudermannia, Smolandia et Bahusia rarius (BOHEMAN). *Forma brachyptera* in Sudermannia et Ostrogothia (BOHEMAN et WAHLBERG), circa Holmiam et in Scania passim (ipse).

14. *D. hemiptera* (GERM.): nigricans (♂) vel pallide flavotestacea (♀); fronte labroque nigricantibus, dilutius carinatis; prothorace basi transversim albedo; hemelytris abdominis longitudine vel eo nonnihil longioribus, sordide hyalinis, nervis elevatis, granulatis; pedibus flavo-albidis, in mare obscurioribus, tarsis apice fuscis ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

D. hemiptera GERM. Magaz. 3, p. 217, 8. — ZETTERST. Faun. Lapp. 1, 549, 4. — Ins. Lapp. 306, 4.

Circa Holmiam (ipse), in Smolandia (BOHEMAN), Lapponia (ZETTERSTEDT).

15. *D. pellucida* (FABR.): nigricans; frontis carinis pedibusque sordide flavotestaceis; prothoracis limbo postico plus minus distincte sordide albedo; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, pallide testaceo-hyalinis, nervis obscurioribus, obsolete fusco-punctatis et granulatis ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

D. pellucida FABR. Syst. Rhyng. 84, 6. — FALL. K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 129, 5. — Hem. Suec. 2, 76, 4. — ZETT. Faun. Lapp. 1, 548, 2. — Ins. Lapp. 305, 2. — GERM. Magaz. 3, p. 212, 3.

Per totam Sueciam passim.



16. *D. dispar* (FALL.): nigricans vel pallide flavotestacea; hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidis vel dilute testaceis, nervis parum obscurioribus, costali ultra medium albido ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$ —3, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.
 FALL. K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 126, 3. — Hem. Suec. 2, p. 74, 2. — ZETT. Ins. Lapp. 305, 1. — Faun. Lapp. 1, 548, 1.
 var. *a.* nigricans, limbo postico prothoracis anguste albido; hemelytris hyalinis, albidis.
D. marginata FABR. Syst. Rhyng. p. 84, 9.
 var. *b.* sordide flavescens, pallida.
D. flavescens FABR. Syst. Rhyng. p. 84, 7.
 Per totam Sueciam frequens.
 Species hæc et duæ præcedentes vix distinctæ.
17. *D. sordidula* (STÅL): dilute flavotestacea; fronte albidocarinata; vertice thoraceque medio longitudinaliter albidis; hemelytris abdomine vix dupplo longioribus vel plus dimidio brevioribus, albido-hyalinis; abdomine nigrovario (♂), vel unicolore (♀) ♂♀. Long. 3— $3\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.
Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo fere longioribus nervis flavescens, apicem versus obscurioribus ♂♀.
Forma brachyptera: hemelytris abdomine tertia fere parte brevioribus, hyalinis, nervis flavescens ♂♀.
D. sordidula STÅL. Öfers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1853, p. 174, 2.
 Circa Holmiam et ad Upsaliam (BOHEMAN et ipse).
18. *D. collina* (BOHEM.): pallide testacea; fronte albido-carinata, carinis fusco-marginatis; hemelytris abdomine dimidio fere brevioribus, margine ad suturam evidenter, postice obsoletius albido; abdomine nigrofusco, sordide fulvovario (♂), vel pallido, lateribus interdum fuscovario (♀). ♂♀. Long. 2— $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.
D. collina BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 51, 18.
 Circa Holmiam et in Uplandia (BOHEMAN et ipse).
19. *D. hyalinipennis* (n. sp.): pallide testacea; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, hyalinis, costa ultra medium albida, dein fusca; pedibus dilute flavotestaceis, tarsis apice fuscis ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.
 Circa Holmiam rara (BOHEMAN et ipse). In Ostrogothia (P. F. WAHLBERG). Kinnekulle (BELFRAGE).
 Caput flavotestaceum, intra oculos subtruncatum, vix productum; fronte labroque tricarinalis, carina illius basi subfurcata. Prothorax brevis, antice parum productus, tricarinatus, carinis lateralibus obliquis; mesothorax late triangularis, longitudinaliter tricarinatus, carinis subparallelis. Hemelytra abdomine dupplo longiora, albida, hyalina, nervis dilute flavotestaceis, costa ultra medium albida, dein fusca. Abdomen pallide testaceum, supra utrimque fuscovittatum. Pedes dilute flavotestacei, tarsis apice fuscis.
20. *D. brevipennis* (BOHEM.): pallide testacea; hemelytris abdomine præsertim apud feminam brevioribus, dilute flavotestaceo-hyalinis, elevato-nervosis; abdomine supra utrimque fuscovittato ♂♀. Long. 2 $\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

D. brevipennis BOHEM. Öfers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 266, 10. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 49, 17.

Circa, Holmiam frequens.

Variat sordide griseoflavescens, obscurior.

Præcedenti valde affinis et forte ejus forma brachyptera.

21. *D. elegantula* (BOHEM.): nigricans (♂), vel sordide flavotestacea (♀); frontis carinis albidis, fuscomarginatis; prothorace albido (♂) vel concolore (♀); hemelytris abdomine dimidio fere brevioribus, sordide albido-hyalinis; abdomine nigro, vitta dorsali maculisque apicalibus fulvescentibus (♂) vel fusciscentibus-testaceo (♀); pedibus flavotestaceis, tarsis apice fuscis ♂♀. Long. 2½, lat. 1 millim.

D. elegantula BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 63, 27. (♂).

In Blekingia et Smolandia (BOHEM.). Circa Holmiam et in Gottlandia (ipse).

22. *D. obscurella* (BOHEM.): nigrofusca vel fuscotestacea; fronte nigricante, testaceo-carinata; hemelytris abdominis longitudine (♂) vel hoc brevioribus (♀), nervis validis, granulatis; pedibus fuscotestaceis ♂♀. Long. 2, lat. 1 millim.

D. obscurella BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 53, 20.

Circa Holmiam et in Gottlandia non raro (BOHEMAN et ipse).

23. *D. discolor* (BOHEM.): nigricans; fronte pallide testaceocarinata; margine postico pro- et mesothoracis sordide albido; hemelytris abdomine parum (♂) vel dimidio fere (♀) brevioribus, fuscotestaceo-hyalinis, costa sordide albida; pedibus fuscotestaceis ♂♀. Long. 2, lat. 1 millim.

D. discolor BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, 61, 26.

In Gottlandia et circa Holmiam parce (BOHEMAN et ipse).

24. *D. forcipata* (BOHEM.): nigricans; capite pedibusque fuscotestaceis; hemelytris abdomine dimidio brevioribus, basi latius, margine reliquo angustius testaceis, valide nervosis ♂♀. Long. 2, lat. 1 millim.

D. forcipata BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 57, 23.

In monte Kinnekulle (BOHEMAN). In Gottlandia et circa Holmiam passim rarius (BOHEMAN et ipse).

25. *D. exigua* (BOHEM.): pallide testacea; thorace dilutius carinato; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, pallide testaceohyalinis; abdomine nigro (♂), vel sordide testaceo, lateribus fuscomaculato (♀); pedibus sordide flavotestaceis, tarsis apice fuscis ♂♀. Long. 1½, lat. ¾ millim.

D. exigua BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 65, 29.

In Gottlandia (BOHEMAN et ipse). Kinnekulle (BOHEMAN).

Femina hujus feminæ *D. elegantulæ* valde similis, sed carinis frontis magis obsoletis, non albidis mox differt.

26. *D. denticauda* (BOHEM.): pallide flavotestacea; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, pallide flavotestaceis; abdomine nigro, anteriori margineque apicali testaceo; tarsis apice fuscis ♂. Long. 2, lat. 1 millim.

D. denticauda BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 64, 28.
Circa Holmiam valde rara (BOHEMAN).

27. *D. lugubrina* (BOHEM.): pallide testacea; hemelytris abdomine tertie fere parte brevioribus, nigrofuscia, basi latius testaceomarginatis (♂) vel abdomine dimidio fere brevioribus, testaceis, unicoloribus (♀); ano et abdomine subtus in mare nigris vel nigrovarius ♂♀. Long. ♂ 2½, ♀ 3, lat. 1½ millim.

D. lugubrina BOHEM. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förbandl. 1847, p. 266, 11. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 55, 21.

In Smolandia et Blekingia (BOHEMAN). Circa Holmiam rarius (ipse).

28. *D. pullula* (BOHEM.): testacea, subtus nigrovaria; hemelytris abdomine multo brevioribus, nigrofuscia, basi apiceque anguste testaceomarginatis; genitalibus nigris ♂. Long. 1½, lat. ¾ millim.

D. pullula BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 116.

In Smolandia rarissime (BOHEMAN).

29. *D. mesomela* (BOHEM.): capite hemelytrisque exceptis atra (♂), vel tota pallide flava (♀); hemelytris abdomine brevioribus albidis, segmento penultimo abdominis in mare apice albomarginato; geniculis maris sordide flavotestaceis ♂♀. Long. 2—2½, lat. 1 millim.

D. mesomela BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1849, p. 257.

In Gottlandia et circa Holmiam rara (BOHEMAN et ipse). Kinnekulle (BELFRAGE).

30. *D. bivittata* (BOHEM.): dilute flavotestacea; supra utrumque vitta in fronte cum opposita conjuncta nigrofusca; hemelytris abdomine dimidio brevioribus, cum sutura non contiguis, vitta fusca ornatis ♂♀. Long. 2, lat. ¾ millim.

D. bivittata BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1849, p. 259.

In Gottlandia et circa Holmiam parce (BOHEMAN et ipse).

II. Frons bicarinata.

31. *D. albosignata* (DABLB.): nigricans; vertice toto, prothorace mesothoraceque medio flavoalbidis; hemelytris abdomine dupplo longioribus vel vix dimidio brevioribus; abdomine segmentis basalibus supra flavomarginatis; geniculis metatarsisque posticis sordide albidis ♂♀. Long. 2½, lat. 1 millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus, sordide albidohyalinis, nervis fuscis ♂♀.

D. fuscimervis BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 113.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine dimidio brevioribus, fuscobyalinis, apice obscurioribus ♂♀.

D. albosignata DABLB. K. Vet. Ak. Handl. 1850, p. 199.

In Blekingia (BOHEMAN), Gottlandia (DABLBOM).

Frons in hac specie non unicarinata, ut dicit BOHEMAN, sed distincte bicarinata.

32. *D. moesta* (BOHEM.): nigrofusca (♂) vel fuscotestacea (♀); prothorace et mesothorace fuscotestaceis, margine postico sordide albidis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, sordide albidohyalinis, vel

eo dimidio brevioribus, nigrofuscis, apice albidomarginatis; pedibus fuscotestaceis ♂♀. Long. 2—2½, lat. 1 millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus.

D. collaris Stål. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1853, p. 175, 3.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine dimidio brevioribus.

D. moesta BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 59, 24.

In Gottlandia et circa Holmiam passim (BOHEMAN et ipse).

33. *D. nasalis* (BOHEM.): pallide flavotestacea; fronte apice maculis 2 mesothoraceae utrimque macula nigris; hemelytris abdomine non-nihil longioribus vel vix dimidio brevioribus, albidohyalinis; abdomine maris nigricante, foeminae supra vitta utrimque obscuriore ♂♀. Long. 3, lat. 1½ millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine longioribus.

D. nasalis BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 41, 11.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus.

D. mutabilis BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 43, 13.

In Gottlandia, Scania et circa Holmiam sat frequens, forma macroptera tamen valde rarior (BOHEMAN et ipse).

Frons in hac specie non tricarinata, h. e. medio unicarinata, ut dicit BOHEMAN, sed obsolete bicarinata.

34. *D. Pteridis* (BOHEM.): nigra, nitida; antennis, prothorace pedibusque flavis; hemelytris nigris (♂) vel griseis, basi interdum dilutioribus (♀); tarsis apice nigrofuscis ♂♀. Long. 2—3, lat. 1—1½ millim.

D. Pteridis BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 115.

In Blekingia et Smolandia (BOHEMAN).

35. *D. raniceps* (BOHEM.): dilute flavotestacea; oculis nigrofuscia; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, cum sutura non contiguus, valde distantibus. Long. 2, lat. ¾ millim.

D. raniceps BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 52, 19.

In Gottlandia (BOHEMAN et ipse).

4. Om hannen af *Scytodes thoracicus*. — Hr

BOHEMAN föredrog nedanstående af Studenten Hr T. THORELL inlemnade uppsats:

»Bland intressantare Arachnider, som under en sommaren förlidet år företagen utländsk resa af mig blifvit funna, befinner sig ett han-exemplar af *Scytodes thoracicus* LATR., en spindel, som förekommer temligen allmänt i länderna kring Medelhafvet. Denna art är den typiska för det märkvärdiga, öfverallt afvikande släktet *Scytodes*, hvars plats i systemet också är ganska vacklande, så att, ehuru det rättast synes böra hän-

föras till familjen *Theridides* SUND. och ställas mellan släkten *Ero* och *Pholcus*, det likväl af WALCKENAEER kunnat sättas nära *Segestria* och *Dysdera*, med hvilka det emellertid har få andra karakterer gemensamma än ögonens antal (sex). Äfven KOCH (Uebersicht des Arachnidensystems, Heft. 5, s. 77) ställer det bland *Dysderides*, näst efter *Ariadna* och sist i hela serien af Araneider. — Emellertid har ingen af de författare (LATR., SAV., WALCK., GUÉRIN, KOCH, LUCAS), som lemnat beskrifningar eller afbildningar af *Scyt. thoracicus*, känt hanen till denna art. Till och med det försök, som LUCAS anställde, att genom utkläckning af en äggsäck förskaffa sig exemplar af det okända könet, misslyckades: alla ungarne voro honor (se WALCK. Hist. Nat. des Ins. Apt. IV, p. 384). — Såsom ett bidrag till kannedomen om denna för systematiken vigtiga art torde kanske derföre härnadan meddelade beskrifning öfver den, så vidt jag vet, hittills okända hanen ej anses öfverflödig, serdeles som den visar märkliga egenheter i kopulations-organets byggnad.

Scytodes thoracicus testaceus, nigro-maculatus, pedibus testaceis, nigro-annulatis.

Sc. thoracicus LATR., WALCK. cet.

» *tigrinus* KOCH. Die Arachniden V, p. 87. Tab. 167, fig. 398.

Descr. ♂ ad. — Longitudo 4 millim. — *Cephalothorax* magnus (2½ millim.), crassus, valde fornicatus, præsertim postice: latus, obovatus, lateribus æqualiter rotundatus, prope palporum insertiones autem abrupte angustatus; *pars cephalica* igitur parva, lateribus rectis, angulis anterioribus subtuberculiformibus, nec ullis impressionibus a thorace distincta. In dorso cephalo-thoracis adsunt pili nigri, brevissimi, crassi, truncati, vel postius *granuli*, in series dispositi. *Sternum* magni planum, ovale, sparse fusco-pilosum. *Oculi* sex, prominuli, aream sat parvam occupantes, in tria paria dispositi: primum par prope medium marginem anticum partis cephalicæ situm est, reliqua duo suo quidque latere paullo pone hoc; quo fit, ut sex oculi triangulum fere æquilaterum forment, basi tamen lateribus paullo longiore, binisque oculis in singulis angulis. *Mandibulæ* prominentes, debiles, angustæ, subcylindricæ, in dorso parum convexæ; *ungue* vix ullo. *Maxillæ* elongatæ, apicem versus paullo angustatæ, in *labrum* subtriangulare valde inclinatæ et convergentes. *Palpi* thoracis fere longitudine, vix attenuati; *pars femoralis* crassitudine femoris anterioris, et hac crassitudine triple longior; *pars patellaris* parva, brevis, sub-pyramidalis; *pars tibialis* crassitudine duplo longior, cylindrica; *pars tarsalis* basi globosa, in processum satis longum, acuminatum, fusco-pilosum producta: huic parti subtilus affixus est bulbus globosus vel sub-pyriformis, processu

alis longo, versus apicem paullo dilatato ibique abrupte angustato et in setam longissimam (1 mill. longiorem) exeunte. *Pedes* longi, graciles, proportione 1, 4, 2, 3 (primi paris long. 12 millim., tertii 7 mill.), granulis parvis, nigris, numerosis, in series collocatis, pilis autem vel aculeis nullis, tarsis exceptis, qui subtilus nigro-pilosi sunt. *Unguiculi* duo, pectinati. — *Abdomen* thorace minus, globosum, *mammillis* brevissimis, vix prominulis.

Cephalo-thorax testaceus, summo margine et linea media tenui abrupta nigro-fusca; præterea maculis compluribus sub-curvis vel sinuatis, et plus minusve oblique dispositis, fuscis. *Sternum* læte testaceum, macula media angusta aliisque ad pedum insertiones sub-lunatis, confluentibus et lineam marginalem, undulatam formantibus, fuscis. *Oculi* glauci, in maculis nigris partis cephalicæ positi. *Mandibulæ* testaceæ, macula dorsali nigra et summis apicibus leviter infuscatis. *Palpi* testacei, seta fusca. *Pedes* colore reliqui corporis, sed paullo dilutius, coxæ præsertim et femorum partes inferiores: trochanterum angulis, trinis binisve femorum annulis, singulo patellarum, trinis tibiarum et binis obsoletissimis metatarsorum, unguiculisque nigro-fuscis. *Abdomen* testaceum, nigro-maculatum; in meo autem exemplo (in spiritu vini asservato) color ita mutatus est, ut macularum dispositionem describere non possim. Nisi autem memoria me fallit, cum figura a Kochio data exacte congruit pictura abdominis.

Mense Julii 1853 in muro domus errantem hunc marem Florentiæ cepi.»

5. *Iakttagelser och anmärkningar öfver de nordiska Humlorna.* — Hr WAHLBERG meddelade följande uppsats:

»Oaktadt *Humlorna*, hvilka företrädesvis synas tillhöra de kallare zonerna, liksom *Xylocoperna* de varma, genom storlek, färgteckning, arbetsamhet och konstdrift från lång tid tillbaka ådragit sig Entomologernes uppmärksamhet och till stor del redan af äldre författare blifvit beskrifna till lefnadssätt och arter, återstår dock ännu mycket att vid dem utreda, ej blott efter REAUMURS, LINNÉs, MÜLLERS, KIRBYS, FABRICII, ILLIGERS, PANZERS, HUBERS med fleres förtjenstfulla arbeten, utan äfven efter den granskning och bearbetning de i sednare tider undergått genom LE PELETIER DE ST FARGEAU samt FREDR. SMITH (i katalogen öfver British Museum 1854), och de nordiska arterna isynnerhet genom ZETTERSTEDTS *), DAHLBOMS **), DREWSENS och

*) *Insecta lapponica* (Hymenoptera 1832), Lipsiæ 1840.

**) *Bombi Scandinaviæ monographice tractati et iconibus illustrati*, Londini Gothorum 1832.

SCHÖDTER *) samt W. NYLANDERS **) bemödanden, genom hvilka desamma erhållit ej ringa tillväxt och mången vigtig rättelse eller upplysning. Då jag så väl i Sveriges öfriga delar, som under resor i Lappmarkerna och Vest-Finnmarken, kommit tillfälle att ofta i naturen iakttaga äfven de annorstädes sällsyntare arterna, har jag, som ett ytterligare bidrag till utredande af detta ämne och med hufvudsaklig hänsyn till de nyssnämnde nordiske författarnes skrifter, ansett mig här korthet böra meddela den erfarenhet jag tror mig hafva vunnit, eller finner mig kunna bekräfta.

Det är väl bekant, att KIRBY, som i sin »*Monographia Apum Angliæ*» först beskref ett större antal af Humlorna, och kunnat undvika att framställa flera species endast tillfölje af färgskillnaden, utan tillräcklig jemförelse af de serskilda könen i talrika exemplar och under deras sammanlefnad i boet. Detta har äfven i sednare skrifter stundom inträffat. Genes sorgfälliga undersökningar i naturen hafva dock numera ej blott bland dylika former blifvit till sina verkliga arter återförda och erfarenhet vunnit om den betydliga färgförändring, som ofta till och med inom samma kön, eger rum. Mera återstår likväl ännu, äfven i denna riktning, att utröna. Vid närmare granskning af dessa förändringar tyckes det, som de flesta, kanhända alla arter, så väl af de egentliga Humlorna (*Bombus*), som af Parasit-Humlorna (*Psithyrus*), oberäknadt andra afvikelser och den urblekning som småningom hos hvarje individ inträder skulle förete en *ljusare* och en *mörkare* hufvudform, med eller utan mellanformer, hvilken omständighet, hittills förbisedd, torde förklara vissa tvifvelaktiga species, och isynnerhet dem, hvarja blott ett kön blifvit funnet. De arter, hos hvilka jag med till-

*) *Bomborum Psithyrorumque enumeratio critica*, Havniæ 1838.

**) *Adnotationes in expositionem monographicam Apum borealium* (Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar Helsingfors 1848), samt

Supplementum adnotationum in expositionem Apum borealium, och Revisio synoptica Apum borealium, comparatis speciebus Europæ mediæ (de båda sednare i nämnda Förhandlingar för år 1852).

förlitlighet iakttagit ett sådant förhållande äro: *Bombus lapponicus* FABR., *nivalis* ZETT., DAHLB., *Pratorum* ILLIG., *terrestris* FABR., *Hortorum* ILLIG., *Hypnorum* FABR. och *Muscorum* FABR., samt *Psithyrus campestris* LEPEL. DE S: T FARG. och *suaveolens* n. sp.; *B. soroënsis* FABR. företer detsamma enligt DREWSSENS och SCHIÖDTES framställning. Om flera andra har jag anledning till en dylik förmodan, fastän jag saknat tillfälle att genom undersökning af boen vinna bestämd upplysning. Så torde t. ex.

Bombus subterraneus FABR. (*Apis* LIN) vara den mörkaste formen af *B. Hortorum* ILLIG., hvartill öfvergångar icke saknas (*A. Acervorum* LIN., eller *B. subterraneus* var. b. DAHLB.), och hvilket det långsträckta hufvudet hos båda äfven synes antyda.

B. Latreillellus ILLIG. (*A. Latreillella* KIRBY, *A. Tunstallana* ♂ KIRBY enligt NYLANDER), hvaraf endast hanen med visshet synes vara känd, är möjligen den mörka *B. fragrans* ILLIG. (*Apis* PALLAS, KIRBY), en förmodan, som den för båda gemensamma rosenlukten tyckes understödja.

Vidare är ej osannolikt, att *B. Agrorum* FABR. (*Apis* KIRBY, *Bomb. arcticus* ZETT., DAHLB.), utmärkt genom helt svart basis abdominis, kan vara en mörkare form och *B. Beckwithellus* (*Apis* KIRBY, *A. Sowerbyana* KIRBY, *B. Agrorum* DAHLB., NYLAND.), igenkänlig genom sin vid basen blekhåriga abdomen med en svafvelgul hårtofs på hvardera sidan, kan utgöra den ljusare formen af samma art, med *B. Curtisellus* DAHLB. som mellanform, åtminstone är deras skillnad analog med den, som förefinnes mellan den mörka och den ljusa *B. Hypnorum* FABR. Enligt NYLANDER hör *B. Mniorum* FABR. äfven hit, och är då den mörkaste varieteten.

Skulle slutligen, såsom DREWSEN och SCHIÖDTE, samt NYLANDER, antaga, *Psithyrus vestalis* (*Apis* KIRBY, *B. æstivalis* DAHLB.) och *Ps. Saltuum* (*Apis* PANZ., *Bomb.* DAHLB., *A. Barbutella* KIRBY) utgöra varieteter af en art, är *Ps. vestalis* den mörkare och *Ps. Saltuum* den ljusare formen med blekgula hår på hufvudet och scutellen samt bredare hvit abdominal-

spets. Deras förekommande i olika Hummelarters bon, enligt SMITHS uppgift, väcker dock någon tvekan om arternas förnande.

Vid de till färgförändringen närmare utredda *Bombi* och *Psithyri* torde följande böra anmärkas:

Bombus lapponicus FABR. Den ljusa formen är den i auctorerne under ifrågavarande namn beskrifna, den mörka åten är DAHLBOMS *B. alpinus* a., och har vanligen med denna art blifvit förvexlad. Den skiljes likväl lätt derifrån genom mindre storlek, kortare och tätare hårlighet, som på abdomen är fulvescent nästan intill basen, samt genom stark lukt af rosenolja. Stundom är den svagt gulaktig framtill på thorax och hane. Äfven på hufvudet, men honan och neutern äro merendels helt svarta utom den röda abdomen. Den förekommer nästan lika allmän, som den ljusa, och är den vanligaste svarta Humlan på fjellen. — *B. alpinus* FABR. (*Apis* LIN.), som endast blifvit funnen mörk, är mycket större, luktar ej rosenartadt och beklädes af en lång, blek, fulvescent-gulaktig hårlighet, som på abdomen uppstiger till andra segmentets spets, men på dess bas och hela första segmentet ersättes af svarta hår. Hanen har samma korta, rundade statur, som hos *B. lapponicus*.

B. nivalis ZETT., DAHLB. Den ljusa formen är äfven här den vanliga (stora honan), samt innefattar dessutom *B. balteatus* DAHLB. (mindre honan) och *B. tricolor* ZETT., DAHLB. (neutern). Den mörka, hvaraf honan redan längesedan af BOHRENS anträffades i boet tillsammans med den ljusa, och hvaraf jag likaledes flera gånger funnit både ♂♀ och ♀, är helt svart utom de två eller tre sista abdominalsegmenterna, som äro fulvescenta, likväl något ljusare än hos *lapponicus*, samt hanens hufvud och framkanten af thorax med några gula hår. Står till hårlighetens längd och täthet, äfvensom till abdominalspetsens röda färg, mellan *lapponicus* och *alpinus*, samt luktar ej af rosor. Hanen skiljes lätt från de närmaste arterna genom sin långsträckt kroppsförm och långa antenner, hvarigenom den påminner om *B. consobrinus* DAHLB., hvilken den likväl i öfrigt

föga liknar. Från *B. lapponicus* och *alpinus* igenkännes den bäst genom sin endast i spetsen gulröda abdomen.

B. Pratorum ILLIG. (*Apis* LIN.). Den mörka är den vanliga och *B. Ehippium* ZETT., DAHLB. dess stora hona. Den ljusa formens hane är *A. Burellana* KIRBY och *B. tullianus* NYLANDER (enligt hans egen uppgift), honan *B. subinterruptus* ILLIG., DAHLB. Dylik neuter finnes äfven.

B. Soroënsis FABR., DREWS. et SCHIÖDTE, som i norden hufvudsakligen tyckes tillhöra Danmark och södra Sverige, eller bokregionen, är till sina både ljusa och mörka varieteter af DREWSEN och SCHIÖDTE noga utredd. Den mörka är den af FABRICIUS beskrifna, och *B. neuter* FABR. den mörka neutern. *A. Cullumana* KIRBY, som enligt SMITH tillhör denna art, är dess ljusaste hane. *A. Donovanella* KIRBY, äfven enligt SMITH, varietet af honans ljusare form.

B. terrestris FABR. (*Apis* LIN.). Den mörkare är den allmänna, hvaraf ännu svartare honor förekomma, hvilka antingen blott hafva svagt gult bälte på framkanten af thorax samt några gula hår vid basen af abdomen, som stundom är helt svart med undantag af spetsen, eller ock ega svart thorax och gult basalbälte på abdomen (*B. Cryptarum* FABR.). Den ljusa är *B. sporadicus* NYLAND., samt hanen *B. Lucorum* FABR. (*Apis* LIN., KIRBY) och *A. Cæspitum* PANZ. Hit hör äfven *B. virginalis* ILLIG. (*Apis* KIRBY), som en mellanform. *B. Lucorum* SMITH ♀ är den vanliga *B. terrestris* och hans *terrestris* ♂ den sydeuropeiska formen med ljusgul abdominalspets *).

Obs. *B. Jonellus* ILLIG. (*Apis* KIRBY) är enligt SMITH ♂, enligt NYLANDER ♀ af *B. Scrimshirani* ILLIG. (*Apis* KIRBY.)

B. Hortorum ILLIG. (*Apis* LIN.) af mig tagen i parning. Den ljusa är den vanliga och *B. autumnalis* ZETT., DAHLB. nöjligen en urblekt neuter. *B. autumnalis* FABR. är, enligt

*) FREDR. SMITHS, från den allmänt antagna, afvikande bestämning af *B. terrestris* (hufvudformen) och *B. subterraneus* m. fl. grundar sig troligen på exemplaren i LINNÉ'S samling, som, när de strida mot hans diagnoser eller förhållandet i Sverige, der han beskref sina arter, väl ej böra tillerkännas för stort afseende.

NYLANDER på grund af FABRICHI samling, *B. Hortorum* ♂. De mörka *Hortorum* har endast några gröngula hår på framkanten af thorax, eller blott på humeri och på scutellen, samt hanen äfven på hufvudet. Abdominalspetsen är hvit.

B. Hypnorum FABR. (*Apis* LIN.) och *A. Ericetorum* PASTOR är den ljusa med basis abdominis rufescent. Den mörkare *B. apricus* FABR. eller *A. meridiana* PANZ.) har abdomen vid basen, hos både ♂♀ och ♂, helt svart.

B. Muscorum FABR. (*Apis* LIN., KIRBY), till kroppsform något aflångare än *B. Agrorum* och *Beckwithellus*, är de ljusa med jemnare färgad hårlighet, så ock *B. senilis* SMITH. Den urblekta neutern är *B. senilis* FABR. samt *B. pygmaea* FABR. enligt NYLANDER med stöd af FABRICHI samling. Den mörkare formen, med högre rufescens, samt smala, mer eller mindre tydliga, svartbruna fascier på abdomen, är *B. Muscorum* SMITH och troligen äfven KIRBYS *A. floralis* ♂♀, *A. Forsterella* ♂ och *A. Francillonella* ♂ samt *B. arcticus* NYLANDER, hvilket sistnämnde är en annan art än ZETTERSTEDTS och DAHLBOMS, och skiljaktighet sannolikt föranledd genom färgläggningen af figuren i DAHLBOMS arbete, der hela abdomen, åtminstone i somliga exemplar, blifvit mörkt rufescent i stället för till främre delen svart, såsom beskrifningen riktigt utvisar.

Det kan tyckas, som äfven *B. Rajellus* ILLIG. (*Apis* KIRBY), hvartill *B. Derhamellus* ILLIG. (*Apis* KIRBY) hörer, skilja förete en mörkare form (*Rajellus*) och en ljusare (*Derhamellus*), men hittills äro endast mörka honor samt ljusare hanar och neutrer anmärkta; det enda fall der hona och neuter öfverensstämma i färg, utan den sednare liknar hanen.

Psithyrus. *Parasit-Humlorna* framställdes först som ett släkte af LEPELETIER DE S. T. FARGEAU, ehuru KIRBY redan antydd dem som en serskild grupp. De utgöra, oaktadt sin likhet i färg med flera verkliga *Bombi*, ett ganska naturligt genus. Dessa insekters lefnadssätt i egentliga Humlors bon, deras samfund af neutrer, liksom af corbikler och af den vid basen af bakmetatarserna sittande lilla horisontala taggen för vaxels aflossande,

lossande, alla obehöfliga för dem som icke arbeta, deras långsträckta kroppsform, korta och rundade hufvud med käkar utan tänder, den starkt inkrökt, nästan hårlösa, glänsande abdominalspetsen, de öfverallt hårbeklädda på utsidan convexa benen, deras låga och långsamma flygt med sitt egna grofva ljud och deras tröga rörelser, utmärka dem allt bestämdt från de lifliga och i sitt arbete outtröttliga *Bombi*. Äfven hos *Psithyrus* ega, som redan nämnt är, ofvan anförda färgförhållanden rum. Så företer

Ps. campestris LEP. DE S:T FARG. (*Apis* PANZ., KIRBY, *Bombus* FABR.) en ljusare och en mörkare form, den förra den vanliga och *A. Leeana* KIRBY (♂), samt *B. Rossiellus* ILLIG. (*Apis* KIRBY) den ljusaste hanen, den senare *Ps. Francisanus* DREWS. et SCHIÖDTE (*Apis* KIRBY).

Ps. suaveolens N. Sp. förveklad med andra arter, vanligen med den mycket olika *Ps. campestris*, eger likaledes en mörkare form, den allmänna, eller *Bomb. campestris* DAHLB. fig. 23 ♀, och en ljusare hane, *Ps. campestris* var. γ DREWS. et SCHIÖDTE, möjligen äfven *Ps. quadricolor* subvar. 2 LEPEL. DE S:T FARG. NYLANDER hänför likväl S:T FARGEAU's art till *Ps. Barbutellus*, d. v. s. *Saluum*.

Af *Ps. rupestris* LEP. DE S:T FARG. (*Apis* FABR., KIRBY) har jag ej träffat någon ljusare form, men LEPELETIER DE S:T FARGEAU anför en sådan från södra Frankrike, af hvilken honnan har thoracis framkant, scutellen baktill, samt andra och tredje abdominalsegmenterna på sidorna gulhåriga (*Ps. Vasco*). Att den vanliga hanen är DAHLBOMS *B. Rajellus* ♂ hafva redan DREWSEN och SCHIÖDTE anmärkt. *Apis albinella* KIRBY är äfven dennes hane enligt SMITH, likasom *Ps. Frutetorum* LEP. DE S:T FARG. enligt NYLANDER.

Detta allt med afseende på Humlornas färgförändringar. I öfrigt bör ej förbises det biträde man för åtskiljande af annars närstående species kan erhålla af hufvudets form och af den rosenlika lukt, som några arter under lefvande tillståndet

vid beröring sprida. I allmänhet är hufvudet kort med rundaktig omkrets, men, särdeles honorna och neutrerna af *B. Hortorum*, *Tunstallanus* (enligt KIRBYS beskrifning), *subterraneus* och *consobrinus* hafva det nedåt betydligt förlängdt, äfven hos *B. fragrans* med flera visar det någon utdragning. Alla *Psithyrernas* hufvud är deremot väl rundadt. — Hvad rosenlukten beträffar, så är den redan i det föregående omnämnd. Det märkes, så vidt jag kunnat iakttaga, hos *Bombus lapponicus fragrans*, *Latreillellus*, samt hos *Psithyrus svaveolens*. Andra arter sprida väl en svagare, snart öfvergående lukt, med af mer eller mindre vidrig beskaffenhet.

Bland de af DAHLBOM anförda arterna är jag oviss om *B. autumnalis* FABR. Enligt NYLANDER är exemplaret i FABRICII samling hane af *Hortorum*, eller FABRICII *B. ruderatus*. DAHLBOMS kan väl vara en urblekt neuter af samma art. KIRBY åter hänför *B. autumnalis* FABR. som var. β till *Apis Barbutella* (*B. Saltuum* DAHLB.), till hvilken DAHLBOMS *B. autumnalis*, för sin litenhet och sin plats bland de egentliga Humlorna, ej lärt kunna höra. — Bland DREWSENS och SCHIÖDTES species känner jag ej *B. Tunstallanus* (*Apis* KIRBY), ej heller *B. equestris* FABR. *B. Tunstallanus* skall, enligt desse författare, äfvensom efter KIRBY, mycket likna *B. Hortorum*, äfven till hufvudets skapnad, men skilja sig genom hälften betydligare storlek, aflångare form och brungulare färg hos honan och neutern, svart basis abdominis samt kortare och tätare hårlighet. SMITH förenar den med *Latreillellus*. Äfven NYLANDER anför derom, att hane, enligt KIRBYS samling, är *B. Latreillellus* och att denna hane skulle vara typexemplaret, hvilket strider mot KIRBYS beskrifning, der endast honan omtalas. Om honan bör skiljas från *Hortorum*, kan jag ej afgöra; möjligen tillhöra de som hane och hona ansedda exemplaren olika arter. — *B. equestris*, som förekommer i Danmark, påminner mycket om *B. fragrans* både genom beskrifningen och figuren hos DREWSEN och SCHIÖDTE; SMITH förenar dem också, likasom DAHLBOM förut gjort.

Enligt denna granskning utgöra de nordiska humlorna följande arter, för hvilka jag ansett mig böra tillägga bifogade synonymi. De med frågetecken utmärkta torde som species vara tvifvelaktiga.

BOMBUS.

LEPELETIER DE S:t FARGEAU, DREWSSEN et SCHÖDTE, NYLANDER, FREDR. SMITH. — *Bombus* p. p. FABR., LATR., ZETT., DAHLB. — *Bremus* p. p. JURINE, PANZ. — *Apis* LIN., KIRBY.

lapidarius FABR. — *Apis lapidaria* LIN. — *Bombus Arbustorum* FABR. (♂). — *Bremus Truncorum* PANZ. (♂).

Rajellus ILLIG., DAHLB. (♀). *Apis Rajella* KIRBY (♀). — *A. ruderaria* MUELL. — *Bomb. Derhamellus* ILLIG., DAHLB. (♂♀). — *A. Derhamella* KIRBY (♂).

alpinus FABR. — *Apis alpina* LIN.

lapponicus FABR. — *Bomb. alpinus a.* DAHLB. (den mörka).

nivalis ZETT., DAHLB. (stor ♀). — *Bomb. balteatus* DAHLB. (mindre ♀). — *Bomb. tricolor* ZETT., DAHLB. (♂).

Pratorum ILLIG. — *Apis Pratorum* LIN. — *Bomb. Burellanus* ILLIG. (*A. Burellana* KIRBY) och *Bomb. lullianus* NYLAND. (ljus ♂). — *Bomb. Ehippium* ZETT., DAHLB. (stor ♀). — *Bomb. subinterruptus* ILLIG., DAHLB. (*A. subinterrupta* KIRBY) (ljus ♀).

soroënsis FABR., DREWS. et SCHÖDTE. — *Bomb. subterraneus* SMITH. — *Apis Cultumana* KIRBY (ljus ♂) och *A. Donovanaella* KIRBY (var. ♀), båda enligt SMITHS skriftliga anteckning i katalogen öfver British Museum. — *Bomb. neuter* FABR. (mörk ♀).

terrestris FABR. — *Apis terrestris* LIN. — *Bomb. virginialis* ILLIG. (*A. virginialis* KIRBY) och *Bomb. sporadicus* NYLAND. (båda den ljusa). — *Bomb. Lucorum* FABR. (*A. Lucorum* LIN.) och *Apis Cæspitum* PANZ. (båda den ljusa ♂). — *Bomb. Cryptarum* FABR. (mörk ♀).

Scrimshirani ILLIG. — *Apis Scrimshirana* KIRBY. — *Bomb. Jonellus* ILLIG. (*A. Jonella* KIRBY) (♂ enl. SMITH, ♀ enl. NYLAND.)

Hortorum ILLIG. — *Apis Hortorum* LIN. — *Apis paludosa* MUELL. — *Bomb. ruderatus* FABR. — *Bomb. autumnalis* FABR.? (♂), ZETT.? och DAHLB.? (urblekt ♀).

? *Tunstallanus* DREWS. et SCHÖDTE. — *Apis Tunstallana* KIRBY.

? *subterraneus* FABR., DAHLB. — *Apis subterranea* LIN. — *Apis Harri-sella* KIRBY. — Var. b. DAHLB. = *A. Acervorum* LIN.

Sylverum ILLIG. — *Apis Sylvarum* LIN. — *Bomb. veteranus* FABR. enl. DREWS. et SCHÖDTE.

? *Latreillellus* ILLIG. — *Apis Latreillella* KIRBY. — *Apis Tunstallana* KIRBY ♂ enl. NYLAND., ♀ enl. SMITH.

fragrans ILLIG. — *Apis fragrans* PALLAS, KIRBY. — *Bomb. Pratorum* FABR.

? *equestris* FABR. i Danmark.

consobrinus DAHLB.

Hypnorum FABR. — *Apis Hypnorum* LIN. — *Apis Ericetorum* PANZ. (ljus var.). — *Bomb. aprieus* FABR. (*A. meridiana* PANZ.) (den mörka).

Cingulatus WAHLB. N. Sp.

hyperboreus SCHÖNH.

? Mniorum FABR.

Agrorum FABR. — *Apis Agrorum* KIRBY. — *Bremus Agrorum* PANZ. — *Bomb. arcticus* ZETT., DAHLB.

? Beckwithellus. — *Apis Beckwithella* KIRBY (♂♀). — *A. Sowerbyana* KIRBY (♂). — *A. Curtisella* KIRBY (♂ enl. SMITH, ♀ enl. NYLAND.). — *Bomb. Agrorum* DAHLB., NYLAND. — *Bomb. Curtisellus* DAHLB. ♂.

MUSCORUM FABR. (den ljusa), SMITH (den mörkare). — *Apis Muscorum* LIN., KIRBY (den ljusa). — *Bomb. senilis* FABR. (urblekt neuter. SMITH (den ljusa). — *Bomb. pygmaeus* FABR. (liten ♀). — *Apis florum* KIRBY? (mörkare ♂♀). — *Apis Francillonella* KIRBY? och *Apis Festerella* KIRBY? (mörkare neuter). — *Bomb. arcticus* NYLAND. (mörkare ♀♀).

PSITHYRUS.

LEPEL. DE SÏT FARG., DREWS. et SCHJÖDTE, NYLAND. — *Apathus* NEVL. SMITH. — *Bombus p. p.* FABR., DAHLB. — *Bremus p. p.* JURINE, PANZ. — *Apis* LIN., KIRBY.

rupestris LEP. DE SÏT FARG. — *Apis rupestris* FABR., KIRBY. — *Bomb. rupestris* FABR., DAHLB. ♀. — *Apathus rupestris* SMITH. — *Bomb. Rajellus* ♂ DAHLB. — *Apis albinella* KIRBY enl. SMITH (♂). — *Apis Frutetorum* PANZ. (♂). — *Psith. Frutetorum* LEP. DE SÏT FARG. (♂) enl. NYLANDER.

campestris LEP. DE SÏT FARG. — *Apis campestris* PANZ., KIRBY. — *Bomb. campestris* FABR., DAHLB. (beskrifningen). — *Apathus campestris* SMITH. — *Apis Leana* KIRBY (♂). — *Bomb. Rossiellus* ILLIG., DAHLB. (*A. Rossiella* KIRBY) (ljusare ♂). — *Psith. Francisanus* DREWS. et SCHJÖDTE (*A. Francisana* KIRBY, *Bomb. Francisanus* ILLIG.) (det mörka formen).

svaveolens WAHLB. N. Sp. — *Bomb. campestris* DAHLB. fig. 23, (ej beskrifningen) (den mörkare). — *Psith. campestris* var. *γ* DREWS. et SCHJÖDTE (ljus ♂). — *Psith. quadricolor* subvar. 2 LEP. DE SÏT FARG. (ljus ♂).

vestalis. — *Apis vestalis* KIRBY. — *Bomb. vestalis* ILLIG. — *Bremus aestivalis* PANZ. — *Bomb. aestivalis* DAHLB. — *Bomb. Nemorum* FABR. enl. SMITH. — *Apathus Nemorum* SMITH.

? Saltuum. — *Apis Saltuum* PANZ. — *Bomb. Saltuum* ILLIG., DAHLB. — *Apis Barbutella* KIRBY. — *Apathus Barbutellus* SMITH. — *Psith. quadricolor* LEP. DE SÏT FARG. var. enl. NYLANDER (♂).

Då bland dessa här upptagna *Bombus*- och *Psithyrus*-arter, tvenne hittills obeskrifna anföras, en af hvardera släktet, nemligen *Bombus cingulatus* och *Psithyrus svaveolens*, torde desamma i korthet böra karakteriseras.

Bombus cingulatus: oblongus breviter hirsutus ater, capite rotundato, thorace supra rufo, in medio fascia transversa interalaris lata nigra, abdominis apice albo, alis totis infuscatis. ♀ long. 6 lin.
B. cingulatus WAHLB. Förhandl. vid de Skand. Naturforskarnes sjette möte i Stockholm 1851.

Hab. in floribus, salicium, præsertim in confiniis fluvii Kalix-elf. Ad Yttermorajerv, Paroeciæ Neder-Kalix d. 15 Junii et in insulis ejusdem fluminis ad Öfver-Kalix, Bottniæ borealis d. 17 Juni 1847, ipse, in Lapponia meridionali Dom. ZETTERSTEDT.

Denna art, hvaraf jag endast känner bonan, hvilken jag på våren kort efter dess uppvaknande ur vintersömnens fångat, står i färgteckning mellan *B. hyperboreus* och *Hypnorum*, men liknar mest den senare, från hvilken den skiljes genom mindre storlek, smalare statur, samt ett bredt svart tvärbälte öfver thorax mellan vingarne, som helt och hållet äro infuscerade. Hufvudet är kort och rundadt, som hos sistnämnde art, en tydlig skillnad från den, enligt KIRBYs beskrifning till färgen snarlika, men vida större, *B. Tunstallanus*. Scutellen är rufescent och basis abdominis helt svart, eller med några få rufescenta hår. Hos oss ej sedd nedåt landet, ej heller i fjellen, synes den hufvudsakligen tillhöra nejderna vid Bottniska viken, särdeles kring Kalix elf. Bland utländska arter liknar den *Bombus collinus* SMITH, af hvilken endast hanen är funnen i England, skild genom kortare kroppsform, bakre hälften af thorax samt hela scutellen svart-håriga och basen af abdomen bredt rödbrunt-hårig.

Psithyrus svaveolens: oblongus hirsutus ater, thorace antice sordide flavo, segmentis abdominis 3—6 (♂), vel 3—5 (♀) fulvescentibus, alis apice infuscat. ♂♀ long. 5—6 lin.

Psith. svaveolens WAHLB. Förhandl. vid de Skand. Naturforskarnes sjette möte i Stockb. 1851.

Bomb. campestris DAHLB. Bomb. Scand. figura 23, ej beskrifn., som tillhör *Ps. campestris* AUCTOR.

Psith. campestris var. *γ*. DREWS. et SCHIÖDTE (ljus ♂).

Psith. quadricolor subvar. 2. LEP. DE SËT FARG.? (ljus ♂).

Hab. in floribus Carduorum ad Gusum, Ostrogothiæ, in Westrogothia, Smolandia et circa Holmiam, haud raro, præsertim versus autumnum. In Justedalen et in alpe Dovre Norvegiæ, BOHEMAN. In copula captus.

Den är till färgteckningen snarlik *Bombus Pratorum* och synes vanligen hafva blifvit förväxlad med *Psith. campestris*, ehuru den otvifvelaktigt mer närmar sig till *Ps. vestalis*, hvars statur den eger. Är något kortare än de öfriga arterna, luktar starkt af rosenolja och är helt svart utom på framkanten af thorax samt de 3—4 sista abdominal-segmenterna. Från *Ps. vestalis* skiljes den lättast genom färgen på abdominaländans hårighet, från *Ps. campestris* genom något bredare och på ryggen mindre convex form, ej så långt inkrökt analspets, hvilken är hårigare och fulvescent liksom de närmaste segmenterna, eller hos den ljusare formen, hvaraf jag endast träffat hanen och äfven denne sällsynt, i sjelfva spetsen fulvescent med en hvit fascia deröfver. Hos den vanliga formen af *Ps. campestris* sitter den gröngula analhårigheten nästan som två tofsar en på vardera sidan om den bara och blanka spetsen.

Det är ett redan känt förhållande, att djurarter, som lefva tillsammans, eller under liknande omständigheter, ej sällan

ega en viss öfverensstämmelse i färg, om de ock tillhöra helt olika klasser. Detta synes äfven vara händelsen inom humlornas båda släkten. Enligt FREDR. SMITH träffas nemligen *Psith. rupestris* i boen hos *Bombus lapidarius*, *Ps. vestalis* hos *B. terrestris* och *Ps. Saltuum* hos *B. Pratorum*. De två förstnämnda likna i färgteckning nästan fullkomligt de *Bombus*-arter hos hvilka de lefva, och den sistnämnde afviker blott genom färgen på abdominaländans hårlighet. Ville man, med afseende på *Psithyrernes* förekommande hos i färgen snarlika *Bombi*, våga en gissning med hänsyn till de öfriga arterna, skulle *Ps. svaveolens* vara att söka hos *B. Pratorum* och *Ps. campestris* hos *B. fragrans*. Denna likhet i utseende, som humlorna och deras parasiter förete, eger i öfrigt ej blott rum med *Psithyrerna*, utan äfven med dipterslägtet *Volucella*, hvars arter likaledes utvecklas i hummelbon, och af hvilka *V. bombylans* till färgen påminner om *Bomb. lapidarius*, *V. plumata* om *B. Hortorum* och *V. hæmorrhoidalis* om *B. Pratorum*. LEPELETIER DE S: T FARGEAU tyckes ej utan skäl antaga, att parasiterne erhållit denna sin dräkt för att obehindradt vinna inträde i Humlornas samhällen och kunna passera som medlemmar deraf.

Icke få af våra Humlor tillhöra mer eller mindre uteslutande de nordliga landskapen och isynnerhet Lappland, och dessa tyckas hafva temligen bestämda gränser för sin utbredning mot eller på fjellen. När man söder ifrån besöker dessa trakter, blifva först *Bombus Agrorum* FABR. (*B. arcticus* DAHLB.) och *B. Scrimshiranus* allmänna, hvilka förut blott sparsamt anträffas, t. ex. i norra Vermlands bergsbygd. Derefter mötes *B. cingulatus* i trakterna kring Bottniska viken, isynnerhet vid Kalix-elf. De följande arterna tillhöra alla hufvudsakligen egentliga fjellbygder, särdeles Lappland, der *B. lapponicus* finnes så väl i dalarne nedom fjellen, som på fjellsidorna och på de närmast ofvan skogsgränsen liggande fälten. *B. consobrinus* lefver mest i bäckdalar på fjellslutningarne inom björkregionen; *B. nivalis* vid denna regions öfra gräns och på de till-

stötande platåerna; *B. alpinus* *) på högt ofvan trädgränsen befintliga fjellslätter, samt *B. hyperboreus* i snögränsens grannskap, dock endast bland stora fjellmassor. *B. lapponicus* är i Lappland den allmännaste och vidsträcktast utbredda arten, och har således ganska lämpligt erhållit sitt namn.

Anmärkningsvärdt är äfven att Humlornas arter ej blott i hårlighet, utan ock i storlek, tilltaga ju högre upp mot nordn, eller på fjellen, de lefva. Så äro *B. Agrorum* och *Scrimshiranus* ej särdeles stora eller långhåriga, ej heller *lapponicus*, som redan träffas i fjelldalärne. *B. consobrinus* är deremot större än det nedra landets största arter (*B. terrestris* och *Hortorum*), men föga långhårigare. *B. nivalis* är ännu större, åtminstone bredare, och har en temlig lång hårlighet, men öfverträffas i dessa hänseenden af *alpinus*, och *hyperboreus* är ändligen den vida största och starkast hårbeklädda arten.

Som ett bevis på de egentliga Humlornas arbetsamhet kan slutligen anföras, att de ej blott visa sig i rörelse på blommorna vid regnig och kylig väderlek, då andra insekter hålla sig i stillhet, utan äfven i den högre nordn, såsom i Finnmarken och Lappland, under de ljusa sommarnätterna, då likväl de öfriga insekterna hvila, oafbrutet fortfara i sitt arbeten.

6. Bidrag till kännedomen om de nordiska Diptera. — Hr WAHLBERG meddelade derefter följande beskrifningar öfver för nordn nya Diptera.

1. *Beris Morrisii*: nitida pallide pubescens, capite cum antennis nigro, thorace scutelloque viridi- vel cyaneo-æneis, abdomine fusco-cupreo, pedibus flavo-testaceis, coxis basi articulisque tarsorum, 1 summo apice, 2—5 totis, infuscatis, metatarsis posticis cetero tarso longioribus, alis subhyalinis basi cum nervis pallidis, stigmatibus fusco, halteribus totis flavo-testaceis. ♂♀. Long. 3½—3¾ lin.

Mas: oculis contiguus, tibiis posticis apice infuscatis, metatarsis posticis fusco-testaceis mediocriter incrassatis oblongo-linearibus.

Femina: oculis interstitio angusto distinctis, metatarsis posticis simplicibus.

*) Neutern tagen af BONEMAN ej långt nedom snögränsen på Gross Glockner i Kärnthen, arten förut endast funnen i Lappland.



B. Morrisii DALE Ent. 175, 75 (1842). — WALKER Ins. Brit. Dipt. 1. p. 12. ♂♀.

B. pallipes LOEW Ent. Zeit. 7 Jahrg. p. 284 (1846) ♀.

Hab. in Westrogothia, BOHEMAN (♂).

B. fuscipedi proxima at major, pedum alarumque colore et interstitio interoculari feminae angusto facile distincta. Epistoma maris triangulum parvum, nitidissimum parum pilosum format, quam in *B. fuscipede* et *6-dentata* multo minus. Oculi fere ad basin antennarum conniventes. Metatarsus posticus plus minus infuscatus. *Feminae* interstitium, secundum Loew, quintae capitis parti latitudine aequale. Oculi *utriusque sexus* breviter et parce pilosi. Antennae capitis longitudine. Genitalia fusco-testacea et femora denique cum tibiis flavo-testacea. Scutelli radii, in nostris speciminibus masculis, sex, certo situ viridi-aenei.

2. *Beris geniculata*: nitida pallide pubescens, capite antennisque nigris, articulo tertio basi intus et subtus subgibbo rufo, thorace scutelloque viridi- vel cyaneo-aeneis, radiis concoloribus, abdomine fusco-cupreo, pedibus nigro-fuscis, femoribus tibiisque basi latius apice anguste flavo-albidis, metatarsis posticis cetero tarso paullo longioribus, alis stigmatibus fusco. ♂♀. Long. 3—3½ lin.

Mas: oculis contiguis, alis infuscatis, secundum WALKER. Tarsi postici sino dubio incrassati.

Femina: oculis interstitio latiori distinctis, metatarsis posticis simplicibus, alis subinfuscatis basi cum nervis pallidioribus, halteribus flavo-albidis, clava puncto parvo atro.

B. geniculata HALIDAY. CURTIS Brit. Ent. 337 (1830). WALKER Ins. Brit. Dipt. 1. p. 12. ♂♀.

Hab. ad Quickjock, Lapponiae Lulensis d. 22 Julii 1843. Femina tantum unicum inveni. Mas mihi ignotus.

B. fuscipedi quoque proxima, magnitudine inter illam et *B. Morrisii* media. A Domino Loew, licet dubitanter, ad *B. fuscipede* refertur, differt vero antennis paullo longioribus, articulo tertio basi oblique subincrassato, rufescente, pedibus saturatius fuscis geniculis late flavo-albidis, interstitio feminae interoculari paullo angustiori, vix tertiam capitis partem latitudine aequante, et denique halterum clava puncto atro in mare quoque verosimiliter praesente, quamvis de illo et de crassitudine metatarsi postici omnino silet WALKER, alas tantum saturate infuscatas describens, quod color alarum in femina comprobare videtur. De cetero haec species antennis habet capitis longitudine, oculos, feminae saltem, brevius et tenuiter hirtos, scutellum sexradiatum et anum pallide testaceum.

3. *Pachygaster pallipennis* MACQU. ZETT. *Mas* feminae in omnibus similis, oculis tantum conniventibus et genitalibus exceptis. Antennae quoque fulvae. In Oelandia, BOHEMAN.
4. *Pachygaster orbitalis* N. Sp.: niger subnitidus, orbitis infra antennis late argenteis, antennis rufis superne et apice cum seta fuscis, femorum apice tibiis tarsisque flavo-albidis, alis totis vitreis,

nervis et macula stigmatica pallidis, halteribus albis. ♀. Long. 1—1½ lin.

Hab. in ligno Populi cæso ad Gusum Ostrogothiæ. Femina plures per annos a solstitio æstivali ad medium mensis Augusti haud raro observata, ex. gr. d. 1 Julii ad 10 Aug. 1840; mas ignotus.

A *P. atro* et *tarsali* antennarum colore, alis totis vitreis, halteribus albis etc., a *pallipenni* antennarum, pedum halterumque colore, a *minutissimo* nervo subcostali ut in *atro* directo et diviso, et ab omnibus orbitis argenteis, facile differt.

5. *Sargus rufipes* N. Sp.: aureo-viridis, oculis non lineatis, antennis nigris, abdomine cupreo in femina postice violaceo, halteribus pedibusque rufo-testaceis, alis in utroque sexu totis æqualiter fere infuscatis, stigmate parum obscuriore. ♂♀ long. 3½—4 lin.

Hab. in foliis fruticum ad Quickjock, Lapponiæ Lulensis d. 13 Julii 1843.

Simillimus *S. flavipedi* at paullo major, pedibus in utroque sexu totis rufo-testaceis et alis æqualiter fere infuscatis, maris tamen saturatioribus, nec pedibus maris femoribus tibiarumque apice nigris, feminae flavo-testaceis et alis feminae basin versus subhyalinis.

6. *Dasypogon flavimanus*: ater nitidus, mystace intus nigro extus albedo, thorace obsolete cinereo-maculato, abdomine maculis utrinque 4 lateralibus albidis, tarsis obscure ferrugineis anticis maris flavo-testaceis valde attenuatis, alis extus parum infuscatis. ♂♀. Long. 5 lin.

D. flavimanus MEIG. Dipt. 2. p. 271. ♂. LOEW Eur. Raubfl., in Linn. Entomol. B. 2. p. 521. ♂.

Hab. ad prædium Eriksberg, Par. Uskela in Provincia Aboensi, Finlandiæ, J. E. BONDORFF.

Mas a MEIGEN et exactius adhuc a LOEW descriptus, femina hic usque ignota, illa enim quam adoptavit MEIGEN, ad aliam speciem sine dubio pertinet. Vera, a Dom. BONDORFF capta, in omnibus mari similis præter genitalia, interstitium interoculare paullo latius et tarsos quoque anticos obscure rufos, haud attenuatos.

7. *Anthrax capucina*: fusca antice flavo-, postice nigro-hirta, scutello, lateribus abdominis, ano pedibusque rufescentibus, abdomine maculis 4 punctiformibus niveis in segmentis 3 et 4 semicirculariter dispositis, alis basi fasciisque 2 irregulariter incisis nigro-fuscis ad costam colore dilutius fusco conjunctis marginemque interioriorem attingentibus, fascia subbasali sordide hyalina, sinu medio magno marginis interioris, minore utrinque adjecto et apice latius vitreis. ♀. Long. 4 lin.

A. capucina FABR. Ent. Syst. IV. 229. 12 et Syst. Antl. 123. 23. — MEIG. Dipt. 2. p. 173.

A. caloptera PALLAS sec. MEIG.

Hab. in Finlandia, W. NYLANDER.

Inter nostrates magnitudine et colore *A. fenestrata* proxima, sed differt alarum pictura et maculis abdominis niveis, quarum 2 exteriores in segmento tertio, 2 mediae in quarto positae. *A. fenestrata* in singulo horum segmentorum fascia interrupta ejusdem coloris ornatur.

8. *Thereva ursina* N. Sp.: nigricans opaca supra dense nigro-, subtus griseo-hirsuta, segmentis abdominis apice anguste et fere aequaliter flavo-albidis, tibiis obscure rufescentibus, alis saturate infuscatis (♂), vel cinerascens opaca brevius et remotius hirsuta supra grisea pilis nigris intermixtis subtus albida, vertice flavo-griseo callis 2 parvis nigris nitidis parum elevatis in lineam transversam dispositis, thorace cinereo-albido-bivittato, segmentis abdominis basi anguste subnitidis nigris, apice fascia albida opaca ad latera latiori antice medio retusa, 2 ultimis totis nigris nitidis, tibiis rufis, alis hyalinis fusco-nervosis (♀). ♂♀ long. 4 lin.

Hab. ad Åkersström prope Trollhättan Westrogothiae, BOHEMAN (♂), ad Quickjock Lapponiae Lulensis 1843, BOHEMAN (♀) et ad fluvium Tornensem inter cataractas Kattilakoski et Korpikoski d. 25 Jun. 1847, ipse (♂♀).

Th. plebeja et *lugubri* affinis, non nihil tamen major. Mas corpore alisque obscurior, hirsutior, vertice, antennarum basi et epistomate ad oculos nigro-hirsutis, barba grisescente, pilis nigris intermixtis, lineis thoracis vix observandis. Femina callis verticis parvis in lineam transversam positis, nec callo magno obcordato. Tarsi antici in utroque sexu nigri, vix summa basi rufescentes.

Obs. *Th. vetula* ZETT. Holmiae 1854 capta.

9. *Psilcephala eximia* ZETT. (*Thereva eximia* MEIG.). Mas nondum descriptus in foliis Coryli ad Ekenäs in insula Wermdö mox ante solstitium aestivale inventus. A femina differt oculis approximatis, interstitio tamen angusto distinctis, barba paullo longiori alba nec nigra, abdomine minus attenuato, fasciis argenteis, vix interruptis, in segmentis 2, 3, 5 et 6, nec maculis lateralibus ejusdem coloris, ventre certo situ argenteo-micante et ano obtusiore, subhiante, segmento ultimo supra retuso, lamellas 2 breves, nigras in excisura continente, subtus genitalibus ferrugineis.

PTIOLINA STAEG.

Ut species novae ab antea descriptis facilius distinguantur characteres omnium indigenarum hic recognitos afferre lubet.

Ptiolina obscura: hirsuta nigra (♂) aut pubescens fusco-grisea (♀), subopaca, epistomate et basi antennarum pilis raris brevibus munitis, articulo tertio ovali, palpis non dilatatis pilosis, thorace obsolete fusco-3-lineato (♀), abdomine nitidiusculo, pedibus fusco-testaceis, alis dilute fusciscentibus stigmatibus saturatori, halterum clava fusca vel sordide albida. ♂♀. Long. 1½—1¾ lin.

Pt. obscura ZETT. — *Leptis* FALL. — *Atherix* MEIG.

Hab. in Scania, Blekingia, Gottlandia, Bahusia et ad Holmiam, BOHEMAN.

Mas in omnibus femina obscurior, magis opacus. Femina antennae basi interdum subferrugineis. In specimine feminae Gottlandico furca petiolata adest pro nervis 2 superioribus ex area discoidali egredientibus.

Ptiolina nigra: hirsuta nigra (♂) aut pubescens fusco-grisea (♀) subopaca, epistomate parum piloso, antennarum articulis 1 et 2 longe et dense pilosis, tertio ovali, palpis dilatatis pilosis, thorace lineis 3 fuscis obsoletis, maris confluentibus, abdomine subnitido, pedibus nigris (♂) vel fusco-testaceis (♀), alis fusciscentibus stigmate saturatori, halteribus fuscis ♂♀. Long. vix 1½ lin.

Pt. nigra STÅG., ZETT. Dipt. Scand. ♂, non ♀.

Hab. in Dalecarlia, BOHEMAN.

Pt. obscura paullo minor, mas obscurior, hirsutior. Antennarum articulis basalibus distincte pilosis optime dignoscitur.

10. *Ptiolina nigra* N. Sp.: nigro-cinerascens opaca, epistomate et articulis antennarum 1 et 2 longe et dense pilosis, tertio late ovali seta crassiori, palpis apice dilatatis, tenuiter pilosis, thorace parcius piloso in medio dorsi lineis 2 approximatis maculisque utrinque 3, quarum 2 in lineam lateralem dispositis holosericeo-atris, abdomine fasciis segmentorum apicalibus latis ejusdem coloris, pedibus nigris, alis subhyalinis nervis crassis manifeste infuscatis, stigmate sat distincto halteribusque fuscis. ♂♀. Long. 1½—1¾ lin.

Leptis nigra WAHLB. in ZETT. Dipt. Scand., T. I. p. 228 sub *Pt. nigra*. *Pt. nigra* ZETT. l. c. ♀. et var. b. ♂.

Hab. in Dalecarlia alpina, BOHEMAN, in Jemtlandia, ZETTERSTEDT et ad Nacka prope Holmiam versus finem mensis Maji, ipse.

Hirsutiae epistomatis antennarumque, forma et seta articuli tertii, palpis dilatatis, thoracis abdominisque pictura, pedibus nigris, alis subhyalinis, nervis crassis abunde distincta. Mas femina paullo obscurior et pilosior.

11. *Ptiolina nitida* N. Sp.: epistomate antennisque subnudis, articulo tertio ovato majore, seta crassiuscula vix articuli longitudine, palpis apice dilatatis pilosis, thoracis ambitu fusco-cinerascente, pedibus nigro-fuscis, stigmate halteribusque fuscis. ♂♀. Long. 1½—1¾ lin.

Mas: parcius pilosus niger supra subnitidus, thoracis disco et abdomine atro-holosericeis, alis dilute fusciscentibus.

Femina: tenuiter pubescens fusco-nitida, vertice pruina detrita nitidissimo, thoracis disco nigro indumento tenuissimo cinerascente obducto vix lineato, alis subhyalinis.

Hab. in alpe Dowre Norvegiæ, BOHEMAN. In planitie alpibus Walli prope Quickjock, 2000 pedes supra mare sita, d. 14 Jul. ad 3 Aug. 1843. In copula capta, ipse.

Epistomate antennisque nudis, articuli tertii forma, palpis dilatatis et verticis thoracisque nitore in femina facile a ceteris dignoscitur.

Obs. Linea frontalis transversa, cinereo-albida, ad basin antennarum in feminis omnium specierum adest plus minus distincta.

SPANIA MEIG., MACQU., WALKER.

Corpus parvum, angustum, postice non nihil attenuatum, pubescens (♂) vel glabriusculum (♀). *Caput* hemisphaericum, thorace fere latius. *Oculi* maris cohærentes, dimidio superiore et inferiore discolorés, feminae vertice epistomateque convexis late separati. *Ocelli* distincti. *Proboscis* subexserta. *Palpi* longi, sublineares. *Antennæ* porrectæ, capite fere longiores, articulis tantum 2 evolutis, basali minuto, apicali longo, in mare basi supra gibbo, subtus recto, in setam validam sensim attenuato, in femina sublineari, basi tantum parum incrassato, maris longiori. *Alarum* area discoidalis tres nervulos emittens, superioribus basi contiguis, inferiore remoto, abbreviato. Area angularis clausa. *Halteres* longissimi, clavati. *Ptiolinæ* proxima, antennarum forma, nervulo abbreviato, nec non verticis et epistomatis convexitate in femina satis diversa.

12. *Spania nigra*: nigra tenuiter nigro-pilosa (♂) vel fusca glabriuscula (♀) subnitida subtus cinerea, abdomine, halteribus pedibusque piceis, alis (maris præsertim) infuscatiss. ♂♀. Long. 1 lin.

Sp. nigra MEIG. Dipt. 6. p. 335. Tab. 66. fig. 12—14. ♂. — MACQU. Dipt. 1. p. 430. pl. 10. fig. 14. 15. ♂. — WALKER Ins. Brit. 1. p. 72. ♂♀.

Hab. in floribus Salicis pentandræ ad Gusum Ostrogothiæ d. 21 Maji 1842 ♂, BOHEMAN et ad Quickjock, Lapponiæ Lulensis, d. 18 Julii 1843 ♀, BOHEMAN.

Parva. Mas nigrior, pilosior. Femina vertice lato et epistomate lucidis, dilute fuscis, nudis, alis sordide hyalinis.

7. *Om Parus borealis DE SELYS LONGCHAMP (Poecila borealis CH. BONAP.), och den s. k. bräm-fällningen hos vissu foglar.* — Hr T. HAMMARGREN i Carlstad hade insändt följande meddelande.

»Redan ett par år har jag observerat, att *Par. borealis* förekommer här vid Venern, liksom han äfven blifvit funnen i Skåne, just ej sällsynt. Likväl har jag ej förr än nu haft tillfälle till en noggrannare undersökning af denna *Parus*-art eller kanhända varietet af *P. palustris*.

De exemplar jag skjutit och examinerat hafva till de minsta detaljer öfverensstämt med den beskrifning, som Professor LILJEBORG lemnat i Naumannia, II bandet, 2 häftet — Descript. A. habitu hiemali, e Scania. Då nu Prof. L. uppgifver, att hans beskrifning är fullkomligt öfverensstämmande med DE SELYS

i Bullet. des Sciences de l'Academie de Bruxelles, Tom. X, N:o 7, hvilken sednare beskrifning jag dock ej har att tillgå, så följer deraf, att DE SELYS's, Prof. LILJEBORGs och de här anträffade exemplaren alla varit identiska; att denna form af Parus-släktet är utbredd öfver Island, Norge, Sverige och norra Ryssland. Den beskrifning, som DEGLAND i *Ornithologie Européenne* gifver, öfverensstämmer visserligen äfven i allmänhet med Prof. L:s, — men härvid förekommer en olikhet i sjelfva diagnosen. Prof. L. säger: »*Pedes iisdem P. palustris similes*» d. v. s. att fötterna äro *blygrå*, som på *P. palustris*; så äro ock fötterna på dem jag haft tillfälle examinera; men DEGLAND säger åter: »*gorge et pieds noirs*», och på ett annat: »*bec et pieds noirs*»; Telles etaient les depouilles que j'ai eues sous les yeux»; men han nämner ej hvarifrån de exemplaren förskrifvit sig, hvilka han begagnade vid beskrifningen.

Prof. LILJEBORG fäster sig vidare vid den svarta färgen på hufvudet, hvilken saknar glans (*absque nitore*). Uti samma häfte af Naumannia, hvaruti Prof. L. infört sin beskrifning, finnes äfven en annan på samma fogel, af Grefve WODSICKI i Krakau, som äfven öfverensstämmer med de andra, men äfven här finnes en olikhet med Prof. L:s beskrifning, — Grefve WODSICKI säger neml. »der Scheitel *glänzend schwarz*», således just motsatsen af Prof. L:s »*absque nitore*.»

Det synes således, som skulle Prof. LILJEBORGs *P. borealis* ej vara fullt identisk med DEGLANDs och WODSICKIs, eller ock äro alla de nämnda formerna endast »Spielarten» af vår vanliga *P. palustris*, måhända ett Brehmiskt subspecies.

Hvad jag för öfrigt anmärkt är, att då nämnde fogel erhållit sin vinterdrägt mot hösten, utgöres *det hvita* på öfre delen af bröstet upp mot halsen af de helt *hvita* fjäderkanterna af de för öfrigt *svarta* fjädrarna, hvilka sednare äro dolda under de förra. Dessa kanter affalla vid parningstiden, och *det svarta* på strupen vidgar sig då nedåt bröstet. En sådan vinterfjäder, tagen från undre delen af halsen, och laggd under mikroskopet, är särdeles vacker; den liknar då en strutsfjäder;

yttersta delen är silfverglänsande hvit, och hvarje fan tillspetsar sig starkt mot ändan; den svarta färgen börjas tvärt, och är skarpt afskiljd från den silfverglänsande, men här är fanet långt tätare.

Hvad Prof. Doct. HERRMANN SCHLEGEL i Leyden yttrar angående vårdräktens utbildning hos vissa foglar, uti ett sändebref till de församlade naturforskarna i Altenburg år 1852, måste bestämdt grunda sig på ett misstag. Han antager nemligen, att vissa fjädrar mot parningstiden åter börja få lif och växa, utskjuta nya fan, färga sig med lifligare färger (*»verfärben sich»*), och att det färgförande pigmentet tränger ut till fjädrarnes spets, och *på detta vis* de ljusare kanterna, eller brämen på t. ex. bröstfjädrarne hos en del foglar försvinna, men *ej* genom fjäderkanternas afrifning eller fällning, hvilket han anser såsom en villfarelse. — Likväl, om man vårtiden skjuter Hämplingar, med vissa kortare mellantider, och med mikroskopets tillhjälp noga betraktar deras bröstfjädrar, så skall man finna, att den blodröda färgen visserligen blir lifligare mot parningstiden, men att tillika de gråa fjäderkanterna, som förut betäckte den röda färgen, *afrifvas* (*»reiben und stossen sich ab»*), men detta *ej* på en gång, ty man kan tydligt se, att på samma fjäder några *fan* äro afrifna jemt till den röda färgen, eller nära derintill, under det att andra fan ännu äro qvar, så att kanterna i början äro *ojemna*, men blifva slutligen fullkomligt *jemna*, när alla de ljusare fanen affallit. Hvarföre sker nu denna afrifning så jemt? De tyska Ornithologerna (hvaribland Friherre v. HOMEYER), som medgifva denna brännfällning, kalla den *»Abreiben»*, *»Abstossen»* o. s. v. och tyckas endast fästa sig vid den mekaniska delen af företeelsen. De tala visserligen om *»att luften, ljuset och mekaniska nötningar slita och bleka fjädrarna* (*»die Federn nutzen sich ab und entfärben»*), men hvarför detta sker så *reglbundet* (d. v. s. att, sedan afrifningen af de ljusare fjäderkanterna skett, fjädern likväl eger en afrundad och välbildad form) detta förbigås i allmänhet med tystnad. Utan att tilltro mig att kunna tillräckligt för-

klara detta förhållande, vill jag likväl hemställa till Hrr Ornithologers afgörande, om icke följande är någorlunda öfverensstämmande med verkliga förhållandet. Vid parningstiden uppväckes hos fjädern liksom en ny *vitalitet*. Dock ej i den mening, som SCHLEGEL antager, att de *gamla* fjädrarna tillväxa med nya fan, hvilket väl ej gerna är möjligt, alldenstund blodkärnen inuti fjäderspolen redan äro förtorkade. Men det färgförande *pigmentet med fett* afsöndras nu i större mängd, och likasom genomdränker fjädern, ända till den gräns, der de ljusare fjäderbrämen vidtaga. Den hjert färgade delen af fjädern blifver härigenom mjukare och smidigare, under det att fjäderbrämen blifva allt *torrare* och *sprödare*, samt slutligen genom mekanisk nötning frånsлитas, just jemt till den färgade delen, der fjäders sprödhet upphörer.»

8. *Om Torpa saltkälla* *). — Såsom ett ytterligare bidrag till beskrifningen öfver denna källa **) meddelade Hr ERDMANN ur bref från Hr E. V. OLBERS följande.

»Vattnets temperatur befanns den 20 April d. å. vid +13°,5 luftvärme i skuggan vara +5°,5 Cels.

Källans djup från vattenytan till botten var 6 fot 5 tum och bestod botten af en seg gråblå lera, som äfven fanns, vid gräfning i marken rundtomkring källan, omedelbart under den öfra mera humusblandade betäckningen.

En omständighet, som jag förut icke observerat, men som jag utaf egaren af Torpa, Hr FAHLBECK, hörde vara vanlig, inträffade ett par gånger under det jag uppehöll mig vid källan, nemligen *en stark gasutveckling ur vattnet*, som kom detta under en eller par minuters tid att likna en starkt sjudande gryta, hvarefter vattnet åter blef fullkomligt stilla. Gasutvecklingen är, som nämndt är, periodisk, men utan bestämda mellantider, så att den ibland inträffar ett par gånger i tim-

*) Hårtill Tab. II.

**) Se denna årgångs Marshäfte, sid. 81.

men, ibland först efter flera timmars förlopp. Vid de besök jag sedermera under loppet af sommaren gjort på Torpa, har jag funnit denna gasutveckling starkare än under våren, så att den nästan oafbrutet fortfor, ehuru emellanåt starkare och svagare, så att då, under några minuters tid, endast några få gasblåsor visade sig här och der på ytan, ökades detta under en kortare stund (icke öfver en half minut) så att hela vattnets yta var i en häftig svallning. Med en enkel apparat, bestående af en större glastratt, förenad med ett böjdt längre glaströr, uppfångade jag gasen i några flaskor, i brist på en gashållare. Undersökningen är visserligen genom brist på dertill tjenliga apparater och ovana vid gasarters behandling icke fullständig, men jag vill dock omnämna, att gasen var färg- och luktlös, hvarken antändes eller befordrar förbränning, utan tvärtom slocknade en deri införd antänd fnöskbit genast. En remsa lackmuspapper införd i gasen rodnade svagt, men återtog i luften snart sin blåa färg. Ett infördt kärl med klart kalkvatten blef snart mjölklikt på ytan, men ett infördt stycke kaustiskt kali absorberade icke märkbart något af gasen. Med anledning häraf skulle jag tro, att den gas, som utvecklas ur källan består helt enkelt af atmosferisk luft, blandad med något kolsyregas. Jag har glömt nämna, att ätticksyrad blyoxid icke förändrades samt att lefvande insekter, införda i gasen, icke deraf märkbart afficerades. Kunde jag anskaffa en gashållare, så ville jag gerna företaga en närmare undersökning af denna gas, men jag förmodar, med anledning af hvad jag omnämnt, att några ovanligare gasarter icke äro till finnandes.

Den vattenquantitet källan gifver på bestämd tid kan jag icke uppgifva, i anseende till svårigheten att bestämma densamma, då källan icke har något egentligt aflopp. Vattenståndet i elfven är nu (i slutet af Maj) ovanligt lågt, så att källans yta befanns vara 2 fot 5 tum högre än elfvattnets och elfgrundens torr på ett afstånd af v. p. 15 alnar, men afloppet från källan var så ringa, att marken utanför densamma endast

var på ett ringa afstånd våt och sumpig, men närmare elfven torr, hvaraf kan slutas, då grunden består af lera, som föga eller iutet genomsläpper vattnet, att dettas qvantitet är obetydlig. Hr FAHLBECK berättade äfven, att då källan under sistlidne sommar begagnades till badning, icke mera än 7 à 8 badkar dermed kunde fyllas om dagen.

Ofvanför källan höjer sig marken först temligen brant och sedan mera långsluttande till en höjd af $64\frac{1}{2}$ fot, hvarefter en besynnerlig sänkning i marken vidtager (se C å den bifogade kartan), som intager en rymd af circa 14 tunnland, har temligen tvärbranta kanter, i nära horisontel plan liggande botten och ett djup af $28\frac{1}{2}$ fot, hvarföre dess botten är endast $33\frac{1}{2}$ fot högre än källans. Denna sänkning är, som nämnt är, omgifven af branta kanter på alla sidor, utom åt södra sidan, der den har en öppning, som sänker sig till och förenar sig med den dalgång, som bildas af Fors å, hvilken har nära samma nivå, som elfven, och i en stark böjning kröker sig så, att den kommer nära öster om källan och sålunda till en del afskar alla tillflöden från kringliggande höjder. Så väl i botten af den nämnde sänkningen, som äfven å dess kanter, vid den branta sluttningen åt elfven och alla andra af naturen gjorda genomskärningar af marken, har jag undersökt dennas beskaffenhet så mycket som med spade kan göras, men endast funnit lera, mer och mindre blandad med sand på olika ställen, men utan någon lagervexling, och har leran öfverallt samma gråblå färg, som på källans botten anmärktes.

Sedan Hr FAHLBECK på Torpa efter mycket besvär erhållit ett jordborr från Vermland, företogo vi oss en dag, att undersöka de djupare belägne jordlugren. Borret var dock icke af någon god beskaffenhet och leran så seg, närmast att likna vid en blandning af vax och terpentin, att vi på en hel eftermiddag med tre mans oafbrutna arbete icke hunno djupare än 12 fot. Stället, som valdes för borrhningen var på ett afstånd af circa $\frac{1}{2}$ alnar innanför källan och vid $\frac{1}{2}$ fots höjning

af marken öfver elfvens vattenyta. Lerans beskaffenhet var intill det uppnådda stället alldeles densamma, som närmast under ytan och sådan som jag funnit den i alla de djupare dalgångarne å Torpa, egor, nemligen af ljus gråblå färg, torkad nära hvit, af högst seg konsistens och fet för känseln, samt till några få procent af sin volum blandad med en fin hvit quarzsand.

Af den på botten af borrhålet funna leran hemtog jag ett prof och anställde å vatten, som med densamma blifvit digereradt, en kvalitativ undersökning, hvilken utvisade, att alldeles desamma ämnen, som blifvit funna i källans vatten, till icke obetydlig kvantitet finnes i leran och att äfven en jodhalt ur en så ringa mängd, som ungefär 4 skålpund lera, tydligt kunde förevisas. Ett par dagar derefter besökte jag åter det gjorda borrhålet och fann då detsamma nära fylldt med vatten (omkring en fot högre än vattenytan i källan) oaktadt en då rådande ovanligt stark och långvarig torka, och detta vatten var äfven af samma beskaffenhet, ehuru af något ringare salt-halt än källans.

Med anledning af hvad nu blifvit anfördt, kan väl såsom sannolikt antagas, att den mäktiga vid Torpa befintliga lerbädden blifvit aflagrad ur hafsvatten och dervid impregnerad med i detta vatten befintliga salter, samt att hafsväxter blifvit inbäddade i slammet, hvilka numera så blifvit förvandlade, att de icke kunna skiljas från leran, ehuru de deruti kvarlemnats sin halt af jod. Dessa salter, som under tidernas längd blifvit urlakade ur den del af lerbanken, som är närmast ytan, finnes ännu kvar på ett större djup, och lösas der oupphörligt af det vatten, som så småningom banar sig väg genom leran, hvilket, uppfångadt af någon mindre sandådra, gifver upphof och näring åt källan. Att sandådran är obetydlig, kan man sluta till deraf, att den ej påträffades vid borrhningen, som verkställdes så nära källan och till ett djup af 4 fot större än källans, dels äfven deraf, att vattenkvantiteten i källan är så ringa.

För att förtydliga källans läge och trakten deromkring, tar jag mig friheten sända en charta öfver Torpa ägor, hvarå äfven finnes en genomskärning af den bredvid källan varande lerbanken, äfvensom en dylik af en sand- och gruskulle med ett deruti befintligt *snäcklager*. Detta snäcklager har ingen gemenskap med källan, då det är beläget på nära $\frac{1}{2}$ miles afstånd (således utom den areal, som på chartan är upptagen) och skiljdt derifrån genom betydliga bergshöjder, men det har sin egen märkvärdighet, då det är beläget på en höjd af minst 200 fot öfver elfvens vattenyta och består af endast hafssnäckor, till en del väl bibehållna. Jag skall framdeles deraf öfversända prof.»

Om upptäckten af ännu en annan saltkälla i närheten af Götha elf, meddelade densamme ur en sednare skrifvelse från Hr E. V. OLBERS på Tösslanda.

»Denna källa, hvilken jag förliden vår hade tillfredsställelsen att finna, är belägen i Bohus län, Torpe härad och Hjertums socken, således på vestrå sidan om Götha elf, och på ett afstånd af v. p. $\frac{1}{2}$ mil från Torpa saltkälla. Den upprinner midt på ett upplöjdt gärd å egendomen *Torp*, tillhörig en Kapten Nycander, och utgör nu endast en liten vattenpöl, men tyckes hafva starkare vattentillgång, emedan under innevarande sommars ihållande torka, och oaktadt den är nära uppfyllt med gyttja, en jemnt flytande vattenrännil var derifrån afledd, hvilket vid Torpa källa icke förmärkes. Äfven i denna förnimmes, ehuru i ringare grad, en gasutveckling. Vattnets temperatur var den 10 Juli vid $+19^{\circ}$ luftvärme $\pm 10^{\circ}$ Cels. Dess egentliga vikt har jag funnit vexla mellan 1,0073 och 1,0088.

Enligt af mig verkställd analys å vatten af sistnämnde egentl. vikt, har jag funnit dess beståndsdelar, beräknade på ett tusen delar vatten, vara följande:

Jodnatrium	0,4373
Chlornatrium	8,3350
Chlormagnesium	0,4487
Transport	9,2210



Transport	9,2210.
Bikarbonat af talkjord . . .	0,7780
do af kalkjord . . .	0,3063
Kiselsyra	0,0339

Summa 10,3392 fasta beståndsdelar på 1000 delar vatten, eller på 46 uns vatten 79,41 gran fasta beståndsdelar.

Dessutom fanns endast spår af jernoxid, kali och fosforsyra. Kolsyrehalten i detta vatten tyckes vara betydligt större än i det vid Torpa, emedan lackmustinctur häraf rodnar och en genom kalkvatten frambragt fällning genom en ny tillsatt portion källvatten åter löses.

På samma gång torde jag få nämna, att jag genom Doctor Boustedt på Lilla Edet fått höra, att en källa med salt vatten lärer finnas i Ahle härad på ett afstånd af ett par mil härifrån, samt att en trovärdig person, med hvilken jag för några dagar sedan var i sällskap, berättade att i trakten af Kinnekulle skulle finnas flera källor, hvilkas vatten smakade salt. När saken blir närmare vidrörd, komma måhända dylika källor att icke blifva sällsynta.»

Inlemnade afhandlingar.

Af Hr Magister ANDERSON: Om Galapagos-öarnas vegetation.

Remitterades till Hr WIKSTRÖM, FRIES och ÅRESCHOUG.

Af framl. Hr JOHANSON: Fem Journaler öfver de under fregatten Eugenies jordomsegling observerade fysikaliska fenomen.

Remitterades till Hr ÅNGSTRÖM.

Hr Rådman BEURLINGS afhandling: Primitivæ Floræ portobellensis, som varit remitterad till Hr WIKSTRÖM och WAHLBERG, återlemnades med tillstyrkande af dess införande i Akademiens Handlingar.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

AF H. M. KONUNGEN.

Supplementi Floræ Danicæ fasc. I. Cum Tabb. fol.

Af H. M. Konungen af Preussen.

Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, von LEPSIUS. Lief. 42—50.
Atlasfolio.

Af kejserliga Franska Regeringen.

Voyage au Pole Sud et dans l'Océanie, de M. DUMONT-D'URVILLE. —
Hydrographie. T. II. — Zoologie. T. III, IV, V. — Botanique.
T. II. Paris 1851—54. 8:o. — *Atlas d'hist. natur.* Zoologie.
Livr. 27 et 28. — Botanique. Livr. 13. fol.
Campagne de Circumnavigation de la Frégate Artemise, de M. LAPLACE.
T. V et VI. Paris 1853, 54. 8:o.

Af Nordamerikanska Förnsta Staternas Regering.

Exploration of the Valley of the Amazon. By W. L. HERNDON et
LARDNER GIBBON. P. I. Wash. 1853. 8:o (m. t.)
Report of an expedition down the Zuni and Colorado Rivers, By L.
SITGREAVES. Wash. 1853. 8:o (m. t. o. k.)

Af Royal Society i London.

Proceedings. Vol. VII. N:o 5. (June 1854). 8:o.

Af Royal Society i Edinburgh.

Transactions. Vol. XX. P. IV. Edinb. 1853. 4:o.
Proceedings. Vol. III. N:o 43. 1852—53. 8:o.

Af Royal Irish Academy i Dublin.

Proceedings. Vol. V. Dublin 1853. 8:o.

Af Geological Society i London.

Quarterly Journal. N:o 38. (X: 2). 1854. 8:o.

Af Société Géologique i Paris.

Bulletin de la Société. T. X. f. 34—40. 1852—53. 8:o.

Af Société du Museum d'hist. nat. i Strassburg.

Mémoires de la société. T. IV. Livr. 2 et 3. 1853. 4:o.

Af Société Vaudoise des sciences natur. i Lausanne.

Bulletin. T. III. N:o 26, 31, 32. 1852—53. 8:o.

Af Société Hollandaise des sciences i Haarlem.

Natuurkund. Verhandelingen. Deel. X. 1854. 4:o.

Af keiserl. Akademie der Wissenschaften i Wien.

Denkschriften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Band. VI.
Wien 1854. 4:o.
Sitzungsberichte. Mathem. naturw. Cl. 1850: 1, 2. B. XI. H. 3—5.
B. XII. H. 1. — Philos. histor. Classe. B. XI. H. 3—5. XII: 1. 8:o.

Tafeln zur dem Vortrage: der polygraphische Apparat. Von A. AUEL.
(Zum B. IX. H. 5 der math. nw. Cl. 1852). 8:o.
Fontes rerum austriacarum. Abth. 2. B. 2. Wien 1850. 8:o.

Af k. k. Geologische Reichsanstalt i Wien.
Jahrbuch 1853. Nr 4. 4:o.

Af Königl. Observatorium i München.
Annaleu der kön. Sternwarte. Von LAMONT. B. VI. 1853. 8:o.
Magnetische Ortsbestimmungen in versch. Puncten des k. R. Bayern.
VON LAMONT. Th. I. München 1854. 8:o.

**Af Kajs. Leop.-Karolin. Akademie der Naturfor-
scher i Breslau.**
Abhandlungen. B. XVI. Abth. 1. Breslau 1854. 4:o.
Preisfrage. VON ANATOL V. DENIDOFF. 4:o.

Af Naturforschende Gesellschaft i Halle.
Abhandlungen. B. II. H. 1. 1854. 4:o.

**Af Schlesische Gesellschaft für vaterländische
Kultur i Breslau.**
Denkschrift zur Feier ihres 50-jährigen Bestehens. Breslau 1853.
4:o (m. t.)

Af Physikalische Gesellschaft i Berlin.
Die Fortschritte der Physik in d. J. 1850 u. 1851. Jg. 6 u. 7.
Abth. 1. Berlin 1854. 8:o.

**Af Physikalisch-Medicinische Gesellschaft i
Würzburg.**
Verhandlungen. B. IV. H. 3. 1854. 8:o.

Af Observatorium i Washington.
MAURY'S Sailing Directions. 6:th edition. Jan. 1854. Philadelphia
1854. 4:o.
— — Storm et Rain chart of the North Atlantic. Wash. 1853.

Af Författarne.
DIRICHLET, LEJEUNE, Gedächtnissrede auf Jacobi. Berlin 1852. 4:o.
(Aus den Abhandl. d. Ak.)
DUMONT, ANDRÉ, Carte géologique de la Belgique et des contrées voisi-
nes. Atlas fol.
DE LA RIVE, A., Traité d'Électricité théorique et appliquée. T. I. Paris
1854. 8:o.
FERRARI, SILVIO, Calcolo decidozzinale. Torino 1854. 4:o.
GRUNERT, J. A., Theorie der Sonnenfinsternisse. Wien 1854. 4:o (Aus
den Denkschr. d. Akad.).

- GUYON, Voyage d'Alger aux Ziban en 1847. Alger 1852. 8:o. —
Avec Atlas. Tvärfolio.
- ILMONI et TÖNNROT, *Analecta clinica iconibus illustrata*. T. I. Fasc. 2.
Helsingf. 1854. 4:o.
- LEREBoullet, A., *Mémoire sur les Crustacés*. Strasb. 1853. 4:o (Extr.
des Mém. de la Soc.).
- MURCHISON, Sir Rod. IMPEY, *Siluria*. The history of the oldest known
rocks containing organic remains. Lond. 1854. 8:o.
- PAINÉ, MARTYN, *The Institutes of Medicine*. New-York 1853. 8:o.
- — *Medical and Physiological Commentaries*. Vol. I—III. New-
York 1840—1844. 8:o.
- — *Materia medica and Therapeutics*, New-York 1848. 8:o.
- — *A discourse on the soul et instinct*. New-York 1849. 8:o.
- — *Memoir of Robert Troup Paine*. By his parents. New-York
1852. 4:o.
- SCHERER, Th., *Der Paramorphismus*. Braunsch. 1854. 8:o. — *Jemte
sex småskrifter, aftryck ur större arbeten*.
- SCHÉLE DE VERÉ, *Outlines of comparative philology*. New-York 1853. 8:o.
- VILLE, GEORGES, *Recherches expérimentales sur la Végétation*. Paris
1853. 4:o.
- Några akademiska föreläsningar öfver Räknekonsten. Lund 1853. 4:o.

Af Utgifvarne.

- Archiv der Mathem. u. Physik, von GRUNERT. XXII: 2—4. XXIII: 1.
Greifsw. 1854. 8:o.
- Archiv f. wissensch. Kunde von Russland. Von A. ERMAN. XIII: 1—3.
Berlin 1853—54. 8:o.
- Astronomical Journal. N:o 68—72. Cambridge 1854. 4:o.
- Flora. Von FUERNROHR. Jg. XI. B. 1. N:o 4—20. Regensb. 1854. 8:o.
- Botaniska Notiser. Utg. af THEDENIUS. 1854. N:o 5, 6. 8:o.
- Die Landtafel des Markgrathurnes Mähren. 1:o Lief. Brünn 1854. Fol.
- Verhandelingen vitgeg. door de Commissie belast met het vervaardigen
eener geologische Beschrijving en Kaart van Nederland. Deel I.
Haarlem 1853. 4:o (m. t.)
- Berättelse öfver Förhandlingarne vid det sjette allmänna Svenska
Landbruksmötet i Lidköping år 1853. Afgifven af Fr. v. SCHÉLE.
H. 1, 3. Carlstad 1854. 8:o.

Af Hr Hausmann i Göttingen.

- Gelehrte Anzeigen. 1853. B. 1—3. Göttingen 1853. 8:o.
- Nachrichten von der Georg-Augusts Universität. v. J. 1853. 8:o.

Af Kongl. Civil-Departementet.

- HEINS, Om den kunstige Frambringelse af Foreller, Örreder og Lax m.
m. 5:te Udg. Kolding 1853. 8:o.

**Till Rikets Naturhistoriska Museum.
Zoologiska afdelningen.**

Af Hr Doctor Regnell.

En Gulo barbarus, en Felis Onça, en Dasypus sp., ett skelett af en Cebus, elfva st. foglar från Brasilien.

Af Hr Professor F. Sundevall.

En Grus cinerea.

Af Hr O. F. Henström.

En Larus fuscus.

Af Hr Professor Huss.

En Estrela senegala, en E. Troglodytes, en Amandana punctulata, från Afrika.

Af Hr Doctor Walmstedt.

Elfva sp. foglar från Chili.

Af Hr Apotekaren Hjalmarson.

Ett skelett af Falco harpyia, en Testudo sp., från Honduras.

Af Hr C. U. Dietrich.

En Hypudæus glareolus från Sickla, en Anas rutila från Stockholms skärgård.

Af Hr Notarien Arfvidson.

En samling sällsyntare fogelägg (sextiosju) och fogelbon (fem) från Sverige.

Af Hr Doctor Goës.

Två kalkstuffer med koraller och en Trilobit från Tåkern.

Af Hr Kapten Werngren.

Tjuguatta glas med i sprit förvarade fiskar, amfibier, crustaceer och mollusker, från Canton, Manilla och Oceanen.

Af Hr Jägmästare A. Jahnson.

En Gallinula crex, unge.

Af Hr Conservator W. Meves.

En Sylvia tithys, hanne, fångad vid Stockholm.

Botaniska afdelningen.

Af Hr Rådman Beurling.

Fyrtiofem arter från nejderna af Strömstad, serdeles från Kosteröarna, deribland *Ligustrum vulgare*, *Thalictrum minus*, *Glaucium luteum*, *Archangelica littoralis*, *Haloscias scoticum*, *Sorbus Aria*, *Rubus suberectus*, *Tilia grandifolia*, *Lathyrus maritimus*, *Euphrasia gracilis*, *E. nemorosa* var. *curta*, *Nymphæa alba* β *minor*, *Triticum junceum*, *T. strictum*, *Zostera angustifolia* m. m. fl.

Af Hr Presten L. L. Læstadius.

Talrika former af *Betula alba*, *alpestris* och *nana* samt många former af flera bland de nordligare arterna af *Salix*.

Af Hr Bibliotekarien Wiede i Linköping.

Talrika exemplar af *Fluminia araundinacea* och *Nuphar pumilum* från Östergötland.

Af Studenten Fredrik Björnström.

Femton växtarter från södra Sverge, förnämligast från Skåne, t. ex. *Helipterum arenarium*, *Cirsium acaule-oleraceum*, *Filago minima*, *Nasturtium officinale*, *Lotus siliculosus*, *Lysimachia Nemorum*, *Rumex sanguineus* m. fl.

Af Studenterna Åkerman.

Tjugusju arter, de flesta från södra Sverge, t. ex. *Inula britannica*, *Bellis perennis*, *Lactuca scariola*, *Taxus baccata*, *Viscum album*, *Cephalanthera ensifolia*, *Epipactis palustris*, *E. latifolia*, *Gymnadenia odoratissima* o. s. v.

Af Hr Magister Areschoug i Lund.

Talrika exemplar af *Alsine tenuifolia* var. *viscosa*.

Af Studenten Göthe i Stockholm.

Femton arter från Stockholmstrakten, t. ex. *Carex norvegica*, *evoluta*, *irrigua*, *chordorrhiza*, *Eriophorum gracile* m. fl.

Mineralogiska afdelningen.

Af Hr Professor A. Retzius.

Tretton stuffer mineralier från förenta staterna i norra Amerika.

Af Hr Apothekaren Hjalmarson i Portorico.

Femtiotre stuffer mineralier och bergarter, de flesta från Honduras.

Af Hr Bergsfogden Arosin.

Sexton stuffer Svafvelmolybden från Bispberg.

Af Hr Landtbrukaren Ljung.

Åtskilliga fragmenter af quartz-kristaller funna i jorden på Åkra egor
i Elfsborgs län.

ÖFVERSIGT
AF
KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS
FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

N. 8.

Onsdagen den 11 October.

Föredrag.

1. *Nya Hemiptera.* — Följande af Studenten CARL STRÅL författade uppsats meddelades af Hr BÖRMAN.

»Vid ordnandet och bestämmandet af Riksmusei exotiska Hemiptersamling, hvarmed jag en längre tid varit sysselsatt, hafva ett antal förut obeskrifna arter blifvit påträffade, och anhåller jag, att i Kongl. Akademiens Öfversigt få införa beskrifningar öfver en del af dessa, under hopp att till ett annat år, allt efter som bestämmandet fortgår, få framlemna fortsättning.

SOLENOSTHEDIUM (SPIN.).

1. *S. chinense*: supra rufotestaceum, dense obscurius punctatum, subtus cum pedibus sordide flavotestaceum; antennis nigris, art. basali flavotestaceo; capite basi thoraceque lateribus anguste nigromarginatis, hoc maculis 3 transversim, unaque utrimque ad angulum humeralem, scutello maculis basalibus 6, mediisque 4 transversim positis, nigrofuscis; tibiis extus fuscocastaneis. Long. 16, lat. 11 millim. — Patria: China.

CALLIDEA (LAP.).

1. *C. lanius*: obscure rufotestacea, violacescens, pubescens; antennis nigris, basi miniatis; thorace ante medium transversim valde depresso, maculis 3 rubris, lateribus aureomicante; scutello maculis 7 linesque media rubris; subtus ochracea, maculis laterilibus transversis violacescentibus; femoribus miniatis, apice cum tibiis cæruleoviridibus. Long. 22, lat. 9 millim. — Java.
2. *C. jactator*: cæruleo-viridis, capite obscuriore, lobo medio nigro; thorace ante medium transversim impresso, ibique nigrofasciato,

maculisque 2 magnis basalibus nigris ornato; scutello maculis 5 nigris; abdomine subtus aureo-viridi, limbo chalybescente; femoribus flavotestaceis, tibiis nigrocæruleis, tarsis nigropiceis; antennis nigris, basi sordide flavotestaceis. Long. 10, lat. 5 millim. — Patria ignota.

SPHÆROCORIS (BURM.).

1. *S. niloticus*: dilute sordide flavus; capitis margine lineisque 2 longitudinalibus mediis nigris; antennarum art. 3—5 fuscis; thorace maculis 4, scutello maculis 10 nigro cinctis, fundo dilute fuscis, quarum 4 basi triangulariter, 4 pone medium in serie transversa et 2 apice positis. Long. 8, lat. 7 millim. — Nubia superior.

ANCYROSOMA (AM. ET SERV.)

1. *A. simile*: statura fere *A. albolineati* et ei simile, sed differt capite magis parallelo, lobis apice rotundatis; thoracis angulis humeralibus minus productis, subrotundatis; carinis scutelli minus elevatis, posterius evanescentibus, hoc etiam apice latius rotundato. Long. 6, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Dauria.

ASPIDESTROPHUS (N. GEN.).

(e Fam. Podopidarum.)

Corpus late ovale, subpubescens. Caput subquadratum, utrimque ante oculos spinosum, lobis lateralibus intermedio vix longioribus. Rostrum coxas anticas attingens. Antennæ capite cum thorace longitudine æquales. Thorax transversim impressus, antice parum sinuatus, postice subtruncatus, lateribus leviter rotundatis, crenatis. Scutellum abdominis longitudine, sed hujus dimidia latitudine, basin versus utrimque leviter sinuatum, apice late rotundatum. Pedes mediocres, tarsorum art. basali et apicali longitudine æqualibus, intermedio minimo.

1. *A. morio*: nigropiceus, rugulosopunctatus, sordide ochraceopubescentis et æriceus; femorum annulo fere apicali tarsisque sordide flavotestaceis. Long. $7\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Java.

PLATYNOPUS (AM. ET SERV.).

1. *P. rubroguttatus*: niger; thoracis margine antico, maculis 3. annuloque spinæ, scutelli maculis 2 basalibus apiceque, corii macula apicali, maculis utrimque 5 pectoris, maculis marginalibus et basali spinaque abdominis rubris. Long. 10, lat. 6 millim. — Montevideo.

ACATALECTUS (DALL.).

1. *A. nitidicollis*: supra ænescente-niger, nitens, remote fortiter punctatus, subtus nigropiceus; antennis pedibusque piceis, tarsis sordide flavotestaceis; capite rugosopunctato, apice late rotundato; thorace ante medium plaga impunctata, nitida; hemelytris fusco-castaneis, membrana sordide albida, fuscomaculata. Long. 11, lat. $6\frac{1}{2}$ millim. — Java.

MECIDEA (DALL.).

1. *M. pallida*: tota flavotestacea, dense punctata; capitis lobis lateralibus apice non distantibus, oculis fuscis; thorace medio longitudinaliter subcarinato, utrimque parce obsolete fuscopunctato. Long. 13, lat. 4 millim. — Nubia superior.
2. *M. longula*: dilute grisescente-flavescens, dense dilute fuscopunctato; capite lobis apice distantibus, intus longitudinaliter parce fuscopunctatis; thorace ante medium subdepresso, longitudinaliter quadrifariam parce dilute fuscopunctato; pectore remote fuscopunctato. Long. 9, lat. 2½ millim. — Ins. St Barthélemy.

PENTATOMA (PAL. BEAUV.).

1. *P. arabica*: albida, rugulosa, nigropunctata; antennis, capitis marginibus lateralibus vittaque media, apicem versus angustata et lineam mediam longitudinalem albidam includente, nigris; thorace vittis 4, basin versus latioribus, nigropunctatis, posterius subevanescentibus; scutello hemelytrisque inæqualiter nigropunctatis, illius litura trivia apiceque impunctatis; abdomine margine supra nigromaculata, subtus punctis nigris serie quintupplo positis; pedibus fuscoferrugineis, tarsis obscurioribus. Long. 14, lat. 9 millim. — Arabia petræa.

STRACHIA (HAHN).

1. *S. ponderosa*: rufotestacea; antennis, capite, maculis 2 anticis thoracis, maculis pectoris, maculis marginalibus et intramarginalibus abdominis, his serie positis, pedibusque nigris; maculis 2 basalibus thoracis, basi, maculis 2 subapicalibus apiceque scutelli, hemelytrisque fuscopiceis; membrana sordide albida, apice fuscomaculato. Long. 16, lat. 10 millim. — Brasilia.
2. *S. generosa*: supra flava, subtus dilute miniata; antennis nigris, art. basali capiteque apice miniatis, hoc posterius, thoracis margine, angulis humeralibus maculisque 2 magnis basalibus, basi fasciasque scutelli, fascia lata hemelytrorum, membrana, maculis pectoris et abdominis, femorum apice, tibiis tarsisque nigris. Long. 15, lat. 9 millim. — Brasilia.
3. *S. circumducta*: supra cum antennis pedibusque nigra, subtus rufa; marginibus thoracis, basali excepto, margineque costali hemelytrorum rufis; scutelli apice obscure rufo. Long. 14, lat. 8 millim. — Brasilia.

UROSTYLIS (WESTW.).

1. *U. flavoannulata*: viridi-flavescens, supra parce nigrofusco-punctata; antennis corpore nonnihil longioribus, art. 1 et 2 rufotestaceis, 3, 4 et 5 nigris, his 2 basi flavis; tarsis apice fuscis. Long. 10, lat. 5 millim. — Dauria.

TESSERATOMA (LEP. et SERV.).

1. *T. Afzelii*: *T. javanæ* et *papillosæ* valde affinis, sed distincta antennis nonnihil gracilioribus, thoracis lateribus vix vel parum



- dilatatis, angulis humeralibus minus late rotundatis, scutellique apice nigro; sordide flavotestacea, antennis, art. basali excepto nigris. Long. 25, lat. 14 millim. — Sierra Leona.

T. papillosa: BURM., Handb. der Ent. II, 1, p. 350, 2 (excl. syn.).

PYCANUM (AM. et SERV.).

1. *P. ponderosum*: ochraceum, rugosopunctatum; antennis subsetulosis, nigris, art. ultimo apice imo fulvescente; marginibus capituli et thoracis, basali hujus excepto, tenuissime nigris; thorace transverso, subrectangulo; scutelli apice dilutiore; pectore metallice viridi- et dilute castaneo-vario; abdomine subtus dilute castaneo, utrimque late metallice viridi, margine supra nigromaculato; pedibus castaneis. — Long. 33, lat. 18 millim. — Assam.
2. *P. pretiosum*: sordide sanguineum, rugulosopunctatum; antennis pedibusque nigricantibus, illarum apice imo fulvo; capite, parte antica maculisque 2 basalibus thoracis, interdum etiam margine scutellari clavi, apiceque corii nitide viridibus; scutelli apice lutescente; pectore viridi-vario; abdomine utrimque viridisparso, margine nigro luteoque vario. — Long. 26, lat. 14 millim. — Pulo Penang.

Species hæc duæ *P. amethystino* certe affines, distinctæ tamen. Ab eo utraque differt antennarum art. ultimo longiore. *P. ponderosum* thoracem rectangulum, antice utrimque dilatatum etiam habet, staturamque majorem. *P. pretiosum* statura angustiore, thorace marginibus lateralibus non late rotundatis, sed ante medium angulum obtusum formantibus differt, quare thorax antice late subtruncatus.

CYCLOPELTA (AM. et SERV.).

1. *C. tartarea*: nigropicea, coriacea, punctata, subtransversim rugosa; scutello basi macula minuta sanguinea; membrana sordide ochracea; subtus granulosa, nigra, nonnihil cupreonitens. Long. 15, lat. 9 millim. — Himalaya.

NEMATOPUS (LATR.).

1. *N. malayus*: antennis ferrugineis, art. ultimo basi testaceo; capite thoraceque obscure cupreo-viridibus; hemelytris ferrugineis, cupreoviridipunctatis; pedibus anterioribus tarsisque posticis flavotestaceis, femoribus posticis granosis, intus spinosis, spina media magna, obscure chalybeo-viridibus, tibiis posticis nigropiceis apice testaceis. Long. 19, lat. 5 millim. — Pulo Penang.

PARYPHES (BURM.).

1. *P. magnificus*: metallice viridis, subtus aureomicans; capite rufotestaceo; maculis 2 thoracis hemelytrisque atris, his flavocinctis; scutello flavotestaceo. Long. 20, lat. 6 millim. — Brasilia.
2. *P. sumtuosus*: antennis pedibusque nigris; thorace scutelloque virescente chalybeis, margine antico, angulisque illius humeralibus, capiteque miniatis, hoc nigrovario; hemelytris obscure viridibus,

membrana olivacea; subtus dilute miniatus, nigrofasciatus. Long. 17, lat. 6 millim. — Patria: Guayaquil.

3. *P. pretiosus*: precedenti affinis, differt thorace omnino miniato cincto, scutello nigro, margine costali hemelytrorum flavotestaceo. Long. 14, lat. 3½ millim. — Mexico.

DIACTOR (Perry).

1. *D. discolor*: supra rufotestaceus, punctatus; antennarum art. 3 ultimis fuscis, 2 basi, 3 basi et apice, 4 apice flavotestaceis; subtus cum pedibus flavotestaceus, tibiis posticis valde dilatatis, rufotestaceis, basi, apice maculaque subtransversa irregulari, tarsisque posticis flavotestaceis. Long. 17, lat. 4½ millim. — Taiti.

ALYDUS (Fabr.).

1. *A. pulcher*: flavotestaceus, supra nonnihil obscurior; antennarum art. 2 basalibus (reliqui desunt), femorum posticorum apice, tibiisque posticis, medio valde curvatis, nigris; femoribus posticis intus nigrogranulosis. Long. 17, lat. 3½ millim. — Honduras.

ANASA (H. Sch.).

1. *A. maculiventris*: nigra; antennarum art. ultimo dilute flavescente; maculis marginalibus et disci abdominis sordide flavis; basi femorum dilute cinnebarina. Long. 15, lat. 6 millim. — Remedios Columbiæ.

LYGÆUS (Fabr.).

1. *L. rubricosus*: ruber; capite nigro, macula utrimque rubra; thoracis fascia antica, vittis 2 mediis, cum illa confluentibus, angulisque humeralibus, scutello, hemelytrorum sutura clavi maculaque corii, maculis pectoris, maculis intramarginalibus et disci abdominis, antennis pedibusque nigris. Long. 9, lat. 4 millim. — Lusitania.

OXYCARÆNUS (Fieber).

1. *O. maculatus*: niger, valde punctatus; corii macula basali membranæque margine basali albidis; tibiis posticis late albidopunctatis. Long. 6, lat. 2 millim. — Caput bonæ spei.

GEOCORIS (Fall.).

1. *G. flavipes*: capite, marginibus lateralibus thoracis hemelytrisque rufoflavescens; thorace, scutello, abdomine antennisque, art. ultimo dilute flavotestaceo excepto, nigris; hemelytris limbo fuscopunctato; pedibus dilute flavotestaceis. Long. 4, lat. 2 millim. — Java.
2. *G. signicollis*: flavotestaceus; capite basi fusco; antennarum art. 1 toto, 2 et 3 basi, thoracis maculis 2 magnis fere semicircularibus incurvis, scutelloque, apice excepto, nigris; hemelytris dilute flavotestaceis, membrana albidohyalina; abdomine subtus fuscotesta-

ceo, vitta utrimque nigricante; femoribus fuscotestaceis, tibiis flavotestaceis. Long. $3\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — Syrkut Nubiæ.

3. *G. Mauriti*: præcedenti subsimilis, niger punctatus; antennarum art. ultimo thoraceque utrimque flavotestaceis; hemelytris dilute flavotestaceis, membrana albidohyalina; femoribus fuscocastaneis, tibiis flavotestaceis. Long. 3, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — Isle de France.
4. *G. tristis*: niger, impresso-punctatus; oculis rufoferrugineis; antennis apicem versus fuscotestaceis; hemelytris griseoflavescens, membrana albida, pedibus dilute flavotestaceis. Long. 3, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — California.
5. *G. pallens*: sordide flavoalbidus; antennis fuscis; capitis macula late quadrata, thorace anterieus scutelloque, marginibus lateralibus exceptis, nigris; corio apice ad membranam albidam striola brunnescente; subtus utrimque vitta nigrofusca; pedibus flavoalbidis. Long. $3\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — California.

DERMATINUS (Stål).

(Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1853, p. 260.)

1. *D. lugens*: capite, antennarum art. basali, abdomine femoribusque nigropiceis; antennarum art. 3 ultimis, tibiis tarsisque fuscotestaceis; thorace, scutello hemelytris fuscotestaceis vel sordide ochraceis, dense fuscopunctatis. Long. 6—7, lat. $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ millim. — Caput bonæ spei.

PHYSOPELTA (Am. et Serv.).

1. *P. rubricosa*: rufescens; antennis, membrana, margine basali segmentorum abdominis nigris; pedibus nigropiceis. Long. 16, lat. 7 millim. — China.
2. *P. hæmorrhoidalis*: rufa; antennis, art. ultimo dilute flavotestaceo excepto, scutello, membrana anguste albidomarginata, maculis 2 utrimque pectoris, abdomine, ano excepto, pedibusque nigris. Long. 16, lat. 6 millim. — Manilla.

DYSDERUS (Am. et Serv.).

1. *D. bimaculatus*: dilute sordide flavotestaceus; antennis nigricantibus; thorace apice albidomarginato; corio macula nigricante; pectore lutescente-maculato; abdomine segmentis basi anguste nigris. Long. 13—15, lat. 5—6 millim.
2. *D. albidiventris*: flavus; capite femoribusque rufotestaceis; tibiis tarsisque fuscis; thorace anterieus testaceo, albidomarginato, posterius cum scutello nigro; macula corii membranaque nigrofusca, hac anguste albidomarginata; subtus albida, nitida, pectore utrimque maculis tribus flavotestaceis. Long. 11, lat. 4 millim. — Mexico.

CAPSUS (Fabr.).

1. *C. circummaculatus*: niger; capite subtus, rostri basi, thoracis pectorisque marginibus lateralibus, illius etiam antico et lineæ lon-

gitudinali apicali, abdominis maculis marginalibus et disco fulvis. Long. 6, lat. $2\frac{3}{4}$ millim. — Chili.

2. *C. Schjodtei*: niger, nitidus; scutelli apice, fascia lata fere basali hemelytrorum, macula basali abdominis, coxis femoribusque basi dilute flavis. Long. 3, lat. 1 millim. — Sicilia.

BRACHYRHYNCHUS (Laf.).

1. *B. chilensis*: fuscoferrugineus, confertim granulosis; thorace antèrius callis 4 longitudinalibus, granulosis, instructo; membrana dilute fusca; antennarum art. ultimo apice imò tarsisque testaceis. Long. $8\frac{1}{2}$, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — Chili.

ACANTHIA (Fabr.).

1. *A. foeda*: *A. lectularia* valde affinis; differt corpore nonnihil minus piloso, thorace angustiore, lateribus minus dilatatis, angulis anticis minus productis; hemelytris parum subtilius punctatis, apice late rotundatis. Long. 5, lat. $2\frac{3}{4}$ millim. — Remedios in Nova Granada.

SPINIGER (Burm.).

1. *S. luteoguttatus*: ater; thorace tuberculis quatuor transversim positis flavotestaceis, basi utrimque scutelloque apice valide spinosis; hemelytris basi apiceque macula lutea. Long. 32, lat. 7 millim. — Brasilia.
2. *S. ochripennis*: hemelytris, antennis tibiis tarsisque flavotestaceis; thorace fusco, longe 4-spinoso; pectore, abdomine pedibusque fuscotestaceis. Long. 30, lat. 6 millim. — Brasilia.
3. *S. femoralis*: niger; antennarum art. 2 basalibus, hemelytris, tibiis tarsisque sordide testaceis; thorace antèrius medio bispinoso, utrimque tuberculato, basi utrimque spinoso. Long. 18, lat. 4 millim. — Buenos Ayres.

ECTRICHODIA (Lep. et Serv.).

1. *E. semirufa*: obscure violacea; capite, thorace antèrius, rostro pedibusque anticis miniatis; antennis hemelytrisque atris. Long. 13, lat. 4 millim. — Pulo Penang.
2. *E. bicoloripes*: nigrochalybea; antennis, pedibus posterioribus hemelytrisque nigricantibus; thorace postèrius pedibusque anticis miniatis. Long. 12, lat. 4 millim. — India orientalis?

HAMMATOCERUS (Burm.).

1. *H. luctuosus*: niger; macula magna media hemelytrorum sordide albida. Long. 21, lat. 5 millim. — Mexico.

CETHERA (Am. et Serv.).

1. *C. annulipes*: sordide flavoalbida, rugosopunctata; capite basi, thorace, marginibus lateralibus exceptis, scutello, clavo fere toto,

maculis corii et parte basali membranæ nigrofuscis; femoribus fuscovariis, tibiis fusco-triannulatis. Long. 9, lat. 3 millim. — Remedios Columbiæ.

PLÆOGASTER (Am. et SERV.)

1. *P. modestus*: testaceus, pedibus posterioribus dilute flavotestaceis; abdomine nigricante, basi utrimque flavoalbido. Long. 20, lat. 7 millim. — Pulo Penang.

HARPACTOR (FARR.)

1. *H. albosparsus*: capite, antennis thoraceque antice nigris, hoc ante medium bispinoso, spinis bisetiferis, postice albido, fascia curvata intramarginali fusca; antennarum art. 2 et 3 basi albidis; hemelytris rufis, cum membrana nigra albosparsis; pedibus flavotestaceis, obscurius maculatis, parce setosis, tibiis anticis et posticis apicem versus nigris; abdomine et pectore fuscis, alboverrucosis. Long. 10, lat. 2½ millim. — Minas Geraes.

PHONOLIBES (N. Gen.).

Caput cylindricum, ante oculos conicoproductum, basi constrictum, collo brevissimo. Antennæ capite ter longiores, crassiusculis, art. 1 et 3 longitudine æqualibus, reliquis crassioribus, 2 his tertia parte brevior, 4 hoc dupplo longior. Thorax subtransversus, convexiusculus, antice transversim, medio longitudinaliter leviter impressus, basi late emarginatus. Scutellum late triangulare, longitudinaliter carinatum, carina basi furcata. Hemelytra corii cellula intramarginali reticulato-nervosa. Pedes mediocres, tarsis brevibus, art. basali brevissimo, ultimo longissimo.

1. *P. venustus*: miniatus; antennis, thoracis margine antico maculisque 2 approximatis mediis, pectore, maculis utrimque abdominis anoque, pedibusque nigris; hemelytris obscure violaceis. Long. 12, lat. 4 millim. — Sierra Leona.

SACCODERES (SPIN.).

1. *S. excavatus*: sordide flavotestaceus; antennis, capite postice, femoribus posticis apice, tibiis posticis ultra medium nigris; thorace valde vesiculoso, antice posticeque compresso, medio utrimque producto, medio valde excavato, sordide albido, parce fuscosericeo; spiraculis albomaculatis. Long. 12, lat. 4 millim. — Brasilia.

CIMBUS (HARR.).

1. *C. ? terreus*: obscure fuscotestaceus, punctatus, fere totus pilosus; membrana magna, nigra. Long. 14, lat. 5 millim. — Nova Hollandia.

HALOBATES (ESCH.).

1. *H. lituratus*: *H. picto* similis; sordide flavotestaceus; thorace margine antico, lineis 4 fere basalibus abbreviatis, mediis utrimque

oblique transversis, curvatis, media longitudinali, laterali utrimque subrecta, nigrofuscis; femoribus anticis utrimque longitudinaliter, tibiis tarsisque totis nigricantibus. Long. 5, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — China.

MONONYX (LAP.).

1. *M. amplicollis*: oblongo-ovatus, ochraceus, confertim granulosus; capite apice trituberculato; thorace lateribus valde dilatatis, basi utrimque levius, medio magis sinuato; scutello convexo, longitudinaliter biimpresso; membrana dilute flavotestacea; subtus cum pedibus nigropiceus, abdominis margine ochraceomaculato; femoribus anticis intus late flavotestaceis. Long. 13, lat. 9 millim. — Antiochia Columbiæ.
2. *M. bipunctatus*: late ovatus, flavotestaceus, granulosus; hemelytris medio macula parva oblonga nigra; subtus fuscus, abdomine margine flavotestaceo-maculato, vittaque similiter colorata, interdum obsoleta, utrimque instructo; pedibus fuscoannulatis. Long. 9, lat. $6\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.
3. *M. obscurus*: late ovatus, subtiliter granulosus; capite thorace scutelloque fuscis, thoracis marginibus, præsertim basali, interdum dilutioribus, fuscomaculatis; hemelytris fuscotestaceis, fusco-irroratis; subtus nigropiceus, abdominis margine et disco sordide flavovariis; femoribus dilute piceis, posterioribus testaceoannulatis, tibiis dilutioribus. Long. 10, lat. $6\frac{1}{2}$ millim. — Mexico.
4. *M. alaticollis*: late ovatus, totus granulatus; capite flavotestaceo, basi utrimque nigrofusco; thorace scutelloque nigricantibus, illo lateribus valde rotundato-dilatatis, dilute flavotestaceis, hoc longitudinaliter trielevato; hemelytris fuscotestaceis, nervis elevatis; pedibus testaceis, femoribus ultra medium picescentibus; abdomine fuscopiceo. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. 5 millim. — Nova Hollandia.

GALGULUS (LATR.).

1. *G. pulcher*: supra densissime subtiliter granulosus, fusco et albedo undulato-variegatus; thorace convexo, inæquali, transversim subimpresso, utrimque exciso et basi angulariter dilatato; scutello trituberculato; margine exteriori clavi obsolete rufescente; subtus nigricans, albidovarius; pedibus albidis, fuscoannulatis. Long. 7, lat. 5 millim. — Mexico.

NAUCORIS (GEOFFR.).

1. *N. obscuripennis*: ovalis, ruguloso-punctatus; capite, thorace pedibusque flavotestaceis, illis inæqualiter scervatim fuscoirroratis; scutello nigro; hemelytris nigropiceis, macula oblonga marginali basali flavotestacea; abdomine subtus fuscopiceo, margine flavomaculato. Long. 8, lat. 5 millim. — Manilla.

BORBOROTREPHES (N. Gen.).

Corpus magnum, ellipticum. Caput intra oculos latitudine dupplo longius, conico productum. Antennæ art. 1 subgloboso, 2 et 3 illo

parum brevioribus, intus dilatatis, extus ramulum longum, curvatum singulo emittentibus, ultimo his ter longiore, crassiusculo, apicem versus sensim acuminato. Rostrum capite nonnihil longius, subdepressum, art. 1 et 2 longiusculis, ultimo his dimidio brevior. Thorax convexiusculus, antice leviter sinuatus, lateribus obliquis, subrectis. Scutellum triangulare, æquilaterum. Membrana subindistincta, reticulatonervosa, margine longitudinaliter nervosa. Pedes longiusculi, graciles, femoribus vix incrassatis, præsertim posterioribus subcompressis; tarsis omnibus dimeris, biunguiculatis, anticis brevibus, intermedis his dupplo, posticis tripplo longioribus, unguiculis, præsertim anticis minutis. *Appaso*, generi mihi invisio, affinis, ut videtur.

1. *B. Hedenborgi*: fuscotestaceus, parce flavosericeus; thorace medio transversim impresso, impressione marginem lateralem non attingente; scutello rugoso, obscuriore; pedibus fuscoferrugineis, unicoloribus. Long. 51, lat. 23 millim. — Aegyptus.

ZAITHA (Am. et SERV.).

1. *Z. cupreomicans*: sordide flavotestacea, nonnihil cupreomicans, præsertim hemelytris; thorace marginibus dilutioribus, fuscosparsis, pone medium transversim lineariter impresso, antierius bifoveolato: scutello medio rugoso, macula quadrata fusca; margine hemelytrorum abdominisque dilutior, cum pedibus fuscoparso, his etiam fuscoannulatis. Long. 30—35, lat. 15—16 millim. — Mexico.

BELOSTOMA (LATR.).

1. *B. collosicum*: capite nigropiceo, fronte utrimque luteo maculata: vertice longitudinaliter subcarinato; thorace rugoso, utrimque nonnihil dilatato et leviter rotundato, antierius fuscopiceo, marginibus ochraceis, fuscoirroratis; scutello nigropiceo, antierius transversim impresso; hemelytris fuscotestaceis, clavi et corii marginibus exterioribus dilutius variegatis; subtus nigricans; femoribus anticis validis, terreis, tibiis tarsisque anticis nigropiceis, extus dilutioribus; pedibus posterioribus nigrofuscis, ochraceoannulatis, tarsis nigricantibus. Long. 78, lat. 32 millim. — Honduras.
2. *B. harpax*: sordide flavotestaceum; thorace antierius nigro, posterius fusco-maculato et irrorato, marginibus lateralibus dilutioribus; clavo, corii parte interiore et margine antico fuscoirroratis: pectore antierius utrimque macula, posterius vitta, medio maculis pluribus nigrofuscis; pedibus fuscoirroratis; unguiculis basi dilute picescentibus, apice nigris. Long. 57, lat. 22 millim. — America borealis.
3. *B. niloticum*: dilute sordide flavotestaceum; capite thoraceque præsertim antierius, hujus marginibus lateralibus vittisque 2 angustis disci exceptis, fuscoirroratis; scutello basi utrimque maculaque magna quadrata media confertim nigrofuscoirroratis; hemelytris præsertim marginibus clavi et corii, hujus etiam nervis, fuscobrunneoirroratis; femoribus anticis fuscoirroratis; pedibus posterioribus intus acervatim, extus remote fuscoirroratis; unguicu-

lis apice nigris. Long. 61, lat. 23 millim. — Sennear, in flumine Bahr el Abiad.

4. *B. patruela*: præcedenti valde simile et affine, differt thorace anteriorius minus convexo, lateribus magis obliquis et ut videtur postice latiore, hemelytris obscurioribus, parvissime vel solum marginibus exterioribus clavi et corii fuscoirroratis, tibiis posterioribus et præsertim tarsis posticis extus magis dilatatis et rotundatis. Long. 65, lat. 24 millim. — Ins. Rhodus.

TELMATOTREPES (N. Gen.).

Genus *Nepæ* affine. Thorax transversus, subrectangulus, antice profunde emarginatus, basi subtruncatus. Scutellum late triangulare. Hemelytra clavo a corio non distincto, pone medium latissima, dein apicem versus sensim rotundata; membrana nulla vel minima. Aidothecæ appendices abdomine plus dimidio breviores.

1. *T. sculpticollis*: terreus; thorace longitudinaliter quadricostato, costis exterioribus apice cum alia obliqua cohærentibus; scutello medio longitudinaliter bicarinato, apice gibbo; abdomine supra ferrugineo? Long. 30, lat. 15 millim. — Antiochia Cumbiæ.

NEPA (LIN.).

1. *N. tristis*: nigricans; abdomine supra obscure sanguineo; femoribus posterioribus apicem versus griseoannulatis. Long. 30, lat. 9 millim. — Nova Hollandia.

N. rubra affinis, sed differt thorace et scutello distinctius granulatis, femoribus anticis brevioribus, ut et colore obscuriore, subtus nigro.

RANATRA (FABR.).

1. *R. annulipes*: flavotestacea; hemelytris fusciscentibus testaceis; pedibus obsolete fuscoannulatis; spiraculis nigrofuscis. Long. 30, lat. 3½ millim. — Brasilia.

NOTONECTA (LIN.).

1. *N. sinica*: sordide flavoalbida; fronte apicem versus lutescente; thorace posteriorius interdum nigropellucido; scutello macula basali sat magna nigra; abdomine supra nigricante; hemelytris subhyalinis, flavoalbidis; abdomine interdum et pectore subtus nigrovariis. Long. 10, lat. 4 millim. — China.

PATYPLEURA (AM. ET SERV.).

1. *P. Afzelii*: testacea; fronte transversim fuscolineata, vertice macula ocellos circumdante, linea utrimque transversa, lineaque inter oculos et frontem, nigris; thorace utrimque angulariter dilatato, vitta media, macula oblonga utrimque disci, impressionibusque nigris; scutello maculis 4 basalibus, mediis 2 majoribus, vitta obliqua utrimque, vittaque media, nigrofuscis; hemelytris basi flavotestaceis, opacis, subsericeis, ante medium maculis fusciscentibus, dein

hyalinis, cellulis maculis dilute fuscis, nervis transversis fuscocinctis, nervis longitudinalibus apicem versus maculis fuscis; alis dimidio basali fusco, dein albidohyalinis. Long. corp. 22, exp. al. 64 millim. — Sierra Leona.

DUNDUBIA (Am. et SERV.).

1. *D. fasciceps*: sordide flava; capite fascia apicali intraoculari nigricante; hemelytris abdomine plus dimidio longioribus, albobyalinis, nervis flavescens; subtus cum pedibus flavoalbida; operculis abdomine dimidio brevioribus, cum sutura inter se tegentibus, subparallelis, apice rotundatis. Long. corp. 26 millim. — China.

FIDICINA (Am. et SERV.).

1. *F. sericans*: dilute olivacea, dense sericea; scutello abdomineque supra nigrosericeis, capite thoraceque flavo et nigrosericeis; subtus flavosericea; hemelytris abdomine dupplo longioribus, costa fusco-brunnea, nervis lutescentibus, pone medium nigris; pedibus flavotestacea. Long. corp. 28 millim. — Brasilia.
2. *F. vinula*: capite thoraceque dilute olivaceis; scutello obscure rufo-testaceo, vitta utrimque obliqua nigra, margine flava, dense flavo-albidopiloso; hemelytris abdomine dupplo longioribus, costa ultra medium virescente, dein nigroolivaceo, nervis basi dilute, dea obscure olivaceis; subtus cum pedibus dilute flavotestacea. Long. corp. 27 millim. — Brasilia.

CICADA (LIN.).

1. *C. fuscovenosa*: flavotestacea; capite nigrofulco; thorace medio vitta inæquali nigra, utrimque nigroirrorato; scutello nigrofulco, vittis 2 angustis dilutioribus, margine flavosericeo; hemelytris abdomine dupplo longioribus, costa dilute flavotestacea, nervis, longitudinalibus 2 et 3 medio, 4 et 5 totis flavescens exceptis, fuscis et fuscocinctis; subtus cum pedibus dilute flavotestacea; abdominis dorso nigrofulco. Long. corp. 18 millim. — Brasilia.
 2. *C. Drewseni*: capite flavo, vertice fascia lata nigra; thorace dilute olivaceo; scutello obscure testaceo, maculis 4 oblongis basalibus, lateralibus majoribus, nigris; hemelytris abdomine dupplo longioribus, costa ultra medium viridi, nervis nigrofulcis; subtus cum pedibus flavescens. Long. corp. 18 millim. — Minas Geraes.
- Variat tota obscurior.

3. *C. macrophthalma*: flavovirescens; fronte producta, transversim nigrolineata, vertice posterius nigricante, oculis valde prominulis; thorace lineis 2 longitudinalibus anticis, aliaque transversa posteriore intramarginali, nigris; scutello macula oblonga utrimque, vittis 2 angustis pone medium furcatis, lineisque inter has 4 longitudinalibus, 2 et 2 apice confluentibus, nigris; hemelytris abdomine plus dupplo longioribus, costa viridiflavescens; nervis pone medium fuscis, apicem versus margine macula fuscescente ornatis. Long. corp. 20 millim. — Brasilia.

4. *C. cinctomaculata*: flavotestacea; fronte antice utrimque, vertice ad oculos et medio nigrofuscis; thorace vitta utrimque lineaque antica intramarginalibus, vittaque media biforca nigris; scutello maculis 4 anticis oblongis dilute rufotestaceis, nigrocinctis, litura media foveolisque 2 nigrofuscis; hemelytris abdomine plus dupplo longioribus, nervis longitudinalibus virescentibus, medio abrupte nigris, apicem versus fuscis, transversis omnibus fuscis vel fuscomaculatis; alis nervis transversis apicalibus fuscomaculatis. Long. corp. 26, lat. 16 millim. — Venezuela.
5. *C. perpulchra*: flavovirescens; fronte transversim fuscolineata; scutello maculis 2 basalibus oblongotriangularibus nigrofuscis; hemelytris abdomine plus dupplo longioribus, costa flavovirescente, nervis flavotestaceis, transversis fuscomaculatis, longitudinalibus apicem versus et apice maculis dilute fuscescentibus. Long. corp. 27 millim. — Brasilia.
6. *C. Sahlbergi*: flavotestacea; fronte vitta utrimque fusca, vertice nigromaculato; thorace impressionibus nigrovittatis; scutello maculis 2 oblongo-triangularibus vittaque utrimque nigris; hemelytris abdomine dupplo longioribus, apice macula fusca ornatis, costa nervisque flavotestaceis, his pone medium fuscis, nervo transverso primo fuscocincto; femoribus anticis subtus, tibiis anticis totis, intermediis apice nigrofuscis. Long. corp. 18 millim. — Brasilia.
7. *C. Steveni*: nigricans; vertice antice ad oculos macula flavescente; thorace flavovario; scutello marginibus lateralibus, vittis 2 mediis, apiceque flavis; segmentis abdominis anguste flavomarginatis; hemelytris abdomine dimidio longioribus, alisque nervis transversis 3 primis fuscomaculatis. Long. corp. 23 millim. — Russia meridionalis.
8. *C. misella*: testacea; fronte medio, vertice posterius nigris; scutello maculis 4 basalibus, 2 mediis confluentibus, nigris; hemelytris abdomine dupplo longioribus, nervis fuscis, costa flavescente, medio curvata; abdomine pedibusque dilute flavotestaceis. Long. corp. 9 millim. — Minas Geraes.
9. *C. pulcherrima*: virescens; capite nigro; thorace utrimque macula magna flavotestacea, vittis 2 obliquis fuscis includente; scutello vittis 2 fuscis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, nervis fuscis, costa flavotestacea; subtus cum pedibus anticis flavotestacea, pedibus posterioribus flavovirescentibus. Long. corp. 9 millim. — Brasilia.
10. *C. casta*: dilute rufoflavescens; hemelytris abdomine dimidio longioribus, costa rufotestacea, nervis testaceis; abdomine subtus segmentis apice anguste sanguineomarginatis. Long. corp. 16 millim. — Brasilia.
11. *C. severa*: supra nigra; thoracis scutellique marginibus lateralibus, hujus etiam maculis 2 oblongis flavis; subtus flava; pectore medio, macula media segmentorum ventris, nigris; pedibus anterioribus tibiisque posticis nigris, femoribus anticis flavovittatis, intermediis

apice flavia, tibiis intermediis basi flavoannulatis, posticis flava.
Long. corp. 16 millim. — Patria ignota.

12. *C. gastrica*: nigra: thorace obscure ferrugineo, nigromarginato; scutello marginibus lateralibus, maculisque 2 oblongis flavis; hemelytris abdomine dimidio longioribus, nervis dilute flavotestaceis; abdomine subtus sanguineo, supra segmentis sanguineomarginatis. Long. corp. 13 millim. — Patria ignota.

HUECHYS (Am. et SERV.).

1. *H. fumigata*: capite, thorace scutelloque nigris, horum marginibus lateralibus, vitta media thoracis maculaque scutelli, flavis; hemelytris fuscovinaceis, costa nervisque dilute flavotestaceis, alis dilute vinaceo-hyalinis; abdomine femoribusque testaceis, illo dorso nigricante; tibiis tarsisque nigropiceis. Long. corp. 12, exp. al. 23 millim. — India orientalis.

HOTINUS (Am. et SERV.).

1. *H. ponderosus*: *H. clavato* affinis; rostro capitis corporis dimidia longitudine, cylindrico, nigropiceo, apice elevato, testaceo; thorace scutelloque flavotestaceis, hoc maculis 4 basalibus et 2 pone medium, nigris; hemelytris sordide albidis, parce albofarinosis, fascia media albomaculata maculisque 2 ad marginem anticum ante medium, unaque ad marginem suturalem, nigris, maculis monnulis disci apiceque fuscis, hoc albidomaculato, alis sorde albidis, subhyalinis, apice dilute fuscis; abdomine flavotestaceo, segmentis testaceomarginatis; pedibus rostroque nigris, femoribus posticis ultra medium flavotestaceis. Long. corp. 38, exp. al. 88 millim. — India orientalis.

ENCHOPHORA (SPIN.).

1. *E. Bohemani*: flavotestacea; capitis cornu vertice cum prothorace longiore, recurvo, apicem versus compresso, et utrumque dilato, exciso, apice nigro; hemelytris dilute carneis, apice sordide adhuc dilutioribus, fasciis 2 obliquis intus subevanescentibus, nonnihil obscurioribus, ornatis; alis abdomineque supra sanguineis, illis apice dilute fuscis. Long. corp. 20, exp. al. 51 millim. — Brasilia.

APHANA (BURM.).

1. *A. nigroirrorata*: vertice scutelloque nigrofuscis; hoc utrumque maculis nonnullis parvis sordide albidis, thorace hemelytris dilute testaceis, fuscopunctatis et irroratis, his etiam nigromaculatis; alis luteis, disco maculis 4 vel 5 minutis albohyalinis, posterius nigromaculatis, apice nigris, alboviolaceo-irroratis; abdomine supra sanguineo; pedibus nigricantibus, sordide albidoannulatis. Long. corp. 17, exp. al. 45 millim. — China.
2. *A. lanifera*: capite flavotestaceo, margine basali frontis lateribusque labri nigrofuscis; thorace, hemelytris pedibusque rufoferrugineis, his nonnihil dilutioribus; hemelytris margine dilute fuscis, nigro-

maculatis; alis fuscis; abdomine apice lanato. Long. 12, lat. 5 millim. — Nova Hollandia.

3. *A. sanguinipes*: capite sordide flavotestaceo; thorace scutelloque obscure rufotestaceis; hemelytris nigrofuscis, fasciis 2 indistinctis maculisque nonnullis posticis flavofarinosis; subtus cum pedibus sanguinea. Long. 8, lat. 4 millim. — India orientalis.

LYSTRA (FABR.).

1. *L. exsiccata*: dilute sordide flavotestacea; vertice linea longitudinali media, lineisque 2 anticis thoracis nigrofuscis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, sordide hyalinis, basi fasciae angusta indistincta ante medium fuscis, nervis parce fuscosparsis; pedibus fuscoirroratis. Long. 12, lat. 6 millim. — Brasilia.

PSEUDOPHANA (BURM.)

1. *P. suturalis*: dilute lutescens; capite parum producto, vertice longitudine latitudine æquali, fronte media longitudinaliter tricarinata, carinis lateralibus basi nigris; hemelytris abdomine vix dupplo longioribus, vitreis, sutura ante medium fuscescente, stigmate dilute flavotestaceo; tarsis apice infuscatis. Long. 9, lat. 3 millim. — Brasilia.

DELPHAX (FABR.).

a. Antennis capitis latitudine dupplo longioribus.

1. *D. obscuripennis*: fronte elongata, medio unicarinata, genisque fuscis, flavofasciatis; thorace 3-carinato, sordide flavescens, scutello nigricante, 5-carinato; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, fuscis, apice albidis, nervis granulatis; subtus fusco albidoque varia; femoribus fuscis, tibiis tarsisque dilute flavotestaceis, anterioribus fuscoannulatis. Long. 8, lat. 3 millim. — Brasilia.
2. *D. placida*: dilute flavotestacea, fronte unicarinata genisque fuscis, sordide flavofasciatis; thorace 3-carinato, scutello 5-carinato; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, sordide albidohyalinis, apice dilute fuscomaculatis, nervis flavotestaceis, disco parce brunnescente-lineatis; femoribus antennarumque art. ultimo fuscotestaceis, tibiis anterioribus fuscoannulatis. Long. 9, lat. 3 millim. — Brasilia.
3. *D. annulipes*: griseoflavescens; fronte unicarinata, medio utrumque fuscomaculata, serie quadrupla punctorum fuscorum ornata, antennarum art. ultimo apice fuscescente; prothorace 3-carinato, scutello 5-carinato; hemelytris abdomine parum longioribus, nervis nonnihil obscurioribus, parce abrupte fuscolineatis; tibiis tarsisque fuscoannulatis. Long. 5, lat. 2½ millim. — Ins. Guam vel Guahon.

b. Antennis capitis longitudine æqualibus vel brevioribus.

4. *D. Bohemani*: griseoflavescens; fronte verticeque angusto marginibus valde elevatis, dilatatis; thorace brevissimo, apice valde emargi-

- nato; scutello tricarinato (?); hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, sordide flavogriseis, fascia media fusca ornatis, nervis dense fuscogranulosis. Long. 5, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — Isle de France.
5. *D. caliginea*: fusca; fronte marginibus elevatis; thorace brevissimo, postice valde emarginato; scutello obsolete tricarinato; hemelytris abdomine dupplo longioribus, fuscobhyalinis, macula pone medium costali sordide albida; alis fuscescentibus; pedibus dilute flavotestaceis, tibiis anticis infuscatis. (Antennæ desunt). Long. $5\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — Ins. Taiti.
 6. *D. concinna*: fronte unicarinata, basi dilute fuscescente, labro utrinque macula fusca; hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidis, hyalinis, fascia obliqua ante medium vittaque apicali semilunata fuscescentibus, nervis fuscopunctatis; pedibus flavoalbidis, nigropunctatis. Long. 4, lat. 1 millim. — Mexico.
 7. *D. pulchra*: flavescens; fronte unicarinata; thorace scutelloque fuscescentibus, subtricarinatis; hemelytris abdominis fere longitudine, flavescente-hyalinis, disco macula magna, triangulari, fusca; tarsis apice imo fuscis. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim. — Ins. Honolulu.
 8. *D. granulinervis*: fuscotestacea; fronte unicarinata, carina a medio basin versus furcata; thorace scutelloque tricarinatis; hemelytris abdomine dimidio brevioribus, grisescentibus, nervis distincte fuscogranulatis; tibiis anticis apice fuscescentibus. Long. $1\frac{1}{2}$, lat. 1 millim. — Ins. Guam.
 9. *D. lugens*: dilute fuscotestacea, abdomine obscuriore; fronte unicarinata; scutello obsolete, thorace distincte tricarinatis; hemelytris abdomine plus dimidio brevioribus, sordide hyalinis, limbo apicali sordide albido, nervis granulatis. Long. $2\frac{3}{4}$, lat. $1\frac{1}{4}$ millim. — Java.
 10. *D. seminigra*: capite, thorace pedibusque flavoalbidis; fronte unicarinata; thorace et scutello obsolete tricarinatis; hemelytris abdomineque nigris, illis coriaceis, abdomine parum brevioribus, nervis elevatis. Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim. — Rio Janeiro.

ISSUS (Fabr.).

1. *I. testudinarius*: obscure ferrugineus; fronte medio longitudinaliter, basi transversim carinata; hemelytris coriaceis, nervis longitudinalibus elevatis; subtus flavotestaceus; pedibus flavotestaceis, femoribus anticis totis, posticis apice fuscescentibus; abdomine medio fusco. Long. 8, lat. 6 millim. — Pulo Penang.
2. *I. malayus*: *I. longipenni* affinis et statura similis; fronte basin versus angustiore, medio tantum unicarinata, vertice angustiore, quadrato, hemelytrisque nonnihil angustioribus magisque parallelis præsertim differt; fronte medio maculis 2 fuscescentibus; scutello tricarinato, inter carinas et utrimque nigrofusco; hemelytris subferrugineis, margine costali dilutiore. Long. 9, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — Malacca.

3. *I. cinclifrons*: sordide flavescens; fronte tricarinata, carinis lateralibus basin versus confluentibus, media medio abbreviata, margine toto nigro, maculis vel callis minutis flavidis dense sparso; hemelytris dilute sordide virescente-subhyalinis, maculis pluribus minutis viridibus circa suturam ornatis; alis fuscis. Long. 8, lat. 3 millim. — Brasilia.

HYSTEROPTERUM. (AM. & SERV.)

1. *H. arctum*: valde compressum; fronte elongata, medio unicarinata, carinis marginalibus sat elevatis, basin versus maculis 2 nigris, pone medium linea longitudinali punctisque fuscis, his serie positis; thorace abdomineque dilute virescentibus; hemelytris ad suturam pone medium gibbosis, reticulatonervosis, sordide flavohyalinis, nervis dilute flavovirescentibus. Long. 6, lat. 2½ millim. — Minas Geraes.
2. *H. vitripennis*: dilute flavotestaceum; hemelytris extus late rotundatis, dilute vinaceohyalinis, nervis reticulatis, flavotestaceis. Long. 5, lat. 2 millim. — California.

RICANIA. (GERM.)

1. *R. malaya*: nigricans; maculis hemelytrorum, media minore, costali mox pone medium aliaque mox pone hanc limboque apicali albidohyalinis. Long. 6, exp. al. 22 millim. — Malacca.
2. *R. Møllerborghi*: testacea; hemelytris fuscis, plaga magna transversa maculisque marginis albidohyalinis. Long. 5, exp. al. 16 millim. — Java.
3. *R. seria*: testacea; hemelytris fuscis, basi, macula suturali ante medium maculisque 3 fere confluentibus prope suturam pone medium, dilutioribus; macula costali media albidohyalina, nervis viridibus instructa. Long. 5, exp. al. 14 millim. — Anjona.

FLATA. FABR.

1. *F. albata*: albida; hemelytris apice fasciis 2 fusciscentibus, pone medium fasciis 3 abbreviatis, obliquis, nigris; geniculis, tibiis tarsisque anterioribus nigrofuscis. Long. corp. 10, exp. al. 33 millim. — Malacca.

POECILOPTERA. (LATR.)

1. *P. fimbriolata*: flava; capite triangulariter producto, vertice obscure sanguineo; thorace scutelloque fulvovittatis, illo etiam vitta media obscure sanguinea; hemelytris truncatis, limbo toto obscure sanguineo, cellulis fundo dilutioribus; alis albidis. Long. 7, exp. al. 20 Millim. — Malacca.
2. *P. Cereris*: flavoviridis; capite triangulariter producto, thorace scutelloque flavotestaceis, his viridi-carinatis; hemelytris truncatis, angulo suturali apicali acute producto, nervis sordide flave-

scentibus, marginibus apicali et suturali-apicali maculis minutis fuscis ornatis; areolis nonnullis fundo dilutioribus; clavo granulato; pedibus flavoalbidis. Long. 9, exp. al. 22 millim. — China.

3. *P. limbellata*: capite, thorace, scutello pedibusque albidoflavis, ille inter oculos late rotundato; hemelytris albedo virescentibus, nervis flavis, margine costali flavoalbido, apicali luteo. Long. 6, exp. al. 16 millim. — Chili.
4. *P. vidua*: flavotestacea; hemelytris plaga magna oblonga, nigricante, apice fuscis. Long. 5, exp. alar. 14 millim. — India orientalis.

PHLEBOPTERUM.

Caput quadrato-productum; vertice convexo, subquadrato; fronte subcirculari, concavo; marginibus acutis, genis antrorsum obtuse angulariter productis. Thorax transversus, brevis, subarcuatus. Scutellum magnum, triangulare. Hemelytra abdomine dupplo longiora, basi sensim rotundata, dein parallela, latitudine dupplo longiora, apice truncata, nervis longitudinalibus, furcatis, inter se nervis transversis irregulariter conjunctis. Tibiæ anteriores subcompressæ.

1. *P. præmorsum*: dilute flavotestaceum; hemelytris dilute albidovirescentibus, nervis sordide flavescentibus, limbo antico et apicali maculis minutis fuscobrunneis dense ornato; clavo dense granulato, corio hic illic granulis sparso. Long. 7, expl. al. 16 millim. — Sierra Leona.

TROPIDUCHUS.

Vertex brevis, transversus, arcuatus, marginibus elevatis. Frons latitudine dupplo longior, basin versus sensim angustior, medio longitudinaliter unicarinata. Thorax brevis, arcuatus, marginibus elevatus, longitudinaliter carinatus. Scutellum magnum, rhomboidale, longitudinaliter tricarinatum. Hemelytra latitudine plus dupplo longiora, subparallela, nervis longitudinalibus, apicem versus furcatis, limbo costali et apicali transversim nervoso.

1. *T. sobrinus*: testaceus; hemelytris dilute olivaceohyalinis, fasciæ obsoleta basali maculaque oblonga obliqua apicem versus marginali dilute fuscescentibus. Long. 6, exp. al. 19 millim. — Sierra Leona.

ELASMOSCELIS. (Spin.)

1. *E. tagalica*: nigricans; capite albedo, carinis nigromaculatis, fronte disco nigricante; hemelytris disco marginibusque præsertim costali albidohyalino-maculatis; pedibus nigrofuscis, albidomaculatis et annulatis. Long. 7½, lat. 4½ millim. — Manilla.

Differt ab *E. cimicoide* statura majore, hemelytris apice latius truncatis, angulis apicalibus minus rotundatis.

2. *E. fuscofasciata*: flavotestacea; hemelytris albidis, subhyalinis, fasciis 3, quarum 2 posterioribus oppositè obliquis, ad saturam

confluentibus, limboque apicali fuscis; pedibus fuscis, tarsis flavotestaceis. Long. 8, lat. 5 millim. — India orientalis.

Carinae capitis in hac specie vix elevatae, sed vix hanc ob rem ad genus aliud referenda.

TETTIGOMETRA (LATR.)

1. *T. funesta*: capite antice rotundato; fronte flavotestacea, basi fuscotestacea, fascia media nigrofusca; vertice thoraceque flavotestaceis, fuscopunctatis et irroratis; hemelytris fuscis, parce brevissime subsericeis, macula ante medium transversa flavescente, fascia obliqua angulata pone medium apiceque denudatis, subnitidis, subdiaphanis; pedibus nigrofuscis, parce subtiliter flavo-irroratis. Long. 5, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — Sierra Leona.

UMBONIA. (BURM.)

1. *U. funesta*: statura *U. reclinatae*, nonnihil major; fuscocastanea, nitida, excavatopunctata; hemelytris fuscescentibus, margine basin versus obscurioribus; pedibus testaceis, tibiis macula media nigricante, tarsis nigropiceis. Long. 14, lat. 8 millim. — America centralis.

ULOPA. (FALL.)

1. *U. sordida*: dilute fuscotestacea, dense punctata; capite ante oculos semicirculari, utrumque impresso; thorace medio longitudinaliter, antice utrumque bis impresso; subtus nigrovaria; femoribus nigropiceis, tibiis tarsisque fuscotestaceis. Long. 5, lat. 2 millim. — Caput bonae spei.

CERCOPIIS. (FABR.)

1. *C. sumtuosa*: lutea; thoracis maculis 2 anticis confluentibus, 2 majoribus mediis hemelytrorum macula basali fasciisque 2 latissimis undulatis, apiceque nigris. Long. 15, lat. $6\frac{1}{2}$ millim. — Patria ignota.
2. *C. pictilis*: obscure viridichalybes; scutello basi utrumque apiceque dilute cinnabarino-maculato; hemelytris sordide albidis, margine basali fasciisque 2 dilute cinnabarinis, maculis, una minore ante fasciam primam, altera inter fasciam primam et secundam, apiceque nigrofuscis; femoribus rufis, tibiis nigricantibus. Long. 15, lat. 6 millim. — India orientalis.

MONCEPHORA. (AM. & SERV.)

1. *M. vinula*: dilute lutea; thorace posterius obscuriore, marginibus lateralibus nigris; hemelytris basi luteis, fascia pone basin nigrofusca, dein a medio sordide albido-subhyalinis, fascia apicali curvata nigrofusca. Long. 11, lat. 5 millim. — Brasilia.
2. *M. similutea*: capite, thorace, scutello, basi hemelytrorum, pectore femoribusque luteis; scutelli apice, hemelytris. basi excepta, ab-



domine, tibiis tarsisque nigris. Long. 11, lat. 4 millim. — Minas Geraes Brazilæ.

3. *M. semiflava*: flava; hemelytris pone medium nigrofuscis, ibique macula marginali et minore suturali lutescentibus; capite subtus, pectore, abdomine pedibusque rufis, tarsis fuscis. Long. 11, lat. 6 millim. — Brasilia.
4. *M. flavopicta*: capite, thorace scutelloque nigro æneis, illo maculis 2 anteocularibus luteis ornato; hemelytris nigrofuscis, clavo fere toto, fasciisque 2 corii flavis; subtus cum pedibus rufis, tarsis infuscatis. — Long. 10, lat. 5 millim. — Brasilia.
5. *M. ruforivulata*: obscure chalybea; hemelytris nigris, vittis, una obliqua clavi, 2 inæqualibus corii, apice confluentibus, rubris; segmentis abdominis apice anguste rubris; tibiis fusco-rufescentibus. Long. 15, lat. 8 millim. — Brasilia.
6. *M. ambriolata*: rubra; hemelytrorum marginibus vittaque media nigris; pectore abdomineque nigrovariis; tarsis apice nigrofuscis. Long. 12, lat. 6 millim. — Minas Geraes.

PTYELUS. (S: FARG.)

1. *P. frenulatus*: dilute flavotestaceus; fronte pectoreque fuscis, vitta utrimque, in frontis apice cum opposita confluenta, flava; vertice thoraceque longitudinaliter fuscolineatis; hemelytrorum basi, litura magna extorsum angulata striolaque apicali obliqua, fuscis. Long. 8, lat. 4 millim. — Java.
2. *P. lemniscatus*: flavus; vertice thoraceque transversim fusco-trilineatis; hemelytris fuscis, vittis, una basali, a basi clavi orta ad marginem costalem currente, altera pone illam obliqua, macula triangulari suturali apicæque fuscis; apicem versus ad suturam lineis 2 parvis fuscis. Long. 7, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — Java.
3. *P. phaleratus*: præcedenti subsimilis; capite flavescente, vertice transversim fuscobilineato; thorace antè flavo, fuscomarginali, postè fuscotestaceo; scutello fusco, medio longitudinaliter flavo; hemelytris fuscis, vitta basali, aliisque parva obliqua cum illa subconfluente, flavis, macula triangulari costali subapicali albidohyalina; pedibus dilute flavotestaceis, tarsis apice fuscis. Long. $5\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ millim.
4. *P. bipunctipennis*: dilute flavotestaceus, subsericeus; fronte transversim fuscolineata; hemelytris apicem versus ad suturam callo nigro; tarsis apice fuscis. Long. ♂ 5, ♀ 7, lat. 3—4 millim. — Java.
5. *P. caffer*: obscure ferrugineus, subtus niger; fronte pectoreque utrimque vitta flava, in apice illius cum opposita confluenta; hemelytris ad marginem costalem flavotestaceum vitta nigrofusca ornatis; pedibus anterioribus fuscis, posticis sordide flavotestaceis. Long. 6, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — Caput bonæ spei.

6. *P. viridicans*: dilute flavoviridis, punctatus; vertice, thoraceque antice dilute rufotestaceis; hemelytris punctatis, subhyalinis; pedibus dilute flavotestaceis, tibiaram posticarum spinis apice nigris. Long. 5, lat. 2 millim. — Java.

LEPYRONIA. (Am. & Szav.)

1. *L. concinna*: castanea; fronte nigricante, basi sordide flavotestacea, fuscolineata; hemelytris fascia ante medium angusta nervisque apicalibus dilute flavotestaceis, maculis, una basali, altera media majore, unaque suturali nigrofuscis; pedibus fuscoferrugineis. Long. 6½, lat. 3 millim. — Brasilia.
2. *L. moerens*: fuscotestacea; fronte dilute flavotestacea, basi transversim fuscolineata; hemelytris nigrofuscis, fascia ante medium obliqua, ad suturam clavi abbreviata maculaque oblonga marginali subapicali dilute flavotestaceis. Long. 5½, lat. 3½ millim. — Nova Hollandia.

CHALEPUS *). (WALKER.)

1. *C. pugionatus*: obscure rufoferrugineus, parce sericeus; cornu capitis triquetrum, carinis fuscis; fronte scutellique apice flavotestaceis, illo medio longitudinaliter nigrofusco; hemelytris fasciis 2 indistinctis nigris, fasciam flavotestaceam, suturam versus obscuriorem, includentibus. Long. 10, lat. 3 millim. — Nova Hollandia.

PETALOCEPHALA. (Stål.)

(Öfvers. af K. Vet. Ak. Handl. 1853, p. 266).

a. Caput latitudine brevius.

1. *P. Afzelii*: dilute flavotestacea; capite subtiliter rugulosopunctato, subparallelo, apice late rotundato, longitudinaliter subtriangulato, basi nigro-tripunctato, fronte subconvexiuscula; thorace fusco ferrugineo-punctato, ante medium punctis 8 majoribus (4, 4,) unaque utrimque ad angulum humeralem, nigris; subtus utrimque vitta obsoleta, fuscescente. Long. 11, lat. 3 millim.
2. *P. Wahlbergi*: dilute flavovirescens, dense punctata; capite lateribus subobliquis, late rotundatis, basi longitudinaliter quadriangulato, fronte medio planiuscula; thorace convexusculo, basi sinuato; hemelytris praesertim clavo, dense punctatis. Long. 11, lat. 4 millim. — Caffraria.

b. Caput latitudine longitudine aequale.

3. *P. Bohemani*: dilute flavescens, rugosopunctata; capite subparallelo, apice late rotundato; thorace basi leviter sinuato; hemelytris dense punctatis, costa basin versus flava. Long. 12, lat. 3½ millim. — Java.

*) Hoc nomine genus etiam Coleopterorum designatum; sed quorum genus a *Ptyelo*, *Aphrophora* etc. non distinctum mihi videatur, nomen mutare nolui.

4. *P. Paykulli*: flavoalbida; capite apice rotundato lateribus subobliquis, late rotundatis; thorace transversim subtiliter rugoso, basi late sinuato. Long. 8, lat. 2 millim. — Senegal, sec. Mus. Paykullii.

Gen. *Petaloccephala* a me prius ad *Aphrophorides* relatum, rectius ad *Scarides* pertinet.

GYPONA. (Gyax.)

a. Capite antierius vix dilatato.

1. *G. sordida*: dilute flavotestacea; capite nigro-, thorace brunneopunctato; scutello fuscomaculato, basi nigromaculato; hemelytris fuscostestaceis, suturam versus nigricantibus, nervis elevatis, areolis callis irregularibus, obscurioribus; pedibus fuscomaculatis. Long. 11, lat. 4 millim. — Minas Geraes.
2. *G. adspersa*: dilute flavotestacea, supra scervatim dense nigro-fuscopunctata; genis macula nigrofusca; fronte transversim fuscolineata; hemelytris nervis ferrugineis, areolis lituris ferrugineis, marginalibus nigricantibus, dense instructis; pedibus parce fuscomaculatis. Long. 11, lat. 4 millim. — Brasilia.
3. *G. interspersa*: flavoalbida; fronte transversim dilute fuscolineata; vertice scutello et praesertim thorace fuscopunctatis; hemelytris nervis utrimque fuscescente-punctatis, areolis longitudinaliter fuscomaculatis; femoribus anticis fuscomaculatis. Long. 10, lat. 3½ millim. — Brasilia.
4. *G. venosa*: dilute flavotestacea, subnitida; capite basi maculis 2, thorace antice maculis pluribus minutis, nigris; scutello basi utrimque fuscomaculato, medio lineis 2 transversis nigricantibus; hemelytris nervis 4 transversis mediis nigricantibus, fascia subapicali inaequali fusca, apice infumatis. Long. 8, lat. 3 millim. — Minas Geraes.
5. *G. prausta*: flavescens; hemelytris maculis 2 suturalibus et 2 mediis minutis nigrofuscis, macula suturali subapicali apiceque fuscis. Long. 8, lat. 3 millim. — Brasilia.
6. *G. sanguineosparsa*: flavescens, tota maculis minutis dilute sanguineis sparsa; fronte disco nigra; capite basi maculis 2, thorace anticis maculis pluribus, scutelloque medio maculis 2 minutis, nigris; hemelytris macula suturali subapicali dilute fuscescente. Long. 8, lat. 3 millim. — Brasilia.
7. *G. albidosparsa*: nigrofusca, maculis minutis albidis dense sparsa; scutello maculis 2 oblongis basalibus albidis; hemelytris fusco-brunneis, similiter pictis; pedibus dilute flavotestaceis, fuscomaculatis. Long. 7, lat. 3½ millim. — Brasilia.
8. *G. nigrina*: nigrofusca; fronte sordide albida, transversim fuscolineata; thorace antierius parce albidosparsa; hemelytris margine apicem versus fuscohyalinis; pedibus posticis extus flavotestaceis. Long. 6½, lat. 2½ millim. — Buenos Ayres.

9. *G. nigronevosa*: sordide flavescens; vertice nigro, maculis 4 flavis; thorace nigro, maculis utrimque 3 lineaque media flavis; scutello macula media nigra; hemelytris nervis, costali et subcostali exceptis, nigris. Long. 7, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — Minas Geraes.
10. *G. diluta*: dilute flavescens; nervis hemelytrorum flavis. Long. 12, lat. 4 millim. — Peru.

b. Capite antcrius dilatato.

11. *G. vittulata*: dilute flavescens; capitis vittis 3, media basin versus furcata, thoracis vittis 4, lateralibus obsoletis, scutelli vittis 2 vel 4 obsoletis, lutescentibus. Long. 10, lat. 3 millim. — Rio Janeiro.

XEROPHLOCA. (GERM.)

1. *X. sordidula*: griseo albida, ruguloso-punctata; capite medio longitudinalitcr, thorace antice longitudinalitcr et posterius scutelloque basi nigrofusca. Long. 5, lat. 2 millim.
2. *X. virescens*: dilute virescens; capite dilute flavescente, vertice limbo apicali virescente; hemelytris pone medium albidohyalinis. Long. 7, lat. 2 millim. — Minas Geraes.

CLASTOPTERA. (GERM.)

1. *C. Sahlbergi*: flavescens; fronte fascia nigra, basin versus transversim fuscolineata, basi fuscomarginata; thoracis fascia inæquali basique fuscis; scutello litura media trivia nigra; hemelytris fuscis, apice albidohyalinis, clavo vitta obliqua flavescente, corio apice extus callo nigro, nitido, instructo; pedibus fuscovittatis. Long. $4\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.
2. *C. lineatocollis*: dilute sordide flavescens; fronte transversim nigrolineata, vertice basi apiceque fuscomarginato; thoracis lineis 5 vel 6 transversis nigris; scutello maculis 2 nigrofuscis; hemelytris flavotestaceo-hyalinis, pone medium fuscescentibus, apice callo nigro, nitido instructis. Long. 4, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — California.
3. *C. fuscomaculata*: dilute flavovirescens; fronte transversim fuscolineata, apice nigrofusca; vertice basi apiceque rufomarginato; hemelytris macula magna costali aliisque 3 apicem versus nigrofuscis, apice callo nigro nitido instructis. Long. $3\frac{1}{2}$, lat. 2 millim. — Minas Geraes.
4. *C. obtusata*: dilute griseoflavescens; fronte transversim fuscolineata, medio nigrofusca; thorace vitta media et basin versus brunnescente; scutello brunnescente, macula utrimque basali lineisque 2 apicis flavescenlibus; hemelytris fuscescentibus, vitta media obsoleta apiceque albidohyalinis, apice extus callo nigro nitido; pedibus fuscovittatis et maculatis. Long. 4, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.
5. *C. funesta*: nigricans, nitida; capite flavotestaceo, fascia frontali nigra; hemelytris margine subapicali flavo, hyalino, apice callo

nigro instructis; pedibus dilute flavotestaceis, tibiis fuscomaculatis. Long. 3, lat. 2 millim. — Honduras.

SELENOCEPHALUS. (GERM.)

1. *S. punctatonervosus*: dilutius fuscotestaceus; fronte transversim fuscolineata, basi fuscopunctata; vertice, thorace scutelloque remote, nervis hemelytrorum dense fuscopunctatis, areolis horum fuscosparsis; pectore abdomineque fuscomaculatis. Long. 9, lat. 4 millim. — Turcia.
2. *S. africanus*: sordide albida, fuscoirrorata; fronte basi nigra; hemelytris sutura clavi testacea, nervis brunneis, areolis brunneirroratis, maculis costalibus, una pone medium, altera apicem versus limboque apicali fuscobrunneis. Long. 6, lat. 2½ millim. — Sierra Leona.

COELIDIA. (GERM.)

1. *C. maculinervis*: flavotestacea; fronte basi lineis 2 longitudinalibus sanguineis; thorace inæquali, fuscopunctato; hemelytris nitidis, nervis nigrofuscis, albidomaculatis. Long. 9, lat. 3½ millim. — Sierra Leona.
2. *C. sparsa*: fusca; capite dilutiore, fronte vittis 2 angustis, obsoletis, dilute sanguineis; thorace hemelytrisque dense flavotestaceo-sparsis; pedibus dilute flavotestaceis. Long. 6½, lat. 2½ millim. — Manilla.
3. *C. adspersa*: nigrofusca; fronte transversim anguste flavotestaceolineata; vertice, thorace, scutello hemelytrisque dense flavotestaceo sparsis; pedibus nigrofuscis, tibiis dilutioribus. Long. 5, lat. 2½ millim. — Monte Video.
4. *C. nigrina*: nigra, nonnihil violaceomicans; vertice sordide flavotestaceo, fuscomaculato. Long. 4, lat. millim. — Monte Video.

STENOCOTIS. (N. GEN.)

Corpus depressum, planiusculum. Caput obtuse triangulariter productum, cum oculis thorace sublatius, margine antico attenuata, acutiusculo; fronte a basi parum ampliata, dein medio subito angustata et a medio parallela; vertice subarcuato, brevi; oculis in fovea oblonga, transversa in margine apicali verticis utrimque locatis. Thorax antierius valde productus, basi late sinuatus, lateribus rectis, parallelis. Hemelytra nervis longitudinalibus, pone medium furcatis. Pedes mediocres.

1. *S. planiuscula*: dilute flavotestacea, supra tota dense nigrofuscoirrorato; vertice longitudinaliter, thorace, scutello nervisque hemelytrorum transversim subtiliter rugulosis; abdomine supra annuloque apicali femorum nigris; tibiis extus nigroirroratis. Long. 18, lat. 6 millim. — Nova Hollandia.
2. *S. subvittata*: flavotestacea; vertice longitudinaliter, thorace scutello nervisque hemelytrorum transversim subtiliter rugulosis; fronte

basi apiceque nigra; vertice linea longitudinali media fusca; thorace parce brunneoparso, lineis 4 parvis longitudinalibus undulatis nigrofuscis; hemelytris sutura clavi fuscosubvittata; femoribus apice nigris. Long. 18, lat. 6 millim. — Nova Hollandia.

PLATYMETOPIUS. (BURN.)

1. *P. modestus*: vertice thoraceque flavis, illo apicem versus concavo, longitudinaliter anguste nigrolineato, hoc basi virescente; hemelytris dilute virescentibus, nervis flavescentibus, margine costali albido-subhyalino; subtus dilute flavotestaceus. Long. 8, lat. 2 millim. — America septentrionalis.

JASSUS. (FABR.)

1. *J. hyalinipennis*: flavescens, nitida; fronte utrimque obsolete fuscolineato; vertice maculis 2 nigris; thorace utrimque, scutello basi fascia fusca; hemelytris albidohyalinis, sutura clavi nervoque costali nigrofuscis. Long. 5½, lat. 2 millim. — Brasilia.
2. *J. lineatipennis*: albida; fronte transversim fuscescente lineata; vertice maculis 4, una apicali, reliquis basilibus, nigris; thorace fasciis 2 obsolete brunnescentibus; hemelytris brunnescente-lineatis. Long. 4, lat. 2½ millim. — Brasilia.

BYTHOSCOPIUS. (GERM.)

1. *B. flavofasciatus*: niger; frontis maculis, thoracis fascia; scutelli marginibus lateralibus clavoque flavis, hoc vitta angusta inæquali fusca; corio nigrofusco, macula marginali pone medium sordide hyalino. Long. 5, lat. 1½ millim. — Brasilia.

2. *Två nya skandinaviska växter.* — Hr FRIES meddelade i bref till Hr WAHLBERG följande botaniska upptäckter.

»*Carex scirpoidea* MICH. (*C. Wormskjoldiana* HORN. *C. Michauxii* SCHWEIN.) har blifvit hemförd från Saltdalen af Studerande UNANDER och DRAKE. Den är högst utmärkt, noga öfverensstämmande med den nordamerikanska och ny för Europas flora. Den är den enda *Carex monostachya* med ludna frukter.

Erucastrum Pollichii KOCH har blifvit af Dr GÖKS funnen på uttorkade ställen i den uttappade sjön Tåkern i Östergötland. Dess uppträdande på detta ställe inuti landet i stor mängd är högst märkvärdigt, då den ej finnes närmare än Baden.»

3. Om flottholmen i sjön Ralången. — Hr J. H. FORSHÄLL hade i bref dat. Eksjö och Qvensås d. 28 September derom meddelat följande:

Under de tio år jag nu bott i Södra Wedbo härad af Jönköpings län har jag ofta hört omtalas en förunderlig ö, Rüdholmen, som finnes i den i Norra Wedbo härad af samma län belägna sjön Ralången, och hvilken ö, försedd med flera, några fot höga, trädstubbar, somliga år visar sig öfver vattenytan någon vecka eller månad, och sedan sjunker, och anses flytande, men alltid visar sig på samma ställe, 380 alnar ifrån säteriet Katrineholms sjöstrand. Då den sällan synliga ön är uppe, infinner sig en mängd resande för att beskåda den och höra berättelsen derom, att vattnets sjunkande eller stigande icke har något inflytande på detta fenomen, samt att sjelfva hjertstocken till Manbäcks kyrkas timrade klockstapel är i fordomtima huggen på denna förunderliga ö, som ett par gånger, åren 1815 och 1826, är af landtmätare afmålt och beskrifven.

Först den 5 Oktober 1850 lyckades det mig att få se den, då dess mark var uppe jemt med vattenytan och trädstubbarne ofvanföre med sina i koppar gjorda inskriptioner så lydande: »År 1766, när Svea rikes Konung, Gustaf den 3:de, såsom då varande Kronprins, reste att möta sin tillkommande gemål, nu drottning Sofia Magdalena, uppkom denna sällsynta flottholme vid dess förbiresa.» — och: »År 1773 den 2 September blef denna holme, som den 19 Augusti å nyo uppkommit, återigen synt och besedd af vår allernådigste Konung, som då till rikets södra gränser, genom Jönköpings län, dess eriksgata fortsatte, till att efterfråga landets tillstånd och bereda rikets framtida väl. Upprättad af Claës Erik Silfverhjelms, dåvarande landshöfding öfver Jönköpings län.» Samme Landshöfding hade med ett namngifvet sällskap äfven besett ön den 24 September 1766.

Händelsen gjorde att rodnen till ön skedde ifrån Stora Herrestads, för fiskarens redskap och hans båt, uppförda så-

kallade båthus, der helt nära invid man finner en af bibehållna stenmurar fordom gjord inhägnad, som synes hafva varit ett åkergräde; men som nu var under vatten, oaktadt vattenytan var låg, och som efter ögonmått gaf anledning till den förmodan, att Ralångens högsta vattenhöjd i fordna tider varit omkring 48 fot lägre än högsta vattenhöjden nu för tiden. Med ledning häraf och med benäget biträde af fideikommisset Stora Herrestads arrendator, Agronomen FOSSELL, lyckades det att vid samma östra strand, omkring 60 famnar norr om båthuset, få reda på en liten koniskt formad klippa, som man för formens skull kallat Sockertoppen, hvilken nu var omkring en aln öfver vattenytan, och på hvilken klippa gjordes en, ett kvarter lång och några linier djup, horisontel uthuggning utvisande vattenytans dåvarande ståndpunkt. Allt detta för att söka besanna den genast hysta tanken, att det är vattenytan som stiger och faller, och att ön står stilla. Sedan dess är Sockertoppsklippan ofta observerad och står den *djupt under vattenytan då ön säges vara sjunken.*

Den 30 September 1852 såg jag ön ifrån landsvägen, men hade ej tillfälle att närmare undersöka förhållandet; men den 20 September innevarande år 1854, då ön åter var synlig, undersöktes förhållandet, och befanns vattenmärket på Sockertoppsklippan vara ett kvarter öfver vattenytan och ön Rödholmens mark likaledes vara ett kvarter öfver vattenytan, och sålunda torde det kunna anses ådagalagd, *att det i så många år omtalade fenomenet är beroende af vattenytans stigande och fallande, och att ön är stillastående.*

Min roddare berättade, att på sjön Ralångens vestra sida är en ö vid bondgården Ralingsås och en annan ö vid bondgården Fiskarehemmet, hvilka öar stiga upp öfver vattnet och sjunka ned deruti på samma tider som detta inträffar med den namnkunniga Rödholmen.

Att personer äfven af bildade folkklassen i så lång tid kunnat påstå, att vattnets sjunkande ej är orsak till att ön synes, torde kunna få sin förklaring deruti, att marken vid Ka-

trineholm, derifrån man vanligen begifver sig till ön, är ett alltid vattensjukt kärr, som gör att sjöns vatten missledande synes vara högt. I detta kärr, der vattnet stundom går i vågor såsom i en sjö, ser man lemmingar efter trädgårdsplantering, hvilket synes ådagalägga, att denna mark fordom varit torr, och att Ralångens högsta vattenhöjd fordom varit flera fot lägre än hvad den nu är.

Som landmätarnes förutnämnda beskrifningar lära blifvit insända till Kongl. Akademien, har jag vågat att vördsammast, göra detta meddelande.»

4. Om färgförändringen hos foglarna genom och utan ruggning *). — Hr W. MEYER meddelade följande:

»I ett sändebref till de den 6 Juli 1852 i Altenburg församlade naturforskarna **), har Professor H. SCHLEGEL gifvit Tysklands ornithologer anledning till en liflig diskussion, hvarvid ganska olika meningar yppat sig om detta ämne, och de talrika afhandlingarne deröfver ***) hafva redan uppnått ett betydligt omfång. Det är egentligen om de af SCHLEGEL uppställda satser, angående »Das Entstehen des vollkommenen Kleides der Vögel durch Verfärben und Wachsen der Federn, unabhängig von der Mauser» som åsigtterna äro delade. Må det derföre tillåtas mig, att framlägga några resultater af de undersökningar, med hvilka jag varit sysselsatt sedan flera år, men hvilka likväl äro att anse blott som en början på ett rikt fält, och som jag knappast skulle våga framlägga, om icke äfven en svensk, Hr T. HAMMARGREN, hade nyligen till Kongl. Akademien insändt en uppsats, hvars resultater ej heller öfverensstämman med mina.

Innan jag öfvergår till det egentliga ämnet, torde det vara lämpligt att gifva en kort öfversigt öfver de förnämsta ruggningsförhållanden, som visa sig hos våra foglar.

*) Hårtill Tab. III och IV.

**) Neumannia I, II. 19—40.

***) I Journal für Ornithologie.

4. *Enkel och fullständig ruggning — höstruggning —*

förekommer hos alla foglar emot hösten, hvarvid såväl de stora ving- och stjertpennorna, som småfjädrarna borttappas och ersättas genom nya. Hit höra:

<i>Loxiæ.</i>	<i>Certhia.</i>
<i>Fringillæ.</i>	<i>Pici.</i>
<i>Emberizæ.</i>	<i>Yynx.</i>
<i>Alaudæ.</i>	<i>Cuculus.</i>
<i>Sturnus.</i>	<i>Alcedo.</i>
<i>Turdi.</i>	<i>Coracias.</i>
<i>Oriolus.</i>	<i>Upupa.</i>
<i>Saxicola oenanthe.</i>	<i>Columbæ.</i>
<i>Sylvia philomela, lusciniæ.</i>	<i>Caprimulgus.</i>
» <i>phoenicurus, tithys.</i>	<i>Cypselus.</i>
» <i>rubecula.</i>	<i>Striges.</i>
» <i>atricapilla, hortensis.</i>	<i>Falcones.</i>
» <i>trochilus, abietina.</i>	<i>Tetrao urogallus.</i>
» <i>sibilatrix, hippolais.</i>	<i>Coturnix.</i>
» <i>schoenobæus, arundinacea.</i>	<i>Otis.</i>
<i>Cinclus.</i>	<i>Grus.</i>
<i>Troglodytes.</i>	<i>Fulica.</i>
<i>Accentor.</i>	<i>Gallinula.</i>
<i>Hirundines.</i>	<i>Ralli.</i>
<i>Muscicapa grisola.</i>	<i>Scolopaces.</i>
<i>Lanii.</i>	<i>Numenii.</i>
<i>Ampelis garrula.</i>	<i>Recurvirostra.</i>
<i>Corvi.</i>	<i>Ciconiæ.</i>
<i>Pica.</i>	<i>Ardeæ.</i>
<i>Caryocatactes.</i>	<i>Cygni.</i>
<i>Garruli.</i>	<i>Anseres.</i>
<i>Pari.</i>	<i>Anas tadorna.</i>
<i>Regulus.</i>	<i>Dysporus sula.</i>
<i>Sitta.</i>	m. fl.

Anmärkn. Undantag göra här de stora roffoglarna, som ej alltid regelbundet ombyta sina fjädrar, utan vanligen efter längre eller kortare afbrott.

2. *Dubbel- eller vårruggning*, inträffar emot våren och utsträcker sig:

A. *Fullständigt*; öfver alla eller de flesta småfjädrarna och hos några äfven de två mellersta stjärt- och tre innersta vingpennorna, t. ex. hos

Anthi.	Charadrii.
Motacillæ.	Anas glacialis.
Saxicola rubetra.	Sternæ.
Sylvia nisoria, cinerea.	Lari.
Muscicapa collaris, atricapilla.	Lestrides.
Tringæ.	Procellariæ.
Phalaropodes.	Colymbi.
Totani.	Uriæ.
Limosæ.	Mormon.
Strepsilas.	Alcæ.
Hæmatopus.	

B. *Delvis*; endast till en del af hufvudets och halsens fjädrar, såsom hos: *Sylvia svecica*, *Emberiza nivalis*, *lapponica*, *Vanellus cristatus*, samt hos ett stort antal yngre hanner, särdeles af LINNÆS Passeres, första våren som följer på deras födelseår.

3. *Sommarruggning*, efter parningstiden försiggår:

A. *Fullständigt*; hvarvid utbytas alla småfjädrarna, hos några äfven de fyra mellersta stjärt- (*Anas boschas*) och fem till sex innersta vingpennorna, hvarvid hannarna antaga en dräkt, som mer eller mindre liknar honans, t. ex. hos Änderna, utom *Anas tadorna* och *glacialis*; t. ex. *Anas boschas*, *acuta*, *penelope*, *clypeata*, *querquedula*, *crecca*, *Fuligula cristata*, *ferina*, *clangula*, *mollissima* *), *Mergi m. fl.*

*) Eiderhannen är ifrån midten af Juni till början af Oktober underkastad en nästan oafbruten fjädrerexling, åtminstone på bröstet, ty efter de rödaktiga bröstfjädrarna följa först nästan enfärgadt bruna, derpå dylika med mer eller mindre hvitt i midten, derefter rödaktiga med en svart kant, och slutligen åter de rödaktiga vinterfjädrarna. I September månad skjutna hanner

B. *Delvis*; hvarvid hufvudets och halsens fjädrar utbytas emot korta, smala och mjuka fjädrar, hvilka nästan likna artens ungdragt, såsom hos *Perdix cinerea* *), *Tetrao bonasia* (hos denna art sitta sommarfjädrarna oftast likasom fjun på spetsarna af de nya framväxande höstfjädrarna), *Tetrao tetrix* och *Tetrao urogalloides* **).

4. *Tredubbel ruggning*, eller en förenig af vår-, sommar- och höstuggning, förekommer:

A. *Fullständigt*, öfver nästan alla småfjädrarna, hos *Lagopus alpina* och *subalpina*. Eburu äfven hos dessa under sommaren en snart sagt oafbruten ruggning fortgår, kan man dock tydligen skilja trenne dragter, nemligen: den mörkare vår-, den ljusare sommar-, eller rättare höstdragten, ty den anlägges först i September, och den hvita vinterdragten.

B. *Delvis*; omfattar *hufvudets, halsens* och *undersidans* småfjädrar. Högtidsdragtens anläggande börjar emot våren och är fullbordad emot slutet af April månad, afläggas åter i början af Juli månad, t. ex. hos *Podiceps auritus* Linné (*P. cornutus* auct.), som blir i sin sommarragt: *P. arcticus*, auct. samt *Graculus carbo* och *cristatus*. Den förra af de sistnämnda bär i Nov. på hufvudet helt korta, svartaktigt blåa, och på halsen gråbruna fjädrar med obetydligt blå anstrykning. Från denna dragt öfvergår han, under vintern genom fjäderombyte, småningom till högtidsdragten.

Huruvida de öfriga *Podiceps*-arterna anlägga en särskild sommarragt har jag ej sjelf haft tillfälle att iakttaga, men saken förtjenar en noggrann undersökning.

Utom dessa dragtförändringar, genom fullständig fällning af de gamla fjädrarne och nyas framväxande, undergår ett stort antal af foglar, särdeles sådana som blott halva *enkel rugg-*

visa oftast tre sorter af dessa fjädrar, och deraf säkert två med blodpennor. Således torde ingen fogel egna sig bättre än denna, att studera *färgförändringar genom verklig ruggning*.

*) W. v. WAGNER, Götheb. K. V. S. Handl. 1850, s. 78.

**) *Rackethanen* har således ärfit denna egenskapen af fadern, *Orrhannen*, ty hos *Tjädern* synes denna sommarragt ej förekomma.

ning, men äfven några med flera ruggningar, en ganska märkbar färgförändring emot våren, nemligen genom förlusten af vissa fjäderdelar, hvilken operation man i allmänhet har kallat: »brämfällning» *). Denna har blifvit uppfattad och förklarad på olika sätt.

Med tillhjälp af några af mig ritade figurer skall jag nu söka besvara hufvudfrågan: *om färgämnet hos vissa fjädrar ifrån början finnas till, eller om de föras dit under våren eller parningstiden.* Enligt den af NITZSCH begagnade terminologi består fjädern utaf: stammen (scapus), grenar (rami) och strålar (radii). Ur stammen utgå åt båda sidor grenarna, ur dessa åter strålarna, men de sistnämnda sitta ej alltid på sidorna, utan ibland *ofvanpå* grenarna. De små ciliæ och hamuli, som äro fästade på strålarna och bestämda till att hålla ihop dessa, förbigås här, då de icke bidraga till färgernas förändring. För öfrigt hänvisas till Prof. C. J. SUNDEVALLS arbete om foglarnas vingar, Vet. Ak. Handl. 1843.

Betraktar man fjädrar af olika foglar med »vinterbräm» under mikroskopet, finner man, att bakom de hvita, mörka eller färglösa yttersta spetsarna, färgämnet hos en del befinner sig i strålarna, hos en annan del i grenen. Dessa bilda således tvenne former, hvilka kunna kallas, efter sina sednare förändringar: *enkel spetsfällning* och *spets- med strålfällning*.

1. *Spetsfällning* förekommer hos de foglar, som hafva färgämnet *företträdesvis* i *strålarna*. De färglösa, eller färgade spetsarna börja efter höstruggningen småningom affalla, men först emot våren, eller mycket senare är denna fällning fullständig, och då visar sig den förut betäckta färgen i sin fulla färging. Tab. III, fig. 4 visar öfre delen af en svart bakfjäder om hösten med sina hvita spetsar, hos en hane af

Sylvia

*) Att äfven andra orsaker än denna kunna frambringa en *färgnyansering* hos några få svenska foglar, t. ex. *Coracias garrula*, *Lanius collurio* o. n. a., torde vid ett annat tillfälle blifva föremål för en undersökning.

Sylvia phoenicurus; fig. 2 en sådan fjäder om våren. Spetsarna äro affallna jemt efter den svartfärgade delen. Till denna afdelning höra vidare: *Fring. montifringilla*, *domestica*, *montana*, *coelebs*, *chloris*, *spinus*, *Emberizæ*, *Alaudæ*, *Sturnus*, *Turdi* (*T. torquatus*), *Pari*, *Saxicola oenanthe*, *Sylvia tithys*, *Sylvia sve-cica*, (de rödbruna och svarta fjädrarna på bröstet), flere foglar med en partiel ruggning, och serdeles ungarna ur denna afdelning efter sin första vinter.

2. *Spets-* med *strålfällning*, förekommer hos sådana arter, som ega färgämnet i *grenen*. Här fälles icke endast spetsarna, utan äfven de färglösa strålarna, med hvilkas spets eller rotfäste grenen till en del betäcket, och gör dess färg matt. Spetsarna försvinna naturligtvis först, och då man mot våren undersöker en sådan fjäder observerar man i början den *enkla spetsfällningen*, och fastän färgerna blifvit betydligt klarare, ser man dock ännu ett slags rim (*pruina*) på dem, men detta försvinner i samma mån strålfällningen uppifrån nedåt framskrider. Först när den färgade delen af grenen helt och hållet är befriad från strålarna, visar sig färgen i sin fulla glans. Fjädern är nu icke blott betydligt kortare, utan äfven smalare, ty strålarna hindra ej mera grenarnas närmande till hvarandra. Fig. 3 visar en bröstfjäder om hösten af *Fring. linaria* mas; fig. 4 ett mellanstycke af en gren från samma fjäder, mycket förstorad, för att visa, att strålspetsarna lägga sig öfver den närmaste grenen. Fig. 5 en bröstfjäder af samma fogel om sommarn (Juli månad), eller i hans fullständiga sommarprydnad.

Hos några fjäderarter äro dessa strålar af ganska kort varaktighet, t. ex. på de röda understjertpennorna hos *Picus major*. Vid framväxandet äro dessa tätt betäckta med fina, smala strålar, så att de tyckes vara beströdda med puder, men knappast har fjädern hunnit sin fulla längd, förrän strålfällningen börjar. Fig. 6 är ett stycke af en sådan fjäder, i October månad. De yttersta spetsarna, som redan voro befriade från



strålarna, äro icke ritade. Ja, hufvudets röda eller gula fjädrar hos Pici sakna till och med ifrån början dessa betäckande strålar, hvarföre de genast, vid framkomsten, ega sin intensiva färg. Fig. 7 visar en sådan ny fjäder af *Picus mar-tius* ♂. Till denna afdelning höra vidare *Fringilla cannabina*, *erythrina*, *flavirostris*, *Loxia pithyopsittacus*, *curvirostra*, *bifasci-ata*, *Corythus enucleator*, *Sylvia suecica* (de blåa fjädrarna) alla Pici med ofvannämnda fjädrar; *Anas boschas*, *clypeata*, *Tadorna*, *Podiceps auritus*, med undersidans bruna och rödbruna fjädrar, och några andra.

För att i allmänhet fästa uppmärksamheten på strålarnas högst olika former hos olika foglar, men förnämligast på den *mycket skiljaktiga strukturen mellan vinter- och sommar-drägtsfjädern* hos somliga foglar, som ega en *dubbelruggning*, meddelas här äfven några figurer öfver fjädrar af utländska foglar, hvilka, som jag hoppas, mera än tillräckligt torde tala emot SCHLEGELS och andras åsigter om fjädrarnas förvandling utan ruggning, eller möjligheten att ur den ena formen den andra kan framväxa.

Tab. IV, fig. 8, ett par grenar af en bröstfjäder af den vackra *Nectarinia senegalensis* ♂, i högtidsdrägt. De röda spetsarna ega ifrån början inga strålar; ej heller fällas de blåa strålarna. Dessa sednare skilja sig väsendtligen från strålarna hos t. ex. *Fring. linaria*, fig. 4. derigenom, att de icke äro fästade längs sidorna utan *ofvanpå* grenen. Detta ses tydligen af fig. 9, en gren sedd från undra sidan. Vinterdrägtens form öfverensstämmer sannolikt med den följandes. Fig. 10, några bröstfjädergrenar, i vinterdrägt, af *Nectarinia formosa* ♂. Fig. 11, en gren af en dylik fjäder i högtidsdrägt, tagen från samma exemplar, hvilket befinner sig i öfvergång till denna drägt. Fig. 12, en vinterdrägtsgren, tagen från bröstets midt af en *Ploceus rubritorquis* ♂. Fig. 13 en orangeröd gren af högtidsdräkten af samma fogel och från samma ställe. Denna art, jemte *Ploceus longicauda*, *axillaris*, *albonotatus*, ca-

pensis och andra, ömsar utom alla småfjädrarna äfven stjärt-pennorna två gånger om året. Fig. 14, en grön hufvudfjädergren af *Anas boschas* ♂, om våren. Efter ruggningen om hösten äro de tvärfskurna strålarna försedde med små färglösa spetsar, hvilka dock snart affalla. Hos *Anas clypeata* har strukturen af hufvudets fjädrar mycken likhet med denna art, dock är grenens färg ej brunaktig, utan hvit. Fig. 15, en gren af *sommardräkten* af samma fogel och från samma ställe som fig. 14.

Strålarna af de med fig. 8 till 15 betecknade arter undergå naturligtvis äfven en afnötning, men denna framkallar icke en högre färgprakt, utan är en ren slitning. Hos exemplar, som stå i öfvergång från den ena till den andra dräkten, kan, om andra märken saknas, med mikroskopets tillhjälp lätt utrönas, hvilka fjädrar äro nya, då de gamla alltid bära spår efter någon slitning.

Fig. 16, en grön bröstfjädergren af *Trochilus rubineus* ♂. De yttre färglösa strålarna, som bilda vinterdräkten, äro till största delen bortfallna; grenens spets qvarsitter sannolikt tills ny ruggning inträffar. Bör räknas till *enkel spetsfällning*. Fig. 17, en bröstfjädergren af *Cuculus cupreus* ♂. De på venstra sidan uppvikta strålspetsarna bidraga mycket till fjäderns ovanliga guldglans. Fig. 18, en gren af de lancettformiga, kopparröda halsfjädrarna hos *Lophophorus impeyanus* ♂. Endast strålarna på grenens ena sida äro metallfärgade, ty de andra ligga dolda inunder den förra. En liknande bildning förekommer hos *Paradisea apoda*, på de gröna hakfjädrarna, samt hos *Epimachus regius* och *magnificus*, på deras blågröna hals- och hufvudfjädrar. De sammetlika bröstfjädrarna deremot hos *E. regius* förete på den färgade sidan en ganska afvikande strålbildning; strålarna kunde här nemligen jämföras med en rad i hvarandra stuckna piluddar med uppåttstående hullingar. Likheten i strålbildningen antyder visserligen icke fogelarters släktskap, men torde gifva ganska upplysande resultater angående fjädrarnas glans, skiftning, m. m. Fig. 19, en grenbit af en blå bröstfjäder af *Pavo cristatus* ♂.

Fig. 20, ett stycke af en brun bröstfjädergren af *Anas boschas*, om våren. Strålarna af grenens spets, som icke äro ritade, af-fallna. Om hösten äro bröstfjädrarna dessutom försedda med smala, hvita kanter. De qvarsittande strålarna, *a*, äro ett hvarf kringvridna. Denna egenhet har jag observerat hos många än-der. På venstra sidan, *b*, två strålar med krokar (hamuli), till strålarnas fasthållande mot hvarandra. Sådana förekomma ser-deles talrika hos vattenfoglarna. Fig. 21 en rödbrun bröstfjä-derbit af *Podiceps auritus* L. Här äro strålarna två hvarf kringvridna; måhända bidrager detta till att afhålla vattnet ifrån kroppen.

Slutligen behöfver väl knappast tilläggas, att allt hvad här blifvit anfördt om ruggningsförhållanden, tydligast visar sig hos gamla hannarna, och att det ganska ofta på honorna ej alls kan tillämpas.»

Akademiska angelägenheter.

Præses tillkännagaf, att Akademiens utländske ledamot i tredje klassen, *Physices Professor* i Neapel, *MAC. MELLONI*, och hennes utländ-ske ledamot i sjette klassen, *Presidenten* i K. Hof-Rätten i Wiborg *Grefve C. G. MANNERHEIM* med döden afgått.

Akademien kallade, genom anstaldt val, till inländsk ledamot i sin åttonde klass f. d. Statsrådet *Hr Grefve BALTZ. v. PLATEN*.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af K. K. Akademie der Wissenschaften i Wien.

Denkschriften der Akademie. Math. natw. Cl. B. VII. 1854.

— — Philos. hist. Cl. B. V, 1854. 4:o.

Archiv f. Kunde österr. Gesch.-Quellen. B. XII: 1, 2. 1854. 8:o.

Sitzungsberichte. B. XII. H. 2, 3, 4. 1854. 8:o.

Register zu den ersten X Bänden d. Sitzungsber. der philos. histor. Cl. 1854. 8:o.

Notizenblatt. 1853 N:o 21—24. 1854 N:o 1—17. 8:o.

Af K. K. Geologische Reichsanstalt i Wien.

Jahrbuch 1854. N:o 1. Wien. 8:o.

Af Senckenbergische Naturf. Gesellschaft i Frankfurt.

Abhandlungen herausgeg. von der Gesellsch. B. I. Lief. 1. Frankf. a M. 1854. 4:o (m. t.).

Af Naturforschende Gesellschaft i Basel.

Verhandlungen 1:s Heft. Basel 1854. 8:o.

Af the British Association.

Report of the 23:d meeting, held at Hull 1853. Lond. 1854. 8:o.

Af the Royal Society i London.

Proceedings. Vol. VII. N:o 6. 1854. 8:o.

Af the Geological Society i London.

The Quarterly Journal. N:o 39 (X: 3). 1854. 8:o.

Af Muséum d'hist. naturelle i Paris.

Archives du Muséum. T. VII. Livr. 1. Paris 1853. 4:o (m. t.).

Af Société Géologique i Paris.

Bulletin. T. XI. F. 4—18. 1854. 8:o.

Af Académie des sciences &c. i Lyon.

Mémoires. Classe des sciences. T. 2 1852. Classe des lettres. T. 2. 1853. 8:o.

Af Société d'agriculture &c. i Lyon.

Annales. Sér. 2. T. 4 et 5. 1852, 53. 8:o.

Af Société Linnéenne i Lyon.

Annales 1852—53. Nouv. Sér. T. I. Lyon 1853. 8:o.

Af Société Vaudoise i Lausanne.

Bulletin. N:o 30. 1853. 8:o.

Af R. Accademia delle Scienze i Neapel.

Atti. Vol. VI. Napoli 1851. 4:o.

Rendiconto. Nuova Serie. N:o 1—5. 1853—54. 4:o.

Af Författarne.

ANDERSON, CH. J., A journey to Lake 'Ngami, and an itinerary of the principal routes . . Cape-Town 1854. 12:o.

BOYER, Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent. T. 1—7. Paris 1844—53. 8:o.

MULSANT, E., Opuscules Entomologiques. Cah. 2—4. Paris 1853. 8:o.

WISTRAND, A. T., Minnesbok för apothekare och pharmaceuter. Sthm 1854. 8:o.

Af Utgåfvarne.

Archiv f. wissensch. Kunde von Russland, XIII: 4. Berlin 1854. 8a.

Af K. Sundhets-Kollegium.

Underd. Berättelse om Medicinalverket i riket 1852. Sthm 1854. 4a.

Af Hr Chefen för K. Civildepartementet.

SAVOYEN, L., Nouvelles études philosophiques sur la dégénération physique et morale de l'homme. Paris 1854. 8:o.

Af Hr Bergmästaren v. Schéele i Filipstad.

(SWEDENBORG) Nova observata et inventa circa ferrum et ignem ..
Una cum nova camini inventione. Amstelod. 1721. 8:o.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Botaniska afdelningen.

Af Studerande Goldkuhl.

Tolf sällsyntare arter från Gottland, t. ex. *Pinguicula alpina*, *Tofieldia calyculata*, *Schedonorus erectus*, *Falcaria Rivini*, *Helianthemum Fumana*, *Sorbus Aria*.

Af Studerande Alfred Ahlqvist i Calmar.

Trettioåtta sällsyntare arter från Calmar län, t. ex. *Thesium alpinum*, *Lactuca scariola*, *Diplotaxis tenuifolia* m. fl., och från Öland: *Orchis militaris*, morio och mascula, *Globularia vulgaris*, *Potentilla fruticosa*, *Inula britannica*, *Ranunculus illyricus*, *Helianthemum oelandicum*, *Eryngium maritimum*, *Selinum lineare*, *Euphorbia palustris*, *Valeriana dioica*, *Alisma ranunculoides*, *Plantago minor* o. s. v.

Ethnografiska afdelningen.

Af Hr Grefve Arm. Fouché d'Otrante.

En utmärkt samling af klädedrägter m. m. hemförd från en resa, åren 1843–1844, till Blackfeet-indianernas stam, nära Missouri's fall vid foten af Rocky mountains:

1. Chemise d'un Chef Indien, tribu des *Pieds Noirs*. Les dessins rappellent les exploits du porteur. La garniture est en cheveux d'ennemis qu'il avait tués, et en crins de chevaux qu'il avait pris à des ennemis. Les broderies sont en porc-épic.
2. Mitasses du même chef (se portent aux jambes). Mêmes remarques que pour le N:o 1.

3. Chemise d'un Indien de la même tribu, en peau de Bison (*Buffalo*). C'était l'unique vêtement de cet Indien, qu'il avait mis pour venir au fort occupé par les blancs. Chez eux, les *Pieds Noirs* sont nus.
4. Habillement d'une jeune fille de la même tribu. Garniture en dents d'élan. Peau de grosse corne.
5. Ceinture d'une femme de la même tribu. Garniture en dents d'élan. Ces deux objets (N:o 4 et 5) ne sont portés que par des personnes aisées.
6. Instrument de musique (tribu des *Assineboines*), garni de fourrure de loutre et de loup blanc. On danse au son de cet instrument. Il se pend à la ceinture.
7. Sifflet en os d'aile de gygne (tribu des *Corbeaux*, *Craw-Indians*), s'emploie pour la danse et à la guerre pour signaux. Se porte au cou. Garniture de peau de buffle avec porc-épic.
8. Arc d'un chef des *Pieds Noirs*, recouvert en peau de serpent à sonnette. Corde en nerf de bison.
9. Flèches de guerre }
10. Flèches de chasse } à plumes d'aigles.
11. Arc d'un jeune indien (*Pieds Noirs*) en côte de bison.
12. Tétière de cheval en peau de cerf. Broderies en porc-épic. Frange en ermine.
13. Gaine de poignard. Peau de cerf. Broderies en porc-épic.
14. Selle pour la guerre et la chasse, avec croupière. Peau de cerf. Broderies en porc-épic. Les objets N:o 12, 13 et 14 sont neufs. Ils étaient destinés à un chef *Sioux*.
15. Port viande (*Pieds Noirs*) en cuir de Bison; sert à porter à dos de cheval, de la viande sèche.
- N. Les *Assineboines* habitent la rive gauche du Missouri vis-à-vis de la *Yellow Stone river*, près de la frontière des possessions anglaises. Les *Craw Indians* habitent dans les montagnes rocheuses, près des sources du Missouri. Les *Sioux* habitent les deux rives du Missouri, plus bas que le *Yellow Stone River*.



ÖFVERSIGT

AF

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

N. 9.

Onsdagen den 8 November.

Föredrag.

1. *Salpetersyrans inverkan på terpentinolja.* —

Hr L. SVANBERG anförde å egna samt å Hr F. L. EKMANS vägnar:

»Oaktadt de produkter terpentinoljan bildar vid behandling med salpetersyra utgjort föremål för en mängd kemiska undersökningar samt denna reaktion således skulle kunna tyckas böra vara temligen utredd, anmärker likväl något hvar, som kritiskt sinsemellan söker jemföra de olika kemisternas uppgifter, huru föga de med hvarandra öfverensstämma samt att följaktligen den reaktion, som dessa ämnen utöfva på hvarandra, ingalunda är studerad med den noggrannhet, som både ämnet förtjenar samt dessutom vetenskapen tarfvar.

Lemnande å sido de äldre försök, hvilka af HASSE *) anställdes, hvarigenom förnämligast bildandet af ett — för den tiden anmärkningsvärdt — gult ämne ådagalades, men hvars bildning befanns vara en egenskap som tillkom salpetersyrans inverkan på ej blott terpentinoljan, utan äfven en mängd andra oljor och fettarter, må endast BROMEIS **), RABOURDINS ***) och

*) CRELLS neueste Entd. in der Chemie IX, 38. CRELLS ANN. 1785, I, 417 och 533 samt 1786, II, 33 och 128.

**) Ann. d. Ch. u. Pharm. XXXVII, 297; BERZ. årsb. afgifven 1842 sid. 230.

***) Journ. de Pharm. et de Ch. VI, 185; BERZ. årsb. afgifven 1845 sid. 455; Ann. Ch. u. Pharm. LII, sid. 391.

CAILLOTS *) undersökningar här omnämnas såsom de, hvilka närmast sluta sig till ifrågavarande ämne.

BROMEIS, som först uppmärksammade den egna syra, ter-
pentinsyra, hvilken bildades genom salpetersyrans inverkan på
terpentinolja, fann att samma syra äfven erhöles vid behand-
ling af colophonium med salpetersyra. Då han, efter salpeter-
syrans inverkan på någondera af dessa, afdunstade till torrhet
och tillsatte mycket vatten, blef ett harz olöst, under det att
vattenlösningen, som reagerade skarpt sur samt hade en bitter
smak, gaf, vid förnyad afdunstning till tunn sirups stadga och
vid några veckors öfverlemning åt sig sjelf, en kristallisation i
små firsidiga, för ändan afskurna prismer med mycken glans
af den nya syran, som genom afsköljning med kallt vatten och
vidare torkning erhöles ren. Den så framställda ter-
pentinsyran karakteriseras af dess oförmåga att fälla blyättika samt deraf
att dess ammoniumoxidsalt icke åstadkommer fällning uti lös-
ningar af chlorcalcium, ättiksyrad blyoxid eller salpetersyrad
silfveroxid. Hvad denna syras salter beträffar, så hindrade
den lilla tillgången på material BROMEIS att dermed anställa
några utvidgade försök, hvarföre han äfven — likväl utan att
förut beskrifva ammoniumoxidsaltets egenskaper och framställ-
ningssätt — endast yttrar sig om syrans silfversalt såsom bil-
dande sidenglänsande, kristallknippen då syrans ammoniumoxid-
salt försattes med ett ringa öfverskott af salpetersyrad silfver-
oxid samt lösningen afdunstas. Silfversaltet är lösligare i varmt
än i kallt vatten. Genom en elementaranalys af den vid +400°
torkade fria syra samt genom en silfverbestämning af syrans
silfversalt drog BROMEIS den slutsats att ter-
pentinsyrans kemiska formel vore $C^{14}H^{10}O^7 + \dot{H}$; men BERZELIUS, som anser den af BROM-
EIS funna vätehalten alltför mycket skilja sig ifrån den, hvil-
ken af denna formel beräknas, antager ter-
pentinsyrans rätta formel vara $C^{14}H^{10}O^7 + \dot{H}$. — Hvad i öfrigt salpetersyrans in-
verkan beträffar på terpentinoljan, så anför BROMEIS, att han

*) Ann. de Gh. et de Phys. XXI, 27; SVANE. Årsh. för 1847 sid.
317; Ann. d. Ch. u. Pharm. LXIV, 376.

förgäfvess dervid eftersökt oxalsyra såsom varande en bildningsprodukt.

Då, enligt BROMEIS, terpentinsyrans bildning jemte syrsättning af något kol och väte (såsom kolsyra och vatten?) utgjorde ett hufvudmoment vid oxidation af terpentinoljan, undergick likväl en sådan åsigt betydlig modifikation till följe af WEPPENS *) sednare undersökningar. Denne kemist visade nemligen att såväl kolsyra som myrsyra förefanns uti den terpentinoljan, som varit utsatt för luftens inverkan, hvarjemte han fann, att dessa båda syror (myrsyra och kolsyra) bildades, såväl då oljan behandlades med en blandning af surt kromsyradt kali med svafvelsyra, som då den behandlades med en lösning af blyättika, i hvilket sednare fall, syre med begärlighet upptogs ur luften. Vid behandlingen med blyättika uppstod tillika en gul blyfällning, som, utkokad först med alkohol och sedan med vatten, för att aflägsna inblandning af mekaniskt inblandad terpentinoljan, gaf, efter sönderdelning med vätesvafva, upphof åt en harzartad syra, hvilken med alkohol kunde utdragas ifrån svafvelblyet samt vid långsam afdunstning afsatte sig uti hvita kristaller, men deremot vid hastigare afdunstning bildade en brun massa. På grund af elementaranalys å den kristalliserade syran antogs dess sammansättning vara $C^{10}H^{14}O^{10}$, men denna formel bekräftades ej genom bestämmelse af qvantiteten bas uti något dess salt. För öfrigt angaf WEPPEN om denna syra icke några andra förhållanden, än att dess alkohollösning fälles såväl af vatten, som faller de flesta metallsalter, men att fällningarne lösas af tillsatt alkohol. Jemför man den uti WEPPENS uppsats anförda elementaranalysen, med den af BROMEIS gjorda, så kan man icke undgå att instämma uti BERZELIUS förmodan om de båda syrornas identitet, oaktadt WEPPEN anser sin syra, såsom skiljaktig ifrån BROMEIS. Den enda omständighet, som skulle gifva stöd åt denna WEPPENS förmodan, är fällningarne, hvilka hans syra föranleder uti metallsaltslösningar, men då

*) Ann. d. Ch. u. Pharm. XLI, 294; Berz. årsb. afgifven 1843 sid. 300.

dessas ej äro närmare beskrifna, så kan lätt en fråga uppstå huruvida dessa reaktioner blifvit gjorda på rent material. — Hvad den gula blyfällningen beträffar, så anställde WEPPEL äfven med den några bestämmelser, hvilka dock icke voro af sådan omfattning, att de ledde till en säkrare åsigt om dess natur. Emedlertid visade han, att om kolsyrad talkjord kokas med vatten och terpentinolja, så förefinnes efteråt uti vattnet en talkjordslösning för handen, hvarur en hvit fällning fås med neutral samt, sedan denna upphört, en gul fällning med basisk ättiksyrad blyoxid.

Genom RABOURDINS undersökningar af ifrågavarande ämne ådagalades, att, vid salpetersyrans inverkan på terpentinolja, bildas oxalsyra jemte terpentinsyra, hvartill kan läggas, att, då salpetersyran är utspädd, gifver den upphof åt ammoniak. RABOURDIN angaf derjemte en bättre method för beredandet af terpentinsyran, hvilken han dock — man kan ej finna på hvilka grunder — anser vara isomerisk och icke identisk med den af BROMEIS framställda syran. RABOURDIN kallar derföre sin syra *acide terebique*, terebinsyra (BERZ.), men gifver, på grund af dess analys uti såväl obundet tillstånd som af dess silfversalt, formeln för den $\text{H} + \text{C}^{\text{H}^{\text{O}}}\text{O}$, hvilken är just enahanda med BROMEIS' formel. Icke heller understödes denna RABOURDINS förmodan af hans uppgifter om sin syras egenskaper: att kristallisera i raka rektangulära prismer, med lång fyrsidig tillspetsning, liknande vigglika oktaedrar; tröglöslighet i vatten, men löslighet i alkohol och eter; dess oföränderlighet af salpetersyra, men svärtning af koncentrerad svafvelsyra. Blysaltet, framställt genom syrans mättning med kolsyrad blyoxid, anskjuter enligt RABOURDIN uti små blomkålslika utgreningar ur en sirupstjock lösning; men ett på bas än mera rikt salt, hvilket dock är än mera lösligt, kan fås kristalliseradt om det förnämnde saltets lösning kokas med mera blyoxid och afdunstas. Om silfversaltet säger RABOURDIN att det faller om starka lösningar af syrans kalisalt och salpetersyrad silfveroxid sammanblandas samt den dervid fällda magman löses i kokande

vatten, hvarur det, vid afsvälning, kristalliserar uti fyrsidiga nålar. — För öfrigt visade RASOUDIN att den nyssnämnde syran utvecklar kolsyra vid torr distillation samt gifver ett oljaktigt distillat af pyroterebinsyra, hvars karaktärer: starkt ljusbrytande och luktande af smörsyra, brännande smak, kokande under $+200^{\circ}$, af 1.01 eg. v., löslighet i 25 delar vatten, men större lättlöslighet uti såväl alkohol, som eter, väl angifva den vara en egen, själfständig syra, men om hvars atomistiska constitution, $H+C^{12}H^3O^3$, oaktadt ganska sannolik, ännu en viss osäkerhet kan anses vara rådande, så länge denna formel stöder sig endast på analys af den obundna syran, utan att något af dess salter blifvit undersökt. Pyroterebinsyrans salter kristallisera trögt, och endast bly- samt silfverlösningar fällas af dess föreningar med alkalierna.

Slutligen är CAILLOT den, som sednast sysselsatt sig med studium af de oxidationsprodukter, hvilka erhållas genom salpetersyrans inverkan på terpentinoljan. Vid upphettning af utspädd (lika vigt vatten och syra) salpetersyra med terpentinolja, hvarvid dock den sednare ej i större mängd sattes till syran, än så länge röda ångor i mängd utvecklades, fann CAILLOT att kolsyra jemte cyanväte utvecklades, hvarjemte han erhöll: 4:o såsom distillat ett surt vatten samt 2:o uti retorten en hartzartad massa i återstod. — Vid afdunstning af den sura öfverdistillerade vätskan afskiljer sig en orangefärgad, beckartad massa, innehållande, förutom det omnämnde hartzet, tvenne egna syror, af hvilka den ena är olöslig i vatten och alkohol, under det att den andra är lös i både kokande vatten och alkohol. Den sednare af dessa, som skall fås ren genom repeterade omkristallisationer ur kokande vatten, kallar CAILLOT terebenssyra och karakteriserar den såsom anskjutande ur vatten i hvita, glänsande nålar, men icke uti blad, såsom benzoesyran; den smälter vid $+169^{\circ}$, men skall redan vid $+100^{\circ}$ begynna sublimeras; dess salter likna, serdeles uti deras löslighet, mycket benzoesyran och dess eter luktar af anis samt kokar vid $+130^{\circ}$; dess sammansättningsformel, härledd ifrån elementär-

analys af den obundna syran samt bestämningen af basquantiteten uti dess silfversalt, representerar **CAILLOR** med $\text{H} + \text{C}^6\text{H}^5\text{O}^2$.

— Den i vatten och alkohol olösliga syran, som erhöles vid afdunstning af den vid salpetersyrans inverkan på terpentinjölja öfverdistillerade sura vätskan, renas enligt **CAILLOR**, efter föregående behandling med alkohol, medelst upplösning i ammoniak, ammoniaksaltets behandling med djurkol samt slutliga omkristallisation, hvarefter tillsats af en mineralsyra utfaller, såsom ett hvitt kristalliniskt pulver, den rena i vatten, alkohol och eter olösliga syran, hvilken af **CAILLOR** blifvit kallad terephthalsyra och med alkalier skall gifva fullkomligt neutrala salter samt, på grund af den fria syrans analys samt quantiteten bas uti dess silfversalt, skall hafva sammansättningsformeln $\text{H} + \text{C}^6\text{H}^5\text{O}^2$; dock ifrågasätter **CAILLOR** huruvida den icke rättast bör sättas under formen $2\text{H} + \text{C}^6\text{H}^5\text{O}^2$, emedan den, upphettad med kalkjord gifver benzol, C^6H^6 , under det att kolsyrad kalk kvarstannar. — Öfverlemnas till frivillig afdunstning det sura vattnet, hvarur den ofvannämnde orangefärgade, beaktade massan, innehållande terephthal- och terebenssyrorne, afsatt sig, så bildas, enligt **CAILLOR**, en ymnig kristallisation af oxalsyra, hvarjemte något terpentinsyra, terephthalsyra och terebenssyra afsätta sig; men moderluten innehåller enligt **CAILLOR**, förutom dessa, ännu en annan syra, hvilken af honom blifvit kallad terechrysinsyra och hvilken skall fås ren genom att med kolsyrad baryt mätta den, efter fullkomlig afdunstning till torrhet, uti vattnet sedan lösliga delen, hvarvid de andra syrornas barytsalter fallas, under det att terechrysinsyrad och salpetersyrad baryt blifva upplösta, hvarefter, då baryten sedan utfalles med svaveltsyra samt ättiksyrad blyoxid tillsättes i värme, terechrysinsyrad blyoxid skall, vid afsvälning, anskjuta i mikroskopiska nålar, hvarur syran, genom behandling med vätesvafva, kan afsondras samt sedan lemnas vid afdunstning en orangegul, okristalliserbar deg, af en sur, men tillika sträf och bitter smak. Terechrysinsyran, som icke är flygtig, utan sönderdelas vid upphettning, gifver orangegula, merendels lösliga salter och dess

eter skall vara en slemartad orangertöd vätska, som vid distillation sönderdelas. Denna syras sammansättning, bestämd genom elementaranalys af den obundna syran samt genom kvantiteten bas uti dess blysalt, skall enligt CAILLOT kunna i vattenfritt tillstånd representeras under formen $C^6H^2O^4$. — Hvad den hartzartade massa beträffar, som i början anfördes att CAILLOT erhöill såsom återstod i retorten vid salpetersyrans inverkan på terpentinolja, så säger han om den, att den efter en kortare behandling med salpetersyra är rödbrun, mjuk och till större delen lösliq i alkohol, men efter en längre behandling med salpetersyra är gul, spröd samt åtskiljes genom behandling med alkohol i tvenne afdelningar, hvarvid den olösliga delen utgöres af terephtalsyra, men den lösliga gifver vid afdunstning en hartzartad massa, hvarur vatten utdrager terebenzsyra, med lämning af tre hartzet. Behandlas den med vatten kokade återstoden med kall alkohol, så blifver α hartzet olöst; men det löses något litet i kokande alkohol, ehuru det åter vid afsvälning afsätter sig kristalliniskt; det är olösligt i ammoniak och kalihaltigt vatten, smälter öfver $+100^\circ$ och är sammansatt enligt $C^{40}H^{24}O^{10}$. Afdunstas hartzlösningen i kall alkohol till torrhets och behandlas återstoden med ammoniak, så lemnas ett, äfven i svag kalilut olösligt hartz, β hartzet, olöst, hvilket smälter under $+100^\circ$ samt är sammansatt enligt $C^{40}H^{24}O^{10}$; men i ammoniakten löses ett γ hartz, hvars smältbarhet är vid $+100^\circ$ samt sammansättning enligt formeln $C^{40}H^{24}O^{10}$.

Man kan icke neka, att ju ej de af CAILLOT framlagda resultaten synas, hvad de af honom angifna egna och nya syrorna beträffar, stödja sig på sådana skäl, hvilka måste antagas. Emellertid saknar man uti hans meddelande någon närmare uppgift om den syra, terpentinsyra, hvilken af alla hans föregångare blifvit angifven såsom varande den mest framstående produkt vid salpetersyrans inverkan på terpentinolja. Det må ej förefalla underligt om ett visst tvifvelsmål kunde af denna orsak hysas emot en del uppgifter af denne kemist, hvarför äfven, då en kvalitativ repetition af hans undersökning företogs,



det icke var osannolikt att ju icke äfven vetenskapen skulle i en eller annan riktning få något sig till godo. Till hvilken ringa grad **CAILLOTS** uppgifter blifvit bekräftade vid en sådan repetition visar sig på det tydligaste af det följande, oakadt all möda varit ospard, att, så vidt varit möjligt, följa den af **CAILLOT** beträdda marchen.

Till syrsättning med salpetersyra användes en med vatten omdistillerad fransk terpentinolja, hvarvid, såsom återstod uti retorten qvarlemnades ett hartz, som var lättsmält, lösligt i alkohol, men olösligt i kaustiskt kali och ammoniak. Distillationsvattnet innehöll myrsyra. Hvad som här kommer att anföras innehåller, förutom några tillägg i afseende på vår äldre kännedom om terpentinsyran, föga utredt och bör betraktas såsom varande endast några få iakttagelser, hvilka böra tagas i betraktande af den, som närmare uti en framtid vill bearbeta detta ämne.

Den rectifierade terpentinoljan behandlades med 4 à 5 gånger dess vikt koncentrerad, ren salpetersyra, hvilken förut blifvit utspädd med sin lika volum vatten. Inverkan skedde med mycken häftighet, hvarvid salpetersyrighet bortgick i mängd, äfvensom cyanväte. För öfrigt undersöktes icke de bildade gaserna. När utvecklingen af röda ångor slutat, afbröts operationen. Återstoden uti retorten var då I:o ett rödgult, efter afsvalning sprödt, hartz samt II:o en sur, gul vätska.

I. Den hartzartade återstoden.

4) Det erhållna hartzet digererades i flera omgångar med varm alkohol, hvarvid till slut återstod en liten olöslig qvantitet af en mörk kropp, som af den varma alkoholen ej ens veknade, utan söndersmulades under kokningen. Den i varm alkohol olösta delen löste sig till en del uti kaustik ammoniak, men ännu bättre i kaustik kalilut. Om denna återstod, som troligen icke hör till de ursprungliga, utan synes bildas genom hartzets ombildning på luftens bekostnad, nämner icke **CAILLOT** något. Deremot säger **CAILLOT** att terephtalsyra blifver olöst

efter hartzets utdragning med varm alkohol; men af denna syra kunde intet spår förmärkas vid vår operation.

2) Då den så erhållna varma alkohollösningen öfverlemnades åt sig sjelf till afsvalning, afsatte sig en del hartz såsom en gul fällning. Denna fällning behandlades åter med varm alkohol, tilldess alkoholen, efter afsvalning, var endast svagt färgad af upplöst hartz. Det afsatta hartzets smältpunkt är högre än de andra hartzernas (det veknar ännu ej vid $+100^{\circ}$), hvarföre det i vätskan bibehåller en pulverform, utan att sammanbaka. Af beredningssättet torde det nu vara *CAILLOTS* α hartz, men om detta sistnämnda säger *CAILLOT* att det ej löses af svag kalilut eller af ammoniak, hvilket åter var händelsen med det af oss beredda. Får lösningen af detta hartz stå en tid utsatt för luften, så bildas deruti efter hand den under 1, 4 omnämnda, i äfven varm alkohol olösliga (huminsartade?) kroppen.

De återstående i kall alkohol lösliga hartzerna utfälldes med vatten. Den utspädda alkoholen, som ännu höll något hartz upplöst, afdunstades, hvarefter allt det så erhållna hartzet digererades med varmt vatten, som dervid färgades gult. Den gula lösningen fällde ej jordarterna, men gaf med flera metallsalter, såsom jernchlorid, ättiksyrad blyoxid, salpetersyrad silfveroxid och qvicksilfveroxid, ljusgula kofviga fällningar. Afdunstadt gaf vattnet i återstod en liten quantitet lättsmält hartz. Någon te-rebenzinsyra, som *CAILLOT* angifver sig hafva i mängd med vatten utdragit kunde icke varseblifvas.

3) Det sålunda ur kall alkohollösning utfällda och med vatten sedermera digererade hartzet behandlades med kaustik ammoniak, som, utan att behöfva uppvärmas, med lätthet löste större delen med mörkt svartbrun färg. Får ammoniaklösningen stå i luften och draga kolsyra till sig, så utfälles hartz. Sättes svafvelsyra till ammoniaklösningen af hartzet, så faller hartzet i ljusa, spröda kofvor, under utveckling af en egen stark lukt, förmodligen härrörande af någon ætherisk olja. Detta hartz, som är något lösligt uti rent vatten, utgör största delen

af hela den hartzartade återstod, hvilken kvarlemnas uti retorten vid salpetersyrans inverkan på terpentinolja samt är ensamt vida mera, än de andra hartzerna tillsammanstagna. Det veknar vid $+80^{\circ}$ samt smälter omkring $+100^{\circ}$ och synes vara enahanda med Caillots γ hartz, ehuru väl fråga kan uppstå huruvida det är en oblandad och ren produkt.

4) När kall kaustik ammoniak upphört att lösa något, kan ännu varm ammoniak utdraga en viss afdelning utaf det som med vatten blifvit utfäldt ur hartzlösningen i kall alkohol och

5) det, som dervid lemnas olöst utgör, efter tvättning först med surt och sedan med rent vatten, ett hartz, hvilket veknar omkring $+50^{\circ}$, smälter emellan $+90^{\circ}$ och $+95^{\circ}$ samt utgöres af Caillots β hartz, men att det icke är rent, följer deraf, att varm kalilut derur kan utlösa en viss del.

II. Den sura, gula vätskan.

Denna koncentrerades i vattenbad. När concentrationen egt rum till stadga af tjock sirup, visade sig en ymnig gasutveckling och då detta möjligen kunde vara en följd af en sönderdelning, som föranleddes af förhandenvarande öfverskjutande salpetersyra, afbröts vidare koncentring. Vid utspädning med mycket vatten af den afsvalnade sirupen, uppkom en hvitgul, flockig fällning, ehuru alltid i relativt ringa mängd, hvilken concentrationsgrad som helst man än sökte gifva det afdunstade eller den med vatten försatta afdelningen.

A. Den erhållna fällningen utgjordes utaf ett hvitt eller svagt gult, beaktadt ämne af stark och angenäm mandellukt, hvilken lukt dock försvann under ämnets vidare behandling. Här borde nu enligt Caillots uppgift terephtalsyra och terebenzinsyra hufvudsakligen vara att söka.

För att utdraga den sednare syran, behandlades massan förnyade gånger med kokande vatten. Det af vatten ökosta blef för hvarje gång hvitare, dock syntes det dervid något lösas, ehuru väl mycket trögt. Den varma lösningen afsatte vid afsvälmning åter det beaktade ämnet, men deremot ingen tere-

benzinsyra. Concentrerad och afdunstad gaf lösningen i återstod samma ämne jemte hartz, men någon terebenzinsyra kunde aldrig upptäckas i denna afdelning.

1) Det återstod då att efterse huru det kunde förhålla sig med den så kallade terephtalsyran. De partiella resterna efter föregående försök sammanslogos derföre, hvarefter de digererades med kall alkohol, som derur utdrog ett vid vanlig temperatur mjukt hartz, lösligt äfven i alkohol och kokande vatten och som af vatten icke fälles ur dess alkohollösning. Det är detta hartz, som gifver fällningen dess gula färg och becktartade konsistens.

2) Det återstående var nu af en renare hvit färg. Af ammoniak löstes det till en svartbrun vätska med återstod af litet hartz. Lösningen behandlades med djurkol, utan att likväl derigenom den mörka färgen kunde på något sätt förminskas. Då fällning sedermera skedde med svafvelsyra, föll väl ämnet såsom ett temligen hvitt pulver, men vid ny upplösning i ammoniak återtog lösningen sin djupt mörkbruna färg.

Sådant detta ämne fås efter fällning ur dess ammoniaklösning, utgöres det af ett ljust gulhvitt, okristalliniskt och smaklöst pulver, som lätt sammanbakar till klumpar. Försöker man med kokande alkohol utdraga något derur, så löser det sig, ehuru ytterst trögt, men det olösta förlorar dervid icke något af dess färg. Får denna alkohollösning afsvalna, så tyckes den afsatta delen, under mikroskopet och vid stark förstoring, vara kristalliniskt. Äfven i kokande vatten löser det sig i ringa mängd, men icke uti eter. Vid ammoniaksaltets afdunstning tyckes det under mikroskopet kristallisera i små runda korn eller qvastar af nålformiga kristaller, men detta salt är alltför lösligt för att derigenom vinna någon rening. Med baryt- och kalksalter gifver det, ur concentrerad lösning, kristalliniska fällningar; med jernchlorid, ättiksyrad blyoxid och salpetersyrad blyoxid gifver det, uti äfven något utspädda lösningar, fällningar, hvilka till färgen äro gulhvita, men om hvilka dock, äfven vid stark förstoring, neppeligen kan afgöras huru-

vida de äro kristalliniska. Upphettad på platinableck smälter icke denna syra, utan afgifver en hvit rök, af en oangenäm vidbränd lukt, hvarefter på blecket återstår ett kol af samma storlek och form, som det uppvärmda ämnet och som, vid starkare upphettning tänder sig och förglimmar. Företages upphettningen af syran uti ett glaströr, så bortgå dervid vatten och kolsyra, i röret bildas ett hvitt sublimat, orenadt af en gul vätska och kol återstår, men derjemte kännes en först stark angenäm och cyanlik lukt, och, sedan denna bortgått, erfar man en oangenäm och vidbränd. Drifver man hettan öfver på sublimatet, så qvarlemnar äfven detta litet kol och bildar ett, numera utan förändring sublimerande ämne. Ur det så erhållna sublimatet kan man lätt med varmt vatten utdraga en syra, som utkristalliserar i nålar, vanligen förenade i små runda bollar och hvars ammoniaksalt äfvenledes kristalliserar i nålformiga grupper. — En annan i vatten olöslig syra återstår som kan utdragas med ammoniak. Detta ammoniaksalt kristalliserar i tunna taflor. Sättes en mineralsyra till ammoniaksaltets lösning, så utfälles syran genast såsom ett hvitt pulver, hvilket, om lösningen var mycket utspädd, visar sig under mikroskopet utgöras af korta, nålformiga kristaller. — Var sublimatet icke förut genom upphettning omsublimerat, så kristalliserar ur dess vattenlösning en syra, hvilken, att döma af dess sätt att kristallisera uti vida större kristaller, synes vara helt olika med de andra här omnämnda.

Onekligen skulle elementaranalyser och atomvigtsbestämnelser af nyssanförda syror varit af intresse, men den ringa materialtillgången medgaf på långt när icke ett sådant utförligare studium. De nu framlagda ofullständiga reaktionsförhållanderna af de anförda kropparna gifva emellertid tillräcklig anledning att visa hvilket vetenskapligt intresse sannolikt är fästadt vid ämnets fullständiga utredande samt att någon sådan kropp, som karakteriserar den Caillotska terephtalsyrans bildningssätt och öfriga förhållanden, icke gifvit sig tillkänna vid den operation af salpetersyrans inverkan på terpentinjölja, som

af oss blifvit företagen, hvarföre vi äfven skulle tro att ett visst frågetecken ännu kan sättas för hela terephtalsyrans tillvaro.

B. Den, efter utfällning med vatten, återstående gula lösningen concentrerad och lemnad till hvila under ett dygn, afsatte kristaller, hvilka till en del voro långa och nålformiga, men till en annan del voro smärre och orediga. Sedan dessa kristaller blifvit frångilda och lösningen ytterligare concentrerad, egde en ymnig anskjutning rum uti blad. Vid ännu ett tredje försök att concentrera moderluten till kristallisation blef den så segflytande, att den, vid börjande afsvalning lät draga ut sig i trådar samt efter fullständig afsvalning föredde en hård massa. För att pröfva huruvida denna moderlut innehöll hartz, försöktes en ny utfällning med vatten, men alltsammans löstes dervid utan återstod.

a) De utkristalliserade syrorna löstes uti vatten, hvarvid större delen löstes med lätthet, men en annan del först efter tillsats af mera vatten och uti värme.

1) Efter afsvalning afsatte sig den svårlöstare delen af syrorna ganska snart samt renades genom några gångers omkristallisation ur vatten. Efter rening karakteriseras denna syra af följande egenskaper.

Den är i kallt vatten ganska tröglöst, men löses deremot temligen lätt i varmt. Alkohol löser henne i större quantiteter, ehuru väl denna lösning icke försiggår serdeles fort utan uppvärmning, deremot löses den mindre lätt af eter. Ur dess i värme mättade vattenlösning utkristalliserar syran vid afsvalning till större delen i kvadrat-oktaedrar, som äro temligen utdragna på längden och hvilkas öfre kant samt hörn äro afstympade. Uti concentrerad kall svafvelsyra löser sig denna syra — hvilken vi framdeles skola få se icke är annat än den förut kända terpentinsyran — utan färg samt utkristalliserar oförändrad vid utspädning med vatten. Huruvida genom fortsatt behandling, serdeles i värme, med concentrerad svafvelsyra några sönderdelningsprodukter bildas, har ej blifvit gran-

skadt, likasom icke, heller buru denna syra förhåller sig till vattenfri svafvelsyra. Af salpetersyra löses terpentinsyran ganska lätt och återfås oförändrad vid afdunstning.

Upphettas den här ifrågavarande syran, terpentinsyran, så sublimeras den utan att afgifva något kristallvatten. Redan vid $+100^{\circ}$ kan man iakttaga att sublimation eger rum, ehuru väl den då sker ytterst långsamt; men vid en högre värme-grad sublimeras den fortare, dock alltid trögt. De kristaller i hvilka hon dervid afsätter sig visa ett något olika utseende med dem, hvilka man erhåller ur dess upplösning; hela skillnaden är dock endast att kristallerna synas mera platta samt att alla oktaederhörnen äro rakt afskurna. Dessa kristaller klyfva sig lätt vid tryckning i två lika halfvor, jemt efter den största genomskärningen. Vid $+168^{\circ}$ smälter syran, hvarefter den icke vidare synes kunna sublimeras såsom oförändrad. Emellertid synes hon icke genom smältningen hafva undergått någon förändring, ty om man upplöser den vid 168° å 170° smälta syran i vatten, så återfås hon vid afdunstning i den vanliga kristallformen, hvilket äfven är händelsen med den syra, som sublimerat under lägre temperatur. Höjes värmegraden ännu högre, till omkring $+190^{\circ}$, så sönderdelas den smälta syran uti kolsyra och ett färglöst oljartadt liqvidum, dock återstår gerna något kol, hvilket kol dessutom lätt medföljer det omnämnda liqvidum vid dess öfverdestillering och färgar det brunt. Detta liqvidum har en oljartad konsistens och en stark samt länge vidhängande lukt. Oaktadt det icke eger någon hvarken serdeles sur, skarp eller brännande smak, hvilken deremot är fedd och ganska obestämd, reagerar det likväl ganska surt på rodnadt lackmuspapper. Sätter man vatten till det oljartade liqvidum, så slår det vattnet med häftighet ifrån sig, men löses af en större quantitet. Sättes stark kaustik ammoniak i mindre quantitet till det oljartade liqvidum, så steltnar snart alltsammans till en vit saltmassa, som dock af mera ammoniak löses och ej vidare kan fås att kristallisera, utan förflygtigas vid afdunstning. Detta liqvidum synes ej vara annat än R_{A} -

oundens pyroterebinsyra; men af dess förhållande till ammoniak vill det synas, såsom om denna syra skulle kunna bilda såväl sura, som neutrala salter. Till det lilla vi förut känna om denna syra torde få läggas, att dess silfversalt visar sig under mikroskopet vara kristalliniskt samt att dess ammoniumoxidsalt gifver fällningar då det sättes till lösningar af ättiksyrad blyoxid, qvicksilfveroxid, tennchlorur och jernchlorid.

Terpentinsyran bildar tvenne serier af salter, eller, med andra ord, den är, hvad mången nu, på grund af ett lättfärdigt användande af mångbacitet hos syror, skulle säga, en tvåbasisk syra, emedan quantiteten bas uti den ena saltserien är, på samma quantitet syra, endast hälften så stor, som uti den andra saltserien. Hvad de förra eller de sura salterna beträffar, så reagera de svagt sura på lackmuspapper, hvaremot de neutrala reagera något alkaliska på ett af syra förut rodnadt lackmuspapper — åtminstone är detta förhållandet med de olika barytsalterna. Behandlar man ett olösligt kolsyradt salt af en bas med vatten och terpentinsyra, så utdrifves kolsyran, men icke — äfven i värme — längre, än att basens sura terpentinsyrade salt blifvit bildadt. Likaså, om kaustik ammoniak sättes i öfverskott till syran och man uppvärmer till kokning, så utdrifves ej blott den i öfverskott tillsatta ammoniaken, utan äfven så mycket af den bundna, att endast sur terpentinsyrad ammoniumoxid befinner sig i lösningen. Följande kvalitativa undersökningar af terpentinsyrans för det mesta sura salter hafva blifvit gjorda. Den ringa tillgången å terpentinsyra har icke medgifvit att anställa undersökningarne i annat än serdeles liten skala samt så liten, att hvarken quantiteten bas eller förhandenvarande af kristallvatten kunnat bestämmas.

Kalisaltet, beredt genom att sätta kalihydrat till den fria syran, men likväl i ej större quantitet, än att lösningen ändock reagerade svagt sur — således det sura kalisaltet — kristalliserar icke, utan intorkar i värme till en gummilik massa, som, lemnad i loften, deliqvescerar.

Natronsaltet, beredt genom att sätta en lösning af kolsyradt natron till syran, så länge kolsyra bortgick, således det sura saltet, kristalliserar icke heller, men saltet deliquescerar icke.

Ammoniumoxidsaltet, beredt genom att lösa syran i ammoniak och koka lösningen länge, är ytterst lättlösl, men kristalliserar dock, ehuru oredigt. Äfven om man låter syrans lösning i ammoniak intorka för sig sjelf, utan att använda yttre värme, fås icke någon redigare kristallisation, utan endast en gruppering af fina nålar. — Det neutrala saltet är icke med säkerhet framställt.

Barytsaltet. — Det sura, beredt genom att lösa kolsyrad baryt i syran, är mycket lättlösl och kristalliserar ej genom afdunstning af dess lösning, ty äfven vid frivillig afdunstning af dess lösning, intorkar detta salt till en gummilik massa. — Det neutrala saltet fås om det sura öfvermättas med barytvatten samt den öfverskjutande baryten afskiljes genom inledande af kolsyra i värme; men äfven detta salt kristalliserar icke.

Kalksaltet, beredt genom att lösa kolsyrad kalk i syran och således surt, är lättlösl samt kristalliserar i fina spetsiga nålar. Vid afdunstning anskjuta äfven gröfre, mera isolerade kristaller, om hvilka man kan förmoda att de hafva en olika vattenhalt. De finare nålarne hafva ett vackert sidenglänsande utseende. De gröfre nålarne visa sig under mikroskopet vara fyrsidiga med stark tillspetsning.

Talkjordssaltet, beredt genom att lösa magnesia alba i syran, är mycket lättlösligt och intorkar vid afdunstning till en gummilik massa.

Nickelsaltet, beredt genom behandling af kolsyrad nickeloxidul med den fria syran samt *Koboltsaltet*, beredt på ett analogt sätt, äro båda lättlösliga och intorka, utan att vela kristallisera, det förre till en grön, det sednare till en violett massa, hvaruti endast små kristallnålar kunna här och der upptäckas. *Manganoxidulsaltet*, beredt på likartadt sätt, förhåller sig lika.

Zinkoxid-

Zinkoxidsaltet fälls ej, äfven ur concentrerade lösningar.

Cadmiumoxidsaltet, beredt genom att lösa kolsyrad cadmiumoxid i den fria syran, kristalliserar temligen lätt i tunna taflor.

Blyoxidsaltet beredt på analogt sätt och således surt, kristalliserar ur en någorlunda concentrerad lösning i små, hvita, halfklotformiga kristallgrupper, bestående af platta, tunna fyrsidiga nålar, hvilka emot ändarne äro tvenne gånger snedt afskurna åt samma sida.

Kopparoxidsaltet, beredt genom behandling af kolsyrad kopparoxid med syran, anskjuter vid afdunstning i rediga blå kristaller, utgörande fyrsidiga taflor eller prismor, än med enkel och än med dubbel tillspetsning. Kopparoxidsalter fällas ur mycket concentrerad lösning af syrans alkalisalt.

Qvicksilfveroxidsaltet, beredt genom att digerera syran med oxiden kristalliserar i nålar och är löslöst. — *Qvicksilfveroxidulsalter* gifva, äfven uti en mycket utspädd lösning en stark fällning med syrans alkalisalt och fällningen visar sig under mikroskopet utgöras af små nålknippen, hvilka på deras midt äro sammandragna, men emot ändarne utbreda sig yfvt. De enskilda nålarna äro fyrsidiga prismor, hvilka dock sakna tillspetsning, utan äro tvert afskurna.

Silfversaltet. Det sura, beredt genom att fälla det sura barytsaltet med salpetersyrad silfveroxid, visar sig under mikroskopet utgöras af en sammangyttring utaf fina kristallnålar. Tagas lösningarna mycket utspädda så afsätter sig saltet om en stund i för ögat tydliga fyrsidiga nålar. I kallt vatten är det ganska svårlöst. Vid lindrig upphettning bortsublimerar en del af syran. — Det *neutrala* saltet fås genom att fälla salpetersyrad silfveroxid med neutral terpentinsyrad baryt (se ofvanföre). Det är ej så luckert, som det föregående, utan kompakt och svårt att tvätta; visar sig under mikroskopet icke vara det ringaste kristalliniskt; tyckes, hvad lösligheten i vatten beträffar, vara lika lösligt, som det föregående, men svårare lättare af solljuset.

Kromoxidsalter fallas icke af syrans alkaliskt.

Hvad den ifrågavarande syrans atomistiska constitution beträffar och för att, utom den likhet uti egenskaper, hvilken är ådagalagd af hvad som redan blifvit anfördt, ytterligare rättfärdiga dess identitet med den förut kända terpentinsyra, hafva några analytiska bestämmelser blifvit gjorda, hvilka här skola omnämnas.

0.4713 grm kristalliserad syra, som blifvit torkad vid + 100° C., gafvo, vid förbränning med kopparoxid, 0.9137 grm kolsyra samt 0.270 grm vatten.

0.5371 grm syra gaf vid förbränning 0.3055 grm vatten. Kolsyran förlorades.

Beräknas häraf syrans procentiska sammansättning och sammanställes denna med de procentvärden, som BROMEIS *) och RABOURDIN funnit, så fås

	E K M A N.		BROMEIS.	RABOURDIN.	räkn.
	1.	2.	.	.	.
C' . . .	52.87		53.203	53.08	53.17
H' . . .	6.37	6.32	6.768	6.46	6.33
O' . . .	40.76		40.029	40.51	40.50.

Dessutom fann EKMAN vid förbränning af ett silfversalt, att 0.646 grm salt gafvo 0.7328 grm kolsyra och 0.1843 grm vatten. Här af fås det analyserade saltets procentiska sammansättning

	funnet	räkn.
C'	30.94	31.70
H'	3.17	3.40
O' } Ag }	förlust . . 65.89	64.90.

Dessa funna värden åter instämma på det närmaste med formeln $\text{AgC}'\text{H}'\text{O}' + \text{HC}'\text{H}'\text{O}' = \text{AgC}'\text{H}'\text{O}'$, således densamma som BROMEIS' och RABOURDINS, allenast med den skillnad, att dessa kemister intagit uti syrans formel elementerna för en atom vatten mera än vi, härrörande deraf, att de betrakta saltet såsom

*) Den af BROMEIS anställda analys är omräknad med de nya atomviktiga på kol och väte, hvilka numera allmänt användas.

neutralt, under det att vi anse det, på skäl, som straxt skola framläggas, såsom ett surt salt. De något för knappa procenthalter af såväl kol, som väte, hvilka vi funnit, emot hvad som enligt beräkning fås, förklaras deraf, att det till analysen använda saltet var beredt genom fällning af salpetersyrad silfveroxid med en sådan terpentinsyrad ammoniumoxid, som visserligen länge kokat för att utdrifva öfverskottet af ammoniak, men hvaruti dock någon ringa portion af det neutrala ammoniumoxidsaltet måste hafva varit icke decomponeradt samt vid fällning gifvit upphof åt en ringa inblandning af neutralt silfversalt. Då först efteråt och sedan den större delen af erhållen terpentinsyra var förbrukad, iakttagelsen om tillvaron af sådane andra salter gjordes, hvilka på samma qvantitet syra innehålla en dubbelt större qvantitet bas, medgaf icke det återstående lilla förrådet att bereda en ny portion af detta salt, hvilket säkrast torde fås rent genom att fälla silfversolution med sur terpentinsyrad baryt, beredd förmedelst syrans inverkan på kolsyrad baryt. Icke heller har den inskränkta tillgången på syran medgifvit att anställa någon silfverbestämmelse af saltet. Då BROMMIS och RABOURDIN icke heller hvar för sig gjort fullständiga analyser af deras under händer varande syra, kunna numera alla de af olika experimentatorer verkställda bestämmelser sägas inbördes supplera hvarandra samt derjemte tjena till att kontrollera hvarandra.

Emellertid skulle ofvanstående uppfattning af terpentinsyrans sammansättning svårligen tillvinna sig förtroende, såvida den icke understöddes af någon numerisk bestämmelse af ett neutralt salt. Då, efter föregående försök, en serdeles obetydlig portion af syran återstod, som icke medgaf att bereda tillräckligt material för bestämmandet af det neutrala saltets halt utaf såväl bas, som utaf dess kol- och vätekvantiteter, måste vi inskränka oss till utförandet af blott den ena arten analys samt bestämde oss för den sednare, hvarvid vi funno, att

1.003 grm neutral terpentinsyrad silfveroxid, beredd genom fällning af AgN medelst neutral terpentinsyrad baryt —



för hvars beredning vi hänvisa till hvad som finnes anfördt ibland salterna — gaf efter föregående torkning vid 100° , 0.9286 grm \ddot{C} , svarande emot 21.10 proc. kol, och 0.2733 grm \ddot{H} , svarande emot 2.53 proc. väte. — Genom en silfverbestämmeelse uti en portion salt, hvars vikt endast var 0.068 grm och som således icke kan göra anspråk på stor tillförlitlighet, funno vi, då 0.038 grm silfver derur erhöles vid upphettning, att saltet innehöll 55.88 proc. silfver.

Sammanställa vi dessa funna värden med de beräknade procentiska tal, hvilka härledas ifrån den kemiska formel, hvarunder de lättast låta sublimera sig, så visar sig

	funnet	räkn.
C'	21.10	21.54
H'	2.53	2.56
O'	20.49	20.52
Ag	55.88	55.38

att denna formel är $AgC'H'O^3 + \ddot{H}$. Visserligen företer sig härvid såsom ganska egen den i formeln signalerade vattenatomen, emedan silfversalter i allmänhet, men serdeles då de blifvit torkade vid $+100^{\circ}$ C., icke bruka qvarhålla något vatten; men då något skäl för vattenfrihet hos silfversalter, mera än hos andra baser svårligen kan inses och då dertill kommer att något försök ännu icke kunnat, af brist på material, anställas huruvida detta silfversalt förlorar, vid en något högre drifven temperatur, den i formeln antydda vattenatomen, torde något hinder icke ifrån den synpunkten möta för antagandet af den utaf oss framlagda sammansättningen af terpentinsyran, såsom uttryckt medelst $\ddot{H}C'H'O^3$ och hvaruti \ddot{H} kan utbytas emot baser.

Att åter antaga det sednast här anförda silfversaltet såsom varande basiskt låter svårligen göra sig, om man erinrar sig detta salts beredning förmedelst användande af det motsvarande barytsaltet, hvilket sednare, oaktadt af oss icke analyseradt, likväl måste hafva en likartad sammansättning. Utan att tala om det frågetecken, som mången skulle sätta framför ett basiskt barytsalt, tro vi att sjelfva dess beredningssätt bör uto-

sluta all tanke om dess basicitet. All den öfverskjutande och såsom basisk befintliga baryten bör nemligen utfällas, vid inledning af kolsyra uti dess vattenlösning, hvilket åter är den beredningsmethod för det neutrala barytsaltet, som vi iakttagit och som i det ofvananförda finnes angifven.

För dem, som med förkärlek tänka på mångbasiska syror, blifver terpentinsyran att betrakta såsom varande en tvåbasisk syra, representerad genom formeln $2\dot{\text{H}} + \text{C}^{\text{H}}\text{H}^{\text{O}}\text{C}^{\text{r}}$, af hvars salter

vi känna såväl $\left. \begin{array}{c} \text{r} \\ \text{H} \end{array} \right\} + \text{C}^{\text{H}}\text{H}^{\text{O}}\text{O}^{\text{e}}$ som $2\dot{\text{r}} + \text{C}^{\text{H}}\text{H}^{\text{O}}\text{O}^{\text{e}}$. För vår del

anse vi likväl ett afgörande af frågan: huruvida denna syra är en- eller två-basisk ännu vara alltför tidig. Förutom en utvidgad kännedom om dess salter, anse vi nemligen ett studium uti äfven andra riktningar vara af nöden, innan man på den frågan kan afgifva ett sakrikare svar. Sålunda böra försök anställas för att efterse huruvida icke terpentinsyran är en dubbelsyra, hvarest hvar och en af de ingående syrorna bibehålla sin mättningscapacitet, eller om den icke är ett med någon syrsättningsgrad af kolet koppladt kolväte. Erinra vi oss likväl huru mycket ännu återstår att undersöka, innan vi kunna om äfven mera tillgängliga syror, såsom t. ex. vinsyra och citronsyra, yttra oss om hvilka constituerande elementer uti dem ingå, eller innan vi kunna — i likhet med hvad som synes följa af KOLBES vackra undersökningar om ättiksyran och valerianasyran, att de nemligen äro oxalsyra, som är kopplad med ett kolväte — ens framlägga några sannolikare åsigtsformer, hvarunder deras metamorfoser låta subsumera sig, så torde vi inse, att hvarje spekulation i närvarande stund om terpentinsyrans inre natur vore alltför tidig eller rättare alltför omotiverad, och detta, emedan några data icke finnas för handen för att med fakta bevisa de hypoteser, som möjligen kunde framkastas. Af detta, om ock endast af detta, skäl anse vi terpentinsyran åtminstone tillsvidare böra få gå och gälla för enbasisk, likasom hvarje annan syra, hvars förhållanden icke ovilkorligen tvinga oss att antaga dess mångbasicitet. Ligger ett

fel härutinnan, som väl kan vara möjligt, så gör man dock sannolikt rättare emot framtida undersökningar, om man, vid första uppfattningen af ett ämnes kemiska natur, utgår till en början ifrån den enklare och icke ifrån den mera invecklade åsigten, hvilken sednare alltid tillkännagifver sig innehafva ett kunskapsmått, hvilket man, ej utan skäl, begär att få se utveckladt uti dess helhet.

2) Sedan terpentinsyran, såsom den svårlöstare afsatt sig af de syror, hvilka utkristalliserade ur den gula lösning, som fanns för handen, efter utfällning med vatten och vidare concentrering af den förut med salpetersyra behandlade terpentinolje-vätskan, mättades den återstående lösningen med kolsyrad baryt, hvarvid en stor mängd af en hvit fällning uppkom uti groft kristalliniskt utseende. Den utgjordes af oxalsyrad baryt.

Den vid oxalsyrate baryt-fällningens upptagande på filtertrum genomgående vätskan gaf, vid concentrering, inga kristaller. Vid tillsats af svafvelsyra utfälldes svafvelsyrad baryt. Lösningen efter svafvelsyrate barytens affiltrering, gaf vid concentrering en portion 'terpentinsyra; men efter terpentinsyrans upptagning förefanns icke något annat i lösningen.

Straxt under B) är omnämndt, att när de i denna afdelning befintliga syror utkristalliserades ur moderluten, erhöles äfven en ymnig anskjutning i blad. Dessa bladiga kristaller undersöktes — till följe af inträffade omständigheter — icke för sig, men utgöras sannolikt af samma bladkristaller som RABOURDIN beskrifvit under namn af fyrfaldt oxalsyrad ammoniumoxid. CAILLOT omnämner dem icke. Emellertid säger CAILLOT, att efter den behandling, som här blifvit vidtagen, såväl terebenzsyra och terephtalsyra, som oxalsyra och terpentinsyra afsätta sig. Af terebenzsyran, eller någon syra med dess karakterer hafva vi likväl icke förmärkt något spår. Deremot afsatte sig ur moderluten jemte syror, en liten quantitet hvitt pulver, som icke sedan kunde lösas af vatten. Så vidt de med detta hvita pulver anställda försöken gifvit oss någon upplysning, har det tyckts vara samma kropp, som blif-

vit beskrifven under afdelningen II. A hvarom åter i det föregående är visadt, att någon kropp med terephtalsyrans karakterer icke förefinnes.

b) Den gula lösning, som återstod efter syrornas (terpentinsyrans och oxalsyrans) *utkristallisation* afdunstades till måttlig concentrering och neutraliserades i värme med kolsyrad baryt. Härvid afskilde sig efterhand en tung fällning, under det att lösningens färg blef allt mörkare samt öfvergick ifråu ljust rödgul till nära nog svartbrun.

α) Den upptagna fällningen är svagt gulaktig, till följe af vidhängande moderlut, hvarifrån den, äfven genom tvättning medelst varmt vatten icke kan fullt befrias. Syran uti det fällda barytsaltet befanns vid undersökning utgöras af oxalsyra; men äfven i denna afdelning kunde icke de syror, terebenzsyra och terephtalsyra upptäckas, hvarom dock CAILLOR talar.

β) Den genomgångna lösningen, efter sista oxalsyrade barytens affiltrering, lemnades till hvila och afsvalning, hvarvid den fyllde sig med en lätt fällning, som långsamt sjönk till botten *). Vid ytterligare concentrering erhöles betydligt mera af denna fällning, men någon egentlig kristallisation kunde icke fås, äfven om man afdunstade till sirupsconsistens och öfverlemnade den då med ett skinn på ytan betäckta lösningen i flera dygn åt sig sjelf **). Den behandlades då med litet vatten i värme, hvarefter, vid afsvalning, den ofvannämnda fällningen åter erhöles, hvilken således tyckes erfordra en viss concentrationsgrad, hvarken för stark eller för svag, för att bilda sig. Några försök hafva icke blifvit anställda huruvida bildningen af denna fällning är förorsakad af någon omvandling, som egt rum till följe af luftens inflytelse.

*) Denna lösning fälles af alkohol, såsom en gul kristallinisk massa blandad med mörka hartzlika klumpar. Men för att ej afvika ifrån CAILLOR för mycket begagnades ej denna method för att afskilja någon del deraf.

**) När man till denna massa tillsatte kallt vatten, blef den ogenomskinlig och likasom fälld, först grön, så gul och slutligen bildades en ljust rödaktig fällning innan alltsammans öfvergick till den vanliga mörka lösningen.

αα) Den erhållna fällningen är ett barytsalt. Under mikroskopet visade den sig utgöras af små runda korn. Den tvättades med kallt vatten ifrån moderlut, men till följe af dess löslighet kunde härvid ingen bestämd gräns iakttagas. Behandlas den med varmt vatten, så löser sig större delen med gul färg, qvarlemnande en lätt svartbrun fällning, som dock vid fortsatt behandling också löses och färgar vattnet smutsigt gulbrunt. Samma förhållande eger rum vid ämnets tvättning med kallt vatten, och när tvättvattnet concentreras erhöles fällningen åter vid afsvalning. Den svartbruna fällningen erhålles i blott ringa mängd och har ej vidare blifvit undersökt. Af anledning, som nedanföre skall nämnas, utfälldes den först af ett litet prof utdragna gula lösningen med svafvelsyra och den fra syran bragtes i en varm lösning af ättiksyrad blyoxid. Efter afsvalning afsatte sig en gul fällning, som under mikroskopet, vid starkare förstoring visade sig bestå af helt små kristaller, hvilka till en del voro ganska tydligt nålformiga.

ββ) Den genomgångna lösningen utfälldes med svafvelsyra: sedan den svafvelsyrade baryten blifvit frånskild koncentrerades lösningen ånyo och hälldes ännu varm till en kokande lösning af ättiksyrad blyoxid, hvarpå blandningen genast i värme afiltrerades ifrån den svafvelsyrade blyoxid, som dervid bildats. Efter ett dygns hvila hade kristallgrupper i mängd afsatt sig.

4. Detta blysalt hade en ljust rödaktig färg, i tunnare lager skiftande i grönt. Det bestod af små grupper af redan för ögat urskiljbara runda eller päronformiga conglomerationer, ty kristaller kan man väl om dem ej säga, då de icke, äfven vid den största förstoring mikroskopet kunde åstadkomma, företedde någon plan yta. För öfrigt voro de hårda samt genomskinliga, och deras sätt att afsätta sig liknade fullkomligt en vanlig kristallisation. De smälta lätt, då man försöker att uti värme torka dem, lösas sedan mycket trögt i äfven kokande vatten samt afsätta sig derur, vid afsvalning, på enahanda sätt, som förut. — Genom att inleda vätesvafva uti vatten, hvaruti blysaltet blifvit utrördt, gjordes ett försök att fri-

göra det med blyoxiden förenade organiska ämnet; men detta misslyckades, emedan den friblefnä syran tycktes sönderdelas af vätesvafva. Under blyets fortgående afskiljande såsom svafvelbly, antog nemligen lösningen en för den fria syran främmande dunkelt mörkgul färg. Behandlingen med vätesvafva egde rum uti täppta och för atmosfäriska luftens inflytelse skyddade flockor. Vid affiltrering af svafvelblyet, sönderdelades lösningen så hastigt i luften, att den rann grumlig och svartbrun genom filtrum. Lemnad åt sig sjelf fortgick sönderdelningen så, att alltsammans slutligen blef en svart tjock massa. Då såväl svafvelblyafdelningen, som lösningen efter dess affiltrering gingo förlorade, kunde några utvidgade försök icke dermed anställas. Likväl visade några reaktionsprof på lösningen och det derur vid luftens inverkan fällda, att det höll svafvel, fräste med kolsyrade alkalier, löstes med gul färg af salpetersyra samt löstes af vatten med lemning af en lätt svart fällning.

Den mindre betydliga, ur kokhett vatten omkristalliserade delen af blysaltet fälldes med svafvelsyra och neutraliserades med kolsyrad baryt. Oaktadt barytlösningen förvarades i en väl sluten flaska har dock en svartaktig fällning deruti bildat sig.

Man skulle nu kunna göra sig den frågan: huruvida den här iakttagna syran är enahanda med *CAILLOT*s terechrysinsyra. Det sätt, på hvilket dess barytsalt afsätter sig är alltför eget för att *CAILLOT* skulle kunnat undgå att anmärka det; åtminstone hade han icke derpå kunnat använda benämningen »små mikroskopiska kristaller.» Dessutom omnämner *CAILLOT* icke den utfällning, som frivilligt försiggår uti den med kolsyrad baryt neutraliserade och derpå filtrerade moderluten, utan har han genast utfällt denna med svafvelsyra och tillsatt ättiksyrad blyoxid.

I den förmodan, att den under II. B. b. β . aa) omnämnda fällning kunde vara terechrysinsyrad baryt, som till följe af någon omständighet (t. ex. starkare concentrering eller något dylikt) för *CAILLOT* icke egt rum, afsatt sig, bereddes af en

liten del utaf denna fällning den deruti befintliga syrans blysalt. Såsom på nämnde ställe är anfördt, afsatte sig blysaltet i små mikroskopiska kristaller. Detta kan vara ett faktum att omnämna, ehuru väl det för sig ingenting säger. För öfrigt fortsattes icke undersökningen af detta ämne likasom icke heller af

den moderlut, hvilken fanns för handen efter blysaltets omkristallisering, och hvilken sednare, efter afdunstning, utgör en tjock, seg massa samt synes vara den till quantitet hufvudsakliga produkt, som fås igenom salpetersyras inverkan på terpentinoljan.

2. Några bidrag till Sveriges mineralgeografi. — Herr Mag. C. W. BLONSTRAND, som i December månad förlidne år, under en resa mellan Lund och Wexiö iakttagit några förut ej anmärkta mineralogiska förhållanden för vårt land, hade uti en skrifvelse till Herr L. SVANBERG derom meddelat följande, hvilket af den sistnämnde föredrogs:

»Den rådande bergarten omkring Wexiö är en mer och mindre finkornig, grå och röd granit. Ett märkligt undantag från detta allmänna förhållande bildar den straxt utom staden (vid cellfängelset) vidtagande och sedan från S. till N. förlöpande höjdstreckningen, hvaraf det s. k. Solberget utgör högsta delen. Den består vanligen uteslutande af en mörk hornblende-sten, hvari fältspat och kvarts förekomma endast såsom högst underordnade blandningsdelar, förnämligast på öfvergången från graniten. I denna bergart, stundom (såsom vid »tättestupan») nästan fullkomligt tät och likformig, stundom med hornblendet mera grofkristalliniskt utveckladt, påträffades följande mineralier:

I en smärre granitisk, högst fältspatrik utsöndring (straxt norr om Hofsberg, der en hall undansprängts för anläggande af väg) förekom *orthit*, dels derb i smärre insprängda partier, dels i temligen stora, som det syntes, rätt väl utbildade kristaller, ehuru ingen oskadad kunde erhållas. Ett brottstycke

af en sådan (ursprungligen af omkring $1\frac{1}{2}$ tums längd, $\frac{1}{2}$ tums bredd, och nästan lika tjocklek) visar, att kristallens habitus varit flersidigt prismatisk, hvarjemte af inåtgående vinklar antydes en tvillingsbildning. (Den enda mätbara vinkeln = 120°).
Eg. v. 3,77.

Analysen gaf för 100 delar:

$$\ddot{\text{Si}} = 33,25.$$

$$\ddot{\text{Al}} = 14,74.$$

$$\ddot{\text{Ce}} = 14,51.$$

$$\ddot{\text{Fe}} = 14,30.$$

$$\dot{\text{Y}} = 0,69.$$

$$\ddot{\text{Ca}} = 12,04.$$

$$\dot{\text{Mg}} = 0,74.$$

$$\ddot{\text{K}} = 0,29.$$

$$\ddot{\text{Na}} = 0,14.$$

$$\ddot{\text{Mn}} = 1,08.$$

$$\text{Vatten och förlust} = 8,22.$$

$$100,00.$$

Jemte orthiten förekom äfven *pistacit* och som det tycktes, liksom bildande en matrix för densamma, i det *pistacit*-strålarne merendels utgingo divergerande från ett centrum af orthit, ett förhållande som i någon mån erinrar om det af *NORDENSKJÖLD* anmärkta för orthiten från Helsingfors, och hvarigenom ett visst sammanhang mellan dessa mineralier synes angifvas. Är *SCHREERERS* formel för orthiten riktig, skulle den ju också rent af ej vara annat än en cerhaltig form af *epidot*.

På ett ställe mellan *Kingsberg* och *Solberget*, der hornblendet uppträder temligen grof-kristalliniskt, förefanns i ringa mängd ett egendomligt, blekgrönt mineral, som jag, att döma af utseendet äfvensom af dess hufvudsakliga förhållanden för blåsröret, till en början antog för att vara *prehnit*, men som vid sednare anställd analytisk pröfning, befanns utgöra ett, så vidt mig är bekant, nytt mineralspecies. Det förekommer dels såsom sprickfyllnad, dels direkt inbäddadt i hornblende-massan,

i kristalliniskt derba, stråliga aggregater, med stänglig afsöndring. I tvärbrottet ofullkomligt mussligt, glasglänsande. För blåsröret smälter temligen lätt, under stark pösning, till glänsande hvit, blåsfri emalj; i kolf ger vatten, men i ytters ringa mängd; löses af borax och phosphorsalt med svag jernreaktion, af det sednare under lemning af kiselskelett; med soda ger föga märkbar reaktion på mangan. Eg. vikt = 2,50. Hårdhet omkr. 7.

Af chlorvätesyra angripes det obetydligt, såväl före som efter glödning. Analysen verkställdes således dels genom dekomponering med kolsyradt kalinatron (N:o 1—3), dels med fluorvätesyra i Brunnerska apparaten. För alkali-bestämningen utfälldes talk och svafvelsyra med baryt:

	1.	2.	3.	4.	5.
Si	= 56,06 . .	55,86 . .	56,08 . .	— . .	—
Al	= 22,45 . .	23,09 . .	— . .	22,58 . .	21,7
Ca	= 7,60 . .	— . .	— . .	7,91 . .	7,8
Na	= — . .	— . .	— . .	9,85 . .	10,30
K	= — . .	— . .	— . .	0,45 . .	0,48
Mg	= 0,30 . .	— . .	— . .	0,48 . .	0,33
Fe	= 0,90 . .	— . .	— . .	0,99 . .	1,13
Mn	= 0,18 . .	— . .	— . .	— . .	—
Glödgnings-förlust	= 1,02 . .	0,82 . .	1,29 . .	— . .	—


Medium häraf:

Si	= 56,00	innehåller syre	= 29,08.
Al	= 22,45		= 10,49.
Ca	= 7,79		= 2,21
Na	= 10,07		= 2,58
K	= 0,46		= 0,08
Mg	= 0,36		= 0,14
Fe	= 1,01		= 0,22
Mn	= 0,18		= 0,05
Glödgnings-förlust	= 1,04.		
	99,36.		

Syreqvantiteterna förhålla sig således:

$$\begin{array}{ccc} \text{Si} & \text{R} & \text{R} \\ = 29,08 : 40,49 : 5,28 = 5,81 : 2,09 : 1,05 \text{ eller temligen} \\ \text{nära} & = 6 : 2 : 1. \end{array}$$

Är åter denna ration riktig leder den ovilkorligen ($6 : 2 : 1 = 18 : 6 : 3$) till formeln:



Den ringa och för öfrigt nog mycket varierande glödningsförlusten har jag ej ansett gifva skäl för antagande af en konstant vattenhalt. Jernet har jag förutsatt såsom närvarande i form af oxidul, då med tillökning af baserna R den supponerade formeln göres mindre passande, utan att dock tillfälle till någon bättre derigenom erbjudes.

Ehuru enkel denna sammansättning än synes vara, tillkommer den ej, såvidt jag kunnat utröna, något förut känt mineral. Såsom ett nytt species, åtminstone så länge dess identitet med något annat ej är bevisad, måste således det ifrågavarande mineralet erhålla ett namn, och har jag i följd af dess stora öfverensstämmelse i yttre egenskaper med prehniten, ansett mig dertill kunna föreslå det af *πρεσνιτης* och *ἔιδος* härledda *Prehnitoid*.

Vid norra slutningen af af Linderöds-åsen, straxt nedanför den för resande mellan Lund och Christianstad valbekanta Ularpa-liden, ej långt från torpet »Ulatutan», anträffades såväl i lösa stenar som i fast håll, ett fältspat-artadt mineral, som till en början väckte min uppmärksamhet genom sin egna glans och från den vanliga fältspaten afvikande violetta färgnyans, men vid noggrannare undersökning af lokalen äfven påträffades kristalliseradt, ehuru äfvenledes uti från orthoklasen väl skiljda former. Jag förblef i min ovisshet om mineralets rätta art, tills det genom analysen ovilkorligen bestämdes såsom *Labrador*, hvilket knappt fallit mig in att antaga, då denna uppgifves ytterst sällan förekomma i fullständigt utbildade kristaller, och i Sverige till och med ej en gång utsöndrad i större kri-

stalliniska partiern (EADM. Min. sid. 334). Den nya fyndorten saknar således ej intresse, då den erbjuder mineralet, såväl derbt i större och mindre partier, som i tydliga kristaller.

Bergarten, hvari labradorn här förekommer och som åtminstone i N. och S. synes ha en ganska ringa utsträckning, då å ena sidan gneissen snart vidtager, å den andra en mörkt violett, nästan tät hornblende-sten (?), tycks hufvudsakligen just af labradorn konstitueras, utgörande än en granit-lik, homogen blandning af densamma, med fina glimmerfjell och kvarts i små korn, än med labrador-kristallerna mera porphyrtadt utsöndrade, större och tydligare utbildade, stundom, fast mera sällan, nästan ensamt bestående af labrador i grofkristalliniska derbmassor, sådan den på de bekantare utländska fyndorterna vanligen förekommer. De vackraste kristallerne finnas der en lös glimmer utgör grundmassan, vanligen af $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ tums längd. Dock påträffades vida större, ehuru ej med alla ytorna utbildade, af ända till 2—3 tums längd och $1\frac{1}{4}$ tums bredd.

Eg. v. = 2,68. Förhållande för blåsroret såsom för labradorn uppgifves. Angripes högst ofullständigt af chlorvätesyra. Färg, violett till grå, på vittrade ställen hvitgul eller blekt tegelröd; i brottet fettglänsande, aldrig irisande.

Analys:

	1.	2.	3.
Si	= 54,00	53,65	—
Al	= 27,24	26,54	27,10.
Fe	= 4,51	—	4,36.
Ca	= 11,14	—	11,27.
Mg	= —	—	0,20.
K	= —	—	1,34.
Na	= —	—	5,00.
Mn	= Spår. . . .	—	—

Medium:

Si	= 53,82 innehåller syre = 27,94.	
Al	= 26,96	= 12,60
Fe	= 4,43	= 0,43
		} 13,03.

Transport 82,21.

Transport 82,21.

Ca = 44,20	= 3,18	} 4,77.	Således	
Mg = 0,20	= 0,08			
K = 1,34	= 0,23			
Na = 5,00	= 1,28			
<hr/>				
99,95.				

Syrerationer:

Si R R

27,94 : 13,03 : 4,77 eller i det närmaste = 6 : 3 : 1

hvaraf (Ca,Na)Si + AlSi.

Kristallerna, tillhörande trikloedrisk systemet, äro alltid prismatiska; sällan genom ett planpars förherrskande med tafvelformig habitus. Den rådande formen (grundformen?) är det rhomboidiska prisma, som uppkommit genom förenig af basiska med makro- och brachy-diagonala planparen. Åtminstone är denna form den företrädesvis uppträdande i alla de kristaller, jag anträffat, och detta antingen, såsom vanligast är händelsen, ensam (fig. 4) eller med isynnerhet de trubbigare prisma-hörnen mer eller mindre afstympade af pyramidal-ytor (fig. 2, 3), den enda, jemte det rena prisma, förekommande kombinationen i alla de exemplar, jag haft tillfälle att iakttaga.

Fig. 1.





Fig. 2.



Fig. 3.



Ytorna luta mot hvarandra:

$$\begin{aligned}
 OP & - \infty \bar{P} \infty = 86^{\circ} 30' (93^{\circ} 30'). \\
 OP & - \infty \bar{P} \infty = 81^{\circ} 30' (98^{\circ} 30'). \\
 \infty \bar{P} \infty & - \infty \bar{P} \infty = 88^{\circ} (92^{\circ}). \\
 P - P & = 122^{\circ}.
 \end{aligned}$$

En noggrann mätning af vinklarna är svårigheter underkastad, emedan kristallernas yta alltid är skroflig och ojemn af fast vidhäftande glimmer-partiklar. De uppgifna talen kunna således ej göra anspråk på absolut tillförlitlighet.

Mineralet har, såsom i handböckerna uppgifves, två genomgångar, parallela med basiska och brachy-diagonala planparen. På den tydligaste af dessa visar sig visserligen en tvillings-streckning, men ganska svag, med glesa, nästan endast i en viss ställning af genomgångsytan skönjbara streck».

3. Utvecklingen af *Pipunculus fuscipes* *). —

Herr BOHEMAN anförde följande:

»Insekternas metamorfoser utgöra, enligt hvad känt är, ibland de viktigaste momenterna af deras lif. Det är nemligen härunder de, så väl genom en mängd intressanta och märkvärdiga företeelser i sin hushållning, som genom den stora och betydliga skada de understundom förorsaka på vegetationen, förtjena all uppmärksamhet.

Sedan man en längre tid, vid uppgörande af systemerna öfver dessa små varelser, uteslutande fästet afseende vid de fullt utbildade djuren, hafva flera entomologer i sednare tider sökt, att med förbigående häraf, hufvudsakligen bygga sina uppställningar på insekternas larv-tillstånd. Ehuru en sådan åtgärd icke kan gillas, torde det likväl icke böra förnekas, att om behörigt afseende fästes på sjelfva djurens former och lefnadsförhållanden, de första stadierna ofta gifva säkerhet åt systematiken samt lemna mången ledning för dessa föremåls naturenliga uppställning. Såsom stöd för hvad här i korthet blifvit antydt och såsom bidrag till utredande af ett insektsläktes metamorfos, hvars första lefnadsförhållanden hittills varit obekanta, torde nedanstående observationer förtjena anföras.

Under en för några år sedan företagen resa till Östergötthland, hvarunder några insekter insamlades på kanalbankarna i närheten af Berg, anmärktes ett och annat exemplar af *Aphrophora spumaria*, hvars abdomen var ovanligt uppsvölld. Som dessa individer voro honor, förmodade jag till en början, att deras

*) Härtill tab. V.

deras bak-kropp var uppfylld med ägg. Då jag var färdig att återgå till ångbåten, föll det mig in, att på ett individ frånlossa abdomen, som befanns innehålla en temligen stor Dipter-larv. För denna gång ej i tillfälle att kunna fortsätta mina iakttagelser, eller att bringa den erhållna larven till utveckling, föresatte jag mig att så fort som möjligt söka utreda hvilket djur det var, som tillbringade sina första stadier på detta sätt. Återkommen till Stockholm undersökte jag samma höst alla de individer af förenämnde insekt-art, som kunde påträffas, utan att det lyckades återfinna den lille parasitiskt lefvande larven; ett förhållande, som antingen härrörde deraf, att denne redan lemnat sitt gömställe, eller att den Dipter-art, som sålunda undergår sin metamorfos, i hufvudstadens granskap torde vara sällsynt. Mina forskningar, som fortsattes under följande sommar på den nämnda *Aphrophoran* misslyckades helt och hållet, hvaremot jag hos en annan Homopter-art, *Thamnotettix* (*Cicadula*) *virescens* FALL., hvilken mot hösten i otrolig mängd finnes på afslagna ängar och åkerfält, påträffade en annan parasit-larv, som, ehuru af mindre kroppsstorlek, fullkomligt liknade den hos *Aphrophoran* anmärkta. Hos en mängd honor af *Cicadulan*, som erhöles i häfven, befanns, ehuru de voro ytterst lifliga i sina rörelser, att bak-kroppen var ovanligt uppsvälld och att den lätt lossnade från sitt fäste vid thorax. Vid närmare betraktande visade sig hos dessa individer hela buk-kaviteten fylld af en liten hvitaktig larv, som utkommen genom hopkrympning och utsträckning af kroppen sakta rörde sig framåt. Oförklarligt skulle det synas huru den lilla *Cicadulan*, trots parasiten, som enligt hvad förut nämnt är fyller buk-kens hela hållighet, kan lifva och muntert kringflyga, om det icke vore lagt i dagen, att parasit-larverna hemta sin föda af den inom kroppen befintliga saften, utan att skada inelfvorna eller de kroppsdelar genom hvilka det angripna djuret erhåller näring och styrka. Då parasit-larven, öfver hvilken beskrifning längre ned skall meddelas, blifvit fullväxt, frånlossar han

genom den rörelse han verkställer med kroppen, på ena sidan den tunna hinna hvarmed abdomen är fästad vid thorax, faller på jorden, nedborrar sig deruti $\frac{1}{4}$ till 1 tum, samt förvandlar sig till en liten brun pupa, hvilken öfvervintrar, och först följande år, från medlet af Juni månad till midsommar, framkommer derutur en Dipter-art, *Pipunculus fuscipes*, som fullständigt finnes beskrifven i ZETTERSTEDTS Diptera Scandinaviæ, Tom. III, p. 953, 5.

Det återstår att i korthet söka antyda det sätt, hvarpå flug-arten går till väga vid läggandet af sina ägg i den lilla *Cicadula* och de resultater, som för systematiken kunna hemtas af de anförda metamorfos-förhållandena. I det förra hänseendet komma förut gjorda iakttagelser till hjälp, eller att intet organ finnes ega en ovanlig bildning, utan att ett visst ändamål dermed är afsedt. Betraktas nu sista bak-kropps-segmentet hos honan af flug-arten, finner man, att detta är trubbigt och försedt med en hvass, inböjd tagg, utgörande ägglägnings-röret. Det synes således mer än sannolikt, att honan genom den lilla taggens införande i *Cicadulans* bak-kropps-ända, lägger sitt ägg och bereder lämpligt rum åt sin afkö. I det sednare hänseendet vinna deras åsigter stöd, hvilka uppställt *Pipunculini* i närheten af *Conopsariæ*, hvilkas larver, åtminstone af vissa arter, enligt hvad jag förr haft tillfälle anføra, lefva parasitiskt i arter af *Orthoptera*.

Den beskrifning och de figurer, som härjemte meddelas öfver larven och pupan till *Pipunculus fuscipes* hafva blifvit gjorda och mig benäget meddelade af Professor C. J. SUNDEVALL.

Larva (fig. 1, 2) elliptica, crassa, leviter depressa, utrinque æque attenuata, glabra, luteo-albida, subopaca, scutulo supraanali piceo, sursum bidentato. Longitudo 3 millim.; latitudo corporis medii paulo minor quam longitudo dimidia. — *Caput* (fig. 3, a) minimum, parum prominens, subretractile; latitudine vix $\frac{1}{10}$ medii corporis; antennulis 2 verrucæformibus; partibus cibariis minutissimis, occultis. — *Segmenta* corporis 11, longitudine subæqualia, parte laterali (pleura) crassa vix prominula, sulcis levibus fere 4-partita. Pars dorsalis, lineis transversis, profunde impressis in plicas tres, æquales, divisa. Pars ventralis eodem modo tripartita: plica media tuberculis 6, parum elevata, crassius, con-

tiguis, insignis (fig. 4). Segmentum primum parte antica (collari) paullo magis distincta, in speciem segmenti parvuli, proprii (fig. 3, b). Segmentum ultimum (fig. 5) postice valde angustatum, superne paullo declivius, quam subtus; parte postrema, in formam verrucæ analis semi-ovatz, profundius distincta. *Anus simplex*, nec tuberculis cinctus, in apice verrucæ analis. *Scutum supraanale* (fig. 5, 6) piceum, corneum, parvum: latit. $\frac{1}{4}$ segmenti ultimi, vel $\frac{1}{2}$ corporis medii; transversim oblongum concavo-impressum; in medio margine antico denticulis 2 approximatis, cuti innatis (parallelis vel paululum divergentibus) instructum; margine postico fere in angulum obtusissimum producto. — *Spiracula* postica in lateribus scuti supraanalis, rotunda, majora; sp. antica supra latera segmenti primi sita, minima, verrucæformia, nigra, cornea. Aperturæ aëreæ minimæ, oculo, etiam lente vitreo armato indistinctæ.

Pupa (fig. 7, 8) paullo minor quam larva et cute ejus indasiata: ovalis, teres, utrinque sub-obtusa; lineis, in cute larvæ impressis, plus minusve evidentibus, relictis; picea, lævis et subnitida; spiraculis anticis, fortius quam in larva prominulis, in segmento antico, magis quam in larva extenso, sitis. *Scutum supraanale* postice quoque apparet.

Tab. V, fig. 1, larven i naturlig storlek. Fig. 2, densamma v. p. 12 ggr förstorad. Fig. 3, dess framända ännu något mer förstorad: a hufvudet, b främre delen af första kropps-segmentet, c hufvuddelen af första segmentet med främre respirations-hålen. Fig. 4, ett par af kropps-segmenterna från buksidan. Fig. 5, sista segmentets ryggsida med respirations-skölden och anal-vårtan. Fig. 6, respirations-skölden serskilt v. p. 50 ggr förstorad. Fig. 7, pupan i nat. storlek. Fig. 8, densamma v. p. 12 ggr förstorad.

4. *Fornforskning i Schweitz*. — Herr A. Ratzius meddelade följande utdrag ur ett bref från Herr TAYLOR, dat. Bel-Air d. 15 September:

»Une série de découvertes archéologiques, faites tout récemment en Suisse, viennent jeter un jour inattendu sur la manière de construire, propre à quelques populations de l'ancienne Europe, et qui s'est conservée jusqu'à nos jours chez les Papous, dont les habitations reposent sur des pilotis, au dessus de la surface des eaux et à une certaine distance des rives.

Depuis longtemps, on découvrait çà et là dans quelques-uns des lacs de la Suisse des armes en bronze, et des poteries antiques qu'on croyait provenir de naufrages. Mais, sur la fin de l'hiver dernier, une découverte fortuite a tout à fait changé

cette manière de voir. A la suite de la baisse extraordinaire des eaux, comme on était occupé à Meilen sur les bords du lac de Zürich, à gagner des terrasses sur la rive, on découvrit sous le limon de nombreux restes de pilotis, auprès desquels se trouvaient un grand nombre d'instruments en pierre et en os, de fragments de poterie, d'ossements d'animaux et de charbons avec d'anciens foyers, consistant en dalles brutes calcinées par le feu. En même temps M^r MÜLLER de Nidau observait sur les bords du lac de Bienne, et sous quelques pieds d'eau, des pilotis dont une partie sortait de la vase et auprès desquels il a aussi péché de nombreux objets, mais de l'âge du bronze, tels que: épée, poignard, celts, couteaux, ciseaux, faucilles, anneaux, épingles, vases en poterie grossière et ustensiles divers. De mon côté j'ai exploré, avec mon ami M^r DE MORAUX, le lac de Léman et le lac de Neuchâtel, sur lesquels sont une vingtaine de localités où existent les mêmes pilotis, plantés parallèlement à la rive, à quelques centaines de pieds de celle-ci, et recouverts de 8 à 15 pieds d'eau. Les vents et les pluies ne m'ont pas permis d'explorer tous les points jusqu'à présent, mais j'ai déjà recueilli dans quelques unes de ces localités de nombreux fragments de poterie grossière, quelques vases intacts ou à peu près, dont les dimensions varient de 2 pouces à 2 pieds et plus de diamètre, des espèces de disques en argile qui paraissent avoir été des supports pour les petits vases, dont la plupart sont terminés en pointe dans la partie inférieure, des marteaux en pierre et des pierres à broyer, des celts, des bracelets, des charbons, des ossements d'animaux, des morceaux de chêne taillés par la main de l'homme etc. Si l'on rapproche tous ces faits, on ne peut douter que nous n'ayons là les restes d'habitations lacustres dont l'origine se perd dans les âges anté-historiques, et dont la destruction qui paraît avoir eu lieu par le feu, ne peut être postérieure, vu le genre d'objets découverts, à l'émigration des Helvétiens du temps de Jules César. — On peut cependant se demander si ces constructions n'étaient pas autrefois sur les rives et s'il n'y a pas

eu un exhaussement du niveau des lacs. Dans ce cas, les objets accumulés entre les pieux des pilotis auraient été nécessairement roulés par les vagues, ce qui n'a jamais eu lieu, ce dont on peut se convaincre par la conservation des objets découverts. On trouve, au milieu de cailloux, de petits vases d'argile intacts; aucune pièce n'est arrondie, la cassure des fragments de poterie est toujours parfaitement anguleuse. Par l'inspection des lieux on acquiert la certitude que ces objets sont restés en place, d'où il résulte que les habitations étaient construites au dessus de la surface des eaux à une certaine distance du rivage, et que les plus grandes tempêtes n'existent sur nos lacs qu'une agitation très superficielle qui n'atteint pas même 8 pieds de profondeur. Il est en outre à remarquer combien en dehors des dépôts d'alluvions torrentiels, les fonds des lacs restent immuables, puisq'on voit encore à la surface de la vase de petits objets qui n'ont point été enfouis sous le limon, après plus de 2,000 ans écoulés.

De même que les Papous, ces anciennes populations construisaient donc leurs demeures au dessus de la surface des eaux, et à une certaine distance des rives. Là ils employaient aussi, comme sur terre ferme, les claies de branchages tressés, garnies avec de l'argile. M^r MÜLLER a retrouvé des morceaux de cette argile cuite par l'incendie et sur lesquels on voit l'empreinte en creux des branchages. Des canots étaient amarrés au pied de ces habitations. Il en existe encore un dans le lac de Bienne. Beaucoup de personnes se souviennent d'en avoir vu un pareil au milieu des pilotis de Morges, sur les bords du Léman; il consistait en un tronc de chêne taillé en auge et pointu à ses extrémités. Après avoir été sorti de l'eau par des pêcheurs, il n'a pas tardé à être détruit par incurie. Le nombre des charbons et des bois carbonnés ne laissent guère de doute que ces constructions n'aient été détruites par le feu.

M^r le D^r FERD. KELLER vient de publier les recherches faites sur les lacs de Zürich et de Bienne. De mon côté je poursuis mes explorations et j'ai l'intention de faire quelques

tranchées sur les débris accumulés assurément pendant bien des siècles. Monlor et moi nous nous sommes déjà promenés au milieu des pilotis et dans ces fondations des antiques cités lacustres, avec une dizaine de pieds d'eau sur la tête. Notre appareil consiste en un simple casque de fer blanc, muni d'une glace devant la figure et fixé sur les épaules, mais sans être adhérent au corps. Au moyen d'un long tube en gutta perca dont l'une des extrémités est fixée au dessus du casque et l'autre à une pompe recoulante placée sur bateau, le plongeur reçoit toujours de l'air pur dont l'excédant s'échappe en grandes bulles à travers l'eau par dessous le menton. Des soupapes de sûreté empêchent l'air de remonter dans le tube. Notre lest consiste en deux poches remplies de plomb du poids de plus de 50 kg , fixées par des bretelles; on peut s'en débarrasser d'un coup de main et l'on regagne la surface comme un liège. Avec cet appareil on peut se mouvoir aisément, les bras restent libres et l'on voit suffisamment clair. Sa confection nous a pris assez de temps; c'est surtout à mon ami qu'en revient l'honneur. Cependant par un temps calme et des eaux transparentes, le moyen le plus simple est de pêcher depuis un bateau, au moyen d'une pince en fer fixée à un long manche en bois, et qui se ferme à l'aide d'une ficelle coulant dans des anneaux.

En entrant en tous ces détails mon intention, Monsieur, est d'attirer l'attention de votre Savante Académie sur ce genre de découvertes, qui ouvre un nouveau champ à la science archéologique. Jusques à présent nous ne connaissons guère des plus anciennes populations de l'Europe que leurs tombeaux et leurs monuments informes du culte. Aujourd'hui nous retrouvons des restes importants de leur habitations, et dans une condition telle que tout ce qui a pu tomber d'une demeure d'homme s'est tassé régulièrement et par couches historiques au fond des eaux, à l'abri des défrichements et en général de tout travail humain. Si j'insiste à cet égard, Monsieur, c'est que j'ai lieu de croire, vu l'analogie des objets découverts avec ceux qui

proviennent des sépultures, que ce genre de construction n'est pas propre à l'ancienne Helvétie seulement, mais à plusieurs pays de l'Europe et en particulier à la Suède, dont les beaux lacs doivent vraisemblablement conserver des antiquités de ce genre.

J'ajouterai encore que l'un des moyens les plus simples d'être renseigné à cet égard est de s'informer auprès des pêcheurs, s'ils ne connaissent pas, à peu de distance des rives, des pieux auxquels s'accrochent leurs filets et leurs hameçons. Une fois sur la voie les observations ne tardent pas à s'étendre. Il va sans dire qu'il est inutile de faire des recherches de cette nature sur les rives rocheuses où on ne pouvait planter les pilotis, pas plus que sur les points qui ont pu être recouverts par des alluvions des torrents. Les lieux occupés de préférence sont les rades où le blanc fond terreux ou sablonneux présente quelque étendue.

5. *Om Furfurin.* — Hr L. SVANBERG meddelade å egna och å Hr C. E. BERGSTRANDS vägnar derom följande:

»Efter den organiska kemins närmare bearbetande de sednare åren och sedan benämningarne alkohol, eter, fett, amid, aldehyd m. fl. erhållit sådane generaliserade definitioner, hvarom de äldre kemister, som uti de första typerna studerade en så benämd kropps kemiska reaktions-förhållanden, svårligen kunde göra sig en föreställning, har kemisternas uppmärksamhet blifvit riktad åt alla möjliga förenings-förhållanden för att utforska, huruvida icke egna grupper finnas för handen åt äfven andra håll, hvarigenom man kunde till mera omfattande klasser sammanföra sådane observerade enstaka förhållanden, hvilka yppat sig vid studium af vissa ämnen och så till sägandes slumpvis framstått.

Vigten af att uppdaga och att, särdeles uti deras början, utvidga hvarje sådan för vetenskapen nytillkommen grupp, inses af hvar och en, som vill komma till någon klarare insigt om

förenings- samt reaktions-lagarne inom den organiska kemien. Ty först sedan dessa grupper blifvit närmare bestämda och sedan deras kemiska reaktionsförhållanden blifvit inom sig granskade samt inbördes jemförda, kunna stödjepunkter framläggas för antagande af de lagar man må anse vara rådande inom kemins område i afseende på elementernas olika sätt att bilda skiljaktiga föreningar. Visserligen må erkännas, att dessa grupper ingalunda ensamne äro afgörande om rätta tolknings sättet i afseende på de ingående enklare eller fjernare konstituenternas föreningsarter eller om deras sätt att befinna sig, sedan en rubbning uti ett föregående status ägt rum; men så mycket torde dock vinnas, att en utvidgad synkrets derigenom beredes samt att, genom en större bekantskap om dessa gruppers tillvaro, hinder läggas för bildandet och uppgörandet af förhastade theoretiska spekulationer samt för tillskapandet af lagar, hvilka knappt öfverlefva den dag de promulgeras. Dessutom, theoretiska åsigten till dess innersta rot må vara hvilken som helst om de sålunda uppdagade gruppernas tolkning, så skola alltid vissa reella vinster framstå för vetenskapen, derigenom nemligen att de dervid tagna stegen utan tvifvel blifva sådane, att man ej behöfver frukta tillbakahalkningar till de ståndpunkter, hvarpå man förut en gång befunnit sig. Sålunda: den theoretiska uppfattningen af en alkohol och dess motsvarande eter må, hos olika kemiska skolor, vara hvilken som helst, så är man dock öfverens derom, att de stå uti sådant inbördes förhållande till hvarandra, att de endast skiljas genom elementerna för en atom vatten. På samma sätt hafva benämningarne amid, imid, aldehyd, amminsyra m. fl. fått vidsträckt omfång och includera i allmänhet vissa bestämda reaktionsförhållanden.

Vi sado här »i allmänhet», ty under benämningen amider finnas för tillfället tvänne arter af föreningar sammanförda, hvilka dock sinsemellan borde noga åtskiljas. Den vanligaste eller, rättare sagdt, den hittills talrikast kända föreningsarten, som här företer sig, är nemligen den, hvilken har sin prototyp uti






den först upptäckta amiden, oxamiden, samt karakteriseras af dess skiljaktighet ifrån det motsvarande, ifrån kristallvatten befriade, ammoniumoxidsaltet derigenom att 2 atomer vatten utgått utur det sednare, hvarefter amiden återstår. Det allmänna schemat för dessa amiders bildning är nemligen

4 at. enatomigt vattenhaltig syra + 1 at. ammoniak — 2 at. vatten
= den ifrågavarande amiden.

Emellertid hafva vi uti hydrobenzamid (= benzhydramiden, isomer med hydrobenzotamid = benzoinamiden), furfuramiden, anishydramiden, salicylimiden (spirimid) och azobenzoylen föreningsarter, för hvilkas bildning vi veta att en helt annan schematisering ligger till grund. Dessa äro icke heller, hvarken till följe af deras bildningssätt eller på grund af deras kemiska förhållanden, att hänföra till amider, i samma bemärkelse som oxamid, lactamid m. fl. Det schema, enligt hvilket alla dessa kunna anses vara bildade är nemligen

3 at. utaf en icke surt reagerande syrehaltig kropp + 2 at. ammoniak — 6 at. vatten = den nybildade och oegentligt så kallade amiden (imiden).

T. ex.



Skilnaden emellan dessa båda amidgrupper är, såsom vi se, icke blott den, att, uti den förra, inverkar 4 at. syrehaltig kropp på 4 at. ammoniak, hvaremot, uti den sednare, 3 at. syrehaltig kropp inverkar på 2 at. ammoniak, utan äfven den, att 2 at. vatten frigöres vid bildandet af förra gruppens amider, under det att 6 at. vatten genereras vid bildandet af den andra grup-

pens. Tager man derjemte i betraktande, att vid kaustiskt kaliverkan på första gruppens amider ett kalisalt af en karsyra bildas, under samtidig utveckling af så mycket ammoniak som motsvarar en ingående halt af 4 at. NH_2 , hvaremot kroppen af basartad natur, med bibehållande af allt qvæfve, regenereras vid kaliums inverkan på den sednare gruppens amider, att blotta kokningen med vatten föranleder en spaltning af konstituenterna för den sednare gruppen, hvilket icke är händelsen för den förra; att den sednare gruppens amider synas, såvidt vi få sluta af BERTAGNIERS försök, öfvergå till baser, då de upphettas, hvilket icke är händelsen med den förra gruppens amider, m. fl. andra omständigheter, hvaruti de sinsemellan åtskiljas, så synes, säga vi, alla skäl finnas för handen att åtskilja dessa båda grupper samt för den sednare icke bibehålla amidbenämningen. Fruktaende att framlägga någon benämningssgrund, som icke skulle kunna antagas af äfven olika skolors kemister, och å andra sidan erkännande släktskapsförhållandet emellan dessa föreningar samt de egentliga amiderna derutinnan, att ammoniak och den primitiva syrehaltiga kroppen lätt regenereras under assimilerande af vatten, ehuru väl dertill åtgår ett större atomtal af vatten, föreslå vi att med instickande af blott en bokstaf förändra amid till *amlid* och kalla dem *amlider*.

Af hittills kända amlider känna vi väl i närvarande stund endast hydrobenzamliden, furfuramliden, anishydramliden och salicylamliden, men denna grupp torde snart nog blifva utvidgad. Hvilka kroppar det tillkommer att gifva upphof åt amlider torde äfven blifva af vetenskapligt intresse att utförligare utreda. För närvarande vill det väl synas, som kunde endast de kroppar, hvilka i allmänhet hänföres till hydroföreningar eller aldehyder, vara benägna att bilda amlider, men dervid är dock till märkandes, att ingen amlid hittills är känd af de till serien $\text{C}^{20}\text{H}^{32}\text{O}^2$ hörande aldehyder, utan endast af dem, hvilka innehålla kolet uti en högre proportion emot vätet. Skulle det i sådant fall icke låta sig förmoda, att amlidbildningen tillkomme blott andra oxiderade kolväten, men att homologa serier af dessa

en gång konstaterade länkar kunde gifva upphof åt specifikt skilda amlider? Något sådant synes följa, då man reflekterar till det med salicylvätet homologa anisylvätet, hvilka båda gifva amlider.

Emellertid torde ämnet böra betraktas ifrån äfven en annan sida. Af de hittills kända amlidbildarne, är bittermandeloljan den enda aldehydartade förening, som innehåller 2 atomer syre *). Fråga kan nu uppstå: huruvida icke furfurolen, anisylvätet och salicylvätet, hvilka alla hålla 4 atomer syre, innehålla 2 at. af detta syre på ett olika sätt, emot de andra 2 samt huruvida det icke är blott den ena 2-syreformiga konstituenten, hvilken vore amlidbildande, under det att den andra förhölle sig såsom blott en kopplande konstituent. Ett stöd för en sådan åsigt synes man äga uti de föreningar, hvilka CALLOUS uppmärksammat samt benämt *thiofurfurol* och *seleniofurfurol* samt representerat under formlerna $C^{10}H^4S^2O^2$ och $C^{10}H^4Se^2O^2$. Så intressant det vore att erhålla en kunskap huruvida en thiofurfuramlid orh seliniofurfuramlid existerar samt om anisyl- och salicylvätena gifva motsvarande svavel- och selenföreningar, blifver visserligen dagens vigtiga hufvudfråga om de ingående konstituenterna uti en förening derigenom icke fullt besvarad, men onekligen skulle vi genom en sådan kunskap hafva ryckt ett steg närmare inpå dessa kroppars kannedom.

Vi hafva härvid icke vidrört de dels olika sjelfständiga, dels isomera amlidföreningar, hvilka sannolikt bildas, då den

*) Den kropp $C^{14}H^4O^2$, hvilken bland ofvanstående schemata blifvit antagen såsom gifvande upphof åt azobenzoylen, $C^{12}H^{10}N^2$, är icke med säkerhet känd, ty ännu är det oss obekant huruvida benzil skall representeras under denna formel eller under formeln $C^{14}H^{14}O^2$. Vi veta icke heller om den hörer till aldehydernas klass eller ej. Dessutom torde böra anmärkas, att azobenzoylen ännu icke är känd på ett sådant sätt, att vi veta huruvida den hörer till amlidföreningarne eller de deraf bildade, men med amlidföreningarne lika atomistiskt sammansatta, således isomera, basartade kropparne. Uppförandet af azobenzoylen ibland ofvanstående kroppar grundar sig därför endast och allenast på en hypotes, hvilken sätter tillvaron af $C^{14}H^4O^2$ samt dess förmåga att, under afgifvande af 6 atomer vatten, assimilera 2 at. NH^2 .

amlidbildande kropp, som blifver underkastad inverkan af ammoniak, befinner sig uti olika tillstånd. Likasom nemligen den med bittermandeloljan isomera eller polymera benzoin bildas genom ammoniaks inverkan på blåsyrehaltig bittermandelolja samt denna benzoin sedermera förhåller sig ganska olika med bittermandeloljan emot ammoniak, derutinnan nemligen, att produkter med helt andra egenskaper produceras, hafva vi tyckt oss finna, att den ammoniak-produkt som bildas då den ursprungliga furfurolen är förorenad af inblandad metafurfurol¹⁾, icke förhåller sig lika med eljest samt att detta måste härröra af någon inblandning af en bildad metafurfuramlid — dock hafva vi för tillfället icke vidare fullföljt denna reaktion, hvarföre vi endast lösligen framkasta frågan: finnes ej en metafurfuramlid, svarande emot hydrobenzoinamliden?

Att de, medelst furfurols behandling med ammoniak, bildade dels egna, dels polymera amliderna skola sedermera genom upphetning, behandling med alkalier, etc., gifva upphof åt egna samt sinsemellan skiljaktiga basartade eller på annat sätt reagerande kroppar, är alltför sannolikt, äfvensom att de iakttagelser man redan gjort om benzolins (amarins, pikramins), lophins, benzoinams med fleres tillvaro och egenskaper för benzoeserien, skola finna deras motsvarigheter uti furfurserien. Det är emellertid icke blott af orsak att få en utvidgad kännedom om de till stor mångfald sig redan förökade organiska föreningarne, som studium af furfurserien torde för vetenskapsmännen komma att erbjuda ett intresse, utan anse vi detta intresse komma att betydligt ökas derigenom att frågan angår egenskaperna hos

¹⁾ Halten af metafurfurol i furfurolen synes ökas ej blott i den mån, som luften och ljuset få tillfälle att utöfva deras inflytelse på den råprodukt, hvilken bildas vid distillation af utspädd svafvelsyra med hvetekli, utan den synes äfven stå i samband med den blåsyra, som vid denna destillation till stundom rätt betydlig mängd uppträder. De proportioner vi funnit vara fördelaktigast för beredande af furfurol hafva varit: 8 delar hvetekli, 5 delar svafvelsyra och 10 delar vatten, hvarvid vi, vid användande af 1600 gram kli och distillation i glaskärl, bekommit omkring 8 å 10 gram renad furfurin.

basartade föreningar, hvilka på artificiell väg blifvit framställda och om hvilkas konstituerande delar vi icke sväfvat uti det fullkomligaste mörker. Lägga vi dertill att dessa artificiella baser äro sådana, att de innehålla minst två equivalenter kväfvat uti den formel, som representerar deras sammansättning, hvaraf likväl blott den ena kan anses uti dem finnas för handen under form af ammoniak, enligt hvad följande samt äldre undersökningar om furfurin upplysa oss om, så torde vi, genom studium af dylika baser, särdeles då deras metamorphoser blifva underkastade en noggrannare granskning, få upplysningar, som vetenskapen med mycken begärlighet afvaktar.

Att likväl icke blott basartade produkter bildas vid furfurins behandling med ammoniak, torde följande iakttagelse bevisa, hvilken vi anföra, oaktadt den ännu icke blifvit analytiskt följd på spåren. Den råa furfuroln renades genom omdistillation öfver kalk och förvandlades omedelbart efteråt till furfuramid, för att undvika bildning af alltför mycken metafurful. Efter furfuramidens affiltrering afdunstades den genomgångna moderluten. Hade de förhandenvarande kropparnes reaktion ägt rum endast och allenast enligt det schema, som uti det ofvanstående blifvit meddeladt, så borde denna moderlut innehålla blott så mycket furfuramid, som densamma kunde hålla upplöst. Vid vätskans afdunstning erhöles emellertid en icke alltför ringa återstod, som utgjordes af en i långa nålar kristalliserad, svartbrun och deliquescent massa, af en egen genomträngande lukt; dess lösning i vatten tillkännagaf sin reaktion och utvecklade ammoniak vid tillsats af kali och uppvärmning. Försätter man denna lösning med kalk, så bortgår ammoniak och en neutralt reagerande vätska erhålles, som har en bitter smak, liknande den af furfurinsalter. Vid afdunstning under exsiccator får man en mörkbrun, något kristallinisk skorpa, som med lätthet löses i vatten, är svårlöst i alkohol samt deliquescerar i luften. Detta utgör nu ett kalksalt, men hvars ingående syra ännu icke utgjort föremål för närmare undersökning, emedan tillräckliga qvan-

titeter icke blifvit bekomna, för att genom omkristallisation resa saltet och dermed anställa några vidare försök.

Den furfurin, som blifvit använd till följande försök, renades enligt Fownes föreskrift genom att förena den med oxalsyra och affärga med blodlutskol. För att rena furfurin kan man äfven använda en annan method, bestående deruti, att man löser den råa alkaloiden uti alkohol och åter utfäller densamma medelst vatten. Efter att förnya samma operation flere gånger, erhåller man slutligen en hvit och ganska ren furfurin. I fullkomligt torrt tillstånd bibehåller sig furfurin i luften oförändrad, men i annat fall blir den snart gråaktigt grön, gulbrun och stundom röd. Detsamma gäller om furfurins salter.

Det studium af furfurin, som utgjort föremål för närvarande undersökning, har varit framställandet af några af dess hittills icke undersökta salter, särdeles hvad dem med *afosforsyra* (= *BERZELII cfosforsyra*) beträffar. Med denna syra har ej blott det neutrala, utan äfven två sura salter blifvit beredde. Tillika hafva de neutrala salterna med meta- och pyrofosforsyrorna blifvit framställda. Derjemte hafva vi undersökt ett surt svafvelsyradt furfurinsalt (det neutrala synes icke existera) samt beredt ett surt vinsyradt salt. Alla dessa salter hafva af föregående kemister icke blifvit framställda.

1. *Tvefaldt svafvelsyrad furfurinammoniumoxid.*

Löser man furfurin i något utspädd svafvelsyra, med iakttagande att lösningen håller svafvelsyra i öfverskott, uppvärmer vätskan något samt filtrerar, så utkristalliserar det sura saltet ganska snart. För att befordra utkristallisationen kan man småningom tillsätta litet mera utspädd svafvelsyra.

Detta salt kristalliserar i korta och något plattade fyr-sidiga prismor, som i båda ändarne äro kort tillspetsade från alla fyra sidorna. Saltet löser sig särdeles lätt i vatten, mindre lätt i alkohol och eter; minst lösligt är detsamma i vatten, som innehåller fri svafvelsyra. Lösningen har en sur och tillika

bitter smak, färgas af starkt koncentrerad svafvelsyra röd. Saltet förvitrar i luften ytterst lätt och förlorar i vanlig temperatur fullständigt sitt kristallvatten, hvarvid färgen förändras från hvit till smutsigt grön eller brun. Underkastas saltet upphetning, så börjar detsamma, efter kristallvattnets förflyktigande, att förändras vid 80 à 90°C., hvorefter det snart förlorar omkring 4 procent i vikt, hvarvid det dock, så vidt af dess utseende kan dömmas, visar sig hafva undergått en söderdelning. I högre temperatur sammanbakar det och smälter till en svart glaslik massa, som sedermera ej klart löser sig i vatten. I detta hänseende synes furfurin förete en slags analogi med de egenomliga förändringar, som under likartade omständigheter inträffa med svafvelsyrad *morphin*, och hvilka af AARPE blifvit studerade. Tyvärr har det ännu ej varit tillfälle att noggrannare fullfölja undersökningen af detta förhållande hos det här ifrågavarande furfurinsaltet.

För att bestämma kristallvattnet hos det sura svafvelsyrade saltet, gjordes följande försök:

a) 0,6560 gr. nyss beredt och mellan sugpapper pressadt salt utsattes för torr luftström vid vanlig temperatur i nära 3 dagar; dervid förlorade saltet i vikt 0,0918 gr. hvilket utgör en vattenförlust af 13,99 procent.

b) 0,5470 gr. salt vägde efter likaledes 3 dagars torkning i vanlig temperatur 0,4670 gr.; förlusten var således 14,63 procent.

Af dessa försök erhålles såsom medium 14,31 procent, hvilket närmast öfverensstämmer med ett salt, som innehåller 7 atomer kristallvatten. Procenten kristallvatten är då följande:

Funnen.	Beräknad.
14,31.	14,68.

Ett tredje försök gjordes med 0,3558 gr. salt, hvilket legat några timmar i öppen luft och redan visade tydliga spår af förvittring; efter tvenne dagars torkning på förenämnde sätt var vigten 0,3129 gr. Den funna procenten uppgår här endast till 12,06, hvaraf synes, att något mer än en atom kristallvatten bortgått redan före försökets början.

Vid dessa försök har man att observera följande tvenne omständigheter, hvilka likväl äro af den beskaffenhet, att de upphäffa hvarandras menliga inflytande på resultatet. För det första har man att befara mekaniskt inblandadt vatten, alldenstund man ej har annan utväg, än att omedelbart efter saltets beredning söka, medelst pressning mellan sugpapper, befria detsamma från hygroskopiskt vatten och vidhängande moderlut. I sådant fall skulle vattenprocenten komma att blifva för stor. För det andra torde saltet svårligen kunna befrias från fri svafvelsyra, eftersom man ej genom omkristallisering kan rena detsamma. Det utkristalliserar nemligen endast, då lösningen innehåller svafvelsyra i öfverskott. Till följe af denna omständighet skulle möjligen den funna procenten kunna blifva för liten. Då nu dessa tvenne olägenheter äro af motsatt art, så kunna de icke anses ega någon väsendtlig eller för mycket störande inverkan på resultatet.

Anmärkningsvärdt är, att detta salt med hänseende till vattenhalt och flera andra förhållanden synes närma sig de svafvelsyrade salterna af *chinin* = $C^{10}H^{12}NO^2$, enligt *BRANZLIUS*). Dessa innehålla äfven 7 atomer vatten och förvittra lätt i luften vid vanlig temperatur.

För att bestämma svafvelsyrehalten anställdes följande försök:

a) 0,5600 gr. salt, befriadt från kristallvatten, gaf 0,3460 gr. svafvelsyrad baryt, hvari finnes 0,1189 gr. svafvelsyra; saltets svafvelsyreprocent blir följaktligen 21,23.

b) 0,4660 gr. likaledes från kristallvatten befriadt salt gaf 0,2990 gr. svafvelsyrad baryt, hvari finnes 0,1027 gr. svafvelsyra; deraf blir svafvelsyrehalten 22,04 procent.

Medium af dessa båda försök blir således 21,63 procent.

Antager man, att saltet består af 4 atom neutral svafvelsyrad furfurin, förenad med 4 atom vattenhaltig svafvelsyra, så erhåller man följande svafvelsyreprocent:


Funnen.	Beräknad.
21,62.	21,85.

Ett

*) »Lehrbuch der Chemie», 1848; Band. 5 pag. 94.

Ett tredje försök gjordes med ett salt, som innehöll hela halten af kristallvattnet, och dervid erhöles af 0,5990 gr. salt 0,3250 gr. svafvelsyrad baryt, d. v. s. 0,1117 gr. svafvelsyra, som i procent af det använda vattenhaltiga saltet gör 18,642. Beräknas svafvelsyrehalten på ett salt med 7 atomer kristallvatten, så är denna 18,648 procent.

Den kemiska formeln för det tvefaldt svafvelsyrade furfurinammoniumoxidsaltet är enligt dessa försök



För korthetens skull tecknas nemligen, efter BERZELIUS, furfurinammoniumoxiden $(\text{C}^{30}\text{H}^6\text{NO}^6.\text{NH}^4) = \text{furAm}.$

Vid försök att framställa det *neutrala* svafvelsyrade saltet, har det ännu ej lyckats att få detsamma i kristalliseradt tillstånd. Mättar man utspädd svafvelsyra med furfuring, tills lösningen reagerar neutralt, erhålles visserligen en vätska af furfurinsalternas vanliga bittra och karakteristiska smak, men försöker man i värme koncentrera lösningen, så blir den snart färgad och afsätter ett svartbrunt pulver. Detsamma inträffar, ehuru mera långsamt, om lösningen sättes att afdunsta under exsiccator. Genom dubbel sönderdelning af furfurinchlorammonium och svafvelsyrad silfveroxid har saltet ej heller kunnat framställas. Vid ett af dessa försök utkristalliserade en kropp i glänsande bladlika fjäll, sedan vätskan fått stå i vanlig temperatur under luftens inflytande i flera dagar. Dessa kristaller afskiljdes, så godt sig göra lät, ur den färgade och numera moderluten, hvilken derjemte innehöll uppslamadt ett svartbrunt pulver, som under tiden likaledes afsatt sig. Denna kristalliserade förening kunde icke vara ett svafvelsyradt salt, ty vid anställd analys befanns den innehålla endast $\frac{1}{2}$ procent svafvelsyra, härrörande deraf, att kristallerna icke genom tvättning kunde befrias från den svafvelsyrehaltiga moderluten. Målbändä var det en egen modifikation af furfuring?

Koncentrerar man medelst temligen stark upphettning den *neutrala* eller *sura* svafvelsyrade furfurinlösningen, frånfiltrerar

det svartbruna pulver, som hunnit bilda sig, och sätter ammoniak till vätskan, så utfaller furfuring, men icke pulverformig eller kristallinisk, utan såsom en sammanhängande seg, gummi-lik massa, hvilken låter utdraga sig i trådar. Efter några minuters sammanknådning af massan stelnar den nästan ögonblickligen till en stenhård, spröd kropp. Undersöker man densamma under mikroskopet, då den nyss blifvit utfälld, så upptäcker man i massan här och der små kristallgrupper, liknande de vanliga snöflingorna: sex större nålformiga kristaller hafva symmetriskt ordnat sig omkring en gemensam medelpunkt, och från dessa utgå sedan parvisa mindre kristaller både af första och andra ordningen. Under vanliga omständigheter faller furfuring eljest i stjärnformiga, qvastlika knippen. Dessa egendomliga förhållanden synas häntyda på ännu en annan modifikation af värmets inverkan, likasom chinin under liknande omständigheter öfvergår i β -chinin eller *chinoïdin*. Äfvenledes har man skäl att förmoda, det den förut omtalade meta-furfuroln på ett eller annat sätt bidrager att förändra så väl furfuramlidens, som furfurins egenskaper.

Med hänsyn dertill att neutral svafvelsyrad furfuring icke kunnat fås att kristallisera, så visar furfuring ett analogt förhållande med *berberin*, hvars sura svafvelsyrade salt lätt kristalliserar, men det neutrala är ännu obekant, åtminstone i kristalliseradt tillstånd.

2. *Tvefaldt sur fosforsyrad furfuringammoniumoxid.*

Furfuring löses i alkohol och försättes med vanlig fosforsyra i temligen stort öfverskott. Lösningen filtreras kokhet, hvarefter, vid afsvälning, ett surt salt utkristalliserar, som, pressadt och torkadt mellan sugpapper, äger ett hvitt silfverglänsande utseende och bibehåller sig oförändradt i luften; får det qvarligga i moderluten någon tid, så förändras färgen småningom till brungul.

Saltet kristalliserar i räta fyrsidiga prismer, som likväl äro så korta, att de synas såsom tunna blad eller silfver-

glänsande taflor. Dessa lösa sig svårt i kallt vatten och alkohol, men temligen lätt vid upphettning: i eter synas de vara nästan olösliga. Enligt anställda försök har det visat sig, att detta salt ej innehåller något kristallvatten och kan upphettas till 150° , utan att lida någon sönderdelning. Vid ännu högre temperatur antager saltet en svartgrå färg och smälter vid 200 à 215° till en svart glasig massa, som är. svårslöslig i kokande vatten, men löser sig någorlunda fullständigt i varm alkohol. Denna lösning reagerar numera icke för vanlig fosforsyra.

Vid bestämmandet af fosforsyrehalten såväl hos detta som hos följande fosforsyresalter har en tillvägd quantitet salt blifvit glödgad med kolsyradt och chlorsyradt kali, för att sålunda öfverflytta syran på kalit, hvarefter densamma åter blifvit utfälld som fosforsyrad ammoniumoxid-talkjord, hvilken sedermera blifvit behandlad på det vid fosforsyrebestämningar vanliga sättet.


Sålunda gaf 0,5850 gr. salt 0,1895 gr. glödgad fosforsyrad talkjord; deri utgör fosforsyrans vikt 0,1218 gr. Procenten fosforsyra uti saltet blir således:

Funnen.
20,7.

Beräknad.
19,6.

Att den funna procenten här, likasom i följande salt, blifvit något större, än den beräknade, härleder sig sannolikt deraf, att något fri fosforsyra medföljt saltet ur moderluten. Man har nemligen ej kunnat omkristallisera detsamma af fruktan att få det förorenadt af ett salt med mindre fosforsyrehalt.

Då man anser den af BERZELIUS kallade c-fosforsyran som en trebasisk syra, så blir formeln för ifrågavarande salt följande:



3. Halft sur fosforsyrad furfurinammoniumoxid.

Om 4 atom furfurin löses i alkohol och sättes till 4 atom af föregående salt och man uppvärmer lösningen samt filtrerar, så anskjuter vid afsvälning ett salt i sneda, fyrsidiga och till-




plattade prismer, som i båda ändar äro från två sidor tillspetsade. Dessa innehålla intet kristallvatten och bibehålla sig i fullkomligt torrt tillstånd oförändrade i luften, hafva ett hvitt, något glänsande utseende och lösa sig lätt i kokande vatten eller alkohol; i eter äro de nästan olösliga. Af fruktan att få ett främmande salt med mindre fosforsyrehalt såsom förorening, har närvarande salt icke kunnat omkristalliseras. Saltet kan, utan att förändras, upphettas till 430 à 435°; i högre temperatur förhåller det sig lika med föregående salt.

Vid försöket att bestämma fosforsyrehalten togs 0,3470 gr. torkadt salt; deraf erhöles 0,0688 gr. glödgad fosforsyrad talkjord, hvori finnes 0,0442 gr. fosforsyra. Saltets fosforsyreprocent blir då följande:

Funnen.	Beräknad.
42,1.	41,3.

Formeln för detta salt blir följaktligen denna:



4. Neutral fosforsyrad furfurinammoniumoxid.

En viss mängd af det tvefaldt sura saltet löses i kokande vatten och försättes med en alkohol-lösning af furfurin i starkt öfverskott. Efter filtrering och afsvalning utkristalliserar ett salt i långa sneda, fyrsidiga prismer, som i båda ändar äro från två sidor kort tillspetsade. Dessa befinnas innehålla intet kristallvatten och kunna upphettas till 420 à 425°, utan att förändra färg eller utseende. I högre temperatur förhåller sig detta salt lika med de två föregående.

Saltet är hvitt, men utan glans, och bibehåller sig oförändradt i luften; löser sig temligen lätt i vatten eller alkohol, isynnerhet vid uppvärmning; i eter synes det vara ganska svårlöst.

0,2648 gr. af detta salt gaf 0,0318 gr. glödgad fosforsyrad talkjord, hvori fosforsyrans vikt är 0,0205 gr. Procenten fosforsyra blir således:

Funnen.

7,7

Beräknad.

7,9.

Häraf fås följande formel:



Anställer man en jämförelse mellan dessa tre fosforsyrade salter, så finner man, att ju större fosforsyrehalten är, ju mera glänsande är det yttre utseendet och ju högre ligger destruktionstemperaturen, men lösligheten i vatten och alkohol aftager deremot i samma mån. Det neutrala saltet reagerar besiskt, det halft sura deremot neutralt och det tvefaldt sura har en svagt sur reaktion. Smaken hos alla tre är skarp och bitter. Vid upphettning öfvergå de, såsom det vill synas, i pyrofosforsyrade och metafosforsyrade salter.

5. Neutral pyrofosforsyrad furfurinammoniumoxid.

Furfurin löses i alkohol och neutraliseras med pyrofosforsyra (b-fosforsyra enligt BERZELIUS), framställd genom dekomposition af pyrofosforsyrad blyoxid medelst vätesvafva. Sättes lösningen att afdunsta under exsiccator så länge, tills alltsammans gått till torrhet, så erhålles en kristalliniskt glasig skorpa på botten och kring väggarna af kärlet. Denna skorpa löser sig lätt i vatten och alkohol, mindre lätt i eter; lösningen reagerar neutralt och gifver med salpetersyrad silfveroxid reaktion för pyrofosforsyra.

För att undersöka, huruvida detta salt innehöll kristallvatten, och tillika för att bestämma fosforsyrehalten, gjordes visserligen ett försök, men hvarpå man icke kan fullt lita, emedan en alltför ringa quantitet fanns att tillgå vid försöket. Till dess noggrannare bestämningar hinna göras, må detta försök emellertid gälla för hvad det kan.

0,1330 gr. salt förlorade vid torkning i vanlig temperatur 1,5 procent, sannolikt endast hygroskopiskt vatten. Vid en temperatur af 100° gaf 0,1310 gr. salt en vattenförlust af 2,14 procent; huruvida detta var kristallvatten eller endast hygroskopiskt vatten, må tillsvidare vara osagdt. Denna funna pro-

cent öfverensstämmer emellertid närmast med ett salt, som innehåller 2 atomer kristallvatten, ty i sådant fall är den beräknade procenten 2,8. Vid 145° gaf saltet ingen vattenförlust; det började då småningom att antaga ett gråaktigt utseende, hvaraf slutes, att destruktionstemperaturen är omkring 115 à 120°.

0,1255 gr. torkadt salt gaf 0,0230 gr. glödgd fosforsyrad talkjord, d. v. s. 0,0148 gr. fosforsyra, som i procent utgör:

Funnen.

Beräknad.


41,7.

44,5.

Formeln för detta salt skulle då blifva följande:



eller också denna, om man vill anse pyrofosforsyran som vanlig fosforsyra, kopplad med vattenfri syra:



hvaruti $\ddot{\text{P}}_2$ utmärker den ingående kopplade vattenfria syran.

Dessa formler må qvarstå så länge, tills ytterligare undersökningar hinna göras.

6. Neutral metafosforsyrad furfuringammoxid.

För att framställa detta salt gjordes följande försök, hvilket likväl ej utföll fullt tillfredsställande. Fosforsyrad ammoniumoxid-natron underkastades stark glödning, afkyldes skyndsamt, hvarefter återstoden löstes i vatten. Fosforsyran utfälldes sedermera medelst chlorbarium såsom metafosforsyrad baryt. Sedan fällningen blifvit upphemad på ett filtrum och tvättad, digererades den i 24 timmar med en neutral lösning af svafvelsyrad furfuring. Efter filtrering erhöles en neutralt reagerande vätska af metafosforsyrad furfuring. Ur den något utspädda lösningen lyckades det icke att utfälla saltet med alkohol eller eter. Vid afdunstning under exsiccatorn erhöles en gummilik massa, som vid upphettning blef svart och glaslik. Något försök att bestämma fosforsyrehalten har ännu ej kunnat anställas.

7. Sur vinsyrad furfurinammoniumoxid.

Furfurin löses i vinsyra, dock så att lösningen förblir temligen sur. Efter några dagar utkristalliserar ett lättlöst surt salt i sneda fyrsidiga prizmer, som vid torkning så väl i vanlig temperatur, som vid 100 till 150° visa sig innehålla intet kristallvatten. Saltet bibehåller sig oförändradt i luften och utvecklar ammoniak vid upphettning med kaustiskt kali. Ur dess lösning kan furfurin ej genom tillsats af ammoniak utfällas. Någon analys, för att bestämma saltets sammansättning, har ännu ej blifvit verkställd.

Inlemnad afhandling.

Hr Magister ANDERSONS afhandling om Galapagos-öarnas vegetation, som varit remitterad till Hr WIKSTRÖM, FRIES och ARESCHOU, hade blifvit återlemnad med tillstyrkan af dess införande i Handlingarna.

Akademiska angelägenheter.

Sekreteraren anmälte, att Hr BOHEMANS årsberättelse för åren 1851 och 1852 var af trycket utkommen, samt att Hr N. P. ANGELIN i Akademiens vård deponerat ett försegladt konvolut.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af Kongl. Norska Universitetet.

Das chemische Laboratorium. Christ. 1854.

Aarsberetning f. 1852.

Index Scholarum, Aug. 1854.

Norske Stiftelser. H. I.

Nissen, Skotlands Almueskolvesen.

Sundt, Fante- eller Landstrygerfolket i Norge.

Boxer, Syphilisationsforsøg, 1853. — Syphilisationen, 1854.
Beregning om Bødfængslets virksomhed 1851, 1852, 1853. Chr.
1852—1854. 8:o.

Af K. Akademie der Wissenschaften i Berlin.

Abhandlungen, 1853.

Monatsberichte. 1853: Aug.—Dec. 1854: Jan.—Juli.

Af Smithsonian Institution i Washington.

Contributions to knowledge. Vol. VI.

Seventh Report of the board, 1852.

Directions for collecting, 2d edit. 1854.

Catalogue of coleoptera, by MELSHEIMER.

List of foreign Institutions.

On the eclipse, May 1854.

BAILEY, Microscopical organisms.

BAIRD, On the serpents of NewYork.

Natural History of the Red River.

Report on the Colonial et Lake trade, 1853. — With maps.

Af the Commissioners of patents i Washington.

Report of patents. 1851: 2. 1852: 1, 2. 1853: 1. 8:o.

Af Americ. Academy of Arts et Sciences i Boston.

Memoirs. Vol. II. 1846.

Proceedings. II: p. 161 et sequ. III: p. 1—104. 8:o.

Af Academy of Natural Sciences i Philadelphia.

Proceedings. VI: 8—12. VII: 1.

Catalogue of oological collection.

Af American Philos. Society i Philadelphia.

Transactions. X: 3. 1853.

Proceedings. N:o 27, 38, 39, 49, 50.

Af Lyceum of Natural History i NewYork.

Annals. V. 7—14. VI: 1—4.

Af Författarne.

BINNEY, The terrestrial airbreathing Mollusks of the U. S. Vol. 1, 2.

BROWN, Philosophy of Physics.

DANA, Crustacea of the U. S. Exploring Expedition. Vol. 1, 2.

GIRARD, Researches upon Nemerteans. I.

— Bibliography of Americ. Nat. Hist. for 1852.

DURAND, De choléra. Brux. 1854.

LA ROCHE, Pnevmonia.

SITGREAVES, Expedition down the Colorado River.

WARREN, Address to the Boston Society of Nat. Hist.

Af Utgifvarne.

American Journal. N:o 46—51.

Botaniska Notiser. 1854. N:o 7, 8.

NORTON's Literary Register f. 1854.

DE VRIES, Voyages, 1632—1644. New York 1853.

WASHINGTON's Farewell Address. New York 1850.

Af Hr Snellen von Vollenhofen i Leiden.

Verslag von d. nederl. entomol. Vereeniging. (1850).

Handelingen der nederl. entomol. Vereenig Deel I. H. 1. Leiden 1854. 4:o.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Kapten Tarras.

En levande *Tragulus javanicus*.

Af Stud. G. A. Lindberg.

Två cranier af släktet *Felis*, några mollusker och fiskar, samt en *Sertularia*, alla från Brasilien.

Af Kammarjunkaren Bååf i Småland.

En *Vipera prester* L.

Af Hr Temminck i Leyden.

En *Zosterops javanica*.

Af Friherre C. J. Cederström.

En större grålax, två honor af lax, fem st. foreller, tre st. laxyngel, alla från Husby å i Södertörn.

Botaniska afdelningen.

Af Frenten Lestadius i Fajala.

Åttio arter från nejderna af Karesuando Prestgård och Kengia, deribland talrika arter af *Carex*, *Luzula*, *Poa*, *Triticum*, *Thalictrum*, *Hieracium*, *Sparganium* o. s. v.

Af Mag. N. J. Andersson.

Några hundrade arter från botaniska trädgårdar i Berlin, deribland talrika serier af många familjer, såsom *Gramineæ*, *Commelineæ*, *Cruciferae*, *Malvaceæ*, *Leguminosæ*, *Labiatae*, *Scrophularineæ*, *Compositæ*.

Af Mag. Zetterstedt.

Elthundrade arter från Dovre fjeld, serdeles af *Gramineæ*, *Cyperaceæ*, *Funcaceæ*, *Cruciferae*, *Leguminosæ*, *Compositæ*, *Ranunculaceæ* o. s. v.

Af Mag. Lönnroth.

Tre arter af *Callitriche*, *Arabis Gerardi*, *Oenanthe fistulosa*.

Af Studeranden Brandelius.

Tjuguåtta arter från Strömstads-nejden t. ex. *Tilia grandifolia*, *Ligustrum vulgare*, *Sorbus Aria*, *Lonciera Periclymenum*, *Thalictrum minus*, *Lathyrus maritimus*, *Haloscias scotica*, *Melilotatus macrorhiza*, *Euphorbia palustris*, *Zostera marina*, *angustifolia*, *Alcheurilla alpina*, *Phleum arenarium*, *Sagina maritima* m. fl.

Af Trädgårdsmästaren Olsson på Årup i Skåne.

Tio skånska arter i flera exemplar, t. ex. *Fagus sylvatica*, *Carpinus Betulus*, *Sarothamnus scoparius*, *Valeriana dioica*, *Cineraria palustris*, *Dianthus arcuarius*, *Hydrocatyle vulgaris*.



*Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i Juni 1854.*

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkin- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,53	25,50	25,42	+12,4	+19,1	+15,0	V.N.V.	V.	V.	Klart
2	25,32	25,31	25,32	+14,0	+12,2	+ 6,1	V.N.V.	N.N.O.	N.O.	Regn
3	25,35	25,38	25,37	+ 4,0	+ 6,0	+ 4,0	N.	N.O.	N.	—
4	25,32	25,24	25,24	+ 5,0	+13,1	+11,0	N.N.V.	N.N.V.	N.	Mulet
5	25,24	25,28	25,28	+ 7,2	+10,0	+ 9,5	N	N.	N.N.V.	Regn
6	25,26	25,23	25,21	+ 9,0	+ 9,0	+ 7,0	N.	N.N.V.	N.N.V.	—
7	25,20	25,27	25,30	+ 6,7	+10,3	+ 8,2	N.N.V.	N.N.O.	N.N.V.	Halfkl.
8	25,30	25,36	25,41	+ 9,7	+15,3	+10,0	N.	N.N.O.	N.O.	—
9	25,38	25,34	25,30	+11,2	+15,5	+11,9	N.	N.N.O.	N.N.O.	Klart
10	25,14	25,07	25,06	+ 9,8	+13,0	+ 9,0	N.	N.	N.N.V.	Mulet
11	25,03	25,15	25,25	+ 9,9	+17,0	+10,0	V.S.V.	S.S.V.	S.	Halfkl.
12	25,35	25,05	25,52	+10,0	+14,0	+ 7,8	O.S.O.	O.S.O.	O.S.O.	—
13	25,50	25,46	25,42	+13,9	+19,0	+15,0	O.N.O.	O.N.O.	N.N.O.	Klart
14	25,31	25,31	25,33	+13,3	+20,3	+13,4	N.N.V.	O.N.O.	S.S.O.	Halfkl.
15	25,35	25,40	25,42	+11,6	+20,5	+15,4	O.S.O.	S.O.	O.S.O.	—
16	25,42	25,42	25,40	+13,3	+17,2	+14,4	—	N.O.	N.N.O.	Regn
17	25,38	25,38	25,45	+15,0	+21,0	+16,0	—	O.N.O.	—	Halfkl.
18	25,50	25,56	25,63	+21,0	+24,0	+17,0	—	O.S.O.	—	Klart
19	25,66	25,64	25,61	+21,0	+25,0	+19,6	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	—
20	25,62	25,59	25,54	+21,0	+24,5	+19,0	O.S.O.	O.S.O.	O.S.O.	—
21	25,49	25,43	25,41	+19,0	+26,5	+19,2	O.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	Regn
22	25,44	25,50	25,52	+16,0	+20,0	+16,7	V.S.V.	V.S.V.	V.	—
23	25,55	25,55	25,53	+19,8	+23,7	+16,0	—	—	S.S.V.	Halfkl.
24	25,51	25,45	25,45	+16,4	+22,0	+18,7	N.N.O.	V.	—	Regn
25	25,44	25,44	25,44	+17,4	+20,0	+16,7	—	O.	O.	—
26	25,43	25,42	25,47	+16,1	+24,1	+17,5	O.	V.	—	—
27	25,33	25,30	25,27	+19,6	+26,1	+20,3	S.S.V.	S.S.O.	S.S.V.	Solrök
28	25,31	25,36	25,33	+16,5	+21,6	+19,0	V.	V.	V.	Halfkl.
29	25,31	25,36	25,32	+18,4	+20,7	+15,2	N.N.O.	S.S.V.	O.	Mulet
30	25,27	25,25	25,22	+16,0	+18,0	+16,3	O.S.O.	N.O.	O.N.O.	—
Med- delt	25,375	25,367	25,381	+13,81	+18,29	+13,83	Nederbörden = 0,496 dec. tum.			
	25,374			+15,31						

i Juli 1854.

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,20	25,20	25,22	+16,0	+22,7	+17,6	N.	N.	N.O.	Bar.
2	25,21	25,20	25,20	+22,0	+22,8	+19,4	—	V.	O.S.O.	—
3	25,23	25,26	25,29	+18,3	+18,7	+17,0	V.	V.	V.	Mar.
4	25,33	25,37	25,39	+18,6	+22,1	+17,7	S.V.	V.	—	H. 1
5	25,41	25,45	25,46	+17,0	+23,5	+18,0	—	S.	O.	Kar.
6	25,45	25,46	25,46	+20,0	+23,2	+19,4	O.	S.O.	O.	—
7	25,44	25,41	25,41	+21,6	+25,0	+19,7	O.	O.	—	—
8	25,35	25,33	25,30	+24,8	+28,0	+22,0	—	O.	O.	—
9	25,27	25,24	25,24	+22,5	+26,1	+21,7	N.	O.	—	—
10	25,23	25,25	25,25	+18,5	+25,6	+16,5	N.	N.N.V.	V.	Bar.
11	25,18	25,15	25,17	+13,4	+15,7	+14,0	N.	N.	N.	Rep.
12	25,12	25,14	25,16	+15,1	+22,0	+16,4	N.N.V.	—	N.O.	—
13	25,16	25,17	25,18	+15,3	+19,5	+17,4	N.	V.S.V.	S.	—
14	25,20	25,26	25,32	+19,5	+23,0	+16,7	O.	O.S.O.	O.S.O.	—
15	25,40	25,46	25,51	+17,2	+26,2	+17,9	—	—	S.	Bar.
16	25,56	25,58	25,60	+18,2	+26,6	+20,0	—	—	S.	Bar.
17	25,60	25,56	25,54	+21,2	+26,1	+21,2	O.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	Bar.
18	25,45	25,45	25,42	+18,3	+19,2	+19,4	N.N.O.	N.	N.O.	Bar.
19	25,42	25,43	25,45	+20,0	+27,0	+20,9	—	—	V.S.V.	Bar.
20	25,49	25,56	25,58	+21,0	+25,2	+22,2	V.	V.	V.	Kar.
21	25,65	25,69	25,69	+19,0	+23,0	+19,5	—	N.N.O.	S.	Bar.
22	25,67	25,65	25,62	+22,0	+26,7	+21,0	V.S.V.	V.S.V.	S.V.	Kar.
23	25,62	25,58	25,57	+22,3	+27,0	+21,0	V.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	—
24	25,52	25,50	25,52	+23,3	+24,0	+19,6	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
25	25,48	25,42	25,41	+18,0	+22,7	+18,7	V.S.V.	V.S.V.	V.	—
26	25,42	25,42	25,37	+18,2	+21,0	+15,0	N.N.V.	N.	—	Bar.
27	25,38	25,37	25,40	+14,5	+18,3	+10,3	N.N.V.	N.N.V.	N.V.	Rep.
28	25,40	25,44	25,48	+11,0	+12,0	+12,7	N.V.	N.	N.V.	—
29	25,50	25,54	25,54	+13,3	+17,7	+14,0	N.N.V.	N.N.V.	S.S.O.	Kar.
30	25,54	25,53	25,51	+17,0	+22,0	+16,1	S.S.V.	S.S.V.	—	—
31	25,50	25,47	25,44	+18,7	+23,0	+17,0	S.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	Bar.
Me- dium	25,399	25,404	25,410	+18,37	+22,76	+18,06	Nederbörden = 1,847 dec. lin.			
	25,404			+1,980						

i Augusti 1854.

	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärk- ningar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,40	25,38	25,35	+17,8	+22,7	+18,2	—	S.	S.S.O.	Mulet
2	25,28	25,26	25,24	+18,1	+22,0	+17,7	N.N.O.	O.S.O.	O.	Halfkl.
3	25,21	25,24	25,29	+18,0	+20,0	+18,0	O.	O.	N.N.O.	Storm
4	25,31	25,38	25,42	+18,0	+22,2	+17,5	N.N.O.	O.N.O.	—	Mulet
5	25,43	25,42	25,43	+16,0	+25,1	+19,2	—	V.N.V.	V.N.V.	Halfkl.
6	25,38	25,40	25,43	+17,2	+25,0	+17,7	—	S.S.O.	—	Regn
7	25,46	25,49	25,53	+15,6	+21,0	+15,2	N.	N.N.V.	O.N.O.	Halfkl.
8	25,53	25,51	25,50	+16,0	+21,6	+14,8	—	V.N.V.	S.S.V.	Klart
9	25,49	25,49	25,49	+17,7	+25,2	+17,4	S.	—	S.	—
10	25,49	25,51	25,49	+18,2	+20,5	+17,6	S.S.V.	O.S.O.	S.S.O.	Regn
11	25,45	25,41	25,39	+18,5	+23,0	+20,0	S.S.O.	O.S.O.	S.O.	Halfkl.
12	25,32	25,36	25,41	+19,0	+23,0	+17,0	S.O.	V.S.V.	S.S.V.	Regn
13	25,46	25,50	25,52	+16,1	+22,0	+18,9	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Klart
14	25,57	25,60	25,59	+19,2	+26,1	+18,0	V.S.V.	V.S.V.	S.S.O.	—
15	25,53	25,50	25,46	+20,0	+26,7	+19,6	S.S.O.	S.	S.	Regn
16	25,41	25,41	25,46	+21,4	+26,2	+18,0	S.O.	S.S.O.	V.N.V.	—
17	25,48	25,47	25,38	+19,0	+24,0	+19,3	—	O.N.O.	O.N.O.	Halfkl.
18	25,38	25,52	25,58	+18,0	+22,0	+16,6	S.	S.S.V.	S.O.	Regn
19	25,60	25,60	25,52	+17,0	+22,0	+18,4	—	O.N.O.	N.N.O.	Halfkl.
20	25,46	25,44	25,46	+17,1	+22,5	+17,8	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	Regn
21	25,49	25,54	25,57	+19,0	+22,0	+17,6	S.S.V.	S.S.O.	S.S.O.	Halfkl.
22	25,51	25,48	25,44	+18,0	+22,9	+17,9	—	S.	S.S.O.	—
23	25,38	25,40	25,43	+19,0	+20,5	+16,8	S.S.O.	S.V.	S.V.	Regn
24	25,37	25,26	25,14	+14,6	+16,2	+15,7	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
25	25,03	25,11	25,21	+14,6	+19,2	+14,5	S.S.V.	S.V.	S.V.	—
26	25,32	25,42	25,51	+11,5	+17,0	+12,5	V.S.V.	N.N.V.	N.N.V.	—
27	25,58	25,60	25,59	+12,0	+19,9	+15,5	N.N.V.	V.N.V.	V.	Halfkl.
28	25,59	25,56	25,53	+14,0	+23,0	+14,9	—	—	V.S.V.	Klart
29	25,43	25,41	25,43	+15,9	+19,9	+13,0	V.S.V.	O.N.O.	V.S.V.	Regn
30	25,48	25,41	25,29	+12,0	+18,4	+16,0	V.N.V.	S.S.V.	V.S.V.	Halfkl.
31	25,21	25,19	25,28	+15,6	+18,0	+14,5	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Klart
Me- diom	25,420	25,428	25,431	+16,91	+21,91	+16,04	Nederbörden = 0,958 dec. tum.			
	25,426			+18,59						

i September 1854.

	Barometern reducerad till 0°. Decimalum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärk- ningar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,38	25,52	25,62	+10,3	+17,0	+12,5	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klar
2	25,71	25,76	25,77	+10,5	+19,1	+12,0	—	V.N.V.	—	—
3	25,75	25,71	25,69	+ 9,6	+18,6	+14,8	S.S.V.	O.	V.S.V.	Half.
4	25,62	25,59	25,41	+13,3	+22,0	+18,6	V.S.V.	V.	V.S.V.	—
5	25,51	25,57	25,42	+10,5	+15,0	+13,0	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klar
6	25,44	25,38	25,30	+ 8,0	+13,1	+ 8,0	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
7	25,27	25,27	25,31	+ 4,5	+11,9	+ 9,0	V.N.V.	V.N.V.	N.N.V.	Half.
8	25,30	25,34	25,38	+ 7,0	+ 9,2	+ 9,0	N.N.V.	N.	N.V.	Regn
9	25,40	25,44	25,47	+ 4,5	+10,0	+ 8,0	N.	N.	N.N.V.	—
10	25,45	25,50	25,55	+ 4,6	+10,7	+ 7,0	N.N.V.	N.N.O.	N.N.O.	—
11	25,57	25,53	25,42	+ 4,6	+13,4	+12,9	—	S.	S.V.	Mulet
12	25,38	25,35	25,39	+12,9	+19,1	+14,5	V.S.V.	V.S.V.	V.	Half.
13	25,37	25,33	25,27	+14,0	+19,6	+15,1	V.	V.	V.	—
14	25,27	25,26	25,18	+15,4	+20,0	+15,0	V.	V.S.V.	V.S.V.	—
15	25,04	25,03	25,03	+14,3	+18,2	+14,5	—	V.S.V.	V.	—
16	25,13	25,22	25,25	+10,2	+18,0	+12,8	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klar
17	25,23	25,15	25,02	+12,0	+15,0	+16,2	V.	S.	V.	Regn
18	25,08	25,07	25,09	+12,1	+17,0	+13,7	V.	V.	V.	Half.
19	24,98	24,82	25,05	+11,0	+13,7	+ 9,0	V.	V.S.V.	N.N.V.	Regn
20	25,22	25,21	25,01	+ 6,2	+13,0	+10,0	—	V.S.V.	S.	Half.
21	25,06	25,18	25,22	+ 8,3	+11,4	+ 7,0	V.	V.	—	Regn
22	25,24	25,32	25,37	+ 5,6	+12,0	+ 8,0	V.	V.N.V.	N.	Klar
23	25,46	25,48	25,50	+ 3,0	+ 9,6	+ 4,5	V.N.V.	V.N.V.	N.V.	—
24	25,32	25,03	24,79	+ 7,9	+10,2	+ 9,6	S.S.O.	S.	S.S.O.	Regn
25	24,69	24,78	25,09	+ 6,2	+ 7,0	+ 5,7	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
26	25,34	25,48	25,53	+ 4,2	+10,9	+ 8,0	V.N.V.	N.V.	V.	Klar
27	25,51	25,52	25,56	+ 7,5	+17,2	+12,0	V.	V.S.V.	V.	—
28	25,57	25,63	25,62	+10,0	+16,2	+11,6	V.	V.	V.	—
29	25,54	25,45	25,36	+12,0	+17,0	+12,9	V.S.V.	V.S.V.	V.	Mulet
30	25,22	25,03	25,11	+ 9,1	+16,0	+ 8,0	V.	V.S.V.	V.S.V.	Regn
Me- dium	25,335	25,332	25,326	+ 8,98	+14,70	+11,97	Nederbörden = 1,245 dec. tum.			
	25,331			+11,88						

ÖFVERSIGT
AF
KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS
FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

N 10.

Onsdagen den 13 December.

Föredrag.

1. *Om upplösningen af numeriska eqvationer af tredje graden.* — Hr Lector LINDMAN hade insänt följande meddelande.

»Då man granskar sättet för algebraiska eqvationers upplösning, så finner man, att för eqvationer af serskilda grader serskilda metoder användas, hufvudsakligen bestående uti att söka en annan eqvation af närmast lägre grad, af hvilkens rötter den gifnas bero. Vid upplösningen af numeriska eqvationer har man deremot sökt metoder passande för eqvationer af alla grader. Om än riktigheten deraf ur theoretisk synpunkt är obestridlig, så är det dock tydligt, att åtgöranden deraf framkallas, som kunna i enskilda fall vara öfverflödiga eller åtminstone af andra och mindre besvärliga ersättas. I praktiken bör man alltså ej försmå någon af de utvägar, som i enskilda fall erbjuda sig, att med minsta besväret finna ett för det afsedda ändamålet tillräckligt noggrant resultat. Sedan jag genom en i möjligaste måtto kort granskning af de förnämsta metoder, som vid upplösning af numeriska eqvationer af tredje graden kunna användas, sökt ådagalägga, att denna i min tanke riktiga åsigt icke dervid gjort sig gällande, anhåller jag att få framställa ett förslag i detta afseende.

Den äldsta metoden är den, som plägar benämnas efter CARDAN, Denna kan naturligtvis äfven användas på numeriska



eqvationer, men, utom det att den lider undantag vid den så kallade »casus irreducibilis», erfordrar den utdragning af en kvadratroten och två kubikrötter. Detta tyckes ej vara så synnerligen besvärligt, men då man tager i betraktande, att kvadratroten bör hafva tre gånger så många decimaler som man önskar i värdet på den obekanta, så får saken ett annat utseende. I följe häraf är CARDANS regel ej tjenlig att gifva roten med ett större antal decimaler. Hvarje annan method att upplösa algebraiska eqvationer af tredje graden leder ytterst till dylika formler och är alltså i samma belägenhet, då den tillämpas på numeriska eqvationer. Att utveckla i serier går bra, om dessa hastigt konvergera, men blir annars alltför mödosamt. Här af följer, att någon annan method för detta fall behöfves. Flera sådana äro kända, hvilka gifva rötterna med en större eller mindre grad af approximation. Den beqvämaste af alla är den, som anlitar goniometriska formler; men han ger i allmänhet endast sex exakta siffror, då logarithmer med sju decimaler användas, och är äfven underkastad undantag. De öfriga methoderna sönderfalla i två slag: sådana, som kunna användas på numeriska eqvationer i allmänhet, och sådana, som äro lämpade för serskilda klasser af eqvationer.

De af förra slaget äro hufvudsakligen tre, uppgifna af NEWTON, LAGRANGE och FOURIER. Emedan dessa äro ämnade för eqvationer i allmänhet, så är det ej underligt, att de fordra en nog vidlyftig räkning. FOURIERS sköna method, som är så utmärkt genom sin allmänlighet och den säkerhet, hvarmed approximationsgraden blir känd, ger alla rötterna utan något tatonnement och med hvilken noggrannhet som önskas. Det enda, som med något skäl synes mot den kunna anmärkas, är, att dess användning fordrar mera möda, än som vid tredje gradens eqvationer kan tyckas behöflig. NEWTONS och LAGRANGES metoder erfordra, att man känner gränсор, emellan hvilka endast en rot ligger. Dylika gränсор kunna visserligen finnas, men det gör alltid besvär.

Till det sednare slaget höra GAUSS' indirekta method för trinomiska eqvationer af alla grader och RUTHERFORDS för eqvationer af tredje och fjerde graden. Vid den förra användas logarithm-tabeller, och man får alltså genom denna method endast sex exakta siffror, då tabeller med sju decimaler nyttjas. RUTHERFORDS vackra method fordrar, likasom methoderna af förra slaget, många substitutioner äfvensom stora tals qvadrering och kvadratrotutdragning, hvarigenom den förlorar en del af sitt företräde.

Af denna, om än flygtiga granskning ses, att flera af dessa metoder hafva egendomliga företräden, äfven om de i vissa fall lemna åtskilligt öfrigt att önska. Är man belåten med sex exakta siffror, så är den goniometrisk methoden beqvämast, då den ej lider undantag, hvarom framdeles. Vill man hafva ganska stor grad af approximation, så anlitas FOURIERS method. Oftast torde man likväl vara fullt belåten med tio exakta decimaler och det är egentligen för ett sådant antals erhållande, som jag nu önskar framställa ett förslag. I vanliga fall kunna nio erhållas genom logarithm-tabeller med tio decimaler. Emedan likväl sådana ej alltid äro tillhands, men bruket af logarithmer vid så otaligt många andra, tillfällen minskar siffräkningens besvärlighet, så har jag trott det löna mödan att försöka, om icke detta ändamål skulle kunna vinnas genom tabeller med sju decimaler. Det torde knappast behöfva sägas, att frågan endast är om incommensurabla och imaginära rötter.

I den till upplösning framställda eqvationen antager jag andra termen bortskaffad, samt att koefficienten för x^3 i den så erhållna eqvationen är $=1$, och de öfriga större än eller lika med 1 d. v. s., att eqvationen har formen

$$x^3 \pm px \pm q = 0 \quad (p \text{ och } q \geq 1)$$

med alla möjliga kombinationer af tecknen.

Man må nyttja hvilken approximationsmethod som helst, så behöfver man till en början något litet approximerade vär-

den. Lättaste sättet att finna sådana tyckes vara att använda den goniometriska methoden och enligt den genom tabeller med fyra eller fem decimaler beräkna rötterna.

De formler, som då erfordras, äro:

$$1:o \quad x^3 + px \pm q = 0, \quad \operatorname{tg} \phi = \frac{p}{3q} \cdot 2 \sqrt{\frac{1}{3} p}, \quad \operatorname{tg} \psi = \sqrt[3]{\operatorname{tg} \frac{1}{2} \phi}$$

$$x_1 = \mp 2 \sqrt{\frac{1}{3} p} \operatorname{Cot} 2\psi, \quad x_2 = -\frac{x_1}{2} \pm \frac{\sqrt{p}}{\sin 2\psi}, \quad x_3 = -\frac{x_1}{2} \mp \frac{\sqrt{p}}{\sin 2\psi};$$

$$2:o \quad x^3 - px \pm q = 0, \quad \frac{q^2}{4} > \frac{p^3}{27}, \quad \sin \phi = \frac{p}{3q} \cdot 2 \sqrt{\frac{1}{3} p}, \quad \operatorname{tg} \psi = \sqrt[3]{\operatorname{tg} \frac{1}{2} \phi},$$

$$x_1 = \mp \frac{2\sqrt{\frac{1}{3} p}}{\sin 2\psi}, \quad x_2 = -\frac{x_1}{2} \pm \sqrt{p} \operatorname{Cot} 2\psi, \quad x_3 = -\frac{x_1}{2} \mp \sqrt{p} \operatorname{Cot} 2\psi;$$

$$3:o \quad x^3 - px \pm q = 0, \quad \frac{q^2}{4} \leq \frac{p^3}{27}, \quad \cos 3\phi = \frac{3q}{p \cdot 2\sqrt{\frac{1}{3} p}}$$

$$x_1 = \mp 2 \sqrt{\frac{1}{3} p} \cos \phi, \quad x_2 = \pm 2 \sqrt{\frac{1}{3} p} \cos \left(\frac{\pi}{3} - \phi \right),$$

$$x_3 = \pm 2 \sqrt{\frac{1}{3} p} \cos \left(\frac{\pi}{3} + \phi \right).$$

Sedan man genom dessa formler erhållit ett approximeradt värde ($=k$), hvars korrektion ($< 0,01$) må heta y , insättes $k+y$ i stället för x i formeln 1:o. Då fås

$$y^3 + 3ky^2 + (3k^2 + p)y + k^3 + pk \pm q = 0.$$

Betecknar man numeriska värden af k med κ , så blir, om $\kappa > 1$, $3k^2 > 3\kappa$ och a fortiori $3k^2 + p > 3\kappa$. Är $\kappa = \frac{1}{3}$, så blir $3\kappa = 1$, $3k^2 + p = \frac{1}{3} + p$, således äfven då $3k^2 + p > 3\kappa$, emedan minsta värdet af p är $= 1$. Samma förhållande eger rum, då $\kappa < \frac{1}{3}$. Således är $3k^2 + p$ alltid större än numeriska värden af $3k$. Sätter man derför

$$y = -\frac{k^3 + pk \pm q}{3k^2 + p} - \frac{3k}{3k^2 + p} y^2 - \frac{y^3}{3k^2 + p}$$

och betänker att y^3 är $< 0,0001$, så kan man antaga termen $-\frac{k^3 + pk \pm q}{3k^2 + p}$, förvandlad till decimalbråk med elfva eller tolf decimaler, att vara det första approximerade värdet på y , hvilket, insatt i stället för y^2 , y^3 , ger ett mera approximeradt, som yt-

terligare insättes. Dermed fortfares, tills två konsekutiva värden på y blifva lika eller endast olika i de sista decimalerna, hvilket efter 3 à 4 substitutioner inträffar, då y enligt antagandet är $< 0,01$. Före dessa substitutioner tagas logaritmerna för $\frac{3k}{3k^2+p}$, $\frac{1}{3k^2+p}$, hvilka begagnas under hela räkningen. Om de båda imaginära rötterna, som i detta fall finnas, skall framdeles talas.

Då eqvationen har formen 2o, så kan samma förfarande användas, om $3k^2-p$ är större än numeriska valören af $3k$. Att så alltid är, kan på följande sätt ådagaläggas. Den reela roten är

$$k+y = \mp \left(\sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^2}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^2}{27}}} \right).$$

Gör man för korthets skull $\sqrt{4 - \frac{4p^2}{27q^2}} = b$, så blir

$$k = \mp \sqrt[3]{\frac{q}{2}} \left\{ (1-b)^{\frac{1}{3}} + (1+b)^{\frac{1}{3}} \right\} - y,$$

$$k^2 - \frac{p}{3} = \sqrt[3]{\frac{q^2}{4}} \left\{ (1-b)^{\frac{2}{3}} + (1+b)^{\frac{2}{3}} \right\} + \frac{p}{3} \pm 2y \sqrt[3]{\frac{q}{2}} \left\{ (1-b)^{\frac{1}{3}} + (1+b)^{\frac{1}{3}} \right\} + y^2.$$

Nu bör $k^2 - \frac{p}{3}$ vara större än numeriska valören af k , d. v. s.

$$\begin{aligned} & \sqrt[3]{\frac{q^2}{4}} \left\{ (1-b)^{\frac{2}{3}} + (1+b)^{\frac{2}{3}} \right\} + \frac{p}{3} - 2y \sqrt[3]{\frac{q}{2}} \left\{ (1-b)^{\frac{1}{3}} + (1+b)^{\frac{1}{3}} \right\} \\ & > \sqrt[3]{\frac{q}{2}} \left\{ (1-b)^{\frac{1}{3}} + (1+b)^{\frac{1}{3}} \right\} + y, \end{aligned}$$

då y^2 försummas. Sätter man sedan $y = 0,01$, så bör vara

$$\sqrt[3]{\frac{q^2}{4}} \left\{ (1-b)^{\frac{2}{3}} + (1+b)^{\frac{2}{3}} \right\} + \frac{p}{3} > 1,02 \sqrt[3]{\frac{q}{2}} \left\{ (1-b)^{\frac{1}{3}} + (1+b)^{\frac{1}{3}} \right\} + 0,01.$$

Emedan detta eger rum, då p och q hafva sina minsta värden neml. 1, och man lätt kan öfvertyga sig att så äfven är för andra värden, så kan alltid, då eqvationen har formen 2o, det nämnda förfarandet användas.

Öfvergår man nu till formen 3o, så finner man för

$$\frac{q^2}{4} = \frac{p^2}{27}, \quad x_1 = \mp 2 \sqrt{\frac{1}{3}p}, \quad x_2 = x_3 = \pm \sqrt{\frac{1}{3}p}.$$

Är $\frac{q^2}{4} < \frac{p^2}{27}$, så inträder casus irreducibilis, då alla rötterna äro reela och olika samt två hafva samma tecken. Goniometrisk methoden ger i allmänhet på hvardera ett approximeradt värde, hvilket kan behandlas såsom förut, om numeriska värden af koefficienten $\frac{3k}{3k^2-p}$ är mindre än 1 eller blott obetydligt öfverstiger 1. Sätter man den rot, som har motsatt tecken mot de två andra, $=a$, de två andras halfva summa $=a$, deras halfva skillnad $=\delta$, så fås

$$(x-a)(x-a-\delta)(x-a+\delta)=0,$$

hvilken eqvation, jemförd med den gifna, ger

$$a+2a=0, 2aa+a^2-\delta^2=-p, a(a^2-\delta^2)=\mp q \dots (v)$$

Om nu a insättes i stället för k i $\frac{3k}{3k^2-p}$, så fås i följe af de båda första

$$\frac{3k}{3k^2-p} = -\frac{3a}{\frac{1}{4}a^2-\delta^2}.$$

Tydligen är $\delta^2 < a^2$, d. v. s. $\delta^2 < \frac{1}{4}a^2$, alltså $\frac{3k}{3k^2-p} < 1$, om numeriska värden af $\frac{3}{2a}$ är < 1 eller $a > \frac{3}{2}$. Det kan lätt visas, att under de gjorda förutsättningarne detta vilkor alltid är såvida uppfyllt, att approximationen lyckas. Insättes på samma sätt och medelst samma eqvation $a-\delta$ i stället för k , så bör numeriska värden af $\frac{3(a-\delta)}{2\delta(3a-\delta)}$ vara < 1 . Emedan nu $\frac{1}{3}$ är numeriskt $> \frac{a-\delta}{3a-\delta}$, så är det tillräckligt, att $\frac{1}{2\delta}$ är < 1 eller blott litet skiljer sig derifrån. Den tredje roten behöfver ej direkt beräknas, emedan alla tre rötternas summa är $= 0$.

Blir deremot $\delta < 0,5$, men $> 0,05$, så är det bäst att multiplicera rötterna med något tal n , som gör den ifrågavarande skillnaden $> 0,5$. Detta kan, såsom bekant är, ske genom att insätta $\frac{x}{n}$ i stället för x . En dylik multiplikation påskyndar äfven annars approximationen genom att göra y liten, t. ex. multiplikation med 2, om tredje decimalen i k är 5.

Är slutligen $\delta < 0,05$, hvilket tillkännagifves genom ett mycket stort värde på $\log \cos 3\phi$, som stundom kommer så

nära 40, att bestämningen af ϕ blir mycket opålitlig, så blir den nyssnämnda multiplikationen obeqväm, derigenom att man får mycket stora tal att räkna med. Emedan den goniometriskas metoden i detta fall antingen icke gifver några approximerade värden eller de erhållna af förut anförda skäl icke kunna nyttjas, så måste man gå tillväga annorlunda. Om man fördenskull eliminerar a mellan de två första af eqvationerna (v), så fås

$$\frac{3}{4}a^2 + \delta^2 = p \dots\dots\dots (r)$$

Emedan δ enligt antagandet är liten, så kan δ^2 negligeras, och man finner det första approximerade värdet på a neml.

$$k = \mp 2\sqrt{\frac{1}{3}p},$$

hvarst tecknens ordning inhemtas af den tredje bland eqvationerna (v). Insättes $k+y$ i stället för x i den gifna eqvationen, så kan y bestämmas såsom förut. Den första bland eqvationerna (v) ger sedan

$$a = -\frac{1}{2}a.$$

Derefter återstår endast att finna δ . För detta ändamål *) torde det vara beqvämast att eliminera a och a mellan eqvationerna (v), hvarigenom man erhåller

$$4(p-\delta^2)(p-4\delta^2) = 27q^2 \text{ eller } 16\delta^4 - 24p\delta^2 + 9p^2\delta^2 = \frac{4p^3 - 27q^2}{4}.$$

Denne sednare eqvation kan få formen

$$\delta^2(3p-4\delta^2) = \frac{4p^3-27q^2}{4},$$

hvaraf man finner

$$\delta = \frac{\sqrt{4p^3-27q^2}}{6p(1-\frac{1}{3p}\delta^2)} = \frac{\sqrt{4p^3-27q^2}}{6p} \left[1 + \frac{4}{3p}\delta^2 + \left(\frac{4}{3p}\right)^2\delta^4 + \text{etc.} \right],$$

*) RUTHERFORD bestämmer i allmänhet δ (d. v. s. då δ ej är liten) genom eqvationen $\delta = \sqrt{p - \frac{1}{4}a^2}$, hvilken han på sitt sätt deducerat. Detta synes dock rätt besvärligt, emedan a (uträknad med 10 decimaler) måste upphöjas till kvadrat.

hvilken serie nödvändigt måste konvergera. Besvärligt är visserligen att uträkna p^3 och q^3 samt sedan utdraga roten; men p^3 och q^3 måste i alla fall beräknas för att kunna veta, om casus irreducibilis eger rum eller icke, såvida man ej vill låta de goniometriska formlerna afgöra det. Bättre blir det för öfrigt än att upphöja a , emedan man, såvida icke p och q äro stora tal, kan få p^3 , q^3 ur en dignitet-tabell. Approximationen, hvilken sker såsom förut med y , går deremot i allmänhet mycket fort. Naturligtvis uträknas $\log \frac{\sqrt{4p^3-27q^3}}{6p} \cdot \frac{4}{3p}$, etc. en gång för alla.

Hvad de imaginära rötterna beträffar, så erhållas de mycket lätt. Deras reela del är nämligen alltid lika med halfva den reela roten tagen med ombytt tecken. Koefficienten för i ($=\delta'$) fås, om man i eqvationen (r) insätter δ' i stället för δ . Då blir

$$\delta' = \sqrt{\frac{3}{4}a^3 - p}.$$

Emedan kännedomen af de imaginära rötterna väl i allmänhet kan anses tillräckligt noggrann, om man har dem med 5 à 6 decimaler, så kan δ' här beräknas medelst ZECHS Tabellen der Additions- und Subtractions-Logarithmen.

Såsom första exempel må eqvationen

$$x^3 - 2x - 5 = 0$$

användas, på hvilken NEWTON och LAGRANGE pröfvat sina metoder och hvilken i KLÜGELS Mathematisches Wörterbuch (Andra Supplementbandet pagg. 554—561) behandlas enligt FOURIERS method. Emedan $\frac{q^3}{4} - \frac{p^3}{27} = \frac{25}{4} - \frac{8}{27} > 0$, så har denna eqvation blott en reel rot. Trigonometriska tabeller med 4 decimaler gifva

$$x = 2,095, \quad x = -1,047 \pm 1,135 i.$$

Emedan tredje decimalen är 5, multipliceras rötterna med 2 eller $\frac{2}{3}$ insättes i stället för x , hvarigenom eqvationen öfvergår till

$$x_1^3 - 8x_1 - 40 = 0.$$

Här gör man $x_1 = 4,19 + y$ och får då

$$0,040059 + 44,6683y + 42,57y^2 + y^3 = 0 \text{ eller}$$

$$y = -0,000896810490 - 9,4493359y^2 - 8,35000y^3,$$

hvarrest de öfverstrukna talen äro logarithmer. Till första approximation antages $y_1 = -0,000896810490$. Emedan $\log y_1 = 6,9527006, n$, så fås

$$\log y_1^2 = 3,9054013$$

$$\frac{9,4493359n}{3,3547372n} \quad y_1 = -0,000896810490$$

$$-0,000000226327$$

$$\log y_1^3 = 0,85810n$$

$$\frac{8,35000n}{9,20810} \dots \dots + 0,000000000016$$

$$y_2 = -0,000897036801.$$

Sedan insätter man y_2 på samma sätt som y_1 och får då $y_3 = -0,000897036916$. Emedan $\log y_2$ blott med $\frac{1}{4}$ enhet i sjunde decimalen öfverstiger $\log y_3$, så lönar det ej mödan att approximera vidare, och man ser, att blott sista decimalen kan vara oriktig. Alltså blir

$$x_1 = 4,189102963084, \quad x = 2,094551481542.$$

Jemförelse med KLÜGEL l. c. visar, att händelsevis afven sista decimalen är riktig. Slutligen fås

$$x = -1,0472757 \pm 1,135940i.$$

Ex. 2.

$$t^3 + 11t^2 - 102t + 184 = 0.$$

Först borttages andra termen genom att sätta $t = \frac{x-11}{3}$, då man erhåller equationen

$$x^3 - 1281x + 17647 = 0.$$

Emedan $\frac{p^3}{27} - \frac{q^2}{4} = \frac{1323}{4}$, så inträffar här casus irreducibilis.

Man får ock $\log \cos 3\phi = 9,9999$, hvaraf ses, att två rötter äro nära lika. Man finner den tredjes approximerade värde $= -44,33$.

Insättes $-44,33 + y$ i stället för x , så fås

$$-7,890637 + 3843,5067y - 123,99y^2 + y^3 = 0 \text{ eller}$$

$$y = 0,002052978598 + 8,5086590y^2 - 6,41527y^3.$$

Man gör $y_1 = 0,002052978598$ och finner då

$$y_1 = 0,002053114561, y_2 = 0,002053114579, \text{ alltså}$$

$x_1 = -41,327946885421$, hvarest endast sista decimalen är osäker.

Emedan vidare $\sqrt{4p^3 - 27q^2} = 189$, så blir

$$\delta = \frac{3}{122} \left[4 + \frac{4}{3843} \delta^2 + \text{etc.} \right] \text{ eller}$$

$$\delta = 0,024590163934 + 5,4081510 \delta^2,$$

hvarest flera termer ej behöfva medtagas. Man får häraf

$\delta = 0,024590179410$. Emedan vidare $\alpha = 20,663973442710$, så blir

$$x_2 = 20,688563622120, x_3 = 20,639383263300.$$

I följe af eqvationen $t = \frac{x-11}{3}$ får man slutligen

$$t_1 = -17,442648961807; t_2 = 3,229521207374; t_3 = 3,213127754433.$$

Ex. 3. $8t^3 - 6t - 4 = 0$ (BOURDON, Elem. d'Alg. Paris 1837, pag. 562).

Denna eqvation förenklas, om man sätter $2t = x$ och blir

$$x^3 - 3x - 4 = 0.$$

Emedan $\frac{p^3}{27} - \frac{q^2}{4} = \frac{3}{4}$, så eger casus irreducibilis rum.

Goniometrisk methoden ger $\cos 3\phi = \frac{1}{2}$, $3\phi = 60^\circ$, alltså

$$x_1 = 1,88; x_2 = -1,532; x_3 = -0,347.$$

Gör man först $x = 1,88 + y$, så erhålles

$$0,004672 + 7,6032y + 5,64y^2 + y^3 = 0 \text{ eller}$$

$$y = -0,000614478114 - \sqrt{9,8702827y^2 - 9,11900y^2}.$$

Här är koefficienten för y^2 temligen stor. Likväl går approximationen raskt, och man erhåller

$$y_2 = -0,000614758172, y_3 = -0,000614758427, \text{ och i följe deraf}$$

$$x_1 = 1,879385241573.$$

Det är nu beqvämast att uträkna den tredje roten, hvars korrektion måste vara liten. Insättes alltså $-0,347 + y$ i stället för x , så erhålles

$$-0,000781923 - 2,638773y - 1,041y^2 + y^3 = 0 \text{ eller}$$

$$y = -0,000296320676 - \sqrt{9,5960487y^2 + 9,57860y^2}.$$

Då blir $y_2 = -0,000296355326, y_3 = -0,000296355332$, alltså

$$x_3 = -0,347296355332.$$

Emedan rötternas summa, tagen med ombytt tecken, är = andra terms koefficient, men denne nu = 0, så blir $x_1 = -1,53208886241$.

Hade man deremot omedelbart beräknat x , d. v. s. satt $x = -1,53 + y$, så hade man fått

$$y = -0,002093867303 + 0,0572954 y^2 - 9,39548 y^3.$$

Som koefficienten för y^2 är stor (δ är blott 0,64), så går approximationen litet långsammare än vanligt, men ger dock 40 exakta decimaler. Bättre är dock att multiplicera denna rot med 5, om man vill serskildt beräkna den. Då förvandlas eqvationen genom insättning af $\frac{x}{5}$ i stället för x till

$$x^2 - 75x - 125 = 0.$$

Gör man här $x = -7,66 + y$, så fås

$$0,044904 + 101,0268 y - 22,98 y^2 + y^3 = 0 \text{ eller}$$

$$y = -0,000444476119 + 9,3569134 y^2 - 7,99556 y^3,$$

hvaraf $y_1 = -0,000444431181$, $y_2 = -0,000444431190$, alltså

$$x = -7,660444431190, x_1 = -1,53208886238,$$

hvilket värde inom gränsen för möjliga fel öfverensstämmer med det förut erhållna. Om dessa värden på x divideras med 2, så fås värdena på t .

Ex. 4. $x^2 - 96x + 362 = 0.$

Här är $\frac{p^2}{27} - \frac{q^2}{4} = 7$ ($4p^2 - 27q^2 = 656$), alltså inträffar casus irreducibilis. Goniometrisk methoden ger $\log \cos 3\phi = 9,9999$.

På förut uppgifna sätt finner man $k = -11,31$ och då man gör $x = -11,31 + y$, så fås

$$1,028909 + 287,7483 y - 33,93 y^2 + y^3 = 0 \text{ eller}$$

$$y = -0,003575725729 + 9,0715712 y^2 - 7,54099 y^3,$$

hvaraf $y_1 = -0,003574217922$, $y_2 = -0,003574219194$, således

$$a = -11,313574219194, a = 5,656787109597.$$

Sedan finner man

$$\delta = \frac{\sqrt{21}}{96} \left\{ 1 + \frac{1}{72} \delta^2 + \left(\frac{1}{72} \right)^2 \delta^4 \right\}.$$

Emedan $\sqrt{21} = 4,58 \sqrt{1 + \frac{59}{32441}} = 4,5825756949557$, så blir

$$\delta = 0,047735163489 + 0,8215059\delta^2 + 4,96417\delta^4,$$

hvaraf $\delta_1 = 0,047736674253$, $\delta_2 = 0,047736674348$, således

$$a + \delta = 5,704523783945; \quad a - \delta = 5,6090504353249.$$

I dessa exempel hafva 14 exakta decimaler erhållits och det är tydligt, att äfven flera kunna erhållas, om det första approximerade värdet uträknas med mera än två. Då blir likväl räkningen något besvärligare än nu, och både dertfore och emedan man i de flesta fall kan vara belåten med 40 eller 14 exakta decimaler, har jag hufvudsakligen fästat mig vid erhållandet deraf.»

2. *Villes recherches expérimentales sur la végétation.* — Hr MOSANDER anförde:

»Ändamålet med de af Hr VILLE anställda kemiska undersökningar, hvilkas resultater äro framlagda i det af honom till Kongl. Akademien förärade arbete, som han utgifvit under titeln: »Recherches expérimentales sur la Végétation», har hufvudsakligast varit att bestämma huruvida luftens qväfve direkt upptages af växterna, och under hvilka omständigheter detta sker. För att på ett tillfredsställande sätt kunna besvara denna fråga, var det likväl nödvändigt, att med större säkerhet än som förut egt rum, bestämma luftens halt af ammoniak. Detta bestämmande har föregått de öfriga af Hr VILLES' undersökningar och i sammanhang dermed har äfven ammoniakens verkningar på växtlifvet blifvit närmare studerade

Redan PRIESTLEY trodde sig hafva funnit, att qväfve upptages ur luften af växterna; detta bestreds af TH. DE SAUSSURE, som, sedan han funnit att atmosfären innehöll ammoniak, ansåg dennas absorption af växterna såsom gifven. Att icke allt det qväfve, som innehålles uti växterna, alltid kunnat hämtas ur den jord hvarur de uppkommit, det hade erfarenheten tydligen visat, och BOUSSINGAULT satte detta förhållande utom allt tvifvel,

genom vetenskapligt anställda försök, hvilka ådagalade, att uppdagna plantor innehöllo mera qväfve än som funnits i de använda fröna och i den jord hvaruti de uppdragits. Hvarifrån detta öfverskott af qväfve härrörde, ansåg BOUSSINGAULT tvifvelaktigt; han anmärkte endast, att det kunde härflyta från luftens ammoniak-halt, eller vara direkte upptaget ur luften eller från det lufthaltiga vattnet. LIZIE tillbakahölls icke af någon tvekan; han antog luftens ammoniak vara källan till växternas qväfhalt, och MULDER visade, genom försök, att vid organiska, icke qväfhaltiga ämnens förruttnelse, i beröring med luften, qväfve ur denna upptages, hvarigenom bildning af ammoniak föranledes.

Det är klart att om man en längre tid dagligen, ur en betydlig mängd, från mekaniskt inblandade ämnen renad luft, utdrager ammoniaken och derefter bestämmer dess vikt, och försöken på samma sätt många gånger repeteras, med föga afvikande resultat, måste derigenom luftens medelhalt af ammoniak blifva bestämd så nära som möjligt. Det är äfven tydligt att om ur frön eller plantor, hvilkas sammansättning är nogga känd, växter uppdragas till mognad ur en qväffri jord och i en luft hvars qvantitet och ammoniakhalt blifvit bestämda, och man, efter det de mognat, finner dem innehålla många gånger större qväfhalt, än som förefunnits i de använda fröna, plantorna och i luftens ammoniak, måste det stora öfverskottet af qväfve, direkte hafva tagits från atmosfären, och detta blifver ändå ovedersägligare, om den under vegetations-perioden använda luften förut blifvit beröfvad all sin ammoniak, men resultatet ändå hufvudsakligen blifver detsamma. Utgående från dessa grundsatser har VILLE, genom sina med den mest utmärkta omsorg anställda försök, kommit till resultatet hvilka för agrikulturen likasom för vetenskapen äro af stort värde.

De kemister hvilka före VILLE sökt bestämma atmosfärens halt af ammoniak, hafva erhållit från hvarandra högst afvikande resultat; genom en noggrann granskning af det förfaringssätt, hvilket begagnats vid analyserna, har VILLE kommit i tillfälle att inse orsakerna till afvikelserna, äfvensom han, genom

kontrollerande motförsök, öfvertygat sig om värdet af de metoder han sjelf begagnat. Icke mindre än 46 försök anställdes för utrönande af atmosferens ammoniakhalt. Hvarje försök fortfor en månad, under hvilken tid den luft som skulle undersökas dagligen fick passera, i små blåsor, genom de vätskor hvari all ammoniak ovilkorligen måste upptagas. Den mängd luft, som för hvarje analys användes, uppgick minst till nära 7,000 och äfven till nära 21,000 kannor, och dessa qvantiteter bestämdes med en noggrannhet, som lemnade intet öfrigt att önska, då man tager i betraktande de väl uttänkta apparaternas beskaffenhet. Den begagnade luften insögs af apparaten, från en höjd af 43 till 47 alnar öfver jordytan, i en trädgård på ett ställe som var beläget på ett betydligt afstånd från hvarje boningshus. De i luften mekaniskt inblandade ämnena frånskildes medelst luftens silning genom tappar af kardad bomull eller glastrådar, och dessa blefvo, efter några månaders bruk, svarta till ett par tums längd, af de afsatta partiklarna, under det att, vid sugrörets öppning, myriader af små insekter samlats sig. De fyra sista serierna af försök anställdes på ett annat ställe, och den begagnade luften insögs då i apparaten från en höjd af 46 till 20 alnar från jordytan. Resultatet af dessa försök blef, att, oaktadt till hvarje analys användes från cirka 50 till 160 Σ luft, erhöles dock aldrig öfver 4.5, och ej under 0.4 milligramm ammoniak, och luftens medelhalt i de båda försöks-serierna visade sig således vara, i den första serien: 2.373 delar ammoniak i 400 millioner delar luft, och i den andra serien, 2.1 del ammoniak i 400 millioner delar luft.

Om man jemför dessa resultat med dem, som af andra kemister förut erhållits, så visar sig att då

KEMP funnit 4 Σ ammoniak uti	257,732 Σ luft
GRÄGER » » » »	3,003,003 » »
FRESSENIUS » » » »	7,490,637 » »

har VILLE deremot en-

dast funnit högst 4 Σ » »	42,194,093 » »
och minst » » » »	47,649,048 » »

eller circa sex gånger mindre än den af hans föregångare som erhållit det lägsta resultatet. Att denna ringa ammoniakhalt af föga mer än en femtiomilliondel af luftens vikt, under vanliga omständigheter, ej kan utöfva ett hufvudsakligt inflytande på växternas vegetation, torde kunna antagas såsom sannolikt.

Sedan luftens medelhalt af ammoniak sålunda blifvit funnen så nära som möjligt, företogs försöken till utrönande af hvarifrån växterna taga det qvälfve, som ej i form af ammoniak, eller ur jorden och deras frön, kunnat hämtas. Dessa försök anställdes i stora klockor af glas och på ett sådant sätt, att så väl den begagnade luften, som öfriga materialier, kunde till sin beskaffenhet noga bestämmas. Växterna uppdrogos i hvit sand, med underlag af tegelstensbitar, uti lämpliga krukor. Dessa så väl som tegelstensbitarne voro, före försöken, behandlade med saltsyra och derefter, liksom sanden, glödgade. Då det mötte svårigheter att i den hermetiskt slutna apparaten, ombesörja vattningen på vanligt sätt, skedde detta sålunda, att de i botten med öppna färor försedda blomkrukorna, ställdes vid ytan af det destillerade vatten, som blifvit infyllt på klockans botten. Dels frön, dels plantor begagnades till växternas uppdragande; men då man icke kunde vänta sig en någorlunda normal vegetation ur blott sand, rent vatten och en och samma luftquantitet, med sin obetydliga halt af kolsyra, afhjelpes detta derigenom, att klockans luft tre till fyra gånger dagligen ombyttes, medelst ett långsamt utsugande nedtill, under det att den nya luften inströmmade vid klockans öfra del. Den luft som begagnades, försattes med 4 till några procent kolsyra, hvars tillströmmande reglerades medelst ett elektriskt ur. All luft som sålunda kom i beröring med växterna, och hvaraf quantiteten uppgick till flera hundra kannor dagligen, bestämdes noga till sin mängd, oaktadt vegetationsperioden stundom uppgick till sju månader. Anskaffandet af de för växterna nödiga oorganiska ämnen, verkställdes derigenom, att aska af samma slags växt som den hvilken skulle uppdragas, inblandades i den sand hvilken begagnades i stället för jord. Här-

vid gjordes den iakttagelse, att ett par procent af sandens vikt aska, redan var för mycket och skadade växtens utveckling; vid användandet af plantor, verkade inblandandet, i den annars vanliga qvantiteten af en procent och derunder, af askan, alltid skadligt, hvarföre den, i sådane fall, först tillsattes sedan man sett att plantan tagit sig och syntes stark, och då måste i alla fall iakttagas, att endast det öfversta lagret af sanden blef askblandadt.

Det första försöket anställdes med krassa och lupiner; luft med sin vanliga ammoniakhalt användes härvid. Ut i detta fall befanns den erhållna skörden innehålla 258 milligrammer qväfve; qväfbalten i de använda fröna och i den ammoniak som funnits i den begagnade luften, uppgick tillsammans endast till 155 milligrammer; således hade 103 milligrammer qväfve tillkommit. I det andra försöket, anställt med Colza, hvete, råg och mais, innehöll den erhållna skörden 1,266 milligrammer qväfve. Fröna och ammoniaken i den begagnade luften, hade tillsammans endast innehållit 86 milligrammer qväfve; således ett öfverskott af 1,180 milligrammer. Att växterna således direkt upptaga qväfve ur atmosfären, bekräftas fullkomligt af dessa försök. För att utröna om atmosfärens ammoniakhalt utöfvar något väsendtligt inflytande på vegetationen, anställdes försöken der efter i en luft, som blifvit befriad från sin ammoniakhalt. Vegetationen förtgick på samma sätt som förut; i skörden af solblommor och tobak, fann man 494 milligrammer qväfve, hvaraf de använda fröna endast innehållit 13 milligrammer, och i en skörd af Colza, hvete och solblommor, hvaruti qväfbalten uppgick till 1,995 milligrammer, hade ur luften upptagits 1,624 milligrammer qväfve.

Luftens ammoniakhalt har följaktligen, i dessa försök, icke utöfvat något anmärkningsvärdt inflytande på vegetationen, hvilken deremot, på ett otvetydigt sätt, gjort sig till godo en betydlig mängd qväfve ur luften, hvarjemte visat sig att den allmänna föreställningen, att klöfver och leguminosæ hufvudsakligen

sakligen hemta sitt qväfve ur luften, då det deremot hemtas ur jorden af cerealierna, icke kan vara fullt riktig, enär de sistnämnde, i dessa försök, hafva upptagit qväfve i mängd ur luften.

Men om äfven luftens så ytterst obetydliga ammoniakhalt, synnerligen under de omständigheter som under dessa försök varit för handen, visat sig utan inflytande, kan deraf icke dragas den slutsats, att en ammoniakbaltig luft är utan verkan på vegetationen; tvertom är denna verkan i hög grad förtjent af uppmärksamhet, såsom det visar sig af VILLAS för utredandet häraf anställda försök. Dessa verkställdes alldeles såsom de förut beskrifna, med den skillnad, att den begagnade luften försattes med entvåtusenfemhundredel ammoniak. Verkan häraf visar sig redan efter 8—10 dagar, på ett i ögonen fallande sätt. Vegetationen tilltager fortfarande i styrka, de i början blekgröna bladen blifva mörkgröna, nästan svarta, bladskafven förlängas, deras yta blir bredare och glänsande och när vegetations-perioden är slut, erhålles en ynnigare skörd, än om vegetationen skett i vanlig luft, och det skördade är mera rikt på qväfve. Detta förhållande inses lätt, genom jämförelse emellan de resultater som erhöles då Colza, hvete och råg uppdrogos i ren luft och i ammoniakalisk.

Colza	{ i ren luft gaf skörd vä- gande, torkad vid +120.	{ 53.761 grm.	{ i ammoniak- blandad luft:	{ 67.024 grm
Hvete	do do do	2.407 do	do do	19.285 do
Råg	do do do	3.136 do	do do	18.655 do
100 del. vid +120 torkad Colza,	{ uppdragen i ren luft, innehöll	{ 1.99 qväfve och 4.99,	{ uppdragen i ammoniak- blandad luft	
do do do Hvete,	do do	1.10 do	3.77, do do	
do do do Råg,	do do	1.18 do	3.07, do do	

Ammoniakalisk lufta egenskap att öka växtligheten, att åstadkomma större och qväfrikare skörd, ådagalades tydligen i dessa försök; men derjemte iakttog VILLE åtskilligt, som är förtjent af stor uppmärksamhet. Om nemligen ammoniak användes flere månader före blomnings-perioden, fortgår vegetationen med mera styrka än vanligt, men fullkomligt normalt;

om åter växten är nära sin blomningsperiod, när man börjar använda ammoniakalisk luft, blir förhållandet ganska olika. Blomsättningen afstannar, vegetationen liksom genomgår ånyo de skiften den redan passerat, stjelken höjer och utgrenar sig i alla riktningar, nya blad framskjuta och om årstiden ej är för långt framskriden, återbörjar blomsättningen, men alla blomorna blifva ofruktsamma. Sker försöket med ett sädesslag, hvars pipiga strå motsätter sig bildandet af nya grenar, förändras i följd deraf fenomenet. Strået tillväxer ej mera, men från roten utskjuta tofsar af nya strån, hvilka snart hinna till lika höjd och högre än moderstrået: men växten gifver ingen frukt. Den onaturligt stegrade verksamheten i en funktion, bladsättningen, försvagar, såsom är vanligt, verksamheten i en annan riktning, äfven i detta fall. Det är således före blomningen och fruktsättningen, som ammoniaken kan åstadkomma nytta på vegetationen. Använd under den varmaste delen af sommaren, kan skada derigenom uppkomma; växternas nedra blad gulna, torka bort, de öfra börja snart undergå samma öde och växten dör. Detta inträffar isynnerhet med de växter, hvilkas vegetationsperiod är långt framskriden.

Det kan icke undfalla någon, att då VILLES' försök måst anställas under omständigheter helt olika med dem, som vanligen äro för handen vid all vegetation, de erhållna resultaten, i flera afseenden äro olika med dem, som skulle uppstått, under mera gynnsamma och naturliga förhållanden. Detta har äfven VILLE sjelf visat, derigenom att han, i stället för sand, använde vanlig god jord för att deri uppdraga Colza, dels i ren dels i ammoniakhaltig luft. I båda fallen erhöles ymnigare och qväfrikare skörd ur jorden, än ur sanden.

De af VILLE erhållna resultatet synas närmast bära öfverensstämma med dem som fås vid plantors odling i växthus. Detta synes äfven bekräfta sig af de försök som, i fyra växthus, blifvit anställda af GUZERT, med användandet af ammoniak i luften, enligt af VILLE lemnad föreskrift. Redan en månad efter försökets början, visade sig en ökad verksamhet i blad-

utvecklingen, isynnerhet på *Musa*, *Caladium*, *Crinum*, *Ravenala* och åtskilliga *Orchidéer*. *Pelargonierna*, som hade lidit mycket och voro gula, blefvo rika på mörkt färgade blad. På *Cammellier* och *Azaléer* ingen förändring. Efter tvenne månader väckte varmhusets plantor uppmärksamhet, genom sin gröna färg och de kraftiga, stora bladen. Växter hvilka annars äro blekgröna, såsom *Miltonia*, *Oncidium rosæum* antogo en lifligare färg. *Crinum*, *Musa* och *Caladium*, hvilka varit lidande, utveckla sig med styrka. Blommorna på *Phajus grandif.*, *Coelia Baueriana* m. fl. *Orchidéer*, hafva en lifligare färg. I kalla växthuset utmärka sig *Cinerarier*, *Calceolarier* och andra växter, genom sin grönska och styrka. Efter trenne månader fortsattes observationerna endast i de varma växthusen. Vegetationen kraftig, men plantor hvilka redan borde blomma, stå tillbaka; andra, hvilkas hvilotid var inne, fortsäsa att vegetera och andra åter förkorta sin hvila, medelst en förtidig vegetation. Efter fyra månader visade sig de redan omnämnda verkningarna i ännu högre grad; vegetationen var yppig, i allt som rörde bildning af blad och stjelkar; men växter som borde blomma rikt, blommade icke alls, men utgrenade sig i stället. När derefter ammoniak-inblandningen för ett par månader upphörde, inträdde visserligen blomning, men föga rikt. — Dessa resultatet öfverensstämma således med de iakttagelser hvilka blifvit gjorda af VILLE, som föreslår, att till förhindrande af blomningens fördröjande eller uteblifvande, afbryta ammoniakens begagnande en månad före blomningsperiodens inträdande.

Af hvad jag nu haft äran anföra, tacktes Kongl. Akademien finna: att Hr VILLEs' arbete icke allenast är af högt värde för den omsorg och utomordentliga noggrannhet hvarmed försöken, under loppet af flere år, blifvit verkställda, utan äfven för de vigtiga resultat hvilka vunnits och hvarigenom våra kunskaper, i växtfysiologiskt hänseende, erhållit en stadga och tillökning, som äfven i det praktiska lifvet måste blifva fruktbarande.»

3. *Bref från Hr J. A. Wahlberg.* — Hr A.

Retzus hade från denne resande naturforskare emottagit följande bref, dateradt Scheppmanedorff d. 22 Juni 1854.

»Min färd till Hvalfiskviken ombord på the Witch of the wave gick temligen långsamt, emedan fartyget under vägen intog guano-last. Härunder måste alla mina saker stå på däck och, ehuru betäckta, fullyrades de belt och hållet af det fina guano-danvet. En ersättning för allt detta obehag var att jag fick tid att erhålla åtskilligt från de små öarne vid kusten, såsom Possession Island, Long Island (på hvilken vi ihjälslögt omkring femtio st. Otarier, af hvilka jag preparerade en gammal hanne), Halifax Island, Pinguin Island, Ichaboe, Mercury Island. Penguinar af den allmänna arten, fyra arter *Graculus*, *Podiceps auritus* (*nigricollis* *Sunnev.*), *Sula melanura*, ett par *Larus*-arter, samt *Huematopus capensis* och några vanliga vadare voro nästan de enda foglar här förekommo. Häraf synes mig kanhända två *Graculus*-arter nya, utmästare har jag dem ej upptagna bland mina afrikanska foglar. Jag kallar den en *Graculus coronatus*, men hinner nu ej sända beskrifningen. Den 22 Mars afseglade vi från Taffelvikens och den 14 April ankommo vi till Hvalfiskviken, hvarest millioner döda fiskar dels flytande på vattnet och dels i högar uppkastade på stranden förpestade luften. Tusentals tjärnor, *Flamingos*- och *Lestris*-arter m. fl. vistades här. Jag erhöi två arter af *Lestris*, den ena en liten mig obekant, den andra liknande *L. pomarina*. Mina saker landades på den låga, sandiga hafsetranden, mit tält uppslogs, och vi ordnade oss på bästa vis, samt skickade en *Namaqua* med bref upp till Missionären Nam, med anhängan om oxar. En natt steg vattnet så högt, att vi voro rundt omsluppe såsom på en liten ö. Vi fängade mycket fisk som uppkastades af vågorna och sköto *Flamingos* till föda. Efter några dagar kom ett spann oxar, och jag begaf mig af med en vagn. Under vägen genom den djupa flygsanden afbröts tistelstängan, men vi arbetade oss dock fram till en stor sandslätt. Här förmådde oxarne ej mera, utan jag måste återskicka

dem och afvägta andra friskare; under denna tid, en natt, rymde allt nytt folk, tre man, hvilka jag medtagit från kapstaden, och lemnade mig alldeles ensam vid vägen. Hr Buss folk ankommo dock om aftonen följande dag med andra oxar, så att jag lyckligen anlände till hans bostad Scheppmansdorff. Några dagar derefter fick jag äfven min andra vagn med Linndorff och den enda trogne kusken Jacob hit upp. Nu återstod att skaffa egna oxar; för detta ändamål hyrde jag tre Namaquas och tre Damaras med fem rid- och packoxar, och begaf mig, den 10 Maj, med tre hundar och något bytesvaror på väg till Swakopfloden. I tjugu timmar gingo och red vi utan uppehåll öfver en ofantlig sandslätt och nådde sedan floden, hvars bädd var sandig och utan en droppe synligt vatten; men på några ställen kunde man medelst gräfnings två till tre fot djupt erhålla sådant. Vi följde floden uppåt till nära Otjimbingue och vandrade härifrån genom vildmarken till Etikams (varmt vatten), Jonker Afrieanders, den mäktigaste Namaqua-höfdingens residens. Här underrättades jag, att fyra dagar före min ankomst, hade han blifvit besfallen af sex andra Namaqua-höfdingars förenade styrka, men lyckligen slagit dem tillbaka. Han sjelf, jemte en sextio man, alla beväpnade med gevär, medföljde mig till valplatsen, hvarest det såg ohögligt ut, flera friska grafvar och mycket blod i sanden och på stenarne. Jag stannade hos honom en dag, men kunde ej erhålla några oxar för annat än krut, och detta hade jag i Kap förbundit mig att ej afgifva till infödingarne. Några fettsvansade får erhöles dock, hvilket var högst nödigt, emedan häruti landet vildt är temligen sällsynt. Jag begaf mig från honom direkte till hans fiende Willem Swartboy och erhöll ett budskap till denne, att han genast skulle lemna landet och att Jonker efter någon tid skulle komma och se efter om han åtydtyt tillsägelsen. Hos Willem Swartboy lyckades jag säga bättre, folket var i upplösningstillstånd och rufvarhorder kringströfvade på plundring. Jag fick dock, för varor, fem oxar af missionären Klunsmidt. Getter och får hade jag nu tillbytt

mig så, att jag hade en hjord af omkring tjugu stycken, get-
 terna hufvudsakligen för mjölken. Äfven hos Jan Boois, en
 annan höfding, kunde jag intet erhålla. Vid vandringen här-
 från kommo mina vägvisare vilse ibland vidsträckta sanddyner
 och sandberg, så att vi först på fjerde dagen erhöilo vatten.
 En ridoxe stupade härunder, och nära hade det så gått med
 oss alla om ej, när nöden var som störst, hjälpen hade kom-
 mit. Den ena Damaran var den förste, som tillförde mig vat-
 ten och jag skänkte honom genast en skjorta, en stor present
 här. Vi ankommo till t'kuisip-flodens sandiga bädd, hvarst
 vatten hörer till sällsyntheter och endast kan erhållas genom
 djup gräfnig. Alla floderna här i landet äro af denna be-
 skaffenhet, de hafva rinnande vatten endast under två, tre
 månader i början af året och ibland på flera år intet. Herr-
 liga Acacie-arter växa i flodbäddarne och deras affallna skidor
 utgjorde kreaturens nästan enda kost, ty gräs fanns föga. Den
 46 Juni ankom jag åter till Scheppmansdorff, hvarst LIND-
 HOLM och JACOB under min bortovaro på tillsägelse hade upp-
 rättat ett litet packhus. Två af mina hundar hade omkommit
 under vägen, den ena sannolikt dödad af en tiger. Jag hade
 sett temligen mycket vildt, såsom Giraffer, Gamsbockar, Sten-
 bockar, Klippspringare, Duykers, Zebrar, Strutsar, samt spår
 efter Rhinoceros och Lejon, men gifvit mig föga tid att jaga
 derefter. Vilda Fasaner och Perlhöns, såsom lättare åtkomliga,
 fälldes till föda under vägen. Jag erhöil tre ex. af den säll-
 synta *Falco semitorquatus* SM., *Lanioturdus torquatus*, *Cossypha*
brevipes, *Dryocæca ocularia*, samt en för mig ny fogel, hvars
 slägte är mig osäkert. Jag har nu fått tillsammans fem kör-
 oxar och två ridoxar; men detta är långt ifrån tjugufyra eller
 flora. Årstiden är ock så långt framskriden, att jag nu ej
 tänker på någon färd innåt landet förr än med October månad
 eller något sednare, när regntiden inträffar. Jag skall under
 tiden samla här i kustlandet. Karakteren af detta sednare är
 en fullkomlig öken, intet annat än flygsand i flera hundrade
 fots höga sandberg, intet vatten och föga vegetation, endast

flodbäddarne göra härifrån undantag. Regn. hörer till sällsyntheter, men detta ersättes af så stark dagg och dimma under nätterna, att marken är våt, som efter ett regn. I flygsanden växer den högst märkvärdiga Naras-frukten. Växten är ljusgrön, bladlös, taggig, något nedliggande, blommorna gulgröna, och frukten af ett kvarter i diameter eller något mindre, gulgrön och taggig. Den innesluter en mängd kärnor, liknande gurkkärnor, och dessa ligga i en saftig gul pulpa, som har en gräddliknande angenäm smak och är mycket närande, men förtärd af ovana personer åstadkommer hudlöshet i munnen. Kärnorna torkas och ätas, de smaka som mandlar, och pulpan utbreddes på flygsanden och torkas af infödingarne, samt användes sedan till soppa e. d. Hela stammar lefva nästan uteslutande af denna frukt. Jag hade mycket nu att skrifva om, men medhinner ej. Jag har hittills haft mycket motgångar och föga kunnat samla; men jag är vid fullkomligt godt mod och helsa och kan ännu intet säga om min återkomst till hemlandet; jagten hänförer mig ännu och krafterna synas stå bi.»

4. *Gamla grufvor igenvallade af mossor.* —

Hr Mag. K. A. HOLMGREN i Upsala hade insändt följande meddelande:

»I Godegårds socken af norra Östergöthland och på hemmanet Linnehults egor finner man en mängd större och mindre grufvålor, bland hvilka dock somliga af den med verkliga förhållandet obekante säkerligen skulle tagas för vanliga Sphagnum-mossar, sådana som de förekomma i våra skogstrakter. Detta så mycket hellre, som marken rundt omkring är temligen jemn, och en tät småskog af gran med en och annan reslig tall uti undangömmen allt, som kunde häntyda på att en grufva här fordom arbetats. Sjelfva mossbädden i dessa igenvallade grufvor, som i likhet med förhållandet hos våra vanliga Sphagnum-mossar ej fullt när stränderna, består öfverst af Sphagnum acu-

lifolium, Menyanthes, Comarum, Briophorum vaginatum, några Carices och Drosera rotundifolia. De med trakten bekante veta dock att berätta, under hvilka namn hvarje af dessa grufvor förr arbetats och med Bergmästare-relationernas tillhjälp kan man lätt kontrollera dessa uppgifter. Då dessa relationer dessutom upplysa när grufvorna sista gången upptogs, så är man härigenom i stånd, att åtminstone uppgifva den grös, som åldern af de öfver deras öppningar numera befintliga mossbäddarne icke öfvereskider. Utom dessa fullständigt igenvaldade grufhålor finnas äfven flera, i hvilka mossbildningen dels nys inträdt dels mer och mindre framskridit. Här erbjuder sig således ett ypperligt tillfälle att observera mossbädden under dess olika utvecklings-stadier, samt sedan genomskära densamma i de grufhålor, der den är äldst, för att der söka på olika djup återfinna hvad man förut sett vara stadt under bildning.

I hålor, som blott för kortare tid sedan blifvit igenlagda, ser man närläro stränderna tunna mattor af Hypnum cordifolium jemte blad af Sparganium natans. Längre ut i bassioen frodas Menyanthes i ett löst sammanhängande lager. I detta samla sig tufvor af Carex canescens m. fl. till små ögrupper och då härigenom några fastare punkter blifvit danade, infinner sig genast den egentliga mossbildningen. Enskilda stånd af Sphagnum cuspidatum slå sig ned vid basen af dessa tufvor, intränga mellan blad och strån af de växter, hvaraf tufvorna utgöras, samt sprida sig snart öfver hela Menyanthes-mattan. Finnes en trädstam tillfälligtvis nedvräkt på vattenytan; så befordras häraf sardesles hastigheten af mossbildningens inträdande och fortgång. Så är det intressant att se, hurusom botten för öfrigt kan hafva en från all vegetation helt och hållet fri vattenspegel, men om t. ex. en bjelke vid grufvans igenläggande blifvit kvarlemnad och vattnet nått densamma, så infinna sig genast Carices och Sphagnum cuspidatum på dess sidor och utskjuta derifrån liksom de första iskristallerna från strån och dylikt, som kommit att ligga i ett tillfrysande vatten. Nu fortgår Sphagnumbildningen: blad och strån af Carex-arterna vissna

och öfverväxas, och mossan får sålunda efter hand allt bättre och bättre fäste.

Genomskär man nu mossbädden i en håla der den före-
kommer som tjockast, så återfinner man allt hvad man kunnat
vänta sig. Djupast ned ett mörkare lager, som mer eller min-
dre lidit af förruttelse, men som alltid kan igenkännas såsom
lemningar af *Hypnum cordifolium*. Detta lager finnes alltid
närmast vattnet, utom der man träffar *Carex*-tufvor, som då
intaga dess plats. Straxt ofvan detta lager vidtager sjelfva
Sphagnum-lagret, som är lösare och mera lidit af förruttelse,
ju djupare ned det ligger. Hela bädden är tät genomfäst af
stjelkarne af *Menyanthes* och *Comarum*, hvilkas rötter hänga
ned i vattnet nedom alla andra organiska bildningar.

Bland dessa grufvålor hade den s. k. Bredajögrufvån den
tjockaste mossbädden. Sjelfva grufvåns djup var också något
större än de öfrigas, nemligen mellan tjugu och trettio alnar.
Enligt Bergmästare-relationerna upptogs den för sista gången
år 1655, hvaraf man således finner, att den mossvall, som nu
betäcker densamma icke var 200 år gammal, då jag 1849 *)
uppmätte dess tjocklek. Som det dessutom heter i samma
Bergmästare-relationer, att i grufvån finnes mycket skön malm,
så är det sannolikt att grufvån ännu en tid bearbetats och att
således mossbädden är vida yngre än 200 år. Så nog som
mossbäddens genomskärning kunde göras, så låg både på ytan
och djupast ned vid vattnet var af en lös byggnad med obe-
stämda gränser, tyckte den sig vara något öfver en och enjfer-
dedels aln.

Det anmärkningsvärda vid dessa iakttagelser, anser jag
ligga deruti, att såväl bildningen af mossbädden som den ord-
ning, i hvilken de olika växtlagren aflösa hvarandra, äro full-
komligt desamma i alla de på sagda ställe betagna, igenvallade,
grufvorna. Detta tycker mig nemligen bentyda på ett förhål-

*) Tillfölje af en godhetsfull inbjudning af Hr Brukspatron P. A.
Wassén valdes jag i tillfälle att göra här meddelade iakttagelser.

lande analogt med det, som i afseende på trädelagen följer af Hr STEENSTRUP *) berömda undersökningar af norra Sjællands torfmossar, nemligen att det ena växtslaget för sin fortkomst förutsätter ett annat såsom underlag. Det skulle derföre måhända icke vara utan intresse, om flera undersökningar anställdes öfver byggnaden af våra vanliga Sphagnum-mossar i detta afseende.»

Akademiska angelägenheter.

Akademien utnämnde till Berzeliansk stipendiat, Studeranden vid Vestm. och Dala Nation i Upsala Hr C. E. BERGSTRAND.

Akademien beslöt, att inleda utbyte af skriften med California Academy of natural sciences i S. Francisco och Society of natural history i Boston.

Från Lieutnant MAURY hade ingått underrättelse om en å Washingtons observatorium af Mr FRACUSON den 2 September upptäckt planet, benämnd Euphrosyne.

SKÄNKER.

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af Kongl. Norska Universitetet i Christiania.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. B. 8. H. 3. 1854. 8:o.

Af Chemical Society i London.

The Quarterly Journal. VII: 3 (Oct. 1854). 8:o.

Af Société Géologique i Paris.

Bulletin de la société. T. XI. F. 19—31. 8:o.

Af Société Holland. d. sciences à Haarlem.

Natuurkund. Verhandelingen. 2:d Verz. Deel 11. H. 1. 4:o.

Af Commission génér. pour la reconnaissance géologique de la Neerlande.

Verhandelingen uitg. door de Commissie. Deel. 2. Haarlem 1854. 4:o.
Verslag van de Commissie. Oct. 1853—Oct. 1854. 4:o.

*) Det Kongl. Danske Vidensk. Selsk. Naturv. og Math. Afh. Deel IX.

Af Uggförelsen.

Dumont, Annael, Carte géologique de la Belgique, exécutée par ordre du gouvernement. (Uti 9 blad, atlasfolio).

Af Hr Edvard Cooper.

Catalogue of stars near the Ecliptid observed at Markree, 1848—50. Vol. I. Dublin 1851. 8:o.

Af Centre-Amiral Virgin.

Annales de la Société universelle pour l'encouragement des arts et de l'industrie. Année 1854. Paris. 8:o.

Woolnough, C. W., History and description of the process of marbling, as applied to paper et bookedges, London 1854. 12:o.

Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Hr Professor Huss.

En *Fringilla punctularia*.

Af Hr Apothekaren Hamnström.

Yngel af *Astacus fluviatilis*.

Botaniska afdelningen.

Af Hr Professor E. Fries.

Herbarium normale plantarum rariorum et criticarum Sueciæ. Fasciculus XIV. Upsaliæ 1853. Fol.

Af Studerande Odén.

Femtiofyra arter från botaniska trädgården i Upsala, serdeles nyare arter af *Compositæ* från Nordamerika.

Af Studerande Westerlund.

Fyratiosex arter från Bleking, Småland och Öland, t. ex. *Juncus maritimus*, *Rubus thyrsoides*, *Radula* och *fruticosus*, *Hypericum humifusum* (Bleking), *Viola uliginosa* (Småland), *Lepidium draba* (Carlskrona), *Plantago minor* (Öland), m. fl.

Af Studenten H. O. Lundeberg.

Sexton fanerogamer från Dalarna, t. ex. *Carex vaginata*, *tenella*, *lobi-
cea*, *globularis* och *irrigua*, samt femtio löfmossar och åtta lever-
mossar från Dalarna, flera af dessa i talrika exemplar.

Mineralogiska afdelningen.

Af Mr Löjtnant Lättman.

Två stuffer kristalliserad kopparkis.

*Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i October 1854.*


	Barometern reducerad till 0. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkingar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,44	25,37	25,20	+ 3,0	+10,2	+11,0	V.N.V.	V.S.V.	V.S.V.	Klart
2	25,04	25,10	25,17	+12,5	+15,0	+11,0	V.S.V.	V.S.V.	V.N.V.	Storm
3	25,15	25,00	24,67	+ 5,0	+ 7,9	+11,7	—	O.S.O.	O.S.O.	Regn
4	24,39	24,61	24,86	+ 7,8	+ 3,5	+ 3,8	—	V.N.V.	V.N.V.	—
5	25,00	24,76	24,62	+ 0,6	+ 8,5	+ 9,7	V.	S.S.V.	S.S.V.	—
6	24,67	24,92	25,05	+ 7,3	+ 9,5	+ 4,7	V.S.V.	V.S.V.	V.	Klart
7	25,20	25,30	25,47	+ 1,9	+ 7,0	+ 2,6	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
8	25,66	25,70	25,73	— 0,7	+ 7,5	+ 4,9	V.N.V.	V.N.V.	V.S.V.	—
9	25,72	25,72	25,70	+ 4,0	+11,0	+ 6,5	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
10	25,67	25,63	25,61	+ 3,0	+10,4	+ 8,6	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
11	25,58	25,57	25,56	+ 7,3	+10,0	+10,1	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Mulet
12	25,57	25,66	25,78	+10,0	+15,9	+ 7,5	S.	S.S.V.	N.	Regn
13	25,83	25,87	25,83	+ 7,0	+11,0	+ 7,0	N.O.	N.O.	N.O.	Mulet
14	25,78	25,78	25,79	+ 4,0	+12,4	+ 6,0	—	V.S.V.	V.	Dimma
15	25,76	25,71	25,66	+ 4,0	+ 8,2	+ 4,7	V.S.V.	V.S.V.	S.S.O.	Mulet
16	25,52	25,48	25,43	+ 4,6	+ 9,2	+ 6,3	S.S.V.	S.S.V.	O.	—
17	25,29	25,17	25,13	+ 7,0	+ 9,6	+ 9,3	O.N.O.	O.N.O.	—	Regn
18	25,20	25,25	25,27	+ 7,1	+ 8,1	+ 8,4	N.N.V.	O.N.O.	O.S.O.	—
19	25,13	25,08	25,02	+ 9,2	+11,1	+ 9,5	V.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	—
20	24,96	25,09	25,14	+ 8,0	+ 9,5	+ 6,2	S.S.V.	S.V.	S.	—
21	25,13	25,14	25,07	+ 8,0	+11,3	+ 8,1	S.	S.	S.	Hafkl.
22	24,97	24,91	24,88	+ 7,3	+10,0	+ 7,3	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	Mulet
23	24,78	24,78	24,91	+ 7,1	+ 9,3	+ 7,6	S.S.O.	—	V.	Regn
24	24,98	25,00	24,98	+ 2,4	+ 9,1	+ 5,6	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Klart
25	24,98	25,01	24,98	+ 4,2	+ 8,0	+ 4,2	S.V.	S.S.V.	O.N.O.	Hafkl.
26	24,87	24,68	24,85	+ 6,4	+ 9,0	+ 4,9	O.N.O.	O.S.O.	V.N.V.	Regn
27	25,27	25,41	25,54	+ 2,3	+ 8,0	+ 3,3	V.	V.S.V.	V.S.V.	Hafkl.
28	25,73	25,90	25,93	— 1,3	+ 4,0	+ 1,0	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klart
29	25,85	25,85	25,82	+ 4,0	+ 6,2	+ 4,7	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
30	25,70	25,73	25,81	+ 4,6	+ 8,0	+ 4,9	S.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	—
31	25,82	25,79	25,73	+ 4,0	+ 9,2	+ 3,0	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Hafkl.
Me- dium	25,311	25,322	25,329	+ 5,17	+ 9,34	+ 6,65	Nederbörden = 1,002 dec. tum.			
	25,321			+ 7,05						

i November 1854.


	Barometern reducerad till 0°. Decimaltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmärkning- gar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	25,69	25,63	25,67	+ 4,0	+ 10,0	+ 6,0	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Klart
2	25,64	25,57	25,46	+ 6,0	+ 10,2	+ 9,6	V.	V.S.V.	V.S.V.	Halfkl.
3	25,28	25,05	24,88	+ 7,4	+ 6,3	+ 7,0	S.V.	S.S.V.	S.	Mulet
4	24,79	24,80	24,90	+ 5,2	+ 6,3	+ 3,1	S.	N.N.O.	N.N.V.	Regn
5	24,97	24,97	25,03	— 0,1	+ 0,2	— 0,5	V.N.V.	V.N.V.	N.V.	Snö
6	25,16	25,35	25,48	— 3,0	+ 0,1	— 2,5	N.V.	N.V.	—	Klart
7	25,49	25,44	25,36	+ 0,9	+ 5,0	+ 4,6	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
8	25,16	25,05	25,12	+ 7,2	+ 10,0	+ 1,0	V.S.V.	V.S.V.	V.	Regn
9	25,13	25,18	25,22	— 2,2	+ 1,3	— 1,0	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klart
10	25,21	25,18	25,17	— 6,0	— 2,0	— 5,0	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
11	25,17	25,14	25,17	— 7,0	— 3,0	— 7,0	—	—	V.N.V.	—
12	25,20	25,34	25,47	— 7,8	— 4,0	— 2,2	N.N.V.	V.N.V.	N.	Snö
13	25,55	25,53	25,45	— 3,0	— 0,3	— 0,5	N.	N.	N.N.O.	Mulet
14	25,31	25,22	25,35	+ 0,2	+ 1,0	+ 1,7	N.	N.	O.S.O.	Snö
15	25,37	25,23	25,21	— 1,0	+ 1,0	+ 3,0	N.N.V.	N.	N.N.O.	—
16	25,27	25,33	25,36	+ 0,7	+ 0,7	— 2,0	N.N.O.	N.N.O.	N.	Klart
17	25,40	25,44	25,46	— 3,0	+ 0,2	— 1,0	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Mulet
18	25,46	25,46	25,47	— 1,9	— 1,0	+ 2,4	N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Snö
19	25,49	25,56	25,61	— 1,0	— 3,5	— 3,8	N.N.V.	N.N.V.	N.N.V.	Mulet
20	25,63	25,64	25,58	— 2,5	— 4,1	— 5,4	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	Snö
21	25,46	25,37	25,34	— 6,0	— 3,4	— 2,9	O.N.O.	O.S.O.	O.N.O.	Mulet
22	25,35	25,34	25,32	— 3,0	— 2,7	— 4,0	O.N.O.	O.N.O.	N.N.O.	—
23	25,22	25,12	25,07	— 2,5	— 4,0	— 4,0	O.N.O.	O.N.O.	O.N.O.	Snö
24	25,14	25,20	25,24	— 5,3	— 5,8	— 5,9	N.N.O.	N.N.O.	N.N.O.	—
25	25,20	25,17	25,19	— 5,7	— 4,3	— 4,0	N.N.O.	N.N.O.	N.	—
26	25,22	25,27	25,24	— 6,0	— 6,9	— 5,6	N.N.V.	V.N.V.	V.	Mulet
27	25,16	25,13	25,09	— 1,7	— 0,9	+ 2,2	V.	V.	V.	—
28	25,05	24,93	24,78	+ 0,2	+ 0,2	— 0,2	S.S.V.	V.S.V.	S.S.V.	—
29	24,59	24,44	24,39	+ 0,5	+ 1,9	+ 2,0	S.S.V.	S.S.V.	S.S.O.	Snö
30	24,37	24,35	24,47	+ 1,4	+ 1,6	+ 1,0	—	S.S.V.	S.S.V.	Regn
Me- dian	25,238	25,214	25,218	— 1°18	+ 0°34	— 0°46	Nederbörden = 0,261 dec. tum.			
	25,223			— 0°43						

i December 1854.

	Barometern reducerad till 0°. Decimalltum.			Thermometern Celsius.			Vindarna.			Anmär- ningar.
	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
1	24,58	24,53	24,48	— 0°3	+ 0°6	+ 0°3	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Mulet
2	24,55	24,60	24,62	— 4,6	— 2,1	— 4,5	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Klart
3	24,62	24,72	24,85	— 5,0	— 2,0	— 3,9	V.S.V.	V.N.V.	V.N.V.	Mulet
4	24,91	24,96	24,98	— 8,1	— 7,8	— 8,0	—	—	—	Dimma
5	24,98	24,99	24,82	— 2,0	— 1,0	+ 2,5	—	—	S.S.V.	Mulet
6	24,74	24,76	24,84	+ 3,0	+ 2,5	+ 3,2	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	Halfkl.
7	24,95	25,14	25,24	+ 1,0	— 0,8	— 4,0	V.N.V.	N.N.V.	V.N.V.	Snö
8	25,25	25,00	24,70	— 6,9	— 1,0	+ 1,0	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
9	24,65	24,70	24,81	+ 2,7	+ 3,0	+ 2,0	S.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Mulet
10	24,88	25,02	25,09	0,0	— 1,0	— 4,6	N.N.V.	N.N.V.	V.N.V.	Halfkl.
11	25,24	25,33	25,33	— 5,5	— 3,9	— 1,0	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
12	25,34	25,36	25,40	+ 0,7	+ 0,5	+ 1,0	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
13	25,46	25,48	25,35	+ 1,4	— 0,3	+ 0,2	S.S.V.	S.S.V.	S.S.V.	—
14	24,99	24,89	24,97	+ 1,0	+ 2,0	— 2,1	S.S.V.	S.S.V.	V.	Snö
15	24,96	24,87	24,88	— 1,7	+ 0,1	— 2,0	S.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	Mulet
16	24,81	24,86	24,91	— 1,1	— 5,2	— 6,1	N.V.	N.V.	N.V.	—
17	24,88	24,88	24,87	— 9,0	— 5,6	— 4,0	S.V.	V.S.V.	S.	Klart
18	24,82	24,84	24,92	— 1,0	+ 1,3	+ 1,0	S.S.V.	S.	S.S.O.	Mulet
19	25,09	25,18	25,18	0,0	+ 1,8	+ 0,5	O.	S.S.O.	S.S.O.	—
20	25,17	25,20	25,22	+ 1,7	+ 2,0	+ 1,0	S.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	—
21	25,21	25,21	25,12	— 1,6	— 1,2	— 1,2	N.N.V.	V.N.V.	S.V.	—
22	24,75	24,69	24,56	+ 0,5	— 0,3	+ 0,3	V.S.V.	V.S.V.	V.	Halfkl.
23	24,54	24,63	24,71	— 9,2	— 7,5	— 5,1	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klart
24	24,79	24,86	24,97	— 6,0	— 7,0	— 9,3	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
25	25,00	24,78	24,44	— 14,0	— 0,4	+ 0,5	S.S.V.	S.	S.	Snö
26	24,42	24,48	24,62	+ 0,3	— 0,2	— 0,7	V.S.V.	V.S.V.	V.S.V.	—
27	24,77	24,88	25,06	— 6,9	— 4,9	— 8,2	V.S.V.	V.N.V.	V.N.V.	Klart
28	25,06	25,23	25,35	— 7,0	— 4,0	— 4,2	V.N.V.	V.N.V.	V.N.V.	—
29	25,51	25,51	25,20	— 5,1	— 8,0	— 2,0	V.N.V.	V.N.V.	S.S.O.	Mulet
30	25,19	25,24	25,00	— 6,2	— 6,0	— 1,5	V.N.V.	V.N.V.	S.S.O.	Dimma
31	24,78	24,93	24,89	0,0	— 1,2	— 2,5	N.O	N.N.O.	V.N.V.	Snö
Me- dium	24,932	24,960	24,948	— 2°87	— 1°86	— 1°98				
	24,947			— 2°24						














10




70












7



Widener Library



3 2044 092 557 446